

KNOWLEDGE, UNDERSTANDING, APPLICATION,
ANALYTICAL & CONCEPTUAL

تکنیکس کی روشنی میں مرتب کیے گئے سوالات پر مشتمل اپنی نوعیت کی بہترین کتاب

ہزار

امتحان بائیولوجی

PCTB کے نئے نصاب 2025ء کے مطابق

9

سالانہ پیپر کا مکمل حل

- ♦ ٹاپک وائر انشائی طرز سوالات
- ♦ انشائی و معروضی طرز سوالات
- ♦ مکمل حل شدہ مشقی سوالات
- (i) ٹاپک وائر MCQ's
- (ii) ٹاپک وائر SHORT QUESTIONS
- ♦ مکمل حل شدہ اضافی معلوماتی سوالات

اساتذہ کرام اور ذہین طلبہ طالبات کی پہلی چوائس

KNOWLEDGE, UNDERSTANDING, APPLICATION,
ANALYTICAL & CONCEPTUAL

تکنیکس کی روشنی میں مرتب کیے گئے سوالات پر مشتمل اپنی نوعیت کی بہترین کتاب

ہزار

نصابی

بائیولوجی

PCTB کے نئے نصاب 2025ء کے مطابق

اساتذہ کرام اور ذہین طلبہ طالبات کی پہلی چوائس

9





جملہ حقوق بحق پبلشر محفوظ ہیں۔

اس کتاب کے نفس مضمون کلی یا جزوی طور پر پبلشرز کی پیشگی اجازت کے بغیر نقل یا نشر کرنے والے خلاف پریس اینڈ پبلی کیشنز آرڈیننس/کاپی رائٹ ایکٹ مجریہ 1962 تصحیح شدہ 1992 اور 2000 تحت کارروائی میں لائی جائے گی۔
محمد عالمگیر عالم (ایڈووکیٹ ہائیکورٹ)



پروجیکٹ ڈائریکٹر:

محمد آصف سعید

مصنفین:

پروفیسر ندیم اعوان M.Phil Zoology

مس عطیہ تنیم آصف M.Phil Botany

پرنٹنگ مینیجر:

طارق رشید

ہیڈ آفس:

ہمڈارڈ کتب خانہ ریسرچ اینڈ ڈویلپمنٹ سنٹر
ریجنل گن روڈ لاہور
فون: 042-37211337

مینیجنگ ڈائریکٹر:

کاشف حسین گوہر

پروجیکٹ مینیجر:

عسلام مصطفیٰ

کمپوزنگ، لے آؤٹ اینڈ ڈیزائننگ:

ہمڈارڈ کمپوزنگ اینڈ ڈیزائننگ سیکشن

پرنٹنگ پریس:

میاں ارشد پرنٹنگ پریس، لاہور

ہمڈارڈ کتب خانہ ریسرچ اینڈ ڈویلپمنٹ سنٹر

042-37211337 فون 042-37211337
Email: hamdard.kutub@gmail.com, visit us: www.hamdardkutubkhana.com.pk



پیش لفظ

اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس کی توفیق سے ہم **ہمڈارڈ** امتحانی بائیولوجی فہم کو ملی صورت میں پیش کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس کتاب میں وہ تمام مواد اور ہدایات موجود ہیں جو امتحانی نقطہ نظر سے طلبہ و طالبات کے لیے ضروری ہیں۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ بازار میں "بائیولوجی" کے خلاصہ جات موجود ہیں مگر انہیں اس بات کا ہے کہ ان میں سے زیادہ تر کتب محض کاروباری نقطہ نظر سے نہایت جلد بازی سے تحریر کی گئی ہیں۔ وہ کتب جماعت نیم کے طلبہ کی امتحانی ضروریات کو (بالخصوص کنسپچوئل انشائیہ، معروضی اور مختصر سوالات کو حل کرنے میں) پورا کرنے سے بالکل عاری ہیں۔ دور حاضر میں سخت مقابلے کے خوب سے خوب تر کی تلاش میں طلبہ کو بہترین مواد کے انتخاب اور حصول میں کافی مشکل پیش آتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ زلزل آنے کے بعد ہی مواد کے معیاری ہونے یا نہ ہونے کا پتہ چلتا ہے لیکن تب تک وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ **ہمڈارڈ** کتب خانہ آردو بازار لاہور فروغ علم کے لیے گزشتہ نصف صدی سے زیادہ عرصہ سے سرگرم عمل ہے اور حکومت کے شانہ بشانہ تعلیمی عمل میں مثبت کردار ادا کر رہا ہے۔ چنانچہ ادارہ ہذا اس کوشش میں ہمیشہ سے مصروف رہا ہے کہ معیاری امدادی کتب نئے تعلیمی و امتحانی نظام کے مطابق مرتب کر کے مارکیٹ میں لائے تاکہ طلبہ نئے تعلیمی نظام اور امتحانی طریقہ کار کو سمجھ کر اعلیٰ نمبروں سے کامیابی حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ادارے کی شائع کردہ تمام کتب کو خاطر خواہ پذیرائی حاصل ہے۔ زیر نظر کتاب **ہمڈارڈ** امتحانی بائیولوجی فہم اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔

ہمڈارڈ امتحانی بائیولوجی فہم کی مختصر خصوصیات:

- کتاب میں ہر قسم کی ذہنی استعداد رکھنے والے طلبہ و طالبات کے لیے آسان اور عام فہم مواد فراہم کیا گیا ہے۔
- کتاب محکمہ تعلیم کے نئے طرز امتحان اور جدید تکنیکس (Knowledge, Understanding, Application, Analytical & Conceptual) کے عین مطابق سادہ اور عام فہم انداز میں مرتب کی گئی ہے۔
- کتاب کو جدید امتحانی نقطہ نظر سے سوال جوابات تحریر کیا گیا ہے۔
- تفصیلی سوالات میں موضوع کے ہر پہلو کو نہایت آسان اور جامع عنوانات کے ساتھ تحریر کیا گیا ہے۔
- کتاب میں مشقی سوالات کا مکمل اور جامع حل موجود ہے۔
- جدید طرز امتحانات کے پیش نظر ہر سبق کے آخر میں کنسپچوئل، انشائیہ، معروضی اور مختصر سوالات و جوابات بھی شامل کیے گئے ہیں۔
- کتاب میں مختصر جوابی سوالات اور کثیر الانتخابی سوالات کی کثیر تعداد شامل کی گئی ہے تاکہ طلبہ کو تیاری میں کوئی وقت محسوس نہ ہو۔
- مختصر سوالات کے جوابات بورڈ کی جاری کردہ ہدایات کے عین مطابق دیے گئے ہیں اور ہر قسم کی غیر ضروری طوالت سے اجتناب کیا گیا ہے۔
- تفصیلی سوالات کے جوابات میں عموماً طلبہ الجھن اور آکٹا ہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان سوالات میں موضوع کے ہر پہلو کو نہایت آسان، جامع اور عنوانات کے ساتھ تحریر کیا گیا ہے۔

عزیز طلبہ و طالبات! **ہمڈارڈ** امتحانی بائیولوجی فہم ماہرین تعلیم اور تجربہ کار اساتذہ کی آرا کو مد نظر رکھ کر نئے طرز امتحان کے عین مطابق مرتب کی گئی ہے۔ کوشش کی گئی ہے کہ کتاب افلاطون سے پاک ہو، تاہم اگر کہیں قسم نظر آئے تو ادارہ کو ضرور آگاہ فرمائیں۔ ادارہ آپ کا شکر گزار ہوگا۔
امید واثق ہے کہ اساتذہ کرام اور طلبہ ہماری اس کاوش کو ضرور سراہیں گے اور مارکیٹ میں موجود بائیولوجی کی دیگر کتب کی نسبت **ہمڈارڈ** امتحانی بائیولوجی فہم کو بہتر پائیں گے اور یہ کتاب ان کی اولین ترجیح ہوگی۔ کتاب کو بہتر بنانے کے لیے معزز اساتذہ کرام کے مفید مشوروں کا انتظار رہے گا۔



صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر
1	بائیولوجی کی سائنس	7	ایئر انکسٹر	162
2	انسانی طرز سوالات	8	انسانی طرز سوالات	162
3	معروضی طرز سوالات	9	معروضی طرز سوالات	167
4	مشقی سوالات کے جوابات	10	مشقی سوالات کے جوابات	174
5	بائیولوجی کی سائنس	11	بائیولوجی کی سائنس	178
6	انسانی طرز سوالات			
7	معروضی طرز سوالات			
8	مشقی سوالات کے جوابات			
9	پودوں کی فزیالوجی			
10	انسانی طرز سوالات			
11	معروضی طرز سوالات			
12	مشقی سوالات کے جوابات			
13	پودوں کی فزیالوجی			
14	انسانی طرز سوالات			
15	معروضی طرز سوالات			
16	مشقی سوالات کے جوابات			
17	پودوں کی فزیالوجی			
18	انسانی طرز سوالات			
19	معروضی طرز سوالات			
20	مشقی سوالات کے جوابات			
21	پودوں کی فزیالوجی			
22	انسانی طرز سوالات			
23	معروضی طرز سوالات			
24	مشقی سوالات کے جوابات			
25	پودوں کی فزیالوجی			
26	انسانی طرز سوالات			
27	معروضی طرز سوالات			
28	مشقی سوالات کے جوابات			
29	پودوں کی فزیالوجی			
30	انسانی طرز سوالات			
31	معروضی طرز سوالات			
32	مشقی سوالات کے جوابات			
33	پودوں کی فزیالوجی			
34	انسانی طرز سوالات			
35	معروضی طرز سوالات			
36	مشقی سوالات کے جوابات			
37	پودوں کی فزیالوجی			
38	انسانی طرز سوالات			
39	معروضی طرز سوالات			
40	مشقی سوالات کے جوابات			
41	پودوں کی فزیالوجی			
42	انسانی طرز سوالات			
43	معروضی طرز سوالات			
44	مشقی سوالات کے جوابات			
45	پودوں کی فزیالوجی			
46	انسانی طرز سوالات			
47	معروضی طرز سوالات			
48	مشقی سوالات کے جوابات			
49	پودوں کی فزیالوجی			
50	انسانی طرز سوالات			
51	معروضی طرز سوالات			
52	مشقی سوالات کے جوابات			
53	پودوں کی فزیالوجی			
54	انسانی طرز سوالات			
55	معروضی طرز سوالات			
56	مشقی سوالات کے جوابات			
57	پودوں کی فزیالوجی			
58	انسانی طرز سوالات			
59	معروضی طرز سوالات			
60	مشقی سوالات کے جوابات			
61	پودوں کی فزیالوجی			
62	انسانی طرز سوالات			
63	معروضی طرز سوالات			
64	مشقی سوالات کے جوابات			
65	پودوں کی فزیالوجی			
66	انسانی طرز سوالات			
67	معروضی طرز سوالات			
68	مشقی سوالات کے جوابات			
69	پودوں کی فزیالوجی			
70	انسانی طرز سوالات			
71	معروضی طرز سوالات			
72	مشقی سوالات کے جوابات			
73	پودوں کی فزیالوجی			
74	انسانی طرز سوالات			
75	معروضی طرز سوالات			
76	مشقی سوالات کے جوابات			
77	پودوں کی فزیالوجی			
78	انسانی طرز سوالات			
79	معروضی طرز سوالات			
80	مشقی سوالات کے جوابات			
81	پودوں کی فزیالوجی			
82	انسانی طرز سوالات			
83	معروضی طرز سوالات			
84	مشقی سوالات کے جوابات			
85	پودوں کی فزیالوجی			
86	انسانی طرز سوالات			
87	معروضی طرز سوالات			
88	مشقی سوالات کے جوابات			
89	پودوں کی فزیالوجی			
90	انسانی طرز سوالات			
91	معروضی طرز سوالات			
92	مشقی سوالات کے جوابات			
93	پودوں کی فزیالوجی			
94	انسانی طرز سوالات			
95	معروضی طرز سوالات			
96	مشقی سوالات کے جوابات			
97	پودوں کی فزیالوجی			
98	انسانی طرز سوالات			
99	معروضی طرز سوالات			
100	مشقی سوالات کے جوابات			

بائیولوجی کی سائنس

The Science of Biology

یہ باب پڑھنے کے بعد طلباء قابل ہوں گے کہ

- بائیولوجی کی تعریف کریں۔
- بیان کریں کہ قرآن مجید زندگی کی تعلیم کی ہدایات دیتا ہے۔
- بائیولوجی کے بڑے شعبوں کی وضاحت کریں جیسے بائی، ذوالوجی، اور مائیکرو بائیولوجی۔
- بائیولوجی کے ذیلی شعبوں کی تعریف کریں۔
- بیان کریں کہ بائیولوجی دیگر قدرتی سائنس سے کس طرح منسلک ہے۔
- وسیع موضوعات کے لحاظ سے مختلف شعبوں (بائیو فزکس، بائیو کیمسٹری، کمپیوٹیشنل بائیولوجی، بائیو جیو گرافی، بائیو میٹیکس، بائیو ٹیکنالوجی، بائیو اکونمکس) کی پہچان کریں۔
- بائیولوجی سے منسلک کیریئرز کی نشاندہی کریں۔
- مثالوں کے ساتھ وضاحت کریں کہ بائیولوجی قدرتی سائنسز اور لائف سائنسز کا ایک ذیلی حصہ ہے۔
- مثالوں سے ثابت کریں کہ سائنس ایک باہمی تعاون پر مبنی میدان ہے جس میں مختلف شعبوں کے محققین ایک ساتھ کام کرتے ہیں، معلومات کا تبادلہ کرتے ہیں اور نظریات پر تنقید کرتے ہیں۔
- سائنسی طریقہ کار کے مراحل بیان کریں۔
- قدرتی سائنس میں تحقیق کے حوالہ سے ہائپو تھسز، تھیوری اور قانون کی اصطلاحات کی وضاحت کریں۔

انسانی طرز سوالات

مطلوبہ بننے کی مہتمی (Knowledge, Understanding, Application, Analytical & Conceptual) کی ڈیٹا سب کے لیے مہتمی مہتمی

1.1 بائیولوجی اور اس کی شاخیں (Biology and its Branches)

حلال 1: بائیولوجی کی تعریف کریں۔ نیز بائیولوجی کے بڑے شعبوں کی وضاحت کریں۔

جواب: بائیولوجی: بائیولوجی زندگی کی سائنس ہے۔ "بائیولوجی" کا لفظ دو یونانی الفاظ سے آیا ہے، یعنی "بائیوس (bios)" جس کے معنی زندگی ہیں اور "لوگوس (logos)" جس کے معنی مطالعہ ہیں۔ یہ جانداروں کی ساخت، افعال، اور باہمی تعلقات کا علم ہے۔

بائیولوجی کے اہم شعبے (Major Fields of Biology): بائیولوجی ایک وسیع شعبہ ہے جو زمین پر زندگی کے ناقابل یقین ڈائیورسٹی کو سمجھنا، بیان کرنا اور اس کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے سائنسدانوں نے بائیولوجی کو تین اہم شعبوں میں تقسیم کیا ہے:

- ذوالوجی (Zoology): یہ جانوروں کا مطالعہ ہے۔ جس میں جانوروں کی ساخت، افعال، برتاؤ اور تنوع کا علم شامل ہے۔
- باہمی (Botany): یہ پودوں کا مطالعہ ہے۔ اس میں پودوں کی ساخت، نشوونما، تولید، اور ماحول کے ساتھ ان کے تعلقات کا علم شامل ہے۔
- مائیکرو بائیولوجی (Microbiology): خوردبینی جانداروں مثلاً بیکٹیریا اور خوردبینی فکس کے مطالعہ کو مائیکرو بائیولوجی کہتے ہیں۔ اس میں خوردبینی جانداروں کی ساخت، افعال، ممکن، تولید، اور صحت و ماحول پر ان کے اثرات کا مطالعہ شامل ہے۔

سوال نم 1: بایولوجی کی مختلف شاخوں پر نوٹ لکھیں۔

جواب: بایولوجی کی شاخیں (Branches of Biology)

مورفولوجی (Morphology) : یہ جانداروں کی بناوت (form) اور ساخت (structure) کے مطالعے کا علم ہے۔ اس شاخ میں بیرونی شکل و صورت (جیسے شکل، رنگ، پتیرہ وغیرہ) کے ساتھ ساتھ اندرونی ساختوں، جیسے اعضاء، کا بھی مطالعہ کیا جاتا ہے۔

ایٹامی (Anatomy) : یہ بایولوجی کی وہ شاخ ہے جس میں جانداروں، خاص طور پر انسانوں کی اندرونی جسمانی ساخت کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یہ بیماریوں کی تشخیص، طبی آلات کی تیاری، اور زندگی کے معیار کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہے، مثلاً نظام انہضام کے اعضاء کا مطالعہ۔

فزیالوجی (Physiology) : بایولوجی کی یہ شاخ جسمانی حصوں کے افعال کے مطالعہ سے متعلق ہے۔ مثال کے طور پر، خون کی گردش کا نظام کیسے ضروری اجزاء پر رے جسم میں منتقل کرتا ہے۔

ہسٹولوجی (Histology) : نشوز (tissues) کا فرد یعنی مطالعہ ہسٹولوجی کہلاتا ہے۔ نشو سے مراد ایک جیسے سبز کا گروہ ہے جو ایک ہی فعل سرانجام دیتے ہیں۔ نشوز کا تجربہ یہ بیماریوں کی تشخیص، ادویات کے مطالعات، اور اعضاء کی ساخت اور افعال کو سمجھنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔

سائٹولوجی (Cytology) : سبز یعنی زندگی کی بنیادی اکائیوں کا مطالعہ سائٹولوجی کہلاتا ہے۔ انسانی جسم میں 30 کرب سے زیادہ سبز سائٹولوجسٹس سبز اور ان کے آرگنیلز (organelles) کی بنیادی ساخت کو سمجھنے کے لیے تحقیق کرتے موجود ہیں، اور مختلف اقسام کے سبز منفرد ہیں۔ وہ سبز کی تقسیم کے عمل کا بھی مطالعہ کرتے ہیں۔

مالیکیولر بایولوجی (Molecular Biology) : یہ بائیو مالیکیولز (biomolecules) مثلاً کاربوہائیڈریٹس (carbohydrates)، پروٹینز (proteins)، لیپڈز (lipids)، اور نیوکلیک ایسڈز (nucleic acids) کا مطالعہ ہے۔ مالیکیولر بایولوجسٹس زندگی کے اعمال کا مطالعہ کرتے ہیں، دو اس تیار کرتے ہیں، اور جینیاتی طور پر تبدیل شدہ جاندار تخلیق کرتے ہیں۔

ایمبریالوجی (Embryology) : فریٹلزڈ اڈ (fertilized egg) سے نمو پا کر ایک جاندار بننے کے عمل کے مطالعہ کو ایمبریالوجی کہتے ہیں۔ اس شعبے میں سائنسدان نشوز اور اعضاء کے بننے کا مطالعہ کرتے ہیں، پیدائشی نقص کی نشاندہی کرتے ہیں، اور طبی علاج کے طریقے تیار کرتے ہیں۔

جینیٹکس (Genetics) : یہ بایولوجی کی وہ شاخ ہے جس میں خصوصیات کی والدین سے اولاد تک منتقلی کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ جینیٹکس میں سائنسدان جینیاتی بیماریوں کے اسباب کا مطالعہ کرتے ہیں اور پودوں اور جانوروں کی بہتر اقسام تیار کرتے ہیں۔

پلیسٹوٹولوجی (Palaeontology) : یہ بایولوجی کی وہ شاخ ہے جس میں فوسلز (fossils) کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ فوسلز کے تجربے سے سائنسدان جانداروں کی ارتقائی تاریخ کو جان سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، انسانہ از کے فوسلز اس بات کے شواہد فراہم کرتے ہیں کہ زمین پر لاکھوں سال پہلے دیو جیل تھے، جسے والے جاندار موجود تھے۔

دلچسپ معلومات

فوسلز (Fossils) : یہ پودوں اور جانوروں کی باقیات ہیں جو چٹانوں اور دیگر ارضیاتی تشکیلوں میں محفوظ ہو گئے تھے۔ سب سے قدیم معلوم فوسل ایک سائینو بیکٹیریم (Cyanobacterium) ہے جو تقریباً 3.5 ارب سال پرانا ہے۔

تیکسٹونومی (Taxonomy) : یہ بایولوجی کی وہ شاخ ہے جس میں ممالکوں اور اختلافات کی بنیاد پر جانداروں کو گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ جانداروں کی کلاسیفیکیشن (classification) سے زندگی کی تنوع کو منظم اور سمجھنے میں مدد ملتی ہے، نئی اقسام کی شناخت کی جاتی ہے، اور ارتقائی تعلقات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔

ایکالوجی (Ecology) : یہ شاخ جانداروں اور ان کے ماحول کے مابین تعلقات سے متعلق ہے۔ ایکالوجی سے جانداروں کے تنوع (biodiversity) کو بچانے اور ماحولیاتی مسائل کو حل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ فوڈ چین (food chain) اس بات کی مثال ہے کہ جاندار کس طرح توانائی اور غذا کے لیے آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔

میرین بایولوجی (Marine Biology) : یہ بایولوجی کی وہ شاخ ہے جس میں سمندروں اور نمکین پانی میں زندگی کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یہ سمندری جانداروں کے تنوع کو سمجھنے، نئی اقسام دریافت کرنے، اور سمندری تحفظ کے مسائل حل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ مثال کے طور پر، کورل ریف (coral reefs) سمندری جانداروں کی وسیع اقسام کو سہارا دیتے ہیں۔

پیتھالوجی (Pathology) : یہ بیماریوں، ان کے اسباب اور اثرات کا مطالعہ ہے۔ پیتھالوجی سے بیماری کی تشخیص، روک تھام، اور علاج میں مدد ملتی ہے۔ مثال کے طور پر، پیتھالوجسٹ یہ مطالعہ کرتے ہیں کہ سبزی کی بے قابو تقسیم اور پھیلاؤ کس طرح کیسز کا سبب بنتی ہے۔

ایمیونالوجی (Immunology) : یہ وہ شاخ ہے جس میں مدافعتی نظام (immune system) کے حصوں اور بیماریوں کے خلاف ان کے کردار کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ ایمیونالوجسٹ ویکسین تیار کرنے، خود کار مدافعتی بیماریوں (autoimmune disease) کا علاج کرنے، اور انفیکشنز کے خلاف مدافعتی رد عمل کو بہتر بنانے کے لیے تحقیق کرتے ہیں۔

فارماکولوجی (Pharmacology) : یہ وہ شاخ ہے جس میں ادویات اور ان کے جسم پر اثرات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یہ نئی ادویات کی تیاری میں مدد فراہم کرتی ہے۔ مثال کے طور پر، نئے اینٹی بائیوٹکس (antibiotics) تیار کیے جاتے ہیں جو بیماری پیدا کرنے والے بیکٹیریا کو مارنے اور بیکٹیریل انفیکشنز کے علاج کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔

1.2 بایولوجی کا دوسرے سائنسی علوم سے تعلق (Relation of Biology with other Sciences)

سوال نم 2: بایولوجی کا دوسرے سائنسی علوم کے ساتھ تعلق کی وضاحت تحریر کریں۔

جواب: بایولوجی کا دوسرے سائنسی علوم سے تعلق (Relation of Biology with other Sciences)

بایولوجی کا دیگر سائنسز جیسے کیمسٹری، فزکس، اور ارتھ سائنسز (Earth sciences) وغیرہ کے ساتھ گہرا تعلق رکھتی ہے۔ یہ تعلق زندگی کے افعال، ماحولیاتی تعاملات (interactions)، اور جانداروں کی ساخت میں پیچیدگیوں کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ ذیل میں بایولوجی کے دیگر سائنسز کے ساتھ تعلق کی چند مثالیں دی گئی ہیں:

1. **بائیو کیمسٹری (Biochemistry)** : بائیو کیمسٹری جانداروں میں موجود مختلف کیمیائی مادوں کی ساخت اور ان کے کیمیکیل ری ایکشنز کا مطالعہ ہے۔ فوٹوسنتھس (photosynthesis) اور سیرینیشن (respiration) کے کیمیکیل ری ایکشنز کا مطالعہ بائیو کیمسٹری کی مثالیں ہیں۔

2. **بائیو فزکس (Biophysics)** : یہ فزکس کے اُن اصولوں کا مطالعہ ہے جو جانداروں میں ہونے والے افعال پر لاگو ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر، بائیو فزکس میں ہم پٹیوں یعنی سبز (muscles)، ہڈیوں، اور جوزوں کے افعال کو سمجھنے کے لیے لیور (lever) اور حرکت کے اصولوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔

3. **کمپیوٹیشنل بایولوجی (Computational Biology)** : کمپیوٹیشنل بایولوجی میں سائنسدان زندگی کے نظاموں اور تعلقات کو سمجھنے کے لیے ریاضیاتی ماڈلز، الگورتھمز (algorithms)، اور کمپیوٹر سولوشنز (simulations) استعمال کرتے ہیں۔ اس میں بائیولوجیکل ڈیٹا، جیسے پروٹین میں امینو ایسڈز (amino acids) کی ترتیب، کا مطالعہ شامل ہے۔


4. **بائیو جیوگرافی (Biogeography)** : دنیا کے مختلف جغرافیائی علاقوں میں جانداروں کی تقسیم کا مطالعہ بائیو جیوگرافی کہلاتا ہے۔ اس میں یہ مطالعہ بھی کیا جاتا ہے کہ آب و ہوا میں تبدیلی (climate change) کس طرح جانداروں کی تقسیم پر اثر انداز ہوتی ہیں۔

5. **بائیو سٹیتسٹکس (Biostatistics)** : یہ جانداروں سے متعلق ڈیٹا کے تجزیے اور تشریح کے لیے شماریات (statistics) کے اصولوں پر مبنی ہے۔ بائیولوجیکل تحقیق، صحت، اور عوامی صحت جیسے شعبوں میں بائیو سٹیتکس اہم کردار ادا کرتی ہے۔

not

6) **بایو ٹیکنالوجی (Biotechnology):** بایو ٹیکنالوجی میں خورد بینی جانداروں کو صنعتی پیانے پر استعمال کر کے انسان کے لیے فائدہ مند پروڈکٹس تیار کی جاتی ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی صحت، زراعت، اور ماحولیاتی انتظام جیسے شعبوں میں کام آتی ہے۔ مثال کے طور پر، بایو ٹیکنالوجی انسولین (insulin) تیار کرتے ہیں۔ یہ ہارمون (hormone) بیماری کے علاج کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

7) **بایو اکنامکس (Bio-economics):** یہ اقتصادی نقطہ نظر سے جانداروں کا مطالعہ کرنے سے متعلق ہے۔ بایو اکنامکس میں، سائنسدان حیاتیاتی منصوبوں جیسے فصلوں کی نئی اقسام کی پیداوار وغیرہ کی لاگت اور منافع کا حساب لگاتے ہیں۔



بایولوجی کا دیگر سائنسز کے ساتھ تعلق

1.3 کیریئر بایولوجی سے منسلک ہے (Careers in Biology)

1.4 زندگی کا علم حاصل کرنے کے متعلق قرآنی ہدایات (Quranic Instructions to Reveal The Study Of Life)

1.5 سائنس بطور ایک مشترکہ شعبہ (Science as a Collaborative Field)

سوال 4: وضاحت کریں کہ بایولوجی کا مطالعہ کس طرح مختلف پیشہ ورانہ تعلیمات کی راہ ہوا کر سکتا ہے؟

جواب: بایولوجی سے منسلک ہے (Careers in Biology)

بایولوجی کے طلبہ زندگی کے مختلف مظاہر (phenomena) کا علم حاصل کرتے ہیں۔ بایولوجی مضمون کے ساتھ ایف ایس سی (FSc) کر لینے کے بعد وہ مختلف پیشوں کے لیے مزید تعلیم کا انتخاب کر سکتے ہیں، جیسے کہ:

1) **میڈیسن اور سرجری (Medicine and Surgery):** میڈیسن کا شعبہ بیماریوں کی تشخیص اور علاج سے متعلق ہے، جبکہ سرجری میں جسم کے خراب حصوں کو مرمت، تبدیلی یا بنایا جاتا شامل ہے۔ اس پیشے کے لیے طلبہ کو 5 سالہ بیچلر آف میڈیسن اور بیچلر آف سرجری (MBBS) کی ڈگری مکمل کرنا ہوتی ہے۔

2) **ڈینٹسٹری (Dentistry):** ڈینٹسٹ منہ کی صحت (oral health) میں مہارت رکھتے ہیں۔ وہ دانتوں کی بیماریوں کی تشخیص اور علاج کرتے ہیں اور سرجری کرتے ہیں۔ اس پیشے کے لیے طلبہ 4 سالہ بیچلر آف ڈینٹسٹری (BDS) کی ڈگری حاصل کرتے ہیں۔

3) **فارماکولوجی (Pharmacology):** فارماکولوجی ادویات کے انسانی جسم پر اثرات کا مطالعہ کرتے ہیں اور نئی ادویات تیار کرتے ہیں۔ اس پیشے کے لیے فارمیسی (pharmacy) میں بیچلر آف سائنسز (BS) کی ڈگری آف فارمیسی (D.Pharm) کی ڈگری درکار ہوتی ہے۔

4) **فزیوتھراپی (Physiotherapy):** یہ طریقہ علاج بیماری یا چوٹ کے باعث متاثرہ جسمانی حرکت اور افعال کو بحال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فزیوتھراپسٹ جسمانی ورزش اور جسمانی طریقہ علاج (جیسے ماس) کا استعمال کرتے ہیں تاکہ مریض کی جسمانی حرکت کو بہتر بنایا جا سکے۔ فزیوتھراپسٹ بننے کے لیے فزیکل تھراپی یا فزیوتھراپی میں 4 سالہ بی ایس (BS) کی ڈگری درکار ہوتی ہے۔

5) **فشریز اور وائلڈ لائف (Fisheries and Wildlife):** فشریز اور وائلڈ لائف ڈیپارٹمنٹس ذوالوحی، فشریز، ایکوا کچر (aquaculture) میں بی ایس (BS) اور ماسٹر آف سائنسز (MS) کی ڈگری رکھنے والے بایولوجسٹ کو ملازمت فراہم کرتے ہیں۔

6) **زراعت (Agriculture):** زری سائنسدان کھیتی باڑی کے طریقوں، فصلوں کی پیداوار، اور پائیدار زرعی تکنیکوں کو بہتر بناتے ہیں۔ اس کے لیے زراعت میں 4 سالہ بی ایس (BS) کی ڈگری درکار ہوتی ہے۔

7) **حیوانیات پروری (Animal Husbandry):** یہ شعبہ مویشیوں کی افزائش اور دیکھ بھال سے متعلق ہے تاکہ ان کے معیار اور پیداوار کو بہتر بنایا جاسکے۔ اس کے لیے طلبہ حیوانیات پروری میں 4 سالہ بی ایس (BS) کی ڈگری حاصل کرتے ہیں۔

8) **باریکچر (Horticulture):** باریکچر یعنی باغبانی کے ماہرین پھل، سبزی، پھول اور آرائشی پودے اگاتے ہیں۔ اس کے لیے باریکچر میں 4 سالہ بی ایس (BS) کی ڈگری درکار ہوتی ہے۔

9) **فورسٹری (Forestry):** فورسٹری کے ماہرین جنگلات اور جنگلی حیات کا انتظام اور تحفظ کرتے ہیں۔ اس شعبے کے لیے فورسٹری میں 4 سالہ بی ایس (BS) کی ڈگری ضروری ہے۔

10) **فارمنگ (Farming):** فارمنگ کے پیشہ ور فارم تیار کرتے ہیں، جیسے جانوروں کے فارمز، پولٹری فارمز، اور پھلوں کے فارمز۔ ان فارمز میں وہ خوراک اور دیگر مصنوعات کے لیے فصلیں اگاتے اور جانور پالتے ہیں۔ اس پیشے کے لیے زراعت میں 4 سالہ بی ایس (BS) یا مخصوص فارمنگ کے کورسز درکار ہیں۔

11) **بایو ٹیکنالوجی (Biotechnology):** بایو ٹیکنالوجی خورد بینی جانداروں کو استعمال کرتے ہوئے طبی، زرعی اور دیگر شعبوں کی مصنوعات اور ٹیکنالوجیز تیار کرتے ہیں۔ اس پیشے کے لیے بایو ٹیکنالوجی میں 4 سالہ بی ایس (BS) کی ڈگری ضروری ہے۔

12) **فرانزک (Forensic):** فرانزک سائنسدان جرائم کی تحقیقات میں جانے وقوع سے حاصل کردہ طبی شواہد کا تجزیہ کرتے ہیں۔ اس کے لیے فرانزک سائنس میں 4 سالہ بی ایس (BS) کی ڈگری درکار ہوتی ہے۔

سوال 5: بایولوجی سے منسلک مزید پیشے اور ان کے کام لکھیں۔

جواب: بایولوجی سے منسلک مزید پیشے:

پیشہ	اہم کام
وٹرنری میڈیسن (Veterinary Medicine)	جانوروں میں بیماریوں کی تشخیص، علاج اور سرجری
ماحولیاتی سائنس (Environmental Science)	آلودگی اور قدرتی وسائل سے متعلق مسائل کا حل تلاش کرنا
مائیکرو بایولوجی (Microbiology)	مائیکرو آرگنزمز پر تحقیق کرنا تاکہ ان کے اثرات کو سمجھا جاسکے
جینیٹک کاؤنسلنگ (Genetic Counselling)	جینیاتی مسائل پر لوگوں کو مدد فراہم کرنا اور ٹیسٹنگ کے ذریعے رہنمائی کرنا
غذائیت اور ڈائیٹیکس (Nutrition and Dietetics)	صحت کو بہتر بنانے کے لیے مناسب غذائی عادات پر مشورہ دینا
پبلک ہیلتھ (Public Health)	تعلیم، پالیسی سازی اور تحقیق کے ذریعے کمیونٹی کی صحت کو بہتر بنانا
بایو میڈیکل انجینئرنگ (Biomedical Engineering)	طبی آلات کا ڈیزائن اور تیاری تاکہ مریضوں کی دیکھ بھال میں بہتری لائی جاسکے
بایو انفارمٹکس (Bioinformatics)	کمپیوٹیشنل ٹولز کا استعمال کرتے ہوئے حیاتیاتی ڈیٹا کا تجزیہ

سوال 6: زندگی کا علم حاصل کرنے کے متعلق قرآنی احکامات کے متعلق لکھیں۔

جواب: زندگی کا علم حاصل کرنے کے متعلق قرآنی ہدایات (Quranic instructions to reveal the study of life):
قرآن مجید میں کئی آیات زندگی کے مطالعے پر روشنی ڈالتی ہیں۔ یہاں چند قرآنی رہنما اصول پیش کیے گئے ہیں جو زندگی کے مطالعے کی جستجو اور غور و فکر کی ترغیب دیتے ہیں:

پانی سے تخلیق:

وَجَعَلْنَاهُمْ نَسْلًا مِّنْ نَّحْسٍ وَنَحْنُ

قرآن مجید میں مختلف آیات میں ذکر ہے کہ تمام جاندار چیزیں پانی سے پیدا کی گئیں۔

ہائپوٹھیس کی خصوصیات:

- یہ مسئلے کے جواب کے لیے ایک تجویز کر دیا جاتا ہے۔
- یہ ہمیشہ احتیاط مشاہدات سے مطابقت رکھتا ہے۔
- اس کو تجربات کے ذریعے جانچا جاسکتا ہے۔
- اسے غلط ثابت کرنے کا ہمیشہ ایک طریقہ موجود ہوتا ہے۔

4 ذیلیکٹن (Deduction): سائنسدان اپنے ہائپوٹھیس سے منطقی نتائج اخذ کرتے ہیں۔ ہائپوٹھیس کے منطقی نتائج ڈیڈکشن کہلاتے ہیں۔ ڈیڈکشن عموماً "اگر تو" کی جملات پائی ہوتی ہیں۔ سائنسدان فرض کرتے ہیں کہ ہائپوٹھیس درست ہے تو اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر: ہائپوٹھیس: "پودے میں جوں کا رنگ آئرن اور نشوونما میں رکاوٹ مٹی میں آئرن کی کمی کی وجہ سے ہے۔"

5 تجربات (Experiments): یہ سائنسی طریقہ کار کا سب سے بنیادی مرحلہ ہے۔ سائنسدان ان تمام ہائپوٹھیس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے تجربات کرتے ہیں۔ ایک کامیاب تجربے میں ایک ہائپوٹھیس درست ثابت ہوتا ہے جبکہ متبادل ہائپوٹھیس غلط ثابت ہوتے ہیں۔ غلط ہائپوٹھیس کو مسترد کر دیا جاتا ہے اور درست ثابت ہونے والے ہائپوٹھیس کو قبول کیا جاتا ہے۔ سائنسدان اس قول شدہ ہائپوٹھیس سے نئی ڈیڈکشن نکالتے ہیں۔ پھر وہ مزید تجربات کرتے ہیں اور ہائپوٹھیس کے درست ہونے کی تصدیق کرتے ہیں۔

تجرباتی گروپ اور کنٹرول گروپ

جب سائنسدان تجربات کرتے ہیں تو وہ دو مختلف سیٹ اپ تیار کرتے ہیں۔ ایک کو تجرباتی گروپ (experimental group) جبکہ دوسرے کو کنٹرول گروپ (control group) کہا جاتا ہے۔

مثال کے طور پر، اگر آپ فوٹوسنتھیز (photosynthesis) کے لیے کاربن ڈائی آکسائیڈ کی ضرورت کو جانچنا چاہتے ہیں تو آپ دو ایک جیسے پودے رکھیں گے۔ آپ ایک پودے کو کاربن ڈائی آکسائیڈ فراہم نہیں کریں گے (تجرباتی گروپ)، جبکہ دوسرے پودے کو کاربن ڈائی آکسائیڈ فراہم کریں گے (کنٹرول گروپ)۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ کا ضروری ہونا اس وقت ثابت ہوگا جب تجرباتی گروپ میں فوٹوسنتھیز نہیں ہوگی جبکہ کنٹرول گروپ میں ہوگی۔

6 نتائج (Results): سائنسدان اپنے تجربات سے ایٹا جمع کرتے ہیں۔ وہ نتائج کا خلاصہ کرنے کے لیے شماریاتی تجزیے اور گراف وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ سائنسدان اپنے خلاصے میں تمام حوالہ جات کی فہرست بھی شامل کرتے ہیں تاکہ معلومات کے ذرائع کو تسلیم کیا جاسکے۔ سائنسدان اپنے نتائج کو سائنسی جریڈوں (journals) اور کتابوں میں شائع کرتے ہیں۔ دوسرے سائنسدانوں کے ساتھ اپنے نتائج کا تبادلہ بھی کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے، دو سائنسی رپورٹ تیار کرتے ہیں اور اسے قومی اور بین الاقوامی ملاقاتوں اور سیمینارز میں پیش کرتے ہیں۔

سوال 9: تھیوری اور قانون (اصول) میں کیسے تفریق کیا جاتا ہے؟

جواب: تھیوری اور قانون (اصول) (Theory and Law/Principle)

جب تجربات کسی ہائپوٹھیس کو درست ثابت کرتے ہیں تو سائنسدان اس ہائپوٹھیس کو استعمال کر کے مزید ہائپوٹھیس بناتے ہیں۔ جب نئے ہائپوٹھیس بھی وہی بارہ تجربات سے درست ثابت ہوتے ہیں تو اصل ہائپوٹھیس تھیوری (theory) بن جاتا ہے۔ ایک نظریہ وسیع شواہد سے حمایت یافتہ ہوتا ہے اور متعدد محققین اس کی بار بار تصدیق کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، ارتقاء کا نظریہ وضاحت کرتا ہے کہ ہر کسی شیز (species) وقت کے ساتھ قدرتی انتخاب کے ذریعے کس طرح تبدیل ہوتی ہیں۔

سائنسدان تجربات کر کے نظریات کو مسلسل ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں۔ وہ نظریے کو غلط ثابت کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اگر ایک نظریہ

تجربات سے بار بار درست ثابت ہوتا ہے تو ایک سائنسی قانون (law) یا اصول (principle) بن جاتا ہے۔ سائنسی قانون غلطی کی ایک گیم یا مستقل حقیقت ہوتی ہے۔ ہائپوٹھیس قوانین کی مثالیں ہارڈی وین برگ کا قانون (Hardy weinberg law) اور منڈل (Mendel) کے وراثت کے قوانین ہیں۔



سائنسی طریقہ کار کا فلو چارٹ (flow chart)

1.8 مہربان! ہائپوٹھیس اور طریقہ کار کا ایک مثال (Malaria-An Example of Biological Method)

سوال 10: طیریا کو بطور مثال لیتے ہوئے ہائپوٹھیس طریقہ کار میں شامل اقدامات کی وضاحت کریں۔

جواب: طیریا۔ ہائپوٹھیس طریقہ کار کی ایک مثال (Malaria-An Example of Biological Method)

طیریا ایک عام بیماری ہے جو کئی ممالک بشمول پاکستان میں پائی جاتی ہے۔ انسانیت کی تاریخ میں میرے کسی بھی دوسری بیماری سے زیادہ افراد کو ہلاک کیا ہے۔

ہائپوٹھیس مسئلہ 1: طیریا کا سبب کیا ہے؟

1 مشاہدات: قدیم ادوار (2000 سال سے زائد عرصہ پہلے) میں معالجین اس بیماری کے بارے میں 19 ویں صدی کے آخر میں طیریا کے بارے میں چار اہم مشاہدات کیے گئے۔

- طیریا اور دلدلی علاقوں کے درمیان کوئی تعلق ہے۔
- طیریا کے علاج کے لیے کوئین (quinine) ایک موثر دوا ہے۔
- دلدلی علاقے کا پانی پینے سے طیریا نہیں ہوتا۔
- طیریا کے مریضوں کے خون میں چارمزوم (Plasmodium) دیکھا گیا۔

2 ہائپوٹھیس: ہائپوٹھیس نے ان مشاہدات اور دریافتوں پر غور کیا اور ایک ہائپوٹھیس تیار کیا یعنی "چارمزوم طیریا کی وجہ ہے۔"

3 ڈیڈکشن: انہوں نے اس ہائپوٹھیس کو درستی مان کر ایک منطقی نتیجہ (ڈیڈکشن) تیار کیا۔ ڈیڈکشن یہ تھی "اگر چارمزوم طیریا کا وجہ ہے تو پھر طیریا کے تمام مریضوں کے خون میں چارمزوم ہونا چاہیے۔"

4 تجربہ اور نتائج: اس ڈیڈکشن کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہائپوٹھیس نے تجربات کیے۔ انہوں نے طیریا کے ان تجربات میں طیریا کے مریض تجرباتی گروپ تھے جبکہ صحت مند افراد کو کنٹرول گروپ کے طور پر لیا گیا۔

- طیریا کے زیادہ تر مریضوں کے خون میں چارمزوم موجود تھا۔
- یہ نتیجہ اس ہائپوٹھیس کو درست ثابت کرتا ہے کہ "چارمزوم طیریا کی وجہ ہے۔"

ہائپوٹھیس مسئلہ 2: چارمزوم کس طرح انسان کے خون میں داخل ہوتا ہے؟

اگلا ہائپوٹھیس مسئلہ یہ جانتا تھا کہ "چارمزوم انسان کے خون میں کیسے داخل ہوتا ہے؟" ہائپوٹھیس کے پاس درج ذیل مشاہدات موجود تھے۔

- طیریا کا تعلق دلدلی علاقوں سے ہے۔
- دلدلی جگہ کا پانی پینے سے طیریا نہیں ہوتا تھا۔
- جب ہائپوٹھیس نے ان مشاہدات پر غور کیا تو انہوں نے سوچا کہ چارمزوم دلدلی پانی میں موجود نہیں تھا۔

1 مشاہدات: 1883 میں ایک معالج اے ایف اے کنگ (A.F.A. King) نے (20) مشاہدات کی فہرست بنائی۔ اس کے کچھ اہم مشاہدات یہ تھے:

- دو لوگ جو باہر سوتے تھے ان میں طیر یا ہونے کے امکانات ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ تھے جو اندر سوتے تھے۔
- دو لوگ جو باریک چھردانی کے نیچے سوتے تھے ان میں طیر یا ہونے کے امکانات کم تھے ان لوگوں کے مقابلے میں جو چھردانی استعمال نہیں کرتے تھے۔
- دو افراد جو دھوئیں والی آگ کے قریب سوتے تھے انھیں عام طور پر طیر یا نہیں ہوتا تھا۔



ایڈز (Aedes) چھردانی
(dengue) بخار منتقل کرتا ہے۔

2 بائوپٹیس: ان مشاہدات کی بنیاد پر کنگ نے ایک بائوپٹیس پیش کیا:

”چھردانی یا زموڈیم منتقل کرتے ہیں اور اس طرح طیر یا کے پھیلاؤ میں شامل ہیں۔“

3 ڈیٹکشن: اس بائوپٹیس سے درج ذیل ڈیٹکشن بنائی گئی:

”اگر چھردانی یا کے پھیلاؤ میں شامل ہیں تو پلازموڈیم چھروں میں موجود ہونا چاہیے۔“



رونالڈ روس، اپنے تجرباتی سامان کے ساتھ

4 تجربہ اور نتائج: رونالڈ روس (Ronald Ross) نے 1880 کی دہائی میں مندرجہ بالا ڈیٹکشن کو مثبت کرنے کے لیے اہم تجربات کیے۔ وہ ایک برطانوی فوجی معالج تھے جو بھارت میں کام کر رہے تھے۔

اس نے ایک مادہ انوفیلیر (Anopheles) چھردانی یا کے مریض کو کائنات دیا۔ بعد میں روس (Ross) نے اس چھردانی کو مارا اور چھردانی کے معدے میں پلازموڈیم کو اپنی تعداد بڑھاتے پایا۔ اس کے تجربے کے طور پر اس نے سوچا کہ ایک متاثرہ چھردانی (جس میں پلازموڈیم موجود تھا) کو کسی صحت مند شخص کو کائنات دیا جائے۔ اگر بائوپٹیس درست ہوتا تو صحت مند شخص کو طیر یا ہونا چاہیے۔

لیکن ایسے پُرخطر تجربے کے لیے انسانوں کا استعمال نہیں کیا۔

روس نے اپنا تجربہ دوبارہ کیا لیکن اس میں انسان کی بجائے چڑیوں کا استعمال کیا۔ اس نے طیر یا میں جتنا چڑیا کو مادہ کیلیکس (Culex) چھروں سے کٹوا یا۔ پھر اس نے ان چھروں کا مختلف اوقات میں مطالعہ کیا۔ اس نے یہ دریافت کیا کہ پلازموڈیم چھردانی کے معدے کی دیواروں میں اپنی تعداد بڑھاتے ہیں اور پھر اس کے سیالینری گلینڈز (salivary glands) میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ اس نے متاثرہ چھروں سے صحت مند چڑیوں کو کٹوا یا۔ یہ صحت مند چڑیاں طیر یا میں جتنا ہو گئیں۔

جب اس نے ان چڑیوں کے خون کا معائنہ کیا تو ان میں پلازموڈیم کی بڑی تعداد موجود تھی۔ یوں یہ بائوپٹیس ثابت ہو گیا کہ ”چھردانی پلازموڈیم کو منتقل کرتے ہیں۔ اس لیے چھردانی یا کے پھیلاؤ کے ذمہ دار ہیں۔“



چڑیا میں طیر یا کی منتقلی کی وجہ کیلیکس چھردانی اور انسان میں طیر یا کی منتقلی کی وجہ انوفیلیر چھردانی

انسان پر تجربات: آخر میں اس بائوپٹیس کو مثبت کرنے کے لیے انسانوں پر تجربات کیے گئے۔ 1898 میں، اطالوی بائیولوجسٹ نے ایک اینوفیلیر چھردانی یا کے مریض کو کائنات دیا۔ پھر اس متاثرہ چھردانی سے ایک صحت مند انسان کو کٹوا یا گیا۔ اس شخص کو بعد میں طیر یا ہو گیا۔ اس طرح یہ تصدیق ہو گئی کہ چھردانی پلازموڈیم منتقل کرتے ہیں اور اس طرح طیر یا کے پھیلاؤ کے ذمہ دار ہیں۔

اشیائی طرح کنسپچوئل (Conceptual) سوالات

سوال 1: سائنس کا معیار کیا ہے؟

جواب: سائنس کا معیار یہ ہے کہ تجربے کے لیے معیاری نقطہ نظر فراہم کرتا ہے تاکہ ان کے نتائج کو بہتر بنایا جاسکے اپنے تجربات میں معیاری طریقہ استعمال کرنے سے، سائنسدان پُر اعتماد ہوں گے کہ وہ حقائق پر قائم ہیں گے اور ذاتی تصورات کے اثر کو محدود کریں گے۔

سوال 2: آپ روزمرہ کی زندگی میں سائنس کا کتنا استعمال کرتے ہیں؟

جواب: سائنس کا معیار ایک ایسا طریقہ کار ہے جو مسائل کے حل اور معلومات حاصل کرنے کے لیے کی مراحل پر مشتمل ہوتا ہے۔ سائنس کا معیار روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہوتا ہے لیکن لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے۔ ہم جہاں بھی جاتے ہیں، ہم ہمیشہ کچھ نہ کچھ دیکھتے رہتے ہیں، چاہے وہ ٹی۔وی پر کوئی پروگرام ہو یا موبائل فون پر کوئی نوٹیفیکیشن لہذا بنیادی طور پر ہم روز سائنسی طریقہ استعمال کرتے ہیں لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔

مثال کے طور پر: فرض کریں کہ میں موبائل فون کو چار جڑ پر لگاتا ہوں، اڈاپٹر کو ساکٹ میں لگاتا ہوں اور فون دہانے پر موبائل فون کی چار جگہ شروع نہیں ہوگی۔

مشاہدات: میرا موبائل فون چارج کیوں نہیں ہوتا؟

بائوپٹیس: ساکٹ یا اڈاپٹر میں کچھ غلط ہے۔

ڈیٹکشن: اگر ساکٹ میں کچھ غلط ہے تو میں چار جڑ کو مختلف ساکٹ میں لگاتا ہوں۔

تجربہ: چار جڑ کو مختلف ساکٹ میں لگایا۔

نتیجہ: موبائل فون کی چار جگہ شروع ہو گئی۔

سوال 3: طیر یا کے پھیلاؤ کو کتنے کے لیے بائیولوجیکل معیار کیا استعمال کیا جاسکتا ہے؟

جواب: سائنس دان تجرباتی طور پر چھروں کا مشاہدہ کر کے طیر یا کے پھیلاؤ کو کتنے کے لیے بائیولوجیکل طریقے کا استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک چھردانی یا میں جتنا کسی شخص کو کائنات ہے اور بعد میں کسی صحت مند شخص کو کائنات ہے جو بعد میں طیر یا سے تو سائنسدان یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ چھردانی یا کو منتقل کرتا ہے۔

سوال 4: رونالڈ روس نے متاثرہ چھروں کو صحت مند انسان کو کائنات کی اجازت کیوں نہ دی؟

جواب: رونالڈ روس نے ایک مادہ انوفیلیر چھردانی یا کے مریض کو کائنات کی اجازت دی۔ اس نے کچھ دنوں بعد چھردانی کو مار دیا اور دیکھا کہ پلازموڈیم چھردانی کے معدے میں تقسیم ہو کر اپنی تعداد بڑھا رہے تھے۔ لہذا تجربہ یہ تھا کہ اس نے متاثرہ چھردانی کو ایک صحت مند انسان کو کائنات کی اجازت دی۔ اگر بائوپٹیس درست تھا تو صحت مند شخص کو طیر یا ہونا چاہیے تھا لیکن سائنسدانوں نے تجربات کے لیے انسانوں کو استعمال کرنے سے گریز کیا کیونکہ اس کے نتائج سنگین ہو سکتے تھے اس لیے رونالڈ روس نے متاثرہ چھروں کو کسی صحت مند انسان کو کائنات کی اجازت نہیں دی۔ چنانچہ اس نے چڑیوں کو استعمال کیا اور اپنے تجربے کو دوبارہ دہرایا۔

سوال 5: بائیولوجی کے کیرئیر کس طرح سے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں؟

جواب: بائیولوجی کے کیرئیر بہت سے طریقوں سے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔

دنیا کو سمجھنا: بائیولوجی ہمیں زندگی کے افعال، ارتقاء اور تعامل کے بارے میں آگاہ کرتی ہے۔

زندگی کے معیار کو بہتر بنانا: بائیولوجی میں ترقی نے میڈیسن، ایگریکلچر، بائیوٹیکنالوجی اور دیگر شعبوں میں بہتری لائی ہے۔

بائیولوجیکل علم کی ترقی: بائیولوجی کے کیرئیر بائیولوجی کی ترقی میں مدد دیتے ہیں۔

کیرئیر کی ترقی: بہت سے بائیولوجیکل ڈگری کے حامل گریجویٹ اپنی مہارت کو آگے بڑھانے اور کیرئیر کی ترقی میں مدد کے لیے پوسٹ گریجویٹ سطح پر تعلیم حاصل کرنے کا انتخاب کرتے ہیں۔

زیادہ ارتقاء: بائیولوجی کے کچھ کیرئیر زیادہ ارتقاء دیتے ہیں جیسے کہ بائیوٹیکنالوجی اور بائیو انفورمیشن وغیرہ۔

معروضی سوالات

تجزیہ و تحلیل کی سطح پر (Knowledge, Understanding, Application, Analytical & Conceptual) کی روشنی میں منتخب کیے گئے سوالات

1.1 (Biology and its Branches)

1.2 (Relation of Biology with other Sciences)

☆ درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔

1. بائیولوجی کی وہ شاخ جس میں جانداروں (خاص طور پر انسانوں) کی اندرونی جسمانی ساخت کا مطالعہ کیا جاتا ہے، کہلاتی ہے:

- (A) نینکولوجی (B) ایکولوجی (C) ہشالوجی (D) اینٹالوجی

2. بائیولوجی کی شاخ جس میں جسم کے اعضاء کا مطالعہ کیا جاتا ہے:

- (A) طبیبی نولوجی (B) ایسینولوجی (C) فزیالوجی (D) فارماکولوجی

3. بائیولوجی کی کس شاخ میں والدین سے اولاد میں خصوصیات کی منتقلی کا مطالعہ کیا جاتا ہے؟

- (A) مارفولوجی (B) جینیٹکس (C) ٹیکسٹونمی (D) میرین بائیولوجی

4. کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز، لپڈز اور نیوکلیک ایسڈ جیسے بائیو مالیکولز کا مطالعہ کرنے والی بائیولوجی کی شاخ ہے:

- (A) ایکولوجی (B) ہشالوجی (C) مالکیولر بائیولوجی (D) ایسینولوجی

5. نشوونما کی رو سے کچھ مطالعہ کیا جاتا ہے:

- (A) ایکولوجی (B) ہشالوجی (C) ایسینولوجی (D) فارماکولوجی

6. بائیولوجی کی وہ شاخ جو فوسلز کا مطالعہ کرتی ہے، کہلاتی ہے:

- (A) مالکیولر بائیولوجی (B) ٹیکسٹونمی (C) طبیبی نولوجی (D) پتھالوجی

7. بائیولوجی کی وہ شاخ جو جانداروں اور ان کے ماحول کے درمیان تعلقات کا مطالعہ کرتی ہے، کہلاتی ہے:

- (A) ایسینولوجی (B) اینٹالوجی (C) ایکولوجی (D) پتھالوجی

8. بائیولوجی کی وہ شاخ جو سمندروں اور خشک پانی میں زندگی کا مطالعہ کرتی ہے، کہلاتی ہے:

- (A) فارماکولوجی (B) ہشالوجی (C) میرین بائیولوجی (D) ایکولوجی

9. بائیولوجی کی وہ شاخ جس میں ہم انسان سسٹم کے اجزاء کا مطالعہ کرتے ہیں:

- (A) اینٹالوجی (B) ایسینولوجی (C) پتھالوجی (D) جینیٹکس

10. سائنس دان بائیولوجیکل سسٹمز اور تعلقات کو سمجھنے کے لیے میتھمیٹیکل ماڈلز، الگورتھم اور کمپیوٹر سیمولیشن کا استعمال کرتے ہیں۔

- (A) بائیوجیوگرافی (B) بائیوسٹیٹسٹکس (C) کمپیوٹیشنل بائیولوجی (D) بائیوٹیکنالوجی

11. دنیا کے مختلف جغرافیائی علاقوں میں جانداروں کی تقسیم کا مطالعہ کرنے والی بائیولوجی کی شاخ کہلاتی ہے:

- (A) بائیوٹیکنالوجی (B) بائیوجیوگرافی (C) بائیوفزکس (D) بائیوسٹیٹسٹکس

12. مختلف شعبوں جیسے کہ صحت، زراعت اور ماحولیات کے لیے قائم ہند مصنوعات تیار کرنے اور جانداروں کے استعمال سے متعلق ہے:

- (A) بائیوفزکس (B) بائیوسٹیٹسٹکس (C) بائیوٹیکنالوجی (D) بائیوکیسٹری

13. معاشی نقطہ نظر سے جانداروں کا مطالعہ کہلاتا ہے:

- (A) بائیو ایکنامکس (B) بائیوکیسٹری (C) بائیوٹیکنالوجی (D) بائیوسٹیٹسٹکس

بائیولوجی سے منسلک پیشے (Careers in Biology)

1.3

1.4 زندگی کا علم حاصل کرنے کے متعلق قرآنی ہدایات (Quranic instructions to reveal the study of life)

1.4

1.5 سائنس بطور ایک مشترکہ شعبہ (Science as a Collaborative Field)

1.5

14. کون سا پیشہ بیماریوں کی تشخیص اور علاج سے متعلق ہوتا ہے:

- (A) میڈیسن (B) فارماکولوجی (C) سرجری (D) پبلک ہیلتھ

15. جسم کے حصے کی مرمت، تہدیل یا کالے جاسکتے ہیں:

- (A) بائیوٹیکنالوجی سے (B) پورٹیکلر سے (C) ایگریکلچر سے (D) سرجری سے

16. جانوروں کی معیار اور پیداوار میں بہتری کے لیے ان کی افزائش نسل اور دیکھ بھال کا مطالعہ کیا جاتا ہے:

- (A) فارمنگ میں (B) اینیمل ہسبنڈری میں (C) فزیوٹھرائی میں (D) پورٹیکلر میں

17. بائیولوجی کی وہ شاخ جو جنگلات اور جنگلی حیات کا تحفظ کرتی ہے:

- (A) فارمنگ (B) فزیوٹھرائی (C) بائیوٹیکنالوجی (D) فوریسٹری

18. انسانی جینوم پروجیکٹ مکمل ہوا:

- (A) 2001ء (B) 2002ء (C) 2003ء (D) 2004ء

19. رویٹکس اور معنوی ذہانت (AI) میں کمپیوٹر سائنس، انجینئرنگ، میتھمیٹکس، سائیکالوجی اور _____ شامل ہیں۔

- (A) پالیٹری سائنس (B) میڈیسن (C) جینیٹکس (D) نیوروسائنس

20. فلکیات، سپیس سائنس، انجینئرنگ، بائیولوجی اور میڈیسن کے تعاون سے سائنسدانوں کو _____ کی حقیقتات کرنے میں مدد ملتی ہے۔

- (A) انسانی جینوم (B) مشین لرننگ (C) کوسموس/کائنات (D) موسمیاتی تحقیق

21. کینسر ریسرچ میں بائیولوجسٹ، بائیوکیسٹ، جینیٹکس، فارماکولوجسٹ اور _____ شامل ہیں۔

- (A) آکولوجسٹ (B) انجینئر (C) ڈیمٹسٹ (D) بائیوٹیکنالوجسٹ

22. جانوروں میں بیماریوں کی تشخیص علاج اور سرجری شامل ہیں۔

- (A) وٹرنری میڈیسن (B) پبلک ہیلتھ (C) ماحولیاتی سائنس (D) بائیو انفارمیشن

23. یہ آلودگی اور قدرتی وسائل سے متعلق مسائل کو حل کرنے سے متعلق ہے:

- (A) جینیٹک کاؤنسلنگ (B) اینوائرنمنٹل سائنس (C) وٹرنری سائنس (D) مالکیولر بائیولوجی

24. کونسا پیشہ مریضوں کی دیکھ بھال کو بہتر بنانے کے لیے طبی آلات بنانا اور ڈیزائن کرتا ہے؟

- (A) پبلک ہیلتھ (B) بائیو میڈیکل انجینئرنگ (C) جینیٹک کاؤنسلنگ (D) مالکیولر بائیولوجی

25. سائیکلک پرابلمز کی تحقیق طلب وضاحت کہلاتی ہے:

- (A) ڈیٹیکشن (B) مشاہدات (C) بائیوٹھیسس (D) لاء

26. بائیوٹھیسس کے متعلق نتائج کہلاتے ہیں۔

- (A) تھیوریز (B) بائیوٹھیسس (C) تجربات (D) ڈیٹیکشن

27. اگر کسی تصوری کو تجربات کے ذریعے باورداشت کیا جاتا ہے تو وہ بن جاتا ہے:

- (A) لاء (B) بائیوٹھیسس (C) تجربات (D) نتائج

- 28- کس صدی سے کیمن طیریا کے لیے واحد مطالعہ تھا؟
 (A) 16 ویں سے 17 ویں (B) 17 ویں سے 18 ویں (C) 17 ویں سے 19 ویں (D) 17 ویں سے 20 ویں
- 29- دو مسائل تک مختلف جسم میں بائیولوجیکل پراپرٹیز کو ملایا جاتا ہے کہلاتا ہے:
 (A) ہائیو بیجیل پراپرٹیز (B) نون-ہائیو بیجیل پراپرٹیز (C) ہائیو بیجیل پراپرٹیز (D) یہ تمام
- 30- بائیو بیجیل پراپرٹیز میں شامل ہیں۔
 (A) 5 مراحل (B) 6 مراحل (C) 7 مراحل (D) 8 مراحل
- 31- بائیو بیجیل پراپرٹیز کا سب سے بنیادی قدم ہے:
 (A) تجربات کرنا (B) مشاہدات کرنا (C) ہائپو تھیس (D) ڈیٹا کشر
- 32- بائیو بیجیل پراپرٹیز کے کس مراحل میں منطق "اگر-جب" استعمال کی جاتی ہے؟
 (A) نتیجہ (B) ہائپو تھیس (C) ڈیٹا کشر (D) مشاہدات
- 33- انسان کی بجائے مرد نے اپنے تجربات کس جاندار پر کیے؟
 (A) موش (B) چوہا (C) کوا (D) کبوتر
- 34- مچھروں میں پلازموڈیم _____ میں تعداد میں اضافہ کرتے ہیں۔
 (A) منہ (B) آنٹوں (C) معدہ (D) جگر
- 35- اینیملز مچھری بیماری کی وجہ بنتا ہے؟
 (A) اینکس (B) طیریا (C) مایکسائیڈ (D) فلو
- 36- چوہوں میں طیریا _____ نامی مچھر سے پھیلتا ہے:
 (A) اینیملز (B) اینڈیج (C) کیولکس (D) ڈیٹا کشر
- 37- "اگر مچھر طیریا کے پھیلاؤ کے ذمہ دار ہیں تو مچھر کے جسم میں پلازموڈیم ہونا چاہیے۔" یہ ہے:
 (A) نتیجہ (B) ڈیٹا کشر (C) مشاہدات (D) ہائپو تھیس
- 38- کسی نئی نسل یا جدید ڈیٹا کو مقدار کی صورت میں ظاہر کیا جاتا ہے؟
 (A) مقدار کی مشاہدات (B) باقی مشاہدات (C) ہائپو تھیس (D) ڈیٹا کشر
- 39- مشاہدات کرنے کے لیے سائنسدان استعمال کرتے ہیں:
 (A) چار جیس (B) پانچ جیس (C) چھ جیس (D) سات جیس

(C) -10	(B) -9	(C) -8	(C) -7	(C) -6	(B) -5	(C) -4	(B) -3	(C) -2	(D) -1
(C) -20	(D) -19	(C) -18	(D) -17	(B) -16	(D) -15	(A) -14	(A) -13	(C) -12	(B) -11
(B) -30	(C) -29	(B) -28	(A) -27	(D) -26	(C) -25	(B) -24	(B) -23	(A) -22	(A) -21
(B) -39	(A) -38	(B) -37	(C) -36	(B) -35	(C) -34	(B) -33	(C) -32	(A) -31	

کثیر الانتخابی کنسپٹ چوئل (Conceptual) سوالات

- ☆ درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔
- 1- بائیولوجی کا بطور سائنس کیا مقصد ہے؟
 (A) جان اشیا کا مطالعہ (B) جاندار چوئل کا مطالعہ
 (C) کیمیکل ری ایکشنز کا مطالعہ (D) فزیکل ری ایکشنز کا مطالعہ
- 2- بیماری کی تشخیص، علاج اور روک تھام کا تعلق ہے:
 (A) ایپینولوجی (B) پیتھولوجی (C) ہسٹولوجی (D) پلائیولوجی
- 3- بائیولوجی کا تعلق ہے:
 (A) کیمسٹری سے (B) فزکس سے (C) اکائیکس سے (D) ان تمام سے
- 4- طیریا کا علاج کیا ہے؟
 (A) ہرٹل چائے (B) پیناڈول (C) کلورو کیمن (D) کیمن
- 5- کونسا مچھرا انسانوں میں طیریا کی منتقلی کا ذمہ دار ہے؟
 (A) اینیملز (B) کیولکس (C) اینڈیج (D) ان میں سے کوئی نہیں
- 6- ہائپو تھیس کے بعد کا مرحلہ ہے:
 (A) تجربات (B) مشاہدات (C) ڈیٹا کشر (D) نتیجہ

مطلبات

-1	(B)	-2	(B)	-3	(D)	-4	(D)	-5	(A)	-6	(C)
----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----

مختصر جوابی سوالات (Knowledge, Understanding, Application, Analytical & Conceptual) کی روشنی میں مرتب کیے گئے مختصر جوابی سوالات

1.1	بائیولوجی اور اس کی شاخیں (Biology and its branches)
1.2	بائیولوجی کا دیگر سائنسوں سے تعلق (Relation of Biology with other Sciences)

☆ مختصر جواب دیں۔

- 1- اینانومی کیا ہے؟
 جواب: اینانومی بائیولوجی کی دو شاخ ہے جس میں جانداروں خاص طور پر انسانوں کی اندرونی ساخت کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اینانومی بیماری کی تشخیص، طبی آلات کی ترقی اور زندگی کے معیار میں بہتری لانے میں مدد دیتی ہے، جیسے ڈائلیسیس سسٹم کے اعضا کا مطالعہ۔
- 2- فزیاولوجی کی تعریف کریں۔
 جواب: فزیاولوجی، بائیولوجی کی دو شاخ ہے جس میں جسم کے اعضاء کے کام کرنے سے متعلق مطالعہ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، سرکولٹری سسٹم جسم میں اہم مادوں کو کیسے منتقل کرتا ہے؟

3- منجس کی تعریف کریں۔

جواب: یہ بائیولوجی کی وہ شاخ ہے جو والدین سے اولاد میں خصوصیات کی منتقلی کا مطالعہ کرتی ہے۔ جنٹیکس میں سائنسدان جینیٹک بیماریوں کے اسباب کا طبی مطالعہ کرتے ہیں اور پودوں کی بہتر اقسام تیار کرتے ہیں۔

4- مالکیولر بائیولوجی سے کیا مراد ہے؟

جواب: مالکیولر بائیولوجی بائیولوجیکل مالکیولز جیسے کہ کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز، لیپڈز اور نیوکلیک ایسڈز کا مطالعہ کرتی ہے۔ مالکیولر بائیولوجسٹ بنیادی بائیولوجیکل پروسیجرز اور جینیاتی طور پر تبدیل شدہ جانداروں کی تخلیق کا مطالعہ بھی کرتے ہیں۔

5- مسئولی سے کیا مراد ہے؟

جواب: مسئولی نشوونما کا نیکو و سکو پک مطالعہ ہے۔ نشوونما کے سبب سے گروپس ہوتے ہیں جو ملتے جلتے کام انجام دیتے ہیں۔ نشوونما کی جانچ بیماریوں کی تشخیص، دواؤں کے مطالعے اور اعضاء و افعال اور ساخت کی سمجھ میں مدد دیتی ہے۔

6- نشوونما کیا ہیں؟

جواب: نشوونما کے گروپ ہوتے ہیں جو ایک جیسے کام انجام دیتے ہیں۔

7- مٹو کونڈریوم کیا ہے؟

جواب: مٹو کونڈریوم بائیولوجی کی وہ شاخ ہے جو فوسلز کے مطالعے سے متعلق ہے۔ فوسلز کی جانچ سائنسدانوں کو آرگنزمز کی ارتقائی تاریخ جاننے میں مدد دیتی ہے۔ مثال کے طور پر، ڈائناسور کے فوسلز بڑے رینگنے والے جانوروں کا ثبوت فراہم کرتے ہیں جو کہ لاکھوں سال پہلے زمین پر گھومتے تھے۔

8- فوسلز کیا ہیں؟

جواب: فوسلز پودوں اور جانوروں کی باقیات ہیں جو چٹانوں اور دیگر جیولوجیکل شکلوں میں محفوظ تھے۔

9- سائٹوبیکسیریم کیا ہے؟

جواب: سائٹوبیکسیریم (cyanobacterium) سب سے پرانا فوسل ہے، جس کی عمر 3.5 بلین سال ہے۔

10- جانداروں کی کھاسٹیکیشن کیوں ضروری ہے؟

جواب: جانداروں کی کھاسٹیکیشن زندگی کی ڈائیورسٹی کو سمجھنے اور منظم کرنے، نئی پس شیز کی شناخت کرنے اور ارتقائی تاریخ کا پتہ لگانے میں مدد دیتی ہے۔

11- میرین بائیولوجی سے کیا مراد ہے؟

جواب: بائیولوجی کی وہ شاخ ہے جو سمندروں اور کھارے پانی میں زندگی کے مطالعے سے متعلق ہے۔ یہ سمندری بائیوڈائیورسٹی کو سمجھنے، نئی پس شیز دریافت کرنے اور سمندری تحفظ کے مسائل کو حل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ مثال کے طور پر کورل ریف سمندری جانداروں کی وسیع اقسام کو سہارا دیتے ہیں۔

12- پتھالوجی کی تعریف کریں۔

جواب: بیماریوں، ان کی وجوہات اور اثرات کا مطالعہ ہے۔ پتھالوجی بیماری کی تشخیص، علاج اور بیماری سے بچاؤ میں مدد دیتی ہے۔ کینسر مثال کے طور پر بے قابو شدہ وراثی اور غیر معمولی سبب کے پھیلاؤ کی خصوصیت ہے۔

13- امیونالوجی کیا ہے؟

جواب: امیونالوجی وہ شاخ ہے جس میں ہم مدافعتی نظام یعنی ایمنی ان سسٹم کے اجزاء اور بیماریوں کے خلاف ان کے کردار کا مطالعہ کرتے ہیں۔ امیونالوجسٹ ویکسین تیار کرنے، آنکولیسٹن بیماریوں کا علاج کرنے اور ٹرانسپلانٹیشن کے خلاف مدافعتی رد عمل کو بہتر بنانے کے لیے مطالعہ کرتے ہیں۔

14- فارماکولوجسٹ فارماکولوجی میں کیا پڑھتے ہیں؟

جواب: فارماکولوجسٹ انسانی جسم پر ادویات کے اثرات کا مطالعہ کرتے ہیں اور نئی دوائیں تیار کرتے ہیں۔ اس کیمر کے لیے فارمی میں پیچھے آف اسٹڈیز (BS) ڈگری یا ڈاکٹر آف فارمیسی (D. Pharm) کی ڈگری درکار ہے۔

15- بائیو کیمسٹری کیا ہے؟

جواب: بائیو کیمسٹری جانداروں میں موجود مختلف کیمیائی مادوں کی ساخت اور رد عمل کا مطالعہ ہے۔ فوٹوسنتھیسیز اور ریپائریشن کے کیمیکیل ریجنسز کا مطالعہ بائیو کیمسٹری کی مثالیں ہیں۔

16- بائیوفزکس بائیولوجی میں کس طرح مددگار ہے؟

جواب: یہ فزکس کے اصولوں کے مطالعے سے متعلق ہے، جو بائیولوجیکل پراسیسز پر لاگو ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر بائیوفزکس میں ہم سسٹمز، ہڈیوں اور جوڑوں کے کام کو سمجھنے کے لیے ہم لیور اور مشین کے اصولوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔

17- کیمپوٹیشنل بائیولوجی کی تعریف کریں۔

جواب: کیمپوٹیشنل بائیولوجی میں، سائنس دان بائیولوجیکل سسٹمز کو سمجھنے کے لیے ریاضی کے ماڈلز، الگورتھمز اور کمپیوٹر سیمولیشن کا استعمال کرتے ہیں۔ اس میں بائیولوجیکل ڈیٹا کا تجزیہ کرنا شامل ہے، جیسے کہ پروٹین میں ایمپائونڈز کی ترتیب۔

18- بائیوجیوگرافی اور بائیو سسٹیمٹکس کے درمیان فرق کریں۔

جواب: بائیوجیوگرافی اور بائیو سسٹیمٹکس کے درمیان فرق:

بائیو سسٹیمٹکس	بائیوجیوگرافی
یہ اعداد و شمار میں تجزیہ کرنے سے متعلق ہے۔ بائیولوجیکل ریسرچ، صحت کی دیکھ بھال اور صحت عامہ وغیرہ میں بائیو سسٹیمٹکس ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔	یہ دنیا کے مختلف جغرافیائی خطوں میں جانداروں کی تقسیم کے مطالعے سے متعلق ہے۔ بائیوجیوگرافی میں جانداروں کی تقسیم پر موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کا مطالعہ بھی کیا جاتا ہے۔

19- بائیو اکناکس کی تعریف کریں۔

جواب: یہ معاشی نقطہ نظر سے جانداروں کے مطالعے سے متعلق ہے۔ بائیو اکناکس میں، سائنس دان بائیولوجیکل منصوبوں کی لاگت اور منافع کا حساب لگاتے ہیں۔ جیسے کہ فصلوں کی نئی اقسام کی پیداوار۔

20- میڈیسن اور سرجری میں فرق لکھیں۔

جواب: میڈیسن اور سرجری میں فرق:

میڈیسن	سرجری
بائیولوجی میں میڈیسن کا شعبہ بیماریوں کی تشخیص اور علاج سے متعلق ہے۔	سرجری میں جسم کے حصے مرمت کیے جاسکتے ہیں، تبدیل کیے جاسکتے ہیں یا نکلے جاسکتے ہیں۔

21- ڈسٹ کس میں مہارت رکھتے ہیں؟

جواب: دانوں کے ڈاکٹر (ڈسٹ) اور ملینٹو، دانوں کے مسائل کی تشخیص، علاج اور سرجری کرنے میں مہارت رکھتے ہیں۔

22- فزیو تھراپی کیا ہے؟

جواب: یہ وہ تھراپی ہے جس کا استعمال جسم کی حرکت اور جسمانی افعال کو بحال کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، جو بیماری یا چوٹ گرنے کی وجہ سے خراب ہو گیا ہو۔ فزیو تھراپسٹ مرلیض کی جسمانی حرکت اور کام کو بہتر بنانے کے لیے جسمانی ورزش اور جسمانی طریقوں (جیسے مساج) کا استعمال کرتے ہیں۔

23- انجمنل میڈیسیں کیا ہیں؟

جواب: انجمنل میڈیسیں میں مویشیوں کے معیار اور پیداواری صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے ان کی افزائش اور دیکھ بھال شامل ہے۔ اس کے لیے، طلباء چار (4) سال BS کی ڈگری انجمنل سائنس میں حاصل کرتے ہیں۔

24- ہارٹنگ کیا کرتے ہیں؟

جواب: ہارٹنگ مرلیض یعنی باغبان پھلوں، سبزیوں اور آرائشی پودوں کی کاشت کرتے ہیں۔

25- فورسٹریز کیا کرتے ہیں؟

جواب: فورسٹریز جنگلات اور جنگلی حیات کی نشوونما کرتے ہیں اور تحفظ فراہم کرتے ہیں۔

26- فرائزک سائنس دان کیا کرتے ہیں؟

جواب: فرائزک سائنسدان مجرمانہ تحقیقات میں مدد کے لیے جرائم کے مناظر سے جسمانی شواہد کا تجزیہ کرتے ہیں۔

27- ایگری کلچرل سائنسدان کیا کرتے ہیں؟

جواب: ایگری کلچرل سائنسدان کاشتکاری کے طریقوں، فصلوں کی پیداوار اور زراعت کی تکنیکوں کو بہتر بناتے ہیں۔

3- بائیولوجی کے کیریئر (Careers in Biology)

1.4 زندگی کا مطالعہ کرنے کے حلقہ قرآنی ہدایت (Quranic instructions to reveal the study of life)

1.5 سائنس بطور ایک مشترکہ شعبہ (Science as a collaborative field)

28- میڈیسن اور سرجری میں ڈاکٹر بننے کے لیے تعلیمی قابلیت کیا ہونی چاہیے؟

جواب: میڈیسن اور سرجری میں ڈاکٹر بننے کے لیے طلباء کو پانچ (5) سالہ پیچھے آف میڈیسن پیچھے آف سرجری (MBBS) کی ڈگری حاصل کرنا ہوتی ہے۔

29- فارماکولوجی کے کیریئر کے لیے کوئی ڈگری ضروری ہے؟

جواب: فارماکولوجی کے کیریئر کے لیے، فارمی میں پیچھے آف اسٹینڈرڈ (BS) کی ڈگری یا ڈاکٹر آف فارمیسی (D. Pharm) کی ڈگری درکار ہے۔

30- فزیو تھراپسٹ بننے کے لیے کوئی ڈگری ضروری ہے؟

جواب: فزیو تھراپسٹ بننے کے لیے فزیکل تھیراپی یا فزیو تھراپی میں چار (4) سال کی BS کی ڈگری کی ضرورت ہے۔

31- مای گیری اور جنگلی حیات کے محکمے کے لیے ڈگری کے بعد نوکریاں دیتے ہیں؟

جواب: مای گیری اور جنگلی حیات کے محکمے ڈیوٹی انٹرین یا ایکو گھر میں BS اور ماسٹر آف اسٹینڈرڈ (MS) کی ڈگری کے بعد ملازمتیں فراہم کرتے ہیں۔

32- سورۃ انبیاء، آیت 30 کے مطابق تمام جاندار کس چیز سے پیدا ہوئے؟

جواب: سورۃ انبیاء کی آیت 30 کے مطابق تمام جاندار پانی سے پیدا ہوئے۔

33- جانداروں میں پانی کی اوسط مقدار کیا ہوتی ہے؟

جواب: مختلف جانداروں میں پانی کی اوسط مقدار 60 سے 90 فیصد ہوتی ہے۔

34- سورۃ الرحمن، آیت 14 انسان کی تحقیق کے بارے میں کیا کہتی ہے؟

جواب: سورۃ الرحمن، آیت 14 کے مطابق انسان کو خنکری کی طرح بھتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔

35- انسانی جینوم پروجیکٹ کا مقصد کیا تھا؟

جواب: جینوم پروجیکٹ کا مقصد پورے انسانی جینوم کی ترتیب اور نقشہ بنانا تھا۔

36- انسانی جینوم پروجیکٹ کب مکمل ہوا؟

جواب: انسانی جینوم پروجیکٹ 2003ء میں مکمل ہوا۔

37- انسانی جینوم پروجیکٹ میں کونسے شعبوں سے تعلق رکھنے والے ریسرچرز شامل تھے؟

جواب: انسانی جینوم پروجیکٹ میں مختلف شعبوں کے ریسرچرز شامل تھے جن میں بائیولوجی، جینیٹکس، انفارمٹکس اور کمپیوٹر سائنس شامل ہیں۔

38- کینسر کی ریسرچ میں کون شامل ہوتے ہیں؟

جواب: کینسر کی ریسرچ میں آنکولوجسٹ (کینسر کسلنٹ)، بائیولوجسٹ، ہائیڈیٹ، فارماکولوجسٹ اور سٹینڈرڈ سائنس شامل ہوتے ہیں۔

39- روبوٹکس اور مصنوعی ذہانت (AI) میں کیا شامل ہے؟

جواب: روبوٹکس اور مصنوعی ذہانت (AI) میں کمپیوٹر سائنس، انجینئرنگ، ریاضی، نیوروسائنس اور سائیکولوجی شامل ہیں۔

40- روبوٹکس اور مصنوعی ذہانت (AI) کے شعبوں کے درمیان تعاون کے کیا فوائد ہیں؟

جواب: روبوٹکس اور مصنوعی ذہانت (AI) کے شعبوں کے درمیان تعاون نے روبوٹک نظام، آٹونوم گاڑیاں، مشین لرننگ اور نیچرل لینگویج کی پروسیسنگ میں نمایاں ترقی کی ہے۔

41- ناسا (NASA) اور بین الاقوامی خلائی اسٹیشن (ISS) جیسی تنظیموں میں کونسے شعبے شامل ہیں؟

جواب: فزکس، طبیعیات، سیاروں کی سائنس، بائیولوجی، انجینئرنگ اور میڈیسن جیسے مختلف شعبوں کے سائنس دان NASA اور بین الاقوامی خلائی اسٹیشن (ISS) جیسی تنظیموں میں شامل ہیں۔

1.6 سائنسی طریقہ کار (Scientific Method)

1.7 نظریہ اور قانون (Principle) (Theory and Law)

1.8 طریقہ کار بائیولوجیکل طریقہ کار کی ایک مثال (Malaria-An Example Of Biological Method)

42- سائنٹیفک میٹھد کیا مراد ہے؟

جواب: سائنٹیفک میٹھد: سائنس کام یا تحقیق کے لیے افہائے محکمے خصوصاً اقدامات کو اجتماعی طور پر سائنٹیفک میٹھد کہتے ہیں۔

43- بائیولوجیکل میٹھد کیا مراد ہے؟

جواب: بائیولوجیکل تحقیق کے لیے افہائے محکمے خصوصاً اقدامات کو بائیولوجیکل میٹھد کہا جاتا ہے۔

44۔ سائنس دان مشاہدات سے مراد کیا ہیں؟

جواب: سائنس دان مشاہدات سے مراد ان کے ذریعے حاصل کیے گئے ہیں۔

- | | | |
|-------------------------|-------------------|---------------------------|
| (i) ہائیڈروجن کی پیمائش | (ii) مشاہدات کرنا | (iii) ہائیڈروجن کی پیمائش |
| (iv) آبی بخار کا | (v) تجربہ کرنا | (vi) آبی بخار کا |

45۔ سائنس دان مشاہدات کیسے کرتے ہیں؟

جواب: سائنس دان مشاہدات کے لیے اپنی حسیں استعمال کرتے ہیں۔ وہ اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ ان کے حواس محدود ہیں۔

46۔ باطنی اور مشاہداتی مشاہدات کے درمیان فرق کریں۔

جواب: باطنی مشاہدات ان میں ایسی خصوصیات شامل ہوتی ہیں جن کو ہمارے ہاتھ پاؤں یا حواس سے نہیں دیکھا جاسکتا۔ مثال کے طور پر بھول کے رنگ اور ساخت کو بیان کرنا۔

مشاہداتی مشاہدات مشاہداتی مشاہدات سے کہتے ہیں جن میں ان کے حواس کی مدد سے دیکھا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک درخت پر پتوں کی تعداد گننا (جیسے کہ 9 پتے)۔

47۔ ہائیڈروجن کی تعریف کریں۔

جواب: مشاہدات کی تحقیق طلب وضاحت ہائیڈروجن کو دیتی ہے۔

48۔ ایک ہائیڈروجن کی خصوصیات کیا ہیں؟

جواب: ہائیڈروجن کی خصوصیات:

- چمکنا کا جواب دینے کے لیے ایک معمولی جواں ہونا چاہیے۔
- ایک انتہائی مشاہدات سے متعلق ہونا چاہیے۔
- اسے تجربہ کرنا چاہیے یا دیکھنا چاہیے۔
- کوئی ایسا طریقہ ضرور ہو جو ہونا چاہیے جس سے ہائیڈروجن کو ملے۔

49۔ آبی بخار کی تعریف کریں۔

جواب: ہائیڈروجن کے حسیں سے ملنے والا بخار کہلاتا ہے۔

50۔ آبی بخار ہٹانے کے لیے کون سی مطلق استعمال کی جاتی ہے؟

جواب: آبی بخار ہٹانے کے لیے "آکر اورب" کی مطلق استعمال کی جاتی ہے۔

51۔ سائنس دان مشاہدات سے مراد کیا ہیں؟

جواب: تجربہ کرنا سائنس دان مشاہدات سے مراد ان کے ذریعے حاصل کیے گئے ہیں۔

52۔ سائنس دان تجربہ کرنا سے مراد کیا ہیں؟

جواب: سائنس دان تجربہ کرنا سے مراد ان کے ذریعے حاصل کیے گئے ہیں۔

53۔ تجربہ کرنا سائنس دان مشاہدات سے مراد کیا ہیں؟

جواب: تجربہ کرنا سائنس دان مشاہدات سے مراد ان کے ذریعے حاصل کیے گئے ہیں۔

54۔ سائنس دان مشاہدات سے مراد کیا ہیں؟

جواب: سائنس دان مشاہدات سے مراد ان کے ذریعے حاصل کیے گئے ہیں۔

55۔ 17 ویں صدی سے 20 ویں صدی تک علم کے بارے میں کیا مشاہدات کون سا تھا؟

جواب: 17 ویں صدی سے 20 ویں صدی تک علم کے بارے میں کیا مشاہدات کون سا تھا۔

56۔ 19 ویں صدی کے آخری حصے میں علم کے بارے میں کیا مشاہدات کون سے تھے؟

جواب: 19 ویں صدی کے آخری حصے میں علم کے بارے میں کیا مشاہدات کون سے تھے۔

- علم کے بارے میں کیا مشاہدات کون سے تھے۔
- علم کے بارے میں کیا مشاہدات کون سے تھے۔

57۔ علم کے بارے میں کیا مشاہدات کون سے تھے؟

جواب: 1878ء میں فرانسیسی آرمی کے ایک افسر نے علم کے بارے میں کیا مشاہدات کون سے تھے۔

58۔ علم کے بارے میں کیا مشاہدات کون سے تھے؟

جواب: علم کے بارے میں کیا مشاہدات کون سے تھے۔

59۔ علم کے بارے میں کیا مشاہدات کون سے تھے؟

جواب: علم کے بارے میں کیا مشاہدات کون سے تھے۔

60۔ علم کے بارے میں کیا مشاہدات کون سے تھے؟

جواب: علم کے بارے میں کیا مشاہدات کون سے تھے۔

61۔ علم کے بارے میں کیا مشاہدات کون سے تھے؟

جواب: علم کے بارے میں کیا مشاہدات کون سے تھے۔

62۔ علم کے بارے میں کیا مشاہدات کون سے تھے؟

جواب: علم کے بارے میں کیا مشاہدات کون سے تھے۔

63۔ علم کے بارے میں کیا مشاہدات کون سے تھے؟

جواب: علم کے بارے میں کیا مشاہدات کون سے تھے۔

64۔ علم کے بارے میں کیا مشاہدات کون سے تھے؟

جواب: علم کے بارے میں کیا مشاہدات کون سے تھے۔

65۔ علم کے بارے میں کیا مشاہدات کون سے تھے؟

جواب: علم کے بارے میں کیا مشاہدات کون سے تھے۔

66۔ علم کے بارے میں کیا مشاہدات کون سے تھے؟

جواب: علم کے بارے میں کیا مشاہدات کون سے تھے۔

67۔ علم کے بارے میں کیا مشاہدات کون سے تھے؟

[illegible]

۵۵۔ رسول اللہ ص نے کہا تم لوگو! کہنے کے لیے انسان کی جانے کا استعمال کیا؟

جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچانک موت نے آپ کے پیروں پر گراؤ کا شعلہ کیا۔

۱۸۸ اس بھڑکاؤ ہم کو کیا فائدہ دے گا؟ میری زندگی کا جو کام کرنے کی اہمیت ہے؟

کتاب: روزنامہ رس۔ نے پھر جس کا تاجروں کا گھاتے کے لیے بارہ گھنٹے گیس کا گھاتے کی اجازت دی۔

۴۰۔ اطالوی ایچ اے انسٹن نے کب انڈیا لکچر مجر کا لکچر کے سر تھیں کو کانے کی اہلادت دی؟

مجموعہ: ۱۸۹۸ء میں سلطان علی شاہ نے ایک نیا دستور جاری کیا جس کے تحت ہر سال کی آمدنی کی

فکریاتی کنسیپچوئل (Conceptual) سوالات

☆

۵۔ ہائیڈروجنی کا دوسری سائنس سے کیا تعلق ہے؟

تھواب: ہائیدرونی دوسری سائنس جیسے کاسٹری انفرکس اور اٹھ سائنس سے منسلک ہے۔ یہ سائنس زندگی کے عمل، ماحولیاتی تعاملات اور جانداروں کی
تجزیہ کلاس کو لگنے میں مدد کرتے ہیں۔

۵۔ مہذب بین اور دہلاڑی مہذب بین میں حوازد کرے۔

جواب: مہذبہ بین: مہذبہ بین انسانوں میں پادریوں کی گھنٹیوں اور عطا کے معلق ہے۔

وزارتی سہیلے ہیں: چھ ماہوں میں چار یوں کی جھبھ اور بھان سے متعلق ہے۔

۱۰۔ ایک شخص نے کہا کہ میں نے اپنے گھر میں ایک کتہا لٹایا ہے جس کا نام ہے "میں نے اپنے گھر میں ایک کتہا لٹایا ہے"۔

یہاں FSC کے لوگوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کے دیگر ایس ایم ایس کے لوگوں کے مسائل کی بھی اطلاع دی گئی ہے۔

۴۔ سائنس ایک ایسی تعاون کے طور پر کام کرتی ہے؟

کتاب: سائنس ایک ایسی تھانہ ہے جس میں مختلف شعبوں کے سرچر مسائل کو حل کرنے کے لیے حل رکام کرتے ہیں۔ بین الحدود سائنسز
 رپورٹرز طریقے سے مسائل سے بات کرتی ہیں۔

۹۔ میں اللہ و سائنس کی یکجہ پیشانی۔

مجاہد: میں اللہ و سائنس کی پاکیزہ مثالیں دیتا ہوں

- انسانی جسم پر دھوکے
- مہربانی جو اللہ کی رحمت ہے
- پہنچنے والی رحمت
- روزِ نکس اور معمولِ اداس (AT)

ہائپوٹھیس کا منطقی نتیجہ پیش ہوتا ہے۔

- سائنسی نظریہ ایک وضاحت ہوتی ہے جو ان حقائق پر مبنی ہوتی ہے جن کی تجربات کے ذریعے بار بار تصدیق کی گئی ہو۔
- اگر ایک نظریہ کو تجربات کے ذریعے بار بار ثابت کیا جائے، تو وہ ایک سائنسی قانون یا اصول بن جاتا ہے۔
- سائنسی قانون قدرت کا ایک یکساں یا مستقل حقیقت ہوتا ہے۔

حل مشقی سوالات

- A- درج ذیل سوالات کے لیے درست جوابات منتخب کریں۔
- 1- ہائیولوجی کی کون سی شاخ سلازکی ساخت اور افعال کا مطالعہ کرتی ہے؟
 (الف) سائٹولوجی (ب) مائیکروبیالوجی (ج) ہسٹولوجی (د) ایکولوجی
- 2- جانداروں میں وراثت اور تئیریات کا مطالعہ کہلاتا ہے:
 (الف) ایکولوجی (ب) جینیٹکس (ج) ایٹانومی (د) انیمیر یولوجی
- 3- بیکٹیریا کے ذریعے بنائی گئی انسولین کس تکنیک کی مثال ہے؟
 (الف) ایسا کالوجی (ب) ہائیوٹیکنالوجی (ج) ہائیوٹیکسٹری (د) ہسٹولوجی
- 4- دل خون پمپ کرتا ہے، معدہ کھانا ہضم کرتا ہے، اور گردے فضلہ نکالتے ہیں۔ یہ بیان کہاں سے آیا ہے؟
 (الف) فزیالوجی (ب) ایٹانومی (ج) مارفولوجی (د) ہسٹولوجی
- 5- ہائیولوجی کی کون سی شاخ میں جانداروں کی کردہ بندی (کلاسیفیکیشن) کا مطالعہ شامل ہے؟
 (الف) ٹیکسونومی (ب) فزیالوجی (ج) پیلے انٹالوجی (د) ہائیوجغرافیائی
- 6- ہائپوٹھیس بنانے اور تجربات کرنے کے درمیان کون سا مرحلہ آتا ہے؟
 (الف) ڈیٹیکشن بنانا (ب) مشاہدات کرنا (ج) نتائج کا خلاصہ کرنا (د) ڈیٹا کا تجزیہ کرنا
- 7- مندرجہ ذیل میں سے کون سی سائنسی طریقہ کار کی خصوصیات میں سے ہے؟
 (الف) یہ شاہد پر انحصار کرتا ہے (ب) اس میں ہائپوٹھیس تیار کرنا شامل ہے (ج) ہائپوٹھیس ہمیشہ درست ہوگا (د) اس میں ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے
- 8- سائنسی طریقہ کار کے اقدامات کی صحیح ترتیب منتخب کریں؟
 (الف) مشاہدات۔ ہائپوٹھیس۔ ڈیٹیکشن۔ تجربات (ب) مشاہدات۔ ہائپوٹھیس۔ قانون۔ تیوری (ج) ہائپوٹھیس۔ مشاہدات۔ ڈیٹیکشن۔ تجربات (د) قانون۔ تیوری۔ ڈیٹیکشن۔ مشاہدات
- 9- جو لوگ دھوئیں والی آگ کے قریب سو تھے، انھیں طبریا ہونے کا امکان کم کیوں تھا؟
 (الف) دھواں ان کے خون میں موجود پلازموڈیم کو مار دیتا ہے (ب) آگ درجہ حرارت بڑھاتی ہے اور پلازموڈیم ہوا میں مر جاتا ہے (ج) چھڑکھڑکیوں کو برداشت نہیں کر پاتے اور دودھ بھاگ جاتے ہیں (د) دھواں چھڑکھڑکیوں میں موجود پلازموڈیم کو مار دیتا ہے

10- سائنسی طریقہ کار میں تجربات بہت اہم ہیں کیونکہ ایک محقق:

- (الف) ہمیشہ صحیح نتائج حاصل کرتا ہے
- (ب) بہت سارے ہائپوٹھیس کو غلط ثابت کرتا ہے اور کچھ ہائپوٹھیس کو ثابت کرتا ہے
- (ج) اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ وہ ہائپوٹھیس کو ثابت کرے گا
- (د) تجربہ گاہ میں کام کرنے کا موقع حاصل کرتا ہے

مجموعات

1- (الف)	2- (ب)	3- (ب)	4- (الف)	5- (الف)	6- (الف)	7- (ج)	8- (الف)	9- (ج)	10- (ب)
----------	--------	--------	----------	----------	----------	--------	----------	--------	---------

B- مختصر جوابات لکھیں۔

1- ہائیولوجی کی درج ذیل شاخوں کی تعریف کریں۔

جینیٹکس، ایٹانومی، پیلے انٹالوجی، میرین ہائیولوجی، پتھالوجی

جواب: جینیٹکس (Genetics): یہ ہائیولوجی کی وہ شاخ ہے جس میں خصوصیات کی والدین سے اولاد تک منتقلی کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ جینیٹکس میں سائنسدان جینیاتی بیماریوں کے اسباب کا مطالعہ کرتے ہیں اور پودوں اور جانوروں کی بہتر اقسام تیار کرتے ہیں۔

ایٹانومی (Anatomy): یہ ہائیولوجی کی وہ شاخ ہے جس میں جانداروں، خاص طور پر انسانوں کی اندرونی جسمانی ساخت کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یہ بیماریوں کی تشخیص، طبی آلات کی تیاری، اور زندگی کے معیار کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہے، مثلاً نظام انہضام کے اعضاء کا مطالعہ۔

پیلے انٹالوجی (Palaeontology): یہ ہائیولوجی کی وہ شاخ ہے جس میں فوسلز (fossils) کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ فوسلز کے تجزیے سے سائنسدان جانداروں کی ارتقائی تاریخ کو جان سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، ڈائنوسارز کے فوسلز اس بات کے شواہد فراہم کرتے ہیں کہ زمین پر لاکھوں سال پہلے دیوبند پر رینگنے والے جاندار موجود تھے۔

میرین ہائیولوجی (Marine Biology): یہ ہائیولوجی کی وہ شاخ ہے جس میں سمندروں اور ٹینکین پانی میں زندگی کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یہ سمندری جانداروں کے تنوع کو سمجھنے، نئی اقسام دریافت کرنے، اور سمندری تحفظ کے مسائل حل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ مثال کے طور پر، کورل ریف (coral reefs) سمندری جانداروں کی وسیع اقسام کو سہارا دیتے ہیں۔

پتھالوجی (Pathology): یہ بیماریوں، ان کے اسباب اور اثرات کا مطالعہ ہے۔ پتھالوجی سے بیماری کی تشخیص، روک تھام، اور علاج میں مدد ملتی ہے۔ مثال کے طور پر، پتھالوجسٹ یہ مطالعہ کرتے ہیں کہ سلازکی بے قابو تقسیم اور پھیلاؤ کس طرح کیسر کا سبب بنتی ہے۔

2- ہائیولوجی کی کون سی شاخ میں جانداروں کی فریٹلائزیشن سے لے کر پیدا ہونے یا انڈے سے نکلنے تک کی نمو کو پڑھا جاتا ہے؟

جواب: ہائیولوجی کی شاخ انیمیر یولوجی میں جانداروں کی فریٹلائزیشن سے لے کر پیدا ہونے یا انڈے سے نکلنے تک کی نمو کو پڑھا جاتا ہے۔

میڈیسن اور سرجری کے پیشہ کو شامل سمیڈیسی سے کیسے مختلف سمجھا جاتا ہے؟

جواب: میڈیسن اور سرجری (Medicine and Surgery): میڈیسن کا شعبہ بیماریوں کی تشخیص اور علاج سے متعلق ہے، جبکہ سرجری میں جسم کے خراب حصوں کو مرمت، تبدیلی یا ہٹایا جاتا شامل ہے۔ اس پیشے کے لیے طلبہ کو 5 سالہ بیچلر آف میڈیسن اور بیچلر آف سرجری (MBBS) کے خراب حصوں کو مرمت، تبدیلی یا ہٹایا جاتا شامل ہے۔ اس پیشے کے لیے طلبہ کو 5 سالہ بیچلر آف میڈیسن اور بیچلر آف سرجری (MBBS)

کی ڈگری مکمل کرنا ہوتی ہے۔ جبکہ انجینئرنگ میں موبائیل کی افزائش اور دیگر بحال سے متعلق ہے تاکہ ان کے معیار اور پیداوار کو بہتر بنایا جاسکے اس کے لیے طلبہ حیوانیات پروری میں 4 سالہ بی ایس (BS) کی ڈگری حاصل کرتے ہیں۔

4- مارفولوجی اور فزیالوجی میں کیا فرق ہے؟

جواب: مارفولوجی (Morphology): یہ جانداروں کی بناوٹ (form) اور ساخت (structure) کے مطالعے کا علم ہے۔ اس شاخ میں بیرونی شکل و صورت (جیسے شکل، رنگ، پیٹرن وغیرہ) کے ساتھ ساتھ اندرونی ساختوں، جیسے اعضاء، کا بھی مطالعہ کیا جاتا ہے۔

فزیالوجی (Physiology): بائیولوجی کی یہ شاخ جسمانی حصوں کے افعال کے مطالعہ سے متعلق ہے۔ مثال کے طور پر، خون کی گردش کا نظام کیسے ضروری اجزاء پر جسم میں منتقل کرتا ہے۔

5- کمپیوٹیشنل بائیولوجی کیا ہے؟

جواب: کمپیوٹیشنل بائیولوجی (Computational Biology): کمپیوٹیشنل بائیولوجی میں سائنسدان زندگی کے نظاموں اور تعلقات کو سمجھنے کے لیے ریاضیاتی ماڈلز، الگورتھمز (algorithms)، اور کمپیوٹر سولوشنز (simulations) استعمال کرتے ہیں۔ اس میں بائیولوجیکل ڈیٹا، جیسے پروٹین میں امینو ایسڈز (amino acids) کی ترتیب، کا مطالعہ شامل ہے۔

6- سائنسی طریقہ کار میں مشاہدہ اور تجربات کا کیا کردار ہے؟

جواب: مشاہدات (Observations): سائنس دان مسئلے کے متعلق مشاہدات کرتے ہیں۔ مشاہدہ کرنے کے لیے سائنسدان اپنے پانچ حواس (senses) استعمال کرتے ہیں۔ وہ اسی یا متعلقہ مسائل پر سابقہ تحقیق کا مطالعہ بھی کرتے ہیں۔ مشاہدات معیاری یا مقدار دار ہو سکتے ہیں۔

تجربات (Experiments): یہ سائنسی طریقہ کار کا سب سے بنیادی مرحلہ ہے۔ سائنسدان ان تمام ہائپوٹھیسز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے تجربات کرتے ہیں۔ ایک کامیاب تجربے میں ایک ہائپوٹھیس درست ثابت ہوتا ہے جبکہ متبادل ہائپوٹھیس غلط ثابت ہوتے ہیں۔ غلط ہائپوٹھیسز کو مسترد کر دیا جاتا ہے اور درست ثابت ہونے والے ہائپوٹھیسز کو قبول کیا جاتا ہے۔ سائنسدان اس قبول شدہ ہائپوٹھیس سے نئی ڈیٹا کٹنگ نکالتے ہیں۔ پھر مزید تجربات کرتے ہیں اور ہائپوٹھیسز کے درست ہونے کی تصدیق کرتے ہیں۔

C- تفصیلی جوابات لکھیں۔

1- بائیولوجی کی تعلیم کا فزکس، کیمسٹری، سٹیٹسٹکس (statistics)، جغرافیہ، انکس اور کمپیوٹر سائنس سے تعلق جوڑیں۔

جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال 3 کا جواب۔

2- وضاحت کریں کہ کیسے بائیولوجی کی تعلیم مختلف پیشہ ورانہ تعلیمات کی راہ ہموار کر سکتی ہے۔

جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال 4 کا جواب۔

3- سائنس ایک تعاون کا میدان ہے جس میں سائنسدان علم کے چاولے کے لیے ایک ساتھ کام کرتے ہیں۔ مثالوں کی مدد سے اس بیان کی صداقت ثابت کریں۔

جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال 7 کا جواب۔

4- ایک ہائپوٹھیس کو تصدیق، لا اور پٹیل میں کیسے تبدیل کیا جاتا ہے؟

جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال 9 کا جواب۔

5- ایک سائنسدان سائنسی مسئلہ کو حل کرنے کے لیے کون سے بنیادی مراحل اختیار کرتا ہے؟

جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال 8 کا جواب۔

6- طیریا کی وجہ دریافت کرنے میں مختلف سائنسدانوں کے کام کو تفصیلی بیان کریں۔

جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال 10 کا جواب۔

7- زوں کے تجربات پر ایک تفصیلی نوٹ لکھیں۔

جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال 10 کا جواب۔

D- تحقیقی سوالات:

1- بائیولوجی کو مختلف شاخوں جیسے بائی، زوولوجی اور مائیکرو بائیولوجی میں درجہ بندی کرتا کیوں ضروری ہے؟ سائنسی تحقیق کو کس طرح سے فائدہ ہوتا ہے؟

جواب: بائیولوجی کو مخصوص شاخوں میں تقسیم کرنے اور کسی مخصوص ایریا میں پیشہ تزیں سے سائنسدانوں کو جدید ریسرچ، مربوط اور گہرائی تک معلومات حاصل کرنے، ریسرچ کرنے اور منظم و اجتماعی طور پر مسائل حل کرنے میں مدد ملتی ہے۔

2- ایک سائنس دان کسی مشاہدے کی تصدیق کے لیے سائنسی طریقہ کار کا اطلاق کیسے کر سکتا ہے کہ پلانٹ کی ایک مخصوص قسم براہ راست سورج کی روشنی کے مقابلے میں سایہ دار جگہوں پر زیادہ تیزی سے بڑھتی ہے؟

جواب: سائنسدان درج ذیل طریقے سے سائنسی طریقے کار کو اپلائی کرتے ہیں:

- سایہ دار اور براہ راست سورج کی روشنی میں پودوں کی گروتھ کا مشاہدہ کرتے ہیں۔
- بیک گراؤنڈ ریسرچ کیجیے اور ہائپوٹھیس بنائیں۔ "پودوں کی چندہی شیز سورج کی براہ راست روشنی کی بجائے سایہ دار جگہوں میں زیادہ بہتر اُگتے ہیں۔"

• تجربات کیجیے۔ (کنٹرول گروپ اور تجرباتی گروپ)

• دونوں تجربات کے پودوں کی گروتھ کی پیمائش کریں اور سٹیٹسٹکس کے ڈیٹا سے تجزیہ کیجیے۔

• اگر ڈیٹا ہائپوٹھیسز کو سپورٹ کرتا ہے تو مشاہدات درست ہیں۔ ورنہ تجربات سے ہائپوٹھیس غلط ثابت ہو جانے پر ختم ہو جاتا ہے۔

باب 2

بائیوڈائیورسٹی

Biodiversity

یہ باب پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہوں گے کہ:

- بائیوڈائیورسٹی اور کلاسیفیکیشن کی تعریف کریں۔
- کلاسیفیکیشن کے نیکسونمک درجوں (ranks) کی فہرست بنائیں۔
- کلاسیفیکیشن کی سیکسوں کی تاریخ پر تبادلہ خیال کریں۔
- تین بڑے ڈومینز (domains) کی فہرست بنائیں جن میں جانداروں کی کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے۔
- دائرس کی کلاسیفیکیشن میں پیش آنے والی چھپچھپائیاں بیان کریں۔
- بائیونومیل نوسن کچر سسٹم کا خاکہ پیش کریں۔

انشائی طرز سوالات

مختصر تعریف کی بنیادی تکنیکس (Knowledge, Understanding, Application, Analytical & Conceptual) کی روشنی میں مرتب کیے گئے انشائی طرز سوالات


2.1 بائیوڈائیورسٹی (Biodiversity)

2.2 کلاسیفیکیشن (Classification)

سوال 1: بائیوڈائیورسٹی کے تصور اور ایکوسسٹم کی صحت کو برقرار رکھنے میں اس کی اہمیت پر نوٹ لکھیں۔

جواب: بائیوڈائیورسٹی (Biodiversity): کسی علاقے میں جانداروں کی مختلف اقسام اُس علاقے کی بائیوڈائیورسٹی کہلاتی ہیں۔ علاقے کی بائیوڈائیورسٹی اس میں جانداروں کی مختلف اقسام کی تعداد اور ہر قسم میں موجود جانداروں کی مزید اقسام کو مد نظر رکھ کر ماپی جاتی ہے۔

بائیولوجسٹس قریباً دو ملین اقسام کے جانداروں کو دریافت کر چکے ہیں اور ان کی گروہ بندی کر چکے ہیں۔ تاہم، ان کا تخمینہ ہے کہ زمین پر جانداروں کی اقسام کی مجموعی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ زمین پر بائیوڈائیورسٹی یکساں طور پر نہیں پھیلی ہوئی۔ کسی جگہ کی بائیوڈائیورسٹی کا انحصار مختلف عوامل پر ہے جیسے آب و ہوا، بلندی (altitude)، اور مٹی کی قسم پر ہے۔ ٹراپیکل (Tropical) علاقے قطبی (Polar) علاقوں کی نسبت زیادہ بائیوڈائیورسٹی رکھتے ہیں۔



اقوام متحدہ نے 22 مئی کو بائیوڈائیورسٹی کے عالمی دن کے طور پر منانے کا اعلان کیا ہے۔ یہ دن بائیوڈائیورسٹی کے تحفظ کو فروغ دینے کے لیے منایا جاتا ہے۔

بائیوڈائیورسٹی کی اہمیت (Importance of Biodiversity): بائیوڈائیورسٹی انسانوں اور سارے کے لیے بہت سی ضروری خدمات فراہم کرتی ہے۔ بائیوڈائیورسٹی کے کچھ اہم فوائد درج ذیل ہیں۔

ماحولیاتی استحکام: بائیوڈائیورسٹی ماحولیاتی نظام کے توازن کو برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ بائیوجیو کیمیکل سائیکلز (biogeochemical cycles) مثلاً کاربن سائیکل اور نائٹروجن سائیکل میں بائیوڈائیورسٹی اہم کردار ادا کرتی ہی ہے۔

آب و ہوا کا کنٹرول: پودے اور اعلیٰ کاربن ڈائی آکسائیڈ جذب کرتے ہیں۔ اس سے آب و ہوا کو متوازن رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ قدرتی وسائل: بائیوڈائیورسٹی خوراک اور ادویات سے لے کر تعمیراتی مواد اور ایندھن سمیت بہت سے وسائل فراہم کرتی ہے۔

معاشی فوائد: بائیوڈائیورسٹی زراعت، سیاحت، اور دوا سازی سمیت مختلف صنعتوں کی معاونت کرتی ہے۔

سوال 2: بائیولوجی میں کلاسیفیکیشن کی اہمیت کی وضاحت کریں اور یہ کس طرح مختلف جانداروں کے درمیان تعلقات کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہے؟

جواب: کلاسیفیکیشن (Classification): بائیولوجسٹس جانداروں کی قریباً دو ملین (بیس لاکھ) اقسام کی شناخت کر چکے ہیں۔ ان میں سے 0.5 ملین اقسام پودوں کی ہیں اور 1.5 ملین اقسام جانوروں کی ہیں۔ یہ بنیاد پر نہیں کرتے کہ یہ انسانوں کے زمین پر موجود جانداروں کی کل اقسام کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ ہر سال، بائیولوجسٹس ہزاروں نئی اقسام دریافت کرتے ہیں۔ جانداروں کے اتنے بڑے مجموعے کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے بائیولوجسٹس جانداروں کی گروہ بندی یعنی کلاسیفیکیشن کرتے ہیں۔ کلاسیفیکیشن وہ عمل ہے جس میں جانداروں کو ان میں پائی جانے والی مشابہتوں اور اختلافات کی بنیاد پر گروہوں اور ذیلی گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

کلاسیفیکیشن کے فوائد (Advantages of Classification)

- کلاسیفیکیشن کی مدد سے مشابہ جانداروں کو ایک گروپ میں رکھا جاتا ہے جس سے ان کی خصوصیات، تعلقات، اور ارتقائی تاریخ کو سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں زمین پر جانداروں کی وسیع ڈائیورسٹی کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔
- کلاسیفیکیشن مختلف پسی شیئرز (species) کے مطالعہ اور موازنہ کے لیے ایک فریم ورک (frame work) فراہم کرتی ہے۔
- یہ مختلف جانداروں کے مابین باہمی تعلقات کو واضح کرتی ہے۔
- یہ نئی پسی شیئر کی شناخت اور ان کے ارتقائی تعلقات کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔
- کلاسیفیکیشن دنیا بھر کے بائیولوجسٹس کے لیے ایک مشترکہ زبان فراہم کرتی ہے جو جانداروں کے مطالعہ میں موثر رابطہ (communication) ممکن بناتی ہے۔
- مجموعی طور پر، کلاسیفیکیشن قدرتی دنیا کو سمجھنے اور بائیوڈائیورسٹی کے تحفظ اور انتظام کے لیے بہت اہم ہے۔

2.3 ٹیکسونمک درجے (Taxonomic Ranks)

2.4 کلاسیفیکیشن کی تاریخ (History of Classification)

سوال 3: کلاسیفیکیشن کے اصول اور مقاصد لکھیں۔

جواب: کلاسیفیکیشن کے مقاصد اور اصول (Aims and Principles of Classification)

- a. جانداروں کے درمیان مشابہت اور اختلافات کا تعین کرنا تاکہ ان کا مطالعہ آسانی سے کیا جاسکے۔
- b. جانداروں کے درمیان ارتقائی تعلقات تلاش کرنا۔

بائیولوجسٹس جانداروں کو ان کی مشابہت، جسمانی خصوصیات کی بنیاد پر گروہوں اور ذیلی گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ حالیہ دور میں، وہ جینیٹکس سے بھی مدد لیتے ہیں۔ وہ جانداروں کے درمیان جینیاتی مشابہت اور اختلافات کا پتہ لگاتے ہیں۔ پھر وہ ان معلومات کو جانداروں کی ساختوں اور انفعال میں مشابہت اور اختلافات جاننے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔

سوال 4: لیمکس سسٹم کی وضاحت کریں نیز سات فیکسائٹک درجات اور ان کے تعلقات کو بیان کریں۔

جواب: فیکسائٹک کے درجات (Taxonomix Ranks):

جانداروں کو جن گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، انہیں فیکسائٹک کے درجات (تاکسا: taxa) کہتے ہیں۔ سویڈن کے بائیٹ (Botanist) کارل لینئس (Carl Linnaeus) نے 1735 میں کلاسیفیکیشن کا ایک اہم سسٹم متعارف کروایا جسے لینئس سسٹم (Linnaean system) کہتے ہیں۔ اس سسٹم میں اس نے سات درجات تجویز کیے: کنگڈم (Kingdom)، فائلم (Phylum) یا ڈویژن (Division)، کلاس (Class)، آرڈر (Order)، فیملی (Family)، جنس (Genus)، اور ہیٹیز (Species)۔ 1977 میں اس سسٹم میں ایک نئے درجے ڈومین (Domain) کا اضافہ کیا گیا۔

ڈومین: فیکسائٹک کا سب سے اعلیٰ درجہ ڈومین ہے۔ تمام جانداروں کو تین ڈومینز میں تقسیم کیا جاتا ہے:

ڈومین آرکیا (Archaea)، ڈومین بیکٹیریا (Bacteria)، اور ڈومین یوکاریا (Eukarya)۔

کنگڈم: ڈومین کو مزید کنگڈمز میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، ڈومین یوکاریا کو چار کنگڈمز میں تقسیم کیا جاتا ہے: پلانٹی (Plantae)، فنجائی (Fungi)، اور پروٹسٹا (Protista)۔

فائلم (phylum): پودوں اور فنجائی کے لیے اس درجہ کو ڈویژن (Division) کہتے ہیں:

ہر کنگڈم مزید قریبی تعلق رکھنے والے فائلمز میں تقسیم ہوتا ہے۔

کلاس (Class): ہر فائلم یا ڈویژن مزید قریبی تعلق رکھنے والی کلاسز میں تقسیم ہوتا ہے۔

آرڈر (Order): ہر کلاس مزید قریبی تعلق رکھنے والے آرڈرز میں تقسیم ہوتی ہے۔


فیملی (Family): ہر آرڈر مزید قریبی تعلق رکھنے والی فیملیوں میں تقسیم ہوتا ہے۔

جنس (Genus): ہر فیملی مزید قریبی تعلق رکھنے والے جنس (واحد جنس) میں تقسیم ہوتی ہے۔

ہیٹیز (Species): یہ کلاسیفیکیشن کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ ایک ہی شیز ایسے جانداروں کا گروپ ہے جو آپس میں تولید کر کے ایسے نئے جاندار پیدا کر سکتے ہیں جو تولید کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

سوال 5: فروٹ فلای، انسان اور مٹر کی درجہ بندی لکھیں۔

جواب: فروٹ فلای، انسان اور مٹر کی درجہ بندی:



فیکسائٹک درجہ	فروٹ فلای (Fruit fly)	انسان (Human being)	مٹر (Pea plant)
ڈومین	یوکاریا (Eukarya)	یوکاریا (Eukarya)	یوکاریا (Eukarya)
کنگڈم	ایٹھیلیا (Animalia)	ایٹھیلیا (Animalia)	پلانٹی (Plantae)
فائلم یا ڈویژن	آرتھروپوڈا (Arthropoda)	کورڈیٹا (Chordata)	میگنولیوفاٹا (Magnoliophyta)
کلاس	انسکٹا (Insecta)	میمیلیا (Mammalia)	میگنولیپسڈا (Magnoliopsida)
آرڈر	ڈپٹیرا (Diptera)	پرائمیٹس (Primates)	فابیلز (Fabales)
فیملی	ڈروسیلیڈی (Drosophilidae)	ہومینائیڈی (Hominidae)	فابیسی (Fabaceae)

جنس	ڈروسیلا (Drosophila)	ہومو (Homo)	پانی سم (Pisum)
ہیٹیز	ڈروسیلا میلے نوکیٹر (Drosophila melanogaster)	ہومو سپی ایز (Homo sapiens)	پانی سم سٹی ویم (Pisum sativum)

سوال 6: کلاسیفیکیشن سسٹم کی تاریخ پر نوٹ لکھیں۔

جواب: کلاسیفیکیشن کی تاریخ (History of Classification):

درجہ بندی کے نظام کی تاریخ قدیم ادوار تک جا سکتی ہے۔

• یونانی فلسفی ارسطو Aristotle (384-322 قبل مسیح) پہلے شخص تھے جنہوں نے 1172ء میں ابن رشد (ایورس) نے ارسطو کی کتاب "دی اینیما (De Anima)" کا عربی میں ترجمہ کیا۔

• عرب عالم ابو عثمان عمر الجاحز Abu Usman Umer Al-Jahiz (869-781ء) نے جانوروں کی 1350 اقسام کی خصوصیات بیان کیں اور چوبیسویں کی زندگی پر بہت کچھ لکھا۔

• اطالوی بائیٹ اینڈ ریازیز لیڈیا Andrea Caesalpinia (1603-1519ء) نے پودوں کو چندہ گروپوں میں تقسیم کیا اور انہیں "جنس" (genera) کہا۔

• فرانسیسی بائیٹ ٹورنفرٹ Tournefort (1708-1656ء) نے کلاس اور ہیٹیز کے ٹیکسا متعارف کروائے۔

• سویڈش بائیولوجسٹ کارل لینئس Carl Linnaeus (1778-1707ء) نے جانداروں کے لیے سات درجات پر مشتمل کلاسیفیکیشن سسٹم بنایا یعنی کنگڈم، فائلم، کلاس، آرڈر، فیملی، جنس، اور ہیٹیز۔

سوال 7: دو کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم کی وضاحت کریں۔

جواب: دو کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم (Two-Kingdom Classification System):

یہ کلاسیفیکیشن کا سب سے پرانا سسٹم ہے جس میں تمام جانداروں کی کلاسیفیکیشن دو کنگڈمز میں کی جاتی تھی۔

کنگڈم پلانٹی (Plantae): وہ جاندار جو اپنی خوراک خود تیار کر سکتے ہیں (یعنی آٹوٹرافس: autotrophs)، کنگڈم پلانٹی میں شامل کیے گئے۔

کنگڈم ایٹھیلیا (Animalia): وہ جاندار جو اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتے (یعنی ہیٹروٹرافس: heterotrophs)، کنگڈم ایٹھیلیا میں شامل کیے گئے۔

پروکاریوٹس (prokaryotes) کی پوزیشن: اس سسٹم کے مطابق پروکاریوٹس (prokaryotes) [بیکٹیریا اور آرکیا (Archaea)] اور فنجائی بھی کنگڈم پلانٹی کے اراکان تھے۔

ٹیکسٹوسٹس کے اعتراضات: فیکسائٹک کے ماہرین نے اس نظام کو ناقابل عمل پایا کیونکہ بہت سے پونی سیلولر جاندار جیسے یوگلینا (Euglena) پودوں اور جانوروں دونوں خصوصیات رکھتے ہیں مثلاً پودوں جیسی خاصیت (کلوروفل کی موجودگی) اور جانوروں جیسی خصوصیات (اندھیرے میں غذا حاصل کرنے کا ہیڈروٹاکٹک طریقہ اور سیل وال کی غیر موجودگی)۔ لہذا، ایسے جانداروں کے لیے ایک علیحدہ کنگڈم تجویز کی گئی۔ یہ سسٹم پروکاریوٹس (بیکٹیریا اور آرکیا) اور یوکاریوٹس کے درمیان فرق بھی واضح نہیں کرتا تھا۔

سوال 8: تین کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم پر نوٹ لکھیں۔

جواب: تین کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم (Three-Kingdom Classification System):

1866 میں جرمن ڈیالوجسٹ ارنسٹ ہیکل (Ernst Haeckel) نے یوگلینا جیسے جانداروں کے لیے ایک تیسرے کنگڈم یعنی کنگڈم پروٹسٹا (Protista) کی تجویز دی۔ اس نے پروکاریوٹس (بیکٹیریا اور آرکیا) کو بھی کنگڈم پروٹسٹا میں شامل کیا۔ اس سسٹم میں فنجائی ابھی کنگڈم پلانٹی کا ہی حصہ تھے۔

فیکسائٹک کے اعتراضات: فیکسائٹک کے کچھ ماہرین نے کنگڈم پلانٹی میں فنجائی کی جگہ کے بارے میں اختلاف کیا۔ فنجائی کی لحاظ سے پودوں سے

مشابہت رکھتے ہیں لیکن یہ ہنز وراثت (heterotrophs) ہوتے ہیں جو اپنے خوراک کو جذب کر کے حاصل کرتے ہیں۔ ان کی سیل وال میں سیلولوز نہیں ہوتا بلکہ کاٹن (chitin) پایا جاتا ہے۔

سوال 9: پانچ کنگڈمز والا کلاسیفیکیشن سسٹم کی وضاحت کریں۔

جواب: پانچ کنگڈمز والا کلاسیفیکیشن سسٹم (Five-Kingdom Classification System)

1967ء میں، فرانسیسی بائیولوجسٹ ای۔ چٹن (E-Chatton) نے بیکٹیریا کو بیان کرنے کے لیے "پروکاریوٹک" (prokaryotic) اور پروٹسٹا، فنجائی، جانوروں اور پودوں کو بیان کرنے کے لیے "یوکاریوٹک" (Eukaryotic) کی اصطلاحات تجویز کیں۔ 1969ء میں امریکی بائیولوجسٹ رابرٹ وٹکر (Robert Whittaker) نے پانچ کنگڈمز والا کلاسیفیکیشن سسٹم متعارف کرایا۔ یہ سسٹم درج ذیل بنیادوں پر مشتمل ہے:

- سیلولر آرگنائزیشن کا کیول جیسا کہ پروکاریوٹک (بیکٹیریا، آرکیا)، یونی سیلولر پروکاریوٹک (پروٹسٹا) اور ملٹی سیلولر پروکاریوٹک (فنجائی، پودے اور جانور)۔
- غذا ایت (nutrition) کے طریقے، جیسے فوٹوسنتھس، خوراک جذب کر کے جسم میں لے جانا اور خوراک کھا کر جسم میں لے جانا (ingestion)۔
- وٹکر (Whittaker) کے سسٹم میں ترامیم: اس بنیاد پر جانداروں کو پانچ کنگڈمز میں تقسیم کیا گیا: کنگڈم مونیرا (Monera)، کنگڈم پروٹسٹا (Protista)، کنگڈم فنجائی (Fungi)، کنگڈم پلانٹی (Plantae) اور کنگڈم انیمیلیا (Animalia)۔ 1988ء میں امریکی بائیولوجسٹ مارگولیس (Margulis) اور شوارٹز (Schwartz) نے وٹکر (Whittaker) کی پانچ کنگڈمز مڑوائی کلاسیفیکیشن میں ترامیم کی۔ انھوں نے کلاسیفیکیشن میں سیلولر آرگنائزیشن اور غذا ایت کے ساتھ ساتھ جینیٹکس کو زیر غور رکھا۔ انھوں نے جانداروں کو ان ہی پانچ کنگڈمز میں تقسیم کیا جو وٹکر (Whittaker) نے تجویز کیے تھے۔

سوال 10: تین ڈومین والا کلاسیفیکیشن سسٹم کیا ہے؟

جواب: تین ڈومین والا کلاسیفیکیشن سسٹم (Three-Domain Classification System)

1977ء میں امریکی مائیکرو بائیولوجسٹ کارل ووز (Carl Woese) نے کنگڈمز سے اوپر ایک ٹیکسون یعنی "ڈومین" شامل کیا۔ اس نے جانداروں کو تین ڈومینز میں تقسیم کیا یعنی آرکیا، بیکٹیریا، اور یوکاریا۔ درحقیقت یہ پروکاریوٹس کی دو ڈومینز یعنی آرکیا اور بیکٹیریا میں تقسیم تھی۔ جبکہ تمام یوکاریوٹس کو ایک ہی ڈومین یعنی یوکاریا میں رکھا گیا۔ آرکیا اور بیکٹیریا کے درمیان فرق اس کلاسیفیکیشن کی بنیاد ہیں۔

(a) 2 کنگڈم سسٹم:

کنگڈم پلانٹی	کنگڈم انیمیلیا
--------------	----------------

(b) 3 کنگڈم سسٹم:

کنگڈم پروٹسٹا	کنگڈم پلانٹی	کنگڈم انیمیلیا
---------------	--------------	----------------

(c) 5 کنگڈم سسٹم:

کنگڈم مونیرا	کنگڈم پروٹسٹا	کنگڈم پلانٹی	کنگڈم فنجائی	کنگڈم انیمیلیا
--------------	---------------	--------------	--------------	----------------

(d) 3 ڈومین سسٹم:

آرکیا	بیکٹیریا	یوکاریا
کنگڈم آرکیا بیکٹیریا	کنگڈم یوکاریا	کنگڈم پروٹسٹا
کنگڈم پلانٹی	کنگڈم فنجائی	کنگڈم انیمیلیا

کلاسیفیکیشن کے مختلف سسٹمز

2.5 جانداروں کے ڈومین (Domain of Living Organisms)

2.6 ڈومین یوکاریا کی کلاسیفیکیشن (Classification of Domain Eukarya)

2.7 کلاسیفیکیشن میں وائرس کا مقام (Status of Virus in Classification)

سوال 11: ڈومین آرکیا اور بیکٹیریا کی خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے درمیان فرق کریں۔

جواب: جانداروں کے ڈومین (Domains of Living Organisms)

ذیل میں جانداروں کی تین ڈومینز کی اہم خصوصیات درج ذیل ہیں۔

1- ڈومین آرکیا (Domain Archaea): یہ زمین پر سب سے قدیم جاندار ہیں۔ یہ پروکاریوٹس ہیں لیکن ان کی سیل وال میں پیپٹائیڈوگلیکین (peptidoglycan) نہیں ہے بلکہ یہ مختلف پولی پیپٹائیڈز (Polypeptides) اور پروٹینز پر مشتمل ہوتی ہے۔ ان کا rRNA (رابو سول RNA) بیکٹیریا کی نسبت یوکاریوٹس سے زیادہ مشابہ ہے۔ ان کی سیل ممبرین میں منفرد لیڈز پائے جاتے ہیں جو انہیں انتہائی ماحول میں زندہ رہنے کے قابل بناتے ہیں، جیسے گرم چشمے، نمکین، جھیلیں اور تیزابی یا اساسی پانی کے ذخیرے۔ تاہم، یہ ماحول جیسے مٹی اور سمندروں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ کچھ آرکیا غیر تاسمانی مرکبات جیسے سلفر یا امونیا سے توانائی حاصل کرتے ہیں۔ ان کے دوسرے گروپ فوٹوسنتھس میں کرتے ہیں لیکن، آکسیجن پیدا نہیں کرتے۔



ڈومین آرکیا میں ڈائوریٹری

ڈومین آرکیا میں ایک ہی کنگڈم شامل ہے، یعنی کنگڈم آرکی بیکٹیریا (Archaeobacteria) جس کا مطلب ہے قدیم بیکٹیریا۔ اس کنگڈم کی مثالیں یہ ہیں:

• میتھینو جنز (Methanogens) جو اپنے مینابولزم میں بطور بائی پروڈکٹ میتھین پیدا کرتے ہیں، ہیلوفائلز (Halophiles) جو انتہائی نمکین ماحول میں پائے جاتے ہیں، تھرموفائلز (Thermophiles) جو گرم پانی کے چشموں میں پائے جاتے ہیں، اور ایسڈو فائلز (Acidophiles) جو انتہائی تیزابی ماحول میں پائے جاتے ہیں۔

2- ڈومین بیکٹیریا (Domain Bacteria): اس ڈومین میں بیکٹیریا اور سائینو بیکٹیریا شامل ہیں۔ یہ بھی پروکاریوٹس ہیں۔ ان کی سیل وال پیپٹائیڈوگلیکین سے بنی ہوتی ہے۔ یہ تمام اقسام کے ماحول میں پائے جاتے ہیں بشمول مٹی، پانی، ہوا، اور جانداروں کے جسم میں۔ یہ یونی سیلولر ہیں۔ زیادہ تر اکیلے رہتے ہیں، البتہ کچھ سیلز کی زنجیریں، جھرمٹ یا کالونیاں بناتے ہیں۔ زیادہ تر ہنز وراثت رکھتے ہیں لیکن کچھ میں کلوروفل ہوتا ہے اور فوٹوسنتھس میں کرتے ہیں۔ اس ڈومین میں کنگڈم یوکاریا (Eubacteria) یعنی حقیقی بیکٹیریا شامل ہے۔ کچھ بیکٹیریا بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ بہت سے بیکٹیریا فائدہ مند ہیں، جیسے کہ ذی کپوزر بیکٹیریا یا غذائی اجزاء کی رہی سائیکلنگ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔

3- ڈومین یوکاریا (Domain Eukarya): اس ڈومین میں تمام یونی سیلولر اور ملٹی سیلولر یوکاریوٹس شامل ہیں۔ ان میں پیچیدہ یوکاریوٹک سیلز ہوتے ہیں جن میں نیوکلئیس اور دیگر ممبرین میں لپے (membrane-bound) آرگنیلز (organelles) ہوتے ہیں۔ اس ڈومین میں کنگڈم پروٹسٹا، کنگڈم فنجائی، کنگڈم پلانٹی اور کنگڈم انیمیلیا شامل ہیں۔

ڈومین یوکاریا (Eukarya)	ڈومین بیکٹیریا (Bacteria)	ڈومین آرکیا (Archaea)
یوکاریا کے سائز آرکیا کی نسبت چھوٹے ہوتے ہیں اور واضح ساخت رکھتے ہیں۔	بیکٹیریا کے سائز آرکیا کی نسبت چھوٹے ہوتے ہیں اور واضح ساخت رکھتے ہیں۔	آرکیا کے سائز خاص کر بیکٹیریا کی نسبت بڑے ہوتے ہیں اور شریہ ماحول میں زندہ رہ سکتے ہیں۔

سوال 12: ڈومین یوکاریا کے چار کنگڈمز کی خصوصیات بیان کریں۔
جواب: ڈومین یوکاریا کی کلاسیفیکیشن (Classification of Domain Eukarya):

(a) کنگڈم پروٹسٹا (Kingdom Protista): کنگڈم پروٹسٹا میں کچھ پروٹسٹ ہیراسائٹ ہوتے ہیں اور بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ مثلاً یوکیروٹس شامل ہیں جو یونی سیلولر، کالونی والے (colonial)، ریشہ دار پلازموڈیم لیٹیریا کا سبب ہے اور اینٹامیبا (Entamoeba) ایک طرح (فلامنٹ جیسے) یا سادہ مٹی سیلولر ہوتے ہیں۔ سادہ مٹی سیلولر کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس مٹی سیلولر جنسی اعضاء نہیں ہوتے۔ پروٹسٹس کی تین اقسام ہیں۔ dysentery کہتے ہیں۔
پودوں جیسے پروٹسٹس کے پاس سیل وال ہوتی ہے جو سیلولوز سے بنی ہوتی ہے۔ ان میں کلوروپلاسٹ کے اندر کلوروئل ہوتا ہے اور یہ آٹوٹروف ہیں۔
ایکسائی (algae) کہا جاتا ہے۔ یوگلینا (Euglena) اور ڈائائٹومز (diatoms) عام مثالیں ہیں۔ جانوروں جیسے پروٹسٹس ہیروٹروف ہوتے ہیں اور خوراک کو کھا کر جسم میں لے جاتے ہیں۔ ان کے سائز میں سیل وال نہیں ہوتی۔ انہیں پروٹوزونز (protozoans) کہتے ہیں۔ ایما (Amoeba) اور پیرامیشیئم (Paramecium) ان کی عام مثالیں ہیں۔ فکس جیسے پروٹسٹس سڑتے ہوئے نامیاتی مادے سے غذا جذب کرتے ہیں۔ ان کی سیل وال کائٹن (chitin) کی بجائے سیلولوز سے بنی ہوتی ہیں۔ سلائم مولڈز (slime molds) اور واٹر مولڈز (Water molds) ان کی مثالیں ہیں۔



واٹر مولڈ، سلائم مولڈ، ہیرامیشیئم، یوگلینا

(b) کنگڈم فنجائی (Kingdom Fungi): یہ کنگڈم فنجائی پر مشتمل ہے۔ یہ ہیروٹروف ہے۔ کچھ فنجائی روٹی، پنیر اور بیئر (beer) کی تیاری میں ہوتے ہیں۔ فنجائی غذائی اجزاء حاصل کرنے کا ایک منفرد طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک اینٹی بائیوٹک جانوروں اور کچھ پروٹسٹس کی طرح خوراک نکلے نہیں ہیں بلکہ اپنے ارد گرد موجود کھلے سڑتے مادے سے خوراک جذب کرتے ہیں۔ فنجائی یوکاریوٹک ہوتے ہیں اور ان کے سائز کے گرد سیل وال موجود ہوتی ہے۔ ان کی سیل وال کائٹن (ایک پولی سیکرائڈ) کی بنی ہوتی ہے۔ زیادہ تر فنجائی مٹی سیلولر ہوتے ہیں مثلاً شراب (mushroom)، رست (rust)، سٹ (smut) اور مولڈز (molds)۔ جبکہ کچھ فنجائی پانی سیلولر ہوتے ہیں مثلاً خیر یعنی پیسٹ (yeast)۔



سویٹ ٹوٹھ فنجائی، بریکٹ فنجائی، ٹوڈسٹول، پتے پر گیسٹ فنجائی، عام فنجائی

(c) کنگڈم پلانٹی (Kingdom Plantae): یہ کنگڈم پودوں پر مشتمل ہے جو یوکاریوٹک اور مٹی سیلولر جاندار ہیں، جن کی سیل وال سیلولوز کی بنی ہوتی ہیں۔ یہ آٹوٹروف (autotroph) ہوتے ہیں اور فوٹوسنتھس سیز کے ذریعے خوراک تیار کرتے ہیں۔ تمام پودوں میں جنسی اعضاء مٹی سیلولر ہوتے ہیں۔ سیکسول ریپروڈکشن (sexual reproduction) کے دوران پودے ایمبریو (embryo) بناتے ہیں۔ پودوں میں نباتاتی (vegetative) حصوں کے ذریعے اسے سیکسول بھی عام ہے۔ مثالوں میں موسز (mosses)، فرنز (ferns)، کوئی فرز (conifers) اور پھولدار پودے شامل ہیں۔



پھولدار پودا، کوئلہ، فرن، موس، عام پودے

(d) کنگڈم اینیملیا (Kingdom Animalia): اس کنگڈم میں جانور شامل ہیں جو یوکاریوٹک، مٹی سیلولر، اور ہیروٹروف ہوتے ہیں۔ یہ ایمبریو سے بنتے ہیں۔ یہ خوراک کھاتے ہیں اور پھر اسے جسم میں ہضم کرتے ہیں۔
سوال 13: وائرسز کی کلاسیفیکیشن کے چیلنجز پر بحث کریں۔

جواب: کلاسیفیکیشن میں وائرسز کا مقام (Status of Virus in Classification)



وائرس انتہائی چھوٹے یعنی الٹرا مائیکروسکوپ (ultramicroscopic) مخلوق ہیں جو جاندار اور غیر جاندار کے درمیان سرحد پر ہیں۔ یہ اے سیلولر (acellular) ہیں، یعنی یہ سائز سے نہیں بنے ہوتے اور نہ ہی ان میں کوئی آرگنیلز ہوتے ہیں۔ ایک وائرس نیوکلیک ایسڈ (DNA یا RNA) پر مشتمل ہوتا ہے، جو ایک پروٹین کے خول سے گھرا ہوتا ہے۔ یہ کوئی مینا بولزم نہیں چلا سکتے۔ اپنی پروٹینز کی تیاری اور اپنی تعداد بڑھانے کے لیے، وائرس جانداروں (پودے، جانور اور بیکٹیریا) میں ہیراسائٹ (parasite) بن کر رہتے ہیں۔ وائرس کو کلاسیفیکیشن کے سسٹم میں شامل نہیں کیا جاتا کیونکہ ان میں زندگی کی تینوں ڈومین کی کوئی خصوصیت موجود نہیں۔

پرائیونز (prions) اور وائرائیڈز (viroids) بھی اے سیلولر ذرات ہیں اور انہیں بھی کلاسیفیکیشن سسٹم میں شامل نہیں کیا جاتا۔ پرائیونز صرف پروٹین پر مشتمل ہوتے ہیں جبکہ وائرائیڈز صرف گول RNA پر مشتمل ہوتے ہیں۔ یہ دونوں ذرات کچھ پودوں میں متعدی بیماریاں (infection) پیدا کرتے ہیں اور کینسر کا سبب بھی بنتے ہیں۔

سوال 15: مندرجہ ذیل کے سائنسی نام لکھیں۔ پیاز، آلو، ٹماٹر، ٹائیگر، شہد کی مکھی اور انسان۔

سائنسی نام

پیاز (Onion)	الیٹیم سیپا (Allium cepa)
آلو (Potato)	سولے ٹیو برسم (Solanum tuberosum)
ٹماٹر (Tomato)	سولے ٹیو اسکولینٹم (Solanum esculentum)
شہد کی مکھی (Honeybee)	اپیس سیرینا (Apis cerana)
تائیگر (Tiger)	پین تھیرانا ٹیگر (Panthera tigris)
انسان (Human being)	ہومو سپی ایز (Homo sapiens)

جواب: بائی نومینل نومن کلچر کی اہمیت: (Significance of Binomial nomenclature)

- بابی نومیل نو من کلیدجو میں دو جانداروں کا ایک ہی نام نہیں ہو سکتا۔ سائنسی ناموں کے لیے الفاظ لاطینی زبان سے لیے جاتے ہیں۔ یہ زبان کسی ملک میں بھی نہیں بولی جاتی۔ اس لیے کسی ملک کی جانبداری نہیں ہوتی۔ جاندار کا سائنسی نام دنیا میں ہر جگہ ایک ہی ہوتا ہے۔ کسی بائیولوجسٹ کی زبان چائیز، عربی، ہسپانوی، یا انگریزی ہو یہ نظام تبادلہ خیال کے لیے ایک معیاری طریقہ دیتا ہے۔
- کئی علاقوں میں ایک ہی جاندار کے کئی مختلف نام ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر onion کو اردو میں 'پیاز' کہتے ہیں مگر پاکستان کے مختلف علاقوں میں اسے اور ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے جیسے 'گنڈا'، 'ہاسل' اور 'واسل'۔ دوسرے ممالک میں بھی اس کے کئی نام ہیں۔
- بعض اوقات مختلف جانداروں کو ایک ہی عام نام سے پکارا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک نام 'بیوٹیل' (blue bell) کئی ایسے پودوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جن پر بیل (bell) کی شکل کے پھول ہوتے ہیں۔ اسی طرح، ایک نام 'کالا پرندہ' یعنی بلیک برڈ (Black bird) عام کوئے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور پہاڑی کوئے (raven) کے لیے بھی۔
- عام ناموں کی کوئی سائنسی بنیاد نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر مچھلی (fish) ایک دھیریت جانور جس میں ریزہ کی ہڈی، فینز (fins) اور گھڑ (gills) پائے جاتے ہیں۔ لیکن کئی عام نام جیسے 'سولور فیش' (silver fish)، 'کرفیش' (cray fish)، 'جیلی فیش' (jelly fish) اور 'سٹار فیش' (star fish) میں سے کوئی بھی fish کی تعریف پر پورا نہیں اترتا۔

سوال 17: جانداروں کے سائنسی نام تجویز کرنے کے اصولوں اور ہدایات کی وضاحت کریں۔

جواب: جانداروں کے سائنسی نام:

چاندرا کے سائنسی نام بین الاقوامی اصولوں کے تحت رکھے جاتے ہیں۔ بائی نوٹ۔ اس نوٹ من کلچر کے چند اہم اصول یہ ہیں:

- 1- سائنسی نام رکھنے کے لیے الفاظ لاطینی زبان سے لیے جاتے ہیں۔
- 2- ہر سائنسی نام کے دو حصے ہوتے ہیں۔ جنس کا نام پہلے آتا ہے اور سی شیر کا نام بعد میں ہوتا ہے۔
- 3- سائنسی نام کو منفرد ہونا چاہیے کیونکہ ایک ہی نام دو مختلف جانداروں کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔
- 4- نام کا پہلا حصہ یعنی جنس کا نام بڑے حروف سے شروع ہونا چاہیے۔ نام کا دوسرا حصہ یعنی سی شیر کا نام چھوٹے حروف سے شروع ہونا چاہیے۔
- 5- سائنسی نام کو پرپٹ کرتے وقت اسے میزھی لکھائی یعنی اٹلیکس (italics) میں ٹائپ کیا جاتا چاہیے۔
- 6- جب سائنسی نام ہاتھ سے لکھنا ہو تو نام کے دونوں حصوں کے نیچے الگ الگ لائن لگائی جائے۔

امتحانی بایولوجی 40 جماعت نہم

40

کھلاڑی امتحانی بائیولوجی

نہیل: دعوے کی کے لاؤمنز اور کنکلا مرکز کی خصوصیات

ذوہین	آرکیا (Archaea)	بیکٹیریا (Bacteria)	یوکاریا (Eukarya)		
تکلفہ	آرکی بیکٹیریا (Archaeobacteria)	یو بیکٹیریا (Eubacteria)	پروٹسٹا (Protista)	فنجائی (Fungi)	پلائی (Plantae)
سپل کی قسم	پروکیئر یونک	یوکیئر یونک	یوکیئر یونک	یوکیئر یونک	یوکیئر یونک
نیوکلیر ممبرین	موجود نہیں	موجود ہے	موجود ہے	موجود ہے	موجود ہے
سپل وال	آرکی بیکٹیریا: پولی پیپٹائڈز اور پروٹینز یو بیکٹیریا: پیپٹائڈ وگائکسین	کچھ میں موجود: مختلف کیمیکلز کی بنی ہوئی	کائن	سیلو لوز اور دوسرے پولی سکرائڈز	موجود نہیں
نڈا حاصل کرنے کا طریقہ	آٹوٹراف یا ہیٹروٹراف	آٹوٹراف یا ہیٹرو ٹراف؛ یا دونوں طریقے	ہیٹروٹراف (خوراک جذب کرتے ہیں)	آٹوٹراف	ہیٹروٹراف (خوراک کھا کر جسم میں لے جاتے ہیں)
مٹی سیلولر ہوتا	کوئی بھی مٹی سیلولر نہیں	زیادہ تر مٹی سیلولر نہیں	زیادہ تر مٹی سیلولر	تمام مٹی سیلولر	تمام مٹی سیلولر

کورونا وائرس (Coronavirus) ایک وائرس ہے جو 2019 کے آخر میں چین کے شہر ووبان (Wuhan) میں دریافت ہوا۔ یہ وائرس سانس کی بیماری کی ایک وبا، جسے COVID-19 کہا جاتا ہے، کا سبب بنایا۔ کورونا وائرس بنیادی طور پر سانس کی بوندوں کے ذریعے پھیلتا ہے۔ جب ایک متاثرہ شخص کھانستے، جھینکتے، بات کرتا یا سانس لیتا ہے۔ یہ وائرس آلودہ سطحوں کو چھونے سے بھی پھیل سکتا ہے۔ بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے تاک اور منہ پر ماسک پہننا، دوا کا غائب ہوسکتا ہے۔ اس بیماری کی عام علامات میں بخار، کھانسی، سانس لینے میں دشواری، تھکاوٹ، جسم میں درد، ذائقے یا سونگھنے کی حس کا ختم ہونا، گلے میں خراش اور سرد و شام ہیں۔ بعض صورتوں میں، یہ خاص طور پر عمر رسیدہ افراد اور دیگر صحت کے مسائل والے لوگوں میں شدید سانس کے مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ صابن سے کم از کم 20 سیکنڈ تک بار بار ہاتھ دھونا یا 60 فیصد الکحل والے ہینڈ سینٹائزر (hand-sanitizer) کا استعمال بھی بیماری کے پھیلاؤ کو روک سکتا ہے۔ COVID-19 سے حفاظت کے لیے ویکسین (vaccine) لگوانا بہت اہم ہے۔ ویکسین مدافعتی نظام کو وائرس کو پہچاننے اور اس سے لڑنے میں مدد دیتی ہے، جس سے بیماری کی شدت کم ہوجاتی ہے۔

2.8 **ہائی نو مینل کچھر (Binomial Nomenclature)**

سوال 14: بائی نومینل نو من کلیچر سے کیا مراد ہے؟

جواب: سوئڈن کا بائیولوجسٹ کارل لینیئس (Carl Linnaeus) جانداروں کے سائنسی نام رکھنے کے نظام کا بانی تھا۔ جاندار کا سائنسی نام دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلا حصہ اس جنس (genus) کا نام ہوتا ہے جس سے جاندار کا تعلق کا قائل ہو۔ دوسرا حصہ جاندار کی پسی شیز (species) کا نام ہوتا ہے۔ جاندار کے سائنسی نام رکھنے کے سسٹم کو بانی نو مین کلیچر کہتے ہیں۔

الٹائی طرز کنسیپچوئل (Conceptual) سوالات

سوال 1: عام ناموں کی نسبت بائیو میٹل کلیچر استعمال کرنے کی تین وجوہات کیا ہیں؟

جواب: عام ناموں کی بجائے سائنسی نام استعمال کرنے کی وجوہات درج ذیل ہیں۔

- یہ سائنسدانوں کو تسلیم شدہ خصوصیات کی بنیاد پر جانداروں کو کلاسیفائی کرنے میں مدد دیتا ہے۔
- یہ سائنسدانوں کو جانداروں کی شناخت کے لیے ایک یونیورسل طریقہ فراہم کرتا ہے۔
- یہ انیس مخصوص ہیٹریز کی موجودہ تعداد کو ٹریک کرنے اور گنتے میں مدد فراہم کرتا ہے۔

سوال 2: ٹیکسٹ نامی اور نومن کلیچر کے درمیان کیا فرق ہے؟

جواب: ٹیکسٹ نامی: ٹیکسٹ نامی جانداروں کے نام اور ان کی گروپس اور سب گروپس میں کلاسیفیکیشن کا مطالعہ ہے۔ ٹیکسٹ نامی جانداروں کی خصوصیات کا مطالعہ کرتے ہیں اور انھیں کنکڈم، فائلم، کلاس، آرڈر، فیملی، جنس اور ہیٹریز جیسے گروہوں میں درجہ بندی کرتے ہیں۔

نومن کلیچر: کسی خاص شعبے میں جانداروں کے نام کا نظام یا نام بنانے کے قواعد کو بائیو میٹل نومن کلچر کہتے ہیں۔ بائیولوجی میں، بائیو میٹل نومن کلیچر جانداروں کے نام رکھنے کا نام ہے۔ مثال کے طور پر انسان کے لیے ہومو سیپیز۔

سوال 3: بائیو میٹل نومن کلیچر کے چند نقصانات پر بحث کریں۔

جواب: بائیو میٹل نومن کلیچر کے نقصانات:

- بائیو میٹل نام یاد رکھنا مشکل ہیں۔
- عام لوگوں کے لیے انھیں سمجھنا مشکل ہے۔
- لاطینی نام ان لوگوں کے لیے مشکل ہو سکتے ہیں جو لاطینی زبان سے واقف نہیں ہیں۔

سوال 4: کنکڈم پلانٹی کی اہمیت لکھیں۔

جواب: کنکڈم پلانٹی کے لیے سب سے اہم ہے کیونکہ وہ درج ذیل فوائد فراہم کرتی ہے۔

خوراک: پودے دوسرے جانداروں کے لیے خوراک کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں۔

آکسیجن: پودے کاربن ڈائی آکسائیڈ جذب کرتے ہیں اور آکسیجن خارج کرتے ہیں، جس کی انسانوں اور دوسرے جانوروں کو سانس لینے کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔

مسکن: پودے مختلف قسم کے جانداروں کے لیے مسکن فراہم کرتے ہیں۔

کڑوی: پودے کڑوی فراہم کرتے ہیں، جو ایندھن کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ فرنیچر اور کھیلوں کا سامان بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

میڈیسنل اہمیت: پودے دوائیں بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔

آب و ہوا کی تبدیلی کے اثرات کو کم کرنا: پودے کاربن ڈائی آکسائیڈ جذب کر کے آب و ہوا کی تبدیلی کے اثرات کو کم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔

سوال 5: پانچ کنکڈم کلاسیفیکیشن سسٹم کیوں اہم ہے؟

جواب: پانچ کنکڈم کلاسیفیکیشن سسٹم اہم ہے کیونکہ یہ جانداروں کو مندرجہ ذیل خصوصیات کی بنیاد پر گروہوں میں تقسیم کرتا ہے۔

ارتقاء: یہ مختلف گروہوں کے درمیان ارتقائی روابط کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے۔

جانداروں کی قسم: یہ یونی سیلولر اور ملٹی سیلولر جانداروں کے فرق کو واضح کرتا ہے۔

تغذیہ: یہ جانداروں کو اس بنیاد پر گروہوں میں تقسیم کرتا ہے کہ یہ غذائی اجزاء کیسے حاصل کرتے ہیں۔ جیسے فنجائی جان آرکیٹک مادوں کے گلے

سڑنے سے خوراک حاصل کرتے ہیں۔ جیسے فنجائی جان آرکیٹک مادوں کے گلے سڑنے سے خوراک حاصل کرتے ہیں۔

سیل کی ساخت: یہ پروکاریوٹس کو دوسرے جانداروں سے ان کی سیلولر ساخت کی بنیاد پر الگ کرتا ہے۔

معروضی سوالات

مکمل نمبر کی نئی امتحانی تکنیکس (Knowledge, Understanding, Application, Analytical & Conceptual) کی روشنی میں متب کے گئے نمبر امتحانی سوالات

2.1 بائیو ڈائورسٹی (Biodiversity)

2.2 کلاسیفیکیشن (Classification)

☆ درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔

1- بائیولوجسٹس نے کتنی قسم کے جانداروں کے نام رکھے اور درجہ بندی کی۔

(A) 1 ملین (B) 2 ملین (C) 3 ملین (D) 4 ملین

2- بائیو ڈائورسٹی کا _____ پر انحصار ہے:

(A) ماحول (B) مٹی کی قسم (C) اونچائی (D) مذکورہ تمام

3- اقوام متحدہ نے کس دن کو بین الاقوامی بائیو ڈائورسٹی کے طور پر منایا؟

(A) 3 جولائی (B) یکم اپریل (C) 22 مئی (D) 6 ستمبر

4- بائیولوجسٹس نے جانداروں کے بارے میں شناخت کی:

(A) تقریباً 0.1 ملین (B) تقریباً 0.2 ملین (C) تقریباً 0.3 ملین (D) تقریباً 0.4 ملین

5- زمین پر پودوں کی اقسام ہیں:

(A) 0.4 ملین (B) 0.7 ملین (C) 0.5 ملین (D) 0.8 ملین

6- زمین پر جانوروں کی اقسام ہیں:

(A) 1.2 ملین (B) 1.3 ملین (C) 1.4 ملین (D) 1.5 ملین

2.3 ٹیکسٹ نامی کے درجات (Taxonomic Ranks)

2.4 کلاسیفیکیشن کی تاریخ (History of Classification)

7- سب سے اعلیٰ ٹیکسٹ نامک ریگ ہے:

(A) ڈومین (B) کنکڈم (C) فیملی (D) کلاس

8- ڈومین کو مزید _____ کنکڈم میں تقسیم کیا گیا ہے۔

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

9- ہر کنکڈم کو تقسیم کیا گیا:

(A) کلاس (B) آرڈر (C) فیملی (D) فائلم

10- ہر فائلم/کنکڈم کو تقسیم کیا گیا۔

(A) ہیٹریز (B) کلاس (C) جنس (D) فائلم

11- ہر کلاس کو مزید متعلقہ _____ میں تقسیم کیا گیا۔

(A) آرڈر (B) ہیٹریز (C) فیملی (D) فائلم

- 12- ہر فیلی کو مزید متعلقہ _____ میں تقسیم کیا گیا۔
(A) پسی شیز (B) جنیس (C) ڈومین (D) کلاس
- 13- کلاسیفیکیشن کا سب سے مخصوص لیول ہے:
(A) جنیس (B) فیلی (C) کلاس (D) پسی شیز
- 14- جانداروں کا گروہ جو آپس میں جنسی تولید کر سکتے ہوں اور جنسی تولید کی اہلیت والے نئے جاندار پیدا کر سکتے ہیں۔
(A) فیلی (B) کلاس (C) پسی شیز (D) فائلم
- 15- فروٹ فلای کا فائلم ہے۔
(A) کورڈیٹا (B) ڈپٹرا (C) پائی سم (D) پرائی میٹس
- 16- کارڈیٹا کس کا فائلم ہے؟
(A) انسان (B) مڑ (C) سیب (D) بلی
- 17- انسان کی کلاس ہے:
(A) میٹو یوفانٹا (B) کورڈیٹا (C) فی بیلز (D) پائی سم
- 18- مڑ کا آرڈر ہے:
(A) پلائٹی (B) فی بیکسی (C) ہومو (D) فی بیلز
- 19- ہومو نیڈی کس کی فیلی ہے؟
(A) مڑ (B) انسان (C) پیاز (D) فروٹ فلای
- 20- انسان کی جنس ہے:
(A) پائی سم (B) سیٹی دم (C) ہومو (D) پرائی میٹس
- 21- پائی سم کس کی جنس ہے؟
(A) مڑ (B) اورک (C) گاجر (D) پیاز
- 22- ہومو سپی انڈز پسی شیز ہے:
(A) انسان (B) کبھی (C) مڑ (D) گاجر
- 23- ابن رشد نے کب ارطو کی ایک کتاب "ذی اللہما" کا عربی میں ترجمہ کیا۔
(A) 1170 (B) 1171 (C) 1172 (D) 1173
- 24- کس نے سب سے پہلے جانداروں کو دو گروہوں (پودوں اور جانوروں) میں کلاسیفائی کیا؟
(A) کارلس لینیئس نے (B) ارطو نے (C) اینڈریاس سیسل پو نے (D) ٹورنی فورٹ نے
- 25- ابو عثمان عمر الجاحز نے اپنی کتاب میں جانوروں کی کتنی ہی شیز کی خصوصیات بیان کیں؟
(A) 150 (B) 250 (C) 350 (D) 450
- 26- ابو عثمان الجاحز نے کس کے حالات زندگی کے بارے میں بہت کچھ لکھا؟
(A) چمچروں (B) چوٹیوں (C) کھیوں (D) مڑیوں
- 27- پودوں کو چند گروہوں میں تقسیم کر کے جنر کا نام دیا۔
(A) جان رے نے (B) ٹورنی فورٹ نے (C) کارلس لینیئس نے (D) اینڈریاس سیسل پو نے
- 28- "کلاس" اور "پسی شیز" کے یکساں معارف کروائے:
(A) ابو عثمان عمر الجاحز نے (B) ارطو نے (C) ٹورنی فورٹ نے (D) کارلس لینیئس نے
- 29- ارطو (322-384) تھا۔
(A) یونانی فلاسفر (B) عرب اسکالر (C) اطالوی بانسٹ (D) اطالوی بائیولوجسٹ
- 30- ابو عثمان عمر الجاحز (780-869 A.D) تھا۔
(A) اطالوی بانسٹ (B) یونانی فلاسفر (C) سویڈش بائیولوجسٹ (D) عرب اسکالر
- 31- قدیم ترین کلاسیفیکیشن سسٹم جس میں تمام جانداروں کو کلاسیفائی کیا گیا تھا:
(A) دو۔ گندم کلاسیفیکیشن سسٹم (B) تین۔ گندم کلاسیفیکیشن سسٹم (C) پانچ۔ گندم کلاسیفیکیشن سسٹم (D) چار۔ گندم کلاسیفیکیشن سسٹم
- 32- دو۔ گندم کلاسیفیکیشن سسٹم کے مطابق، پروکیروس (بیکٹریا) اور فنجائی کس گندم کے ممبرز تھے؟
(A) اینیمیلیا (B) پروٹسٹا (C) فنجائی (D) پلائٹی
- 33- 1866ء میں کس نے تین۔ گندم کلاسیفیکیشن سسٹم جو یز کیا۔
(A) ای۔ جینٹن (B) ارنسٹ ہیکل (C) کارل ووز (D) روبرٹ وینکمر
- 34- ارنسٹ ہیکل نے پروکیروس کو کس گندم میں شامل کیا؟
(A) پروٹسٹا میں (B) اینیمیلیا میں (C) پلائٹی میں (D) فنجائی میں
- 35- ای۔ جینٹن نے پروکیروس کو کس اصطلاحات متعارف کروائی:
(A) فنجائی کے لیے (B) جانوروں کے لیے (C) پودوں کے لیے (D) بیکٹریا کے لیے
- 36- ای۔ جینٹن نے پروکیروس کو کس اصطلاح متعارف کروائی:
(A) پروٹسٹا کے لیے (B) جانوروں کے لیے (C) پودوں کے لیے (D) بیکٹریا کے لیے
- 37- امریکن ایکولوجسٹ، رابرٹ ویکر نے پانچ گندم کلاسیفیکیشن سسٹم متعارف کروایا:
(A) 1957ء میں (B) 1967ء میں (C) 1977ء میں (D) 1987ء میں
- 38- 1988ء میں دو سائنسدانوں مارگولیس اور شوارز نے کلاسیفیکیشن سسٹم میں ترامیم کیں۔
(A) دو گندم (B) تین گندم (C) چار گندم (D) پانچ گندم
- 39- کارل ووز نے جانداروں کو کلاسیفائی کیا:
(A) دو ڈومینز میں (B) تین ڈومینز میں (C) چار ڈومینز میں (D) پانچ ڈومینز میں
- 40- کارل ووز کی بنائی گئی کلاسیفیکیشن فرق پر مبنی ہے۔ بیکٹریا اور _____۔
(A) پودے (B) جانور (C) فنجائی (D) آرکیا

2.5	جانداروں کے ڈومین (Domains of Living Organisms)
2.6	ڈومین پروکیریا کی کلاسیفیکیشن (Classification of Domain Eukarya)
2.7	کلاسیفیکیشن میں وائرس کا مقام (Status of Virus in Classification)

41- ڈومین آرکیا میں کون گندم شامل ہے:

- (A) یو بیکٹریا (B) پروٹسٹا (C) آرکیا بیکٹریا (D) پلائٹی

42- زیادہ تر آرکیسکٹر یا میٹھا نو جینز اور _____ شامل ہیں۔

(A) ہیلو فائزر (B) قہر مو فائزر (C) الیٹرو فائزر (D) یہ تمام

43- یہ انتہائی کمین ماحول میں پائے جاتے ہیں۔

(A) میٹھا نو جینز (B) قہر مو فائزر (C) ہیلو فائزر (D) الیٹرو فائزر

44- مندرجہ ذیل میں سے کون سے گرم چشموں میں پائے جاتے ہیں؟

(A) قہر مو فائزر (B) الیٹرو فائزر (C) میلو فائزر (D) میٹھا نو جینز

45- بیکیٹیریا اور سائٹوبیکٹیریا کنگڈم سے تعلق رکھتے ہیں۔

(A) آرکیا بیکیٹیریا (B) یو بیکیٹیریا (C) پروٹسٹا (D) فنجائی

46- ڈومین یو کیرو یا کنگڈم پروٹسٹا اور _____ پر مشتمل ہے۔

(A) فنجائی (B) پلانٹی (C) انجیویلیا (D) ان تمام

47- پلازموڈیم جب بنتا ہے:

(A) لیریائی (B) ڈیٹکی کی (C) ٹائیفائیڈ کی (D) COVID کی

48- پودوں سے مشابہہ پرنٹس میں خصوصیات موجود ہیں۔

(A) سیل وال (B) کلورو فل (C) آؤٹراک (D) یہ تمام

49- کونے پرنٹس بیٹر وٹانس ہوتے ہیں اور ان میں سیل وال موجود نہیں ہوتی۔

(A) پودوں سے مشابہہ پرنٹس (B) جانوروں سے مشابہہ پرنٹس (C) فنجائی سے مشابہہ پرنٹس (D) ان میں سے کوئی نہیں

50- پروٹوزوئز کسے کہا جاتا ہے؟

(A) پودوں سے مشابہہ پرنٹس (B) جانوروں سے مشابہہ پرنٹس (C) فنجائی سے مشابہہ پرنٹس (D) ان میں سے کوئی نہیں

51- ہانگی کی طرح کی ساخت بناتے ہیں اور سپروٹیک ہوتے ہیں؟

(A) پودوں سے مشابہہ پرنٹس (B) جانوروں سے مشابہہ پرنٹس (C) فنجائی سے مشابہہ پرنٹس (D) ان میں سے کوئی نہیں

52- امیبا اور ہیلامیٹیم ہیں۔

(A) پودوں سے مشابہہ پرنٹس (B) جانوروں سے مشابہہ پرنٹس (C) فنجائی سے مشابہہ پرنٹس (D) ان میں سے کوئی نہیں

53- مشروم، رسٹ، سٹ اور مولڈز مثالیں ہیں:

(A) پروٹوزوئز (B) انجی (C) فنجائی (D) ان میں سے کوئی نہیں

54- فنجائی جاندار ہیں جو کہ:

(A) کنگڈم فنجائی (B) کنگڈم انجیویلیا (C) کنگڈم انجی (D) کنگڈم پلانٹی

55- فنجائی کی سیل وال بنی ہوتی ہے:

(A) یو کیروٹک ہیں (B) بیٹر وٹانس ہیں (C) یونی سیلر یا ملٹی سیلر ہیں (D) یہ تمام

56- فنجائی کی سیل وال بنی ہوتی ہے:

(A) سیلوز (B) لکٹن (C) کائٹن (D) میکٹن

56- کنگڈم پلانٹی میں ایسے پودے موجود ہیں جن کی خصوصیت ہے:

(A) یو کیروٹک ہیں (B) ملٹی سیلر ہیں (C) آؤٹراکٹ ہیں (D) مذکورہ تمام

57- موسمز، غرناز اور پھولدار پودے مثالیں ہیں۔

(A) پروٹسٹا (B) انجیویلیا (C) پلانٹی (D) فنجائی

58- کنگڈم انجیویلیا میں ایسے جانور موجود ہیں جو:

(A) یو کیروٹک (B) ملٹی سیلر (C) بیٹر وٹانس (D) مذکورہ تمام

59- اے سیلر ہیں:

(A) وائرسز (B) بیکٹیریا (C) فنجائی (D) پلانٹی

60- مندرجہ ذیل میں سے کون سے جاندار اے سیلر ہیں؟

(A) وائرسز (B) پرائیویٹ (C) وائریائیڈز (D) مذکورہ تمام

61- صرف پروٹسٹا پر مشتمل ہوتے ہیں؟

(A) وائریائیڈز (B) پرائیویٹ (C) بیکٹیریا (D) وائرسز

62- وائریائیڈز پر مشتمل ہوتے ہیں۔

(A) صرف DNA پر (B) صرف RNA پر (C) صرف پروٹین پر (D) صرف سیل وال پر

63- پرائیویٹ اور وائریائیڈز انجیویلیا کی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔

(A) انجی میں (B) فنجائی میں (C) پودوں میں (D) جانوروں میں

64- کس کو جانداروں اور بے جان کے درمیان تصور کیا جاتا ہے؟

(A) پودوں (B) وائرسز (C) جانوروں (D) بیکٹیریا

65- کسی جاندار کا سائیکلک نام مشتمل ہوتا ہے:

(A) دو حصوں پر (B) تین حصوں پر (C) چار حصوں پر (D) پانچ حصوں پر

66- کسی جاندار کے سائنسی نام کا پہلا حصہ ظاہر کرتا ہے:

(A) فائنلیم کا نام (B) جنس کا نام (C) آرڈر کا نام (D) کلاس کا نام

67- کسی جاندار کے سائنسی نام کا دوسرا حصہ ہوتا ہے:

(A) کنگڈم کا نام (B) فیملی کا نام (C) جینیٹکس کا نام (D) جنس کا نام

68- پیاز کا سائنسی نام ہے:

(A) کوروس پلینڈنز (B) الیٹروٹریس روجیز (C) الیٹروٹریس (D) ہومو سپیئرز

69- سویٹیم ٹیو بروم کس کا سائنسی نام ہے؟

(A) ٹماٹر (B) آلو (C) پیاز (D) اورک

70- لکٹو لیم سائنسی نام ہے:

(A) گاجر (B) آلو (C) مٹر (D) ٹماٹر

71- ہومو سپیئرز کا سائنسی نام ہے:

(A) زبیرا (B) ٹائیگر (C) انسان (D) کوے

72- سائنسی نام کے الفاظ کس زبان سے لیے جاتے ہیں؟

(A) انگریزی (B) عربی (C) اردو (D) لاطینی

73- پیاز، گندھ، بادل، واسل مختلف نام ہیں۔

(A) آلہ (B) گاجر (C) پیاز (D) مٹر

74- لفظ بیک برڈ کو سے اور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

(A) طوطے (B) عقاب (C) کبوتر (D) پہاڑی کوئے

75- ہائی کوئیل ٹوٹن کلچر کا بانی کون تھا؟

(A) ارستو (B) کارل لینیئس (C) ارنسٹ ہیکل (D) رابرٹ واٹکین

جوابات

(B) -1	(D) -2	(C) -3	(B) -4	(C) -5	(D) -6	(A) -7	(C) -8	(D) -9	(B) -10
(A) -11	(B) -12	(D) -13	(C) -14	(B) -15	(A) -16	(B) -17	(D) -18	(B) -19	(C) -20
(A) -21	(A) -22	(C) -23	(B) -24	(C) -25	(B) -26	(D) -27	(C) -28	(A) -29	(D) -30
(A) -31	(D) -32	(B) -33	(A) -34	(D) -35	(A) -36	(B) -37	(D) -38	(B) -39	(D) -40
(C) -41	(D) -42	(C) -43	(A) -44	(B) -45	(D) -46	(A) -47	(D) -48	(B) -49	(B) -50
(C) -51	(A) -52	(A) -53	(D) -54	(C) -55	(D) -56	(C) -57	(D) -58	(A) -59	(D) -60
(B) -61	(B) -62	(C) -63	(B) -64	(A) -65	(B) -66	(C) -67	(C) -68	(B) -69	(D) -70
(C) -71	(D) -72	(C) -73	(D) -74	(B) -75					

کثیر الانتخابی کنسیپچوئل (Conceptual) سوالات

☆ درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔

1- کلاسیفیکیشن کس بنیاد پر کی جاتی ہے؟

(A) ساخت (B) طبعی خصوصیات (C) کیمیائی خصوصیات (D) مشابہت اور اختلافات

2- کلاسیفیکیشن کا سب سے مخصوص لیول ہے۔

(A) کنڈم (B) فائلم (C) جنس (D) پس شیئر

3- کون سے جاندار نیوکلیک ایسڈ (DNA اور RNA) پر مشتمل ہوتے ہیں؟

(A) بیکٹریا (B) وائرسز (C) پودے اور جانور (D) یہ تمام

4- کلاسیفیکیشن کے کس کنڈم میں نیوکلیکس نہیں ہوتا؟

(A) پریونس (B) فنجائی (C) پلائی (D) بیکٹریا

5- بیکٹریا، آرکیا اور یوکلئیڈا کو رکھا گیا تھا۔

(A) دو کنڈم سسٹم میں (B) تین کنڈم سسٹم میں (C) چار کنڈم سسٹم میں (D) پانچ کنڈم سسٹم میں

6- جانداروں کے ارتقاء کی پیش گوئی کرنے کے لیے مندرجہ ذیل میں سے کون سا ٹیکسٹونک ریک نہیں ہوتا۔

(A) جنس (B) پس شیئر (C) کنڈم (D) ایکوسٹم

جوابات

(D) -1	(D) -2	(D) -3	(D) -4	(B) -5	(D) -6
--------	--------	--------	--------	--------	--------

مختصر جوابات (Knowledge, Understanding, Application, Analytical & Conceptual) کی روشنی میں مرتب کیے گئے مختصر جوابی سوالات

2.1 بائیوڈائیورسٹی (Biodiversity)

2.2 کلاسیفیکیشن (Classification)

☆ مختصر جواب دیں۔

1- بائیوڈائیورسٹی کی تعریف لکھیں۔

جواب: بائیوڈائیورسٹی مختلف ایکوسسٹمز میں موجود جانداروں کی مختلف اقسام کو ماننے کا ایک پیمانہ ہے جس میں زمینی، سمندری اور صحرائی ایکوسسٹمز شامل ہیں۔

2- بائیوڈائیورسٹی نے کتنی اقسام کے جانداروں کے نام درجہ بندی کی ہے؟

جواب: بائیوڈائیورسٹی نے تقریباً 2 ملین قسم کے جانداروں کے نام اور درجہ بندی کی ہے۔

3- کسی جگہ کی بائیوڈائیورسٹی کن عوامل پر منحصر ہے؟

جواب: کسی جگہ کی بائیوڈائیورسٹی کا انحصار آب و ہوا، اونچائی اور مٹی کی قسم جیسے عوامل پر ہوتا ہے۔

4- کن علاقوں میں بائیوڈائیورسٹی زیادہ ہوتی ہے؟

جواب: شہنڈے یعنی پولر علاقوں کی نسبت گرم علاقوں یعنی ٹراپکس میں بائیوڈائیورسٹی زیادہ ہوتی ہے۔

5- بین الاقوامی بائیوڈائیورسٹی کا دن کب منایا جاتا ہے؟

جواب: بین الاقوامی بائیوڈائیورسٹی کا دن 22 مئی کو منایا جاتا ہے۔

6- زمین پر کتنے قسم کے جانور اور پودے ہیں؟

جواب: بائیوڈائیورسٹی نے تقریباً 2 ملین قسم کے جانداروں کی شناخت کی۔ ان میں سے 0.5 ملین پودوں کی اقسام ہیں اور 1.5 ملین جانوروں کی اقسام ہیں۔

7- کلاسیفیکیشن کیا ہے؟

جواب: کلاسیفیکیشن وہ عمل ہے جس میں بائیوڈائیورسٹی جانداروں کی اقسام کو گروپس اور سب گروپس (sub-groups) میں تقسیم کرتے ہیں۔

8- کلاسیفیکیشن کے مقاصد اور اصول کیا ہیں؟

جواب: کلاسیفیکیشن کے مقاصد اور اصول:

(i) جانداروں کے مابین مشابہتیں (ایک جیسی خصوصیات) اور اختلاف کا تعین کرنا تاکہ ان کا مطالعہ آسان ہو سکے۔

(ii) جانداروں کے مابین ارتقائی رشتہ تلاش کرنا۔

2.3 ٹیکسٹونک رینکس (Taxonomic Ranks)

2.4 کلاسیفیکیشن کی تاریخ (History of Classification)

9- ٹیکسٹونک رینک سے کیا مراد ہے؟

جواب: وہ گروپس جن میں جانداروں کی کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے ٹیکسٹونک رینک کہلاتی ہیں۔

10- ٹیکسٹونک رینک کا نظام کس نے مرتب کیا؟

جواب: سویڈش بوٹنٹ کارل لینیئس نے 1735ء میں ٹیکسٹونک رینک کا نظام مرتب کیا۔

- 11- کارلس لینیس کی طرف سے تجویز کردہ ٹیکسا نوک ریک کے نام لکھیں۔
جواب: کارلس لینیس نے سات ٹیکسا نوک ریک مرتب کیے۔ یعنی کنگڈم، فائلم (ڈویژن)، کلاس، آرڈر، فیملی، جنس اور سی شیز۔
- 12- ٹیکسا نوک ریک کے نظام میں ڈومین کا درجہ کب شامل ہوا؟
جواب: 1977ء میں ٹیکسا نوک ریک کے نظام میں ڈومین کا درجہ شامل ہوا۔
- 13- ڈومین یوکیریا کے چار کنگڈم کون سے ہیں؟
جواب: ڈومین یوکیریا کے کنگڈمز میں انیمیلیا، پلانٹی، فنجائی اور پروٹسٹا شامل ہیں۔
- 14- کنگڈم کو کس ریک میں تقسیم کیا گیا؟
جواب: کنگڈم کو متعلقہ فائلم یا ڈویژن میں تقسیم کیا گیا۔
- 15- کلاس کو کس ریک میں تقسیم کیا گیا؟
جواب: کلاس کو متعلقہ آرڈر میں تقسیم کیا گیا۔
- 16- آرڈر کو کس ریک میں تقسیم کیا گیا؟
جواب: آرڈر کو متعلقہ فیملی میں تقسیم کیا گیا۔
- 17- کلاسیفیکیشن کا مخصوص درجہ کون سا ہے؟
جواب: کلاسیفیکیشن کا مخصوص درجہ سی شیز ہے۔
- 18- سی شیز کی تعریف لکھیں۔
جواب: سی شیز ایسے جانداروں کا گروہ ہے جو فطری طور پر آپس میں جنسی تولید کر سکتے ہیں اور جنسی تولید کی اہلیت والے نئے جاندار پیدا کر سکتے ہوں۔
- 19- فروٹ فلائی کی کلاسیفیکیشن لکھیں۔
جواب: فروٹ فلائی کی کلاسیفیکیشن:

ڈومین	یوکیریا	آرڈر	ڈیپٹرا
کنگڈم	انیمیلیا	فیملی	ڈروسوفیلیڈی
فائلم	آرتھروپوڈا	جنس	ڈروسوفلا
کلاس	انسیکا	سی شیز	ڈروسوفلا میلو نوکیسٹر

20- مڑکی کلاسیفیکیشن کیا ہے؟

جواب: مڑکی کلاسیفیکیشن:

ڈومین	یوکیریا	آرڈر	فیملی
کنگڈم	پلانٹی	فیملی	فیملیسی
فائلم	میکو لیوفاٹا	جنس	پائی سم
کلاس	میکو لیوڈا	سی شیز	پائی سم سیڈوم

- 21- ارسلو کی کتاب "ڈی اینیما" کا عربی میں ترجمہ کس نے اور کب کیا؟
جواب: 1172ء میں ابن رشد (ایبیروس) نے ارسلو کی کتاب "ڈی اینیما" کا عربی میں ترجمہ کیا۔
- 22- کس نے جانداروں کو دو گروہوں میں تقسیم کیا؟
جواب: ارسلو نے جانداروں کو دو گروہوں یعنی پودوں اور جانوروں میں تقسیم کیا۔
- 23- ابوعثمان عمر الجاحز نے کیا کام کیا؟
جواب: عرب اسکالر ابوعثمان عمر الجاحز نے 350 اقسام کے جانوروں کی خصوصیات بیان کیں۔
- 24- ابوعثمان عمر الجاحز نے کس جاندار پر زیادہ کام کیا؟
جواب: ابوعثمان عمر الجاحز نے چوہنیوں کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ لکھا۔
- 25- "کلاس" اور "سی شیز" کے ٹیکسا کس نے متعارف کرائے؟
جواب: فرانسیسی ماہر نباتات نورنی فورٹ نے "کلاس" اور "سی شیز" کے ٹیکسا متعارف کرائے۔
- 26- چھ ٹیکسا کے ساتھ جانداروں کی ٹیکسا نوئی کا نظام مراتب کس نے متعارف کرایا؟
جواب: سوئڈش بائیولوجسٹ کارل لینیس نے چھ ٹیکسا یعنی کنگڈم، کلاس، آرڈر، فیملی، جنس اور سی شیز کے ساتھ ٹیکسا نوئی کے نظام مراتب متعارف کرائے۔
- 27- دو کنگڈم کلاسیفیکیشن کے مطابق جانداروں کو کن کنگڈمز میں کلاسیفائی کیا گیا؟
جواب: دو کنگڈم کلاسیفیکیشن کے مطابق تمام جانداروں کو دو کنگڈمز یعنی پلانٹی اور انیمیلیا میں کلاسیفائی کیا گیا۔
- 28- دو کنگڈم کلاسیفیکیشن کے مطابق کون سے جانداروں کو کنگڈم پلانٹی میں رکھا گیا؟
جواب: وہ جاندار جو اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں یعنی آٹوٹرافس انھیں کنگڈم پلانٹی میں رکھا گیا تھا۔
- 29- کنگڈم انیمیلیا میں کون سے جاندار شامل تھے؟
جواب: دو کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم کے مطابق جاندار اپنی خوراک خود نہیں تیار کر سکتے یعنی آٹوٹراف انھیں کنگڈم انیمیلیا میں رکھا گیا تھا۔
- 30- دو کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم ناقابل عمل کیوں پایا گیا تھا؟
جواب: چند ٹیکسا نوٹسٹس نے اس سسٹم کو ناقابل عمل پایا کیونکہ کئی یونی سیلولر جانداروں مثلاً یوگلینا میں پودوں اور جانوروں دونوں کی خاصیتیں پائی جاتی ہیں۔
- اس سسٹم نے پروکیروٹس اور یوکیروٹس کے درمیان فرق کو بھی واضح نہیں کیا۔
- 31- کس نے تین کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم متعارف کروایا؟
جواب: 1866ء میں ارنسٹ ہیکل نے یوگلینا کی طرح کے جانداروں کے لیے تیسرا کنگڈم پروٹسٹا تجویز کیا۔
- 32- تین کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم میں نفس کو کہاں رکھا گیا تھا؟
جواب: تین کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم میں نفس کو کنگڈم پلانٹی میں رکھا گیا تھا۔ کیونکہ فنجائی کئی لحاظ سے پودوں سے مشابہ ہیں۔
- 33- کچھ بائیولوجسٹس فنجائی کی کنگڈم پلانٹی میں کلاسیفیکیشن سے کیوں متفق نہیں تھے؟
جواب: کچھ بائیولوجسٹس فنجائی کی پوزیشن سے متفق نہیں تھے کیونکہ فنجائی پودوں سے مشابہ ہے لیکن وہ آٹوٹراف نہیں ہے۔ فنجائی خاص طرح کے بیٹروٹرافس ہیں جو اپنی خوراک کو جذب کر کے جسم میں لے جاتے ہیں۔

34- پانچ کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم کس نے متعارف کرایا؟

جواب: 1967ء میں، رابرٹ وینکرنے پانچ کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم متعارف کرایا۔

35- پانچ کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم کن عوامل پر مبنی ہے؟

جواب: یہ نظام درج ذیل عوامل پر مبنی ہے:

• سیلولر آرگنائزیشن کا لیول یعنی پروکیروٹک، یوکیروٹک، یونی سیلولر یوکیروٹک اور ملٹی سیلولر یوکیروٹک۔

• خوراک تیار کرنے کے طریقے یعنی فوٹو سنتھیسیز، خوراک جذب کر کے جسم میں لے جانا اور خوراک کھا کر جسم میں لے جانا۔

36- پانچ کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم میں کون سے کنگڈمز شامل ہیں؟

جواب: پانچ کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم میں مونیرا، پریٹا، فنجائی، پلانٹی اور اینیمیلیا شامل ہیں۔

37- رابرٹ وینکر کے پانچ کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم میں ترامیم کس نے کی؟

جواب: 1988ء میں دوسرا سائنس دانوں مارگولس اور شوارزن نے وینکر کے پانچ کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم میں ترامیم کیں۔ انھوں نے کلاسیفیکیشن کے سیلولر آرگنائزیشن اور خوراک حاصل یا تیار کرنے کے طریقوں کے ساتھ ساتھ جینیٹکس کو بھی بنیاد بنایا۔

38- کلاسیفیکیشن میں کارل ووڈ کی کامیابی کیا تھی؟

جواب: کارل ووڈ نے جانداروں کو تین ڈومینز یعنی آرکیا، بیکٹریا اور یوکیریا میں تقسیم کیا۔

39- کارل ووڈ نے پروکیروٹس کو کن دو ڈومینز میں رکھا؟

جواب: کارل ووڈ نے پروکیروٹس کو آرکیا اور بیکٹریا میں رکھا۔

2.5 جانداروں کے ڈومین (Domain of Living Organisms)

2.6 ڈومین یوکیریا کی کلاسیفیکیشن (Classification of Domain Eukarya)

40- جانداروں کی تین ڈومینز میں کلاسیفیکیشن کس پر مبنی ہے؟

جواب: جانداروں کی تین ڈومینز میں کلاسیفیکیشن سیل کے آر۔ این۔ اے (RNA) میں نیوکلیوٹائیڈ کی ترتیب اور سیل ممبرین کی ساخت پر مبنی ہے۔

41- کونسا پروٹسٹا طیر یا کاسب بنتا ہے؟

جواب: پلازموڈیم طیر یا کاسب بنتا ہے۔

42- کنگڈم پروٹسٹا میں کس قسم کے جاندار شامل ہیں؟

جواب: کنگڈم پروٹسٹا میں یوکیروٹک یونی سیلولر اور سادہ ملٹی سیلولر جاندار رکھے جاتے ہیں۔

43- پودوں سے مشابہہ پروٹسٹس کی خصوصیات کیا ہیں؟

جواب: پودوں سے مشابہہ پروٹسٹس میں سیلولوز سے بنی سیل وال موجود ہوتی ہے۔ ان کے کلورو پلاسٹ میں کلوروفل موجود ہوتا ہے اور یہ آؤٹروفز ہیں۔ انھیں الجی بھی کہا جاتا ہے۔ مثلاً یوگلینا۔

44- جانوروں سے مشابہہ پروٹسٹس کی خصوصیات کیا ہیں؟

جواب: جانوروں سے مشابہہ پروٹسٹس ہیر وٹرفز ہوتے ہیں۔ ان میں سیل وال موجود نہیں ہوتی۔ انھیں پروٹوزووز کہا جاتا ہے۔ مثلاً امیبا، جیرا پیٹم۔

45- کنگڈم فنجائی کی خصوصیات لکھیں۔

جواب: کنگڈم فنجائی میں یوکیروٹک ملٹی سیلولر ہیر وٹرفز شامل ہیں جو خوراک کو جذب کر کے جسم میں لے جاتے ہیں۔ زیادہ تر فنجائی ڈمی کپوزرز ہیں۔ مثلاً کھمبیاں (mashrooms)۔

46- فنجائی کے فوائد بیان کریں۔

جواب: فنجائی کے فوائد:

• کچھ فنجائی روٹی، پنیر اور بٹر کی تیاری میں استعمال ہوتی ہیں۔

• کچھ فنجائی دوائیں بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں جیسے کہ پینسلین۔

47- کنگڈم پلانٹی کی کچھ مثالیں دیں۔

جواب: موس، فرن، کوئی فراور پھولدار پودے کنگڈم پلانٹی میں پائے جانے والے پودوں کی مثالیں ہیں۔

48- کنگڈم پلانٹی اور کنگڈم اینیمیلیا کے درمیان فرق کریں۔

جواب: کنگڈم پلانٹی:

• اس کنگڈم میں یوکیروٹک ملٹی سیلولر آؤٹروفز شامل ہیں۔

• تمام پودے انیمبر یو سے بنتے ہیں۔

کنگڈم اینیمیلیا:

• اس کنگڈم میں یوکیروٹک ملٹی سیلولر ہیر وٹرفز شامل ہیں۔

• جانور خوراک کھانے کی شکل میں جسم میں لے جاتے ہیں اور پھر اسے مخصوص حصوں میں ڈائیجسٹ کرتے ہیں۔

49- وائرسز کیا ہیں؟

جواب: وائرسز کو جانداروں اور بے جان کے درمیان تصور کیا جاتا ہے۔ وائرسز میں DNA یا RNA موجود ہوتا ہے جو عام طور پر پروٹین کے بنے ایک غلاف میں لپٹا ہوتا ہے۔

50- "وائرسز اے سیلولر ہیں" کا کیا مطلب ہے؟

جواب: وائرسز اے سیلولر ہوتے ہیں یعنی ان میں سیلولر آرگنائزیشن نہیں پائی جاتی۔

51- وائرسز کیسے اپنی تعداد بڑھاتے ہیں؟

جواب: وائرسز کسی بھی میٹابولزم کو نہیں چلا سکتے۔ یہ اپنی تعداد بڑھانے اور پروٹین بنانے کے لیے ہوسٹ سیل (پودوں، جانوروں اور بیکٹریا) پر انحصار کرتے ہیں۔

52- پرائیویز اور وائریٹیز کے درمیان فرق کریں۔

جواب: پرائیویز اور وائریٹیز اے سیلولر پارٹیکلز ہیں۔ پرائیویز صرف پروٹین جبکہ وائریٹیز صرف RNA پر مشتمل ہوتے ہیں۔ یہ دونوں پارٹیکلز پودوں میں بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔

2.8 بائی نومنیکلچر (Binomial Nomenclature)

53- بائی نومنیکلچر کس نے متعارف کرایا؟

جواب: سویڈن کے ایک بائیولوجسٹ کارل لینیس نے بائی نومنیکلچر کو متعارف کرایا۔

54- بائی نومنیکلچر کی تعریف کیجیے۔

جواب: جانداروں کو سائنسی نام دینے کا طریقہ بائی نومنیکلچر کہلاتا ہے۔ جیسا کہ لفظ بائی نومنیکلچر کے نام سے ظاہر ہے یہی شیڈ کا سائنسی نام دو ناموں پر مشتمل ہوتا ہے۔

55- پیاز اور آلو کا سائنسی نام لکھیں۔

جواب: پیاز کا سائنسی نام *Allium cepa* جبکہ آلو کا سائنسی نام *Solanum tuberosum* ہے۔

56- بائی نومیل نوٹن کلچر کیوں بنایا گیا؟

جواب: تمام جانداروں کو ایک نام دینے، علاقائی ناموں کی کنفیوژن سے بچنے کے لیے بائی نومیل نوٹن کلچر اپنایا گیا۔ اس سسٹم میں ہر جاندار کو ایک نام دیا جاتا ہے جو پوری دنیا میں رائج ہوتا ہے۔

57- سائنسی نام کا کونسا حصہ پہلے لکھا جاتا ہے؟

جواب: ہر سائنسی نام کے دو حصے ہوتے ہیں۔ جنس کا نام ہمیشہ پہلے آتا ہے اور یہی شیر کا نام بعد میں آتا ہے۔

58- سائنسی نام لکھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟

جواب: سائنسی نام لکھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ:

- نام کا پہلا حصہ یعنی جنس کا نام بڑے حروف سے شروع ہونا چاہیے۔
- نام کا دوسرا حصہ یعنی ہی شیر کا نام ہمیشہ چھوٹے حروف سے شروع ہونا چاہیے۔ چاہے یہ مخصوص اسم (Proper noun) سے ہی ماخوذ کیوں نہ ہو۔

مختصر جوابی کنسیپچوئل (Conceptual) سوالات

☆ مختصر جواب دیں۔

1- سائنسدان دو کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم سے متفق کیوں نہیں تھے؟

جواب: چند سائنسدانوں نے دو کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم کو ناقابل عمل پایا کیونکہ کئی یونی سیلولر جانداروں مثلاً یوگلینا میں پودوں (کلوروفل کی موجودگی) اور جانوروں (اندرجے میں، ہیزوڈراف بن جانا اور سیل وال کی عدم موجودگی) دونوں کی خاصیتیں پائی جاتی ہیں۔ سائنسدانوں کے خیال میں ایسے جانداروں کے لیے ایک الگ کنگڈم ہونا چاہیے۔ یہ سسٹم یوکیروٹک اور پروکیروٹک سیل رکھنے والے جانداروں کے درمیان فرق کو بھی نظر انداز کرتا ہے۔

2- ڈومین آرکیا اور بیکٹیریا کی خوراک حاصل یا تیار کرنے کا طریقہ کیا ہے؟

جواب: ڈومین آرکیا کے جاندار ہیزوڈراف ہوتے ہیں یہ اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتے جبکہ ڈومین بیکٹیریا کے جاندار آٹوٹرافس ہوتے ہیں یہ اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں۔

3- بیکٹیریوٹج اور افلوایز اوٹرس میں کیا فرق ہے؟

جواب: • بیکٹیریوٹج وائرس بیکٹیریا کو متاثر کرتا ہے جبکہ افلوایز وائرس انسانوں اور جانوروں کو متاثر کرتا ہے۔
• بیکٹیریوٹج وائرس کو اینٹی بائیوٹکس کے متبادل کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے جبکہ افلوایز وائرس کی بیماریوں کا سبب بنتا ہے جیسے فلو۔

4- بائی نومیل نوٹن کلچر کیوں ضروری تھا؟

جواب: بائی نومیل نوٹن کلچر ضروری تھا کیونکہ کئی علاقوں میں ایک ہی جاندار کے بہت سے مختلف نام ہوتے تھے۔ مثال کے طور پر onion کو اردو میں پیاز کہتے ہیں مگر پاکستان کے مختلف علاقوں میں اسے اور ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے جیسے 'گنڈا'، 'باسل' اور 'واصل' وغیرہ۔

• کچھ صورتوں میں کئی جگہ مختلف جانداروں کو ایک جیسے ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک نام "کالا پرند یعنی بلیک برڈ" عام کوئے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور پہاڑی کوئے کے لیے بھی۔

5- وائرسز کو کلاسیفائی کرنا کیوں مشکل ہے؟

جواب: وائرسز کو کلاسیفائی کرنا مشکل ہے کیونکہ یہ جانداروں اور بے جان کے درمیان موجود ہیں۔ ان میں زیادہ ڈیٹیل اور تغیر پذیر ہے، اور ان میں سیلولر جانداروں میں پائی جانے والی بہت سی خصوصیات نہیں ہیں۔

6- آرکیا اور بیکٹیریا ایک دوسرے سے کیسے مختلف ہیں؟

جواب: آرکیا اور بیکٹیریا ایک دوسرے سے مختلف ہیں کیونکہ بیکٹیریا میں پیپٹائڈوگلیکین سے بنی سیل وال موجود ہوتی ہے جبکہ آرکیا میں بہت سی مختلف قسم کی سیل وال ہوتی ہیں لیکن عام طور پر ان میں پیپٹائڈوگلیکین نہیں ہوتا۔

اہم نکات

• بائیوڈائیورسٹی سے مراد مختلف ایکوسسٹمز، جیسے کہ زمینی، سمندری اور صحرائی ایکوسسٹمز، میں موجود جانداروں کی اقسام ہیں۔
• جانداروں کو ان میں موجود شاہدوں اور فرق کی بنیاد پر بڑے اور چھوٹے گروپس میں تقسیم کرنے کے عمل کو کلاسیفیکیشن کہتے ہیں۔
• جن گروپس میں جانداروں کو تقسیم کیا جاتا ہے انہیں کلاسیفیکیشن کے درجات یا "ٹیکسا" کہتے ہیں۔
• کلاسیفیکیشن کا سب سے پہلے درجہ "ڈومین" کہلاتا ہے۔

• جانداروں کو مجموعی طور پر تین ڈومینز میں تقسیم کیا جاتا ہے: آرکیا، بیکٹیریا، اور یوکیریا۔
• کنگڈم پرولٹا کے جاندار یونی سیلولر یا سادہ مٹی سیلولر ہوتے ہیں اور ان کے سیلز پر یوکیروٹک ہوتے ہیں۔
• فنجائی یوکیروٹک بیکٹریوٹک جاندار ہیں جو اپنی خوراک جذب کرتے ہیں۔
• پودے یوکیروٹک مٹی سیلولر آٹوٹرافس ہیں اور ان کے سیلز آرگنل سیلولر ہوتے ہیں۔
• جانور یوکیروٹک مٹی سیلولر ہیزوڈرافس ہیں جو خوراک کھاتے ہیں اور جسم میں مخصوص کیوینی (cavity) میں ہضم کرتے ہیں۔
• وائرسز میں تین ڈومینز یا چھ کنگڈمز کی خصوصیات موجود نہیں ہوتیں، اس لیے انہیں کلاسیفیکیشن میں شامل نہیں کیا جاتا۔
• ہر جاندار کا سائنسی نام دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے: پہلا حصہ اس کے جنس کا نام ہوتا ہے اور دوسرا اس کی ہی شیر کا نام۔

حل مشقی سوالات

A- درج ذیل سوالات کے لیے درست جوابات منتخب کریں۔

1- ٹیکساٹومی کے درج ذیل درجات میں سے کون سا درجہ سب سے بڑا ہے؟

(الف) ہی شیر (ب) جنس (ج) کنگڈم (د) ڈومین

2- وہ کون سی خصوصیت ہے جو ڈومین آرکیا کے جانداروں کے لیے منفرد ہے؟

(الف) پیپٹائڈوگلیکین سے بنی سیل وال (ب) نیوکلئیس کی موجودگی

(ج) شدید ماحول میں رہنے کی صلاحیت (د) رابو سوز کی غیر موجودگی

3- ان میں سے کون سا بیان بیکٹیریا سے متعلق نہیں ہے؟

(الف) نیوکلئیس نہیں رکھتے (ب) سیل وال پیپٹائڈوگلیکین سے بنی ہوتی ہے

(ج) زیادہ تر ہیزوڈرافٹک ہیں (د) کلوروپلاسٹ میں کلوروفل رکھتے ہیں

4- ان میں سے کون سا جاندار کا تعلق ڈومین یوکیریا سے ہے؟

(الف) اسکریشیا کولائی (Eshcherichia Coli) (ب) پیسٹ

(ج) کورونائرس (د) ان میں سے کوئی نہیں

5- درج ذیل میں سے کون سی خصوصیت یوکیروٹک سیلز کو پروکیروٹک سیلز سے الگ کرتی ہے؟

(الف) سیل وال کی غیر موجودگی (ب) نیوکلئیس کی موجودگی

(ج) رابو سوز کی غیر موجودگی (د) چھوٹا سائز

6- کون سا کنگڈم ایسے جانداروں پر مشتمل ہے جو بنیادی طور پر یونی سیلولر یوکیروٹک، اور اکثر ہیزوڈرافٹک ہوتے ہیں؟

(الف) آرکیا (ب) پرولٹا (ج) فنجائی (د) پلانٹی

7- فنجائی کا شمار وٹر فلک جانداروں میں کیوں کیا جاتا ہے؟

(الف) سیل وال میں کائن کی موجودگی

(ج) سپورز (spores) کے ذریعے تولید کرتے ہیں

8- وائرسز کو روایتی بائیولوجیکل نگلڈم میں شامل کرنا کیوں ناممکن ہے؟

(الف) ان کی ساخت سلاز پر مشتمل نہیں ہوتی اور آرگنلزم بھی موجود نہیں

(ب) وہ فوٹوسنتھی سیز نہیں کر سکتے

(ج) وہ جسامت میں بیکٹیریا سے چھوٹے ہیں

(د) وہ ہیراسائنٹ (parasite) ہیں

9- انسان کا سائنسی نام لکھنے کا صحیح طریقہ کون سا ہے؟

(الف) Homo sapiens (ب) Homo sapiens

(ج) Homo Sapiens (د) homo sapiens

10- اگر آپ کسی جاندار کا سائنسی نام جانتے ہیں تو آپ کون سی معلومات حاصل کر سکتے ہیں؟

(الف) نگلڈم اور فائلم (ب) فائلم اور جنس (ج) جنس اور سی شیز (د) کلاس اور سی شیز

جوابات

1- (ج)	2- (ج)	3- (ب)	4- (ب)	5- (ب)	6- (ج)	7- (ب)	8- (الف)	9- (الف)	10- (ج)
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	----------	---------

B- مختصر جوابات لکھیں۔

1- ایکوسسٹم میں جانداروں کی اقسام بیان کرنے کے لیے کون سی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے؟

جواب: ایکوسسٹم میں جانداروں کی وضاحت کے لیے بائیوڈائیورسٹی کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔

2- انسانوں اور کرہ ارض کے لیے بائیوڈائیورسٹی کی کیا اہمیت ہے؟

جواب: بائیوڈائیورسٹی انسانوں اور کرہ ارض کے لیے ضروری ہے کیونکہ ہم خوراک، صاف پانی، ادویات، آکسیجن، معاشی مواقع، تفریح سرگرمیاں، ثقافتی اہمیت، سائنسی ڈیٹا، سیلاب کو روکنے اور دیگر شدید موسمی اثرات وغیرہ فراہم کرنے کے لیے فطرت (پہنچر) پر انحصار کرتے ہیں۔

3- لیجنس سسٹم میں استعمال ہونے والے ٹیکساٹومی کے سات درجات کون سے ہیں؟

جواب: لیجنس سسٹم میں استعمال ہونے والے سات ٹیکساٹومک رینکس درج ذیل ہیں:

(i) ڈومین (ii) نگلڈم (iii) فائلم (iv) کلاس

(v) آرڈر (vi) فیملی (vii) جنس (viii) سی شیز

4- شیر اور بکری کے ٹیکساٹومی کے درجات تحریر کریں۔

جواب: شیر اور بکری کے لیے ٹیکساٹومک کلاسیفیکیشن:

ٹیکساٹومک رینک	شیر	بکری
نگلڈم	میمیڈیا	پلائی
فائلم/ڈومین	کورڈیٹا	میکوئیوفاٹا
کلاس	میمیڈیا	لیلوپیدا

آرڈر	کارنی دورا	سائپر پلیر
فیملی	فلیدی	پوائسی
جنس	پیتھرا	زیا
سی شیز	پیتھرا ایو	زیا میز

5- آرکیا اور بیکٹیریا کے درمیان بنیادی فرق کیا ہیں؟

جواب: آرکیا: یہ پروکیروٹس ہیں لیکن ان کی سیل وال میں پیپٹائڈوگلائکین موجود نہیں ہوتا۔

بیکٹیریا: یہ پروکیروٹس ہیں ان کی سیل وال پیپٹائڈوگلائکین سے بنی ہوتی ہے۔

6- تین نگلڈمز کے کلاسیفیکیشن سسٹم کی کیا کمزوریاں ہیں؟

جواب: تین نگلڈم کلاسیفیکیشن سسٹم کی خامیاں:

• اس سسٹم میں فنجائی کو اب بھی نگلڈم پلائی میں رکھا گیا تھا۔

• اس سسٹم نے پروکیروٹس اور یوکیریوٹس کے درمیان فرق کو واضح نہیں کیا تھا۔

7- کون سے نگلڈم میں وہ جاندار شامل ہیں جو ملٹی سیلولر اور ہیٹروفلک ہیں اور سیل وال نہیں رکھتے؟

جواب: پانچ نگلڈم کلاسیفیکیشن سسٹم میں نگلڈم اسمبلیا وہ نگلڈم ہے جس میں ملٹی سیلولر، ہیٹروفلک جاندار شامل ہیں اور ان میں سیل وال نہیں ہوتی۔

8- فنجائی کی خصوصیات کی فہرست بتائیں۔

جواب: فنجائی کی خصوصیات:

(i) فنجائی یوکیریوٹک جاندار ہیں۔ (ii) ان کی سیل وال میں سیلولوز کی جگہ کائن موجود ہوتی ہے۔

(iii) ان میں کلوروفیل نہیں ہوتا اور اس وجہ سے یہ فوٹوسنتھی سیز نہیں کرتے۔

(iv) ملٹی سیلولر ہوتے ہیں۔

9- تین ڈومینز کی فہرست بتائیں جن میں تمام جانداروں شامل ہیں۔

جواب: مندرجہ ذیل تین اہم ڈومینز ہیں جن میں تمام جاندار شامل ہیں:

(i) ڈومین بیکٹیریا (ii) ڈومین آرکیا (iii) ڈومین یوکیریا

10- ہم کسی بھی نگلڈم میں وائرسز کی کلاسیفیکیشن کیوں نہیں کر سکتے؟

جواب: ہم وائرسز کو کسی بھی نگلڈم میں کلاسیفائی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ جانداروں اور بے جان کے درمیان تصور کیے جاتے ہیں، وہ اے سیلولر ہیں اور یہ اپنی تعداد بڑھانے اور پرورش بنانے کے لیے ہوسٹ سیل پر انحصار کرتے ہیں۔

11- کس طرح بانی نومیل نومن کلچر مختلف زبانوں میں جانداروں کے بارے میں واضح بات چیت میں مدد فراہم کرتا ہے؟

جواب: بانی نومیل نومن کلچر مختلف زبانوں میں جانداروں کے بارے میں کیونٹیشن کو آسان بناتا ہے کیونکہ بانی نومیل نومن کلچر میں ہر جاندار کو ایک سائنسی نام دیا جاتا ہے جس میں دو حصے ہوتے ہیں پہلا حصہ جنس کا نام اور دوسرا حصہ سی شیز کا نام ہوتا ہے۔ سائنسی نام لاطینی زبان سے لیے گئے ہیں تاکہ کسی ملک کی حمایت نہ ہو۔ کسی جاندار کا سائنسی نام ہر جگہ ایک جیسا ہوتا ہے، اس لیے یہ نظام پوری دنیا میں کیونٹیشن کا ایک معیاری طریقہ فراہم کرتا ہے۔

C- تفصیلی جوابات لکھیں۔

بائیوڈائیورسٹی اور ایکوسسٹم کی صحت کو برقرار رکھنے میں اس کی اہمیت پر بحث کریں۔

جواب: جواب: دیکھیے سوال نمبر 1 کا جواب۔

بائیولوجی میں کلاسیکیٹیشن کی اہمیت کی وضاحت کریں اور یہ بتائیں کہ یہ مختلف جانداروں کے تعلقات کو سمجھنے میں کس طرح مددگار ثابت ہوتی ہے؟

جواب: دیکھیے سوال نمبر 2 کا جواب۔

3- لئمن سسٹم کے کلاسیکیٹیشن سسٹم کو تفصیل سے بیان کریں اور یکسانوی کے سات درجات اور ان کے تعلقات بیان کریں۔

جواب: دیکھیے سوال نمبر 4 کا جواب۔

4- ڈومین آرکیا اور ڈومین بیکٹیریا کی اہم خصوصیات بیان کرتے ہوئے ان ڈومینز کا موازنہ کریں۔

جواب: دیکھیے سوال نمبر 1 کا جواب۔

5- ڈومین یوکاریا کے چار گٹھنری مخصوص خصوصیات بیان کریں۔

جواب: دیکھیے سوال نمبر 12 کا جواب۔

6- جانداروں کے روایتی تین ڈومینز میں وائرس کی کلاسیکیٹیشن کے چیلنجز پر بات کریں۔

جواب: دیکھیے سوال نمبر 13 کا جواب۔

7- جانداروں کو سائنسی نام دینے کے اصول اور نمائندگی کی وضاحت کریں۔

جواب: دیکھیے سوال نمبر 14 کا جواب۔

D- تحقیقی سوالات:

1- غلط درجہ بندی گروپ میں حیاتیات کو کس طرح رکھنے سے تحفظ یا سائنسی مطالعات پر اثر پڑ سکتا ہے؟

جواب: کسی آرگنزم کی دوسرے گروپ (غلط گروپ) میں کلاسیکیٹیشن اس کی بقایا سائنسی مطالعہ کو مندرجہ ذیل طریقوں سے متاثر کرتی ہے۔

• آرگنزم کی خصوصیات اس کا برتاؤ، رہن، بہن اور اس گروپ کے دوسرے جانداروں سے نہیں ملتا۔

• مختلف ہسی شیز کے جانداروں کا آپس میں ملاپ اس میں جنیاتی مسائل کا سبب بن سکتا ہے۔

• اس ہسی شیز کے بارے میں کوئی پیش گوئی نہیں کی جاسکتی اس کی ایکولوجی، ایکوسسٹم میں توازن خراب ہو جاتا ہے۔

2- تصور کریں کہ آپ کو ایک نیا حیاتیات دریافت ہوا ہے۔ بائیو میٹل نام کے اصولوں کے مطابق آپ درجہ بندی کرنے اور اس کا نام لینے کے لیے آپ کیا اقدامات کریں گے؟

جواب: جاندار کے جنٹیس اور ہسی شیز معلوم کریں۔ اس بنیاد پر اس کو سائنسی نام دیں۔

اس کے نام کا پہلا حصہ بڑے حروف کے ساتھ لکھا جائے گا جو اس کی جنٹیس کو ظاہر کرتا ہے نام کا دوسرا حصہ ہسی شیز کو ظاہر کرتا ہے اور چھوٹے حروف میں لکھا جائے گا۔ نام کو انیکس میں لکھیں یا انڈر لائن کریں۔

باب 3

سیل

The Cell

یہ باب پڑھنے کے بعد طلبہ اس قائل ہوں گے کہ:

• سیل کی وضاحت زندگی کی بنیادی اکائی کے طور پر کریں۔

• ڈایاگرامز بنا کر جانوروں اور پودوں کے سیلز کی ساخت کا موازنہ کریں۔

• مختلف سب سیلر آرگینیلز (organelles) کا خاکہ بنائیں اور ان کے افعال بیان کریں۔

• مختلف اقسام کے سیلز (میزوفل سیل، اپی ڈرمس سیل، نیورانز، مسلز، ریڈ بلڈ سیل، جگر (لیور کے سیل) کی شناخت کریں اور ان کی ساخت کا خاکہ بنائیں۔

• ڈویژن آف لیبر (division of labor) کے تصور کی وضاحت کریں اور یہ بتائیں کہ یہ سیلز (آرگنیلز کے درمیان) اور ملٹی سیلر جانداروں (سیلز کے درمیان) میں کس طرح لاگو ہوتا ہے۔

• سیل سپیشلائزیشن (specialization) کی وضاحت کریں۔

• سٹیم سیلز (stem cells) کو غیر تخصیص شدہ سیلز کے طور پر تعریف کریں۔

انشائی طرز سوالات

تفہیم کی نئی امتحانی تکنیک (Knowledge, Understanding, Application, Analytical & Conceptual) کی روشنی میں مرتب کیے گئے انشائی طرز سوالات

سیل ایک شہر کی طرح ہے

ایک سیل ایک مصروف شہر کی طرح ہوتا ہے۔ مثلاً، سیل میں وہ ساختیں ہوتی ہیں جو توانائی پیدا کرتی ہیں (جیسے شہر کے پاور پلانٹس)، کچھ ساختیں مواد کو پروٹینس اور منتقل کرتی ہیں (جیسے شہر کی سڑکیں اور ڈیلیوری سروسز)، اور دیگر ساختیں بے کار مادے نکالنے یا توڑنے کا کام کرتی ہیں (جیسے شہر کے ویسٹ ڈسپوزل یونٹس)۔ آخر میں، جیسے شہر کا ایک حکومتی نظام ہوتا ہے، ویسے ہی سیل میں ایک نیوکلیئس ہوتا ہے جو اس کی سرگرمیوں کی رہنمائی کرتا ہے اور سیل کے ہر فنکشن کے لیے ہدایات فراہم کرتا ہے۔

سیل (Cell)

3.1

سیل کی ساخت (Structure of Cell)

3.2

سوال 1: سیل کیا ہے؟

جواب: سیل (Cell)

سیل زندگی کی بنیادی اکائی ہے۔ جیسے ایک گھر کی تعمیر کے لیے اینٹیں استعمال ہوتی ہیں، ویسے ہی سیلز جانداروں کے تعمیری بلاکس ہیں، بشمول پودوں، جانوروں اور انسانوں کے۔ سب سے چھوٹے بیکٹیریا سے لے کر سب سے بڑے ویل تک ہر جاندار چیز سیلز سے بنی ہوتی ہے۔

زیادہ تر سبز بہت چھوٹے ہوتے ہیں، اور انھیں آنکھ سے نہیں دیکھا جاسکتا۔ ان کے سائز کے باوجود، سبز بہت پیچیدہ ہوتے ہیں اور جانداروں کو زندہ اور فعال رکھنے کے لیے سارے ضروری افعال انجام دیتے ہیں۔


شتر مرغ کا انڈہ، ایک یونی سیلولر بائیولوجی (Acetabularia)، اور یونی سیلولر ڈیو امیبا (giant amoeba)۔

سیل کی ساخت (Structure of Cell):

سیل کی بنیادی ساخت ایک برطانوی سائنسدان رابرٹ ہک (Robert Hooke) نے دریافت کی۔ 1665ء میں، ایک سادہ مائیکروسکوپ کا استعمال کرتے ہوئے، ہک نے کارک کے ایک پتلے ٹکڑے کا جائزہ لیا اور چھوٹے ذہن ساز خلیوں کی دریافت کی جنہیں اُس نے سبز کا نام دیا۔ وہ سیل کی اندرونی ساخت کی تفصیلات کا مطالعہ نہ کر سکے۔ تاہم، انیسویں صدی میں مائیکروسکوپ کے معیار میں بہتری آئی۔ 1831ء میں، پودوں کے سبز کا مائیکروسکوپ کے ذریعے مطالعہ کرتے ہوئے، سکاٹ لینڈ کے ایک سائنسدان رابرٹ براؤن (Robert Brown) نے نیوکلئس دریافت کیا۔ اس کے بعد آنے والے برسوں میں بہت سے آرگنیلز دریافت کیے گئے۔

سوال 2: ذایا گرام بنائیں اور نام لکھیں۔

جواب: (i) پودے کا سیل (ii) جانور کا سیل



سوال 3: سیل وال کی ساخت اور افعال بیان کریں۔

جواب: سیل وال (Cell Wall)

بیکٹیریا، فنجائی، پودوں اور کچھ پروٹسٹس (الچی) کے سبز میں سیل ممبرین کے گرد ایک سخت بے جان دیوار ہوتی ہے جسے سیل وال کہتے ہیں۔

سیل وال کا کام:

یہ سیل کے اندر موجود زندہ مواد (پروٹوپلازم) کو شکل، مضبوطی، حفاظت اور سہارا فراہم کرتی ہے۔

سیل وال کی ساخت:

پودوں کی سیل وال تین پرتوں پر مشتمل ہوتی ہے یعنی مڈل لیمبلا (middle lamella)،

پرائمری وال (primary wall)، اور سیکنڈری وال (secondary wall)۔



پودے کی سیل وال کی مختلف حصوں



پرائمری وال میں سیلولوز کے ریٹے

پلازموڈسماتہ (plasmodesmata):
singular plasmodesma) سیل وال
میں موجود چھوٹے ہیں جن کے ذریعے قریبی سبز کے
درمیان مائیکروٹوبولز کا تبادلہ ہوتا ہے۔

پرائمری وال: سیل ممبرین کے بالکل اوپر موجود ہوتی ہے۔ یہ بنیادی طور پر سیلولوز، ہیکسی سیلولوز (hemi-cellulose) اور پیکٹن (pectin) کی بنی ہوتی ہے۔ سیلولوز ریٹے بناتا ہے جو ایک دوسرے کے اوپر جال کی شکل میں پھیل کر مضبوط پرائمری وال بناتے ہیں۔

مڈل لیمبلا: قریبی سبز کی پرائمری وال کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر رکھتی ہے۔ یہ میکینیشیم، کالشیئم اور پیکٹن پر مشتمل ہوتی ہے۔

سیکنڈری وال: کچھ پودوں کے سبز مثلاً زانگم سبز، پرائمری وال کے اندرونی جانب سیکنڈری وال بناتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر سیلولوز، لگنین (lignin) اور دیگر کیٹیکلز پر مشتمل ہوتی ہے۔ الچی کی سیل وال بھی سیلولوز پر مشتمل ہوتی ہے۔ پروٹیکریٹس کی سیل وال پیپٹائیزڈ گلیکوسین سے بنی ہوتی ہے (ایمینو ایسڈز اور شکرز پر مشتمل واحد مائیکروٹوبول)۔ فنجائی کی سیل وال کاشن کی بنی ہوتی ہے۔


سوال 4: سیل ممبرین کے فلوئڈ موزیک ماڈل کی وضاحت کریں۔

جواب: سیل ممبرین (Cell Membrane)

تمام سبز میں سائٹوپلازم کے گرد ایک باریک پگھ دار سیل ممبرین موجود ہوتی ہے۔ یہ سلیکیولی پرمی ایبل (selectively-permeable) ہوتی ہے۔

سیل ممبرین کا فعل: یہ صرف چند مائیکروٹوبولز کی گزرنے کی اجازت دیتی ہے جبکہ بہت سے مائیکروٹوبولز روک دیتی ہے۔

سیل ممبرین کی کیمیائی کمپوزیشن: سیل ممبرین پروٹینز (proteins) اور لیپڈز (lipids) کی بنی ہوتی ہے اور اس میں تھوڑی سی مقدار میں کاربوہائیڈریٹس بھی پائے جاتے ہیں۔



فلوئڈ موزیک ماڈل: سیل ممبرین کی ساخت کو فلوئڈ موزیک ماڈل (fluid mosaic model) میں بیان کیا جاتا ہے۔ اس ماڈل کے مطابق لیپڈز ایک سیال مائع (fluid) کی طرح کی دوہری تہ (bilayer) بناتے ہیں جس میں پروٹینز کے مائیکروٹوبولز ڈوبے ہوتے ہیں۔ لیپڈز اور پروٹینز حرکت کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے، لیپڈز اور پروٹینز کی ترتیب یعنی "موزیک" تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ کاربوہائیڈریٹس پروٹینز اور لیپڈز کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ پروٹینز کے ساتھ جڑ کر یہ گلیکوپروٹینز (glycoproteins) بن جاتے ہیں۔ جبکہ لیپڈز کے ساتھ جڑ کر یہ گلیکولیپڈز (glycolipids) بن جاتے ہیں۔

یوکیروٹیک سیل میں کئی آرگنیلز کے گرد بھی ممبرین لپٹی ہوتی ہے مثلاً مائٹوکونڈریا، کلوروپلاسٹس، گالٹی اپریٹس، اینڈوپلازمک ریکی کولم، اور لائوسوسمز۔

سیل ممبرین کی لیپڈز کی دوہری تہ کے اندرونی طرف ایک اور لیپڈ یعنی کولیسٹرول (cholesterol) بھی پایا جاتا ہے۔ زیادہ تر بیکٹیریا کی ممبرینز میں کولیسٹرول نہیں ہوتا۔

سوال 5: سائٹوپلازم پرتوں لکھیں۔

جواب: سائٹوپلازم (Cytoplasm): یہ جیلی جیسا (jelly-like) ایک مادہ ہے جو سیل کی اندرونی جگہ میں بھرا ہوتا ہے۔

کیمیکل کمپوزیشن: یہ ایک پیچیدہ مکسر (mixture) ہے جس میں پانی، پروٹینز، اینزائمز، نمکیات اور دوسرے مادے شامل ہیں۔

افعال: سائٹوپلازم کے افعال درج ذیل ہیں:

- سائٹوپلازم آرگنیلز کو افعال سرانجام دینے اور حرکت کرنے کے لیے میڈیم (medium) فراہم کرتا ہے۔
- یہ سیل میں مختلف مادوں کی نقل و حرکت میں بھی مدد دیتا ہے۔
- کئی اہم میٹابولک (metabolic) ری ایکشنز بھی سائٹوپلازم میں وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ مثلاً گلیکولائسز (glycolysis) یعنی گلوکوز کا ٹوٹنا کے ری ایکشنز یہاں ہوتے ہیں۔
- یہ خوراک اور بے کار مادوں کو ذخیرہ بھی کرتا ہے۔

سائٹوپلازم کا مائع حصہ جس میں مایکرو ل اور چھوٹے ذرات مثلاً رائبوسوم (یعنی ممبرین میں لپے بڑے آرگنیلز کے بغیر والا حصہ) سائٹوسول (cytosol) کہلاتا ہے۔

سوال 6: نیوکلیس پر نوٹ لکھیں۔

جواب: نیوکلیس: تمام یوکیریوٹک سیلز میں ایک نمایاں نیوکلیس موجود ہوتا ہے۔

مقام: جانوروں کے سیلز میں یہ درمیان میں موجود ہوتا ہے۔ پودے کے بالغ سیلز میں یہ درمیان میں ایک بڑا ویکول بن جانے کی وجہ سے نیوکلیس ایک جانب دھکیلا جاتا ہے۔

نیوکلیئر اینولوپ: نیوکلیس کے گرد ایک ذیل ممبرین ہوتی ہے جسے نیوکلیئر اینولوپ کہتے ہیں۔ یہ سی پی اے سیل ہے اور اس میں کئی چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں۔ جنہیں نیوکلیئر پورز کہتے ہیں۔


نیوکلیو پلازم: نیوکلیس کے اندر جیلی جیسا مادہ نیوکلیو پلازم کہلاتا ہے۔ نیوکلیو پلازم کے اندر ایک یا دو چھوٹے اجسام پائے جاتے ہیں۔ جنہیں نیوکلیو لائی واحد نیوکلیس کہتے ہیں۔ یہاں رائبوسومز تیار کیے جاتے ہیں۔

کروماتین: نیوکلیو پلازم میں باریک دھاگے جیسا مواد کروماتین کہلاتا ہے۔ یہ DNA اور پروٹینز کا بنا ہوتا ہے۔

کروموسوم: کروموسوم جب سیل تقسیم ہونے کا عمل شروع کرتا ہے تو اس کا کروماتین سکڑ کر کروموسوم کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔

ڈی۔ این۔ اے (DNA): ڈی۔ این۔ اے DNA میں جین ہوتے ہیں جو سیل کی تمام سرگرمیوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ڈی۔ این۔ اے خصوصیات کو اگلی نسل میں منتقل کرنے کا ذمہ دار ہے۔ اسی لیے اسے وراثی مادہ کہتے ہیں۔

پروکیریوٹک سیل میں نیوکلیس: پروکیریوٹک سیلز میں واضح نیوکلیس نہیں ہوتا۔ ان کے کروموسوم میں ڈی۔ این۔ اے تو ہوتا ہے لیکن پروٹینز نہیں ہوتیں۔ ان کا ڈی۔ این۔ اے سائٹوپلازم میں ہی ڈوبا ہوتا ہے۔



نیوکلیس اور کروموسوم کی ساخت


سوال 7: سائٹوسکیلیٹن پر نوٹ لکھیں۔

جواب: سائٹوسکیلیٹن (Cytoskeleton): یہ باریک ٹیوبز اور فلامنٹس (filaments) پر مشتمل ایک جال ہے جو سائٹوپلازم میں پھیلا ہوتا ہے۔ یہ تین حصوں پر مشتمل ہے یعنی مائیکرو ٹیوبولز، مائیکرو فلامنٹس اور انٹرمیڈیٹ فلامنٹس۔

مائیکرو ٹیوبولز (microtubules): کھوکھلی ٹیوبز ہیں۔ یہ ٹیوبولن (tubulin) پروٹین کی بنی ہوئی ہیں۔ یہ حصہ آرگنیلز کو اپنی جگہ پر قائم رکھتا ہے، سیل کی شکل برقرار رکھتا ہے اور آرگنیلز کے لیے رستے بناتا ہے۔ مائیکرو ٹیوبولز سے مائی ٹوس کا سپنڈل (mitotic spindle)، سیلیا (cilia) اور فلیجلا (flagella) بھی بنتے ہیں۔

مائیکرو فلامنٹس (microfilaments): مائیکرو ٹیوبولز کی نسبت زیادہ باریک ہوتے ہیں۔ یہ سکڑنے والی پروٹین یعنی ایکٹن (actin) کے بنے ہوتے ہیں۔ یہ سیل کی حرکات میں مدد دیتے ہیں مثلاً وائٹ بلڈ سیل کے ریگٹنے والی حرکات اور مسلز سیلز کا سکڑنا۔

انٹرمیڈیٹ فلامنٹس (intermediate filaments): انٹرمیڈیٹ فلامنٹس ساخت نما ہیں۔ یہ کیراٹن (keratin) اور ویمینٹن (vimentin) پروٹینز کی بنی ہوئی ہیں۔ یہ فلامنٹس نیوکلیس اور دوسرے آرگنیلز کو سہارا دیتے ہیں۔ یہ سیل اور دوسرے سیلز کے درمیان جنکشن (junction) بھی بناتے ہیں۔



سائٹوسکیلیٹن

سوال 8: رائبوسوم کی ساخت اور افعال بیان کریں۔

جواب: رائبوسوم: رائبوسومز چھوٹی دانے دار ساختیں ہیں۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں پروٹینز تیار ہوتی ہیں۔

مقام: سائٹوپلازم میں آزادانہ تیرتے ہیں یا راف (rough) اینڈوپلازمک ریٹیکولم کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔


کمپوزیشن: رائبوسوم پروٹین اور رائبوسول آر۔ این۔ اے (RNA) کی برابر مقدار کا بنا ہوتا ہے۔

پروکیریوٹک رائبوسومز: رائبوسومز کے گرد ممبرین نہیں ہوتی اس لیے یہ پروکیریوٹک سیلز میں بھی پائے جاتے ہیں۔

یوکیریوٹک رائبوسومز: یوکیریوٹک سیل کا رائبوسومز پروکیریوٹک سیل کے رائبوسومز سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے۔

افعال: ہر رائبوسوم دو چھوٹی اکائیوں کا بنا ہوتا ہے۔ جب رائبوسوم سیل کی پروٹین تیار کر رہا ہوتا ہے تو اس کی دونوں اکائیاں جڑی ہوتی ہیں۔ جب رائبوسوم اپنا کام مکمل کر لیتا ہے تو اس کی اکائیاں دوبارہ الگ الگ ہوجاتی ہیں۔

سوال 9: آپ اینڈوپلازمک ریٹیکولم کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اس کی اقسام اور افعال لکھیں۔




رائبوسوم

جواب: اینڈوپلازمک ریٹیکولم: یہ ممبرینز میں لپٹی ہوئی نالیوں کا ایک جال ہے جو یوکیریوٹک سیل کے تمام سائٹوپلازم میں پھیلا ہوتا ہے۔ سیل کے اندر دو اقسام کا اینڈوپلازمک ریٹیکولم موجود ہوتا ہے۔

سوال 12: مائٹوکائڈریا کی ساخت اور فعل کی وضاحت کریں۔

جواب: مائٹوکائڈریا (Mitochondria):




مائٹوکائڈریا (واحد: مائٹوکائڈریا (mitochondrion) سیل کے توانائی پیدا کرنے والے مراکز یعنی پاور ہاؤس (power house) ہیں۔ یہ سیل کے لیے توانائی پیدا کرتے ہیں۔ یہ اسے روک (aerobic) ریسپریشن کے ری ایکشن کرتے ہیں جن میں آکسیجن استعمال کر کے خوراک (گلوکوز) کو توڑا جاتا ہے اور توانائی حاصل کی جاتی ہے۔ یہ توانائی ایڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ (adenosine triphosphate) یعنی ATP کی شکل میں ہوتی ہے۔

ساخت: مائٹوکائڈریا ڈبل ممبرین میں لپٹی ساختیں ہیں جو صرف یوکیئر یوس میں پائی جاتی ہیں۔ ان کی بیرونی ممبرین تو ہموار ہوتی ہے لیکن اندرونی ممبرین بہت سی تھیں بناتی ہے۔ ان تھوں کو کرٹی (cristae; sing, crista) کہتے ہیں۔ یہ تھیں مائٹوکائڈریا میں ریسپریشن کے لیے سطحی رقبہ بڑھاتی ہیں۔ مائٹوکائڈریا کا اندرونی سیال مائع میٹوکس (matrix) کہلاتا ہے۔ مائٹوکائڈریا کے اندر اپنا DNA اور اپنے رابیوسوم ہوتے ہیں۔ مائٹوکائڈریا کے رابیوسوم پر یوکیئر یوس کے رابیوسوم سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں۔ یہ نسبت یوکیئر یوس کے رابیوسوم کے کام: یہ ایروک ریسپریشن کے مقامات ہیں یعنی انرجی پیدا کرنے کے بڑے مراکز ہیں۔

سوال 13: پلاسٹڈز کیا ہیں؟ پلاسٹڈز کی اقسام کی وضاحت کریں۔

جواب: پلاسٹڈز (Plastids):

یہ ممبرین میں لپٹے ہوئے آرگنیلز ہیں جو پودوں اور فوٹو سنتھی سیز کرنے والے پروٹسٹس (الگی) کے سیلز میں پائے جاتے ہیں۔ پلاسٹڈز کی اقسام: پلاسٹڈز کی تین بڑی اقسام ہیں یعنی کلورو پلاسٹ، کرومو پلاسٹ اور لیوکوپلاسٹ۔



کلورو پلاسٹ (chloroplast): یہ سبز رنگ کے پلاسٹڈ ہیں اور پودے کے سبز حصوں اور الگی میں پائے جاتے ہیں۔ ان میں فوٹو سنتھی سیز کے پگمنٹ (pigment) ہوتے ہیں مثلاً سبز پگمنٹ، کلوروفل (chlorophyll)، کلورو پلاسٹ، فوٹو سنتھی سز کرتے ہیں۔ اپنے پگمنٹ کی مدد سے یہ روشنی کی توانائی کو جذب کر کے اسے کیمیکیل توانائی میں تبدیل کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس توانائی کو استعمال کر کے گلوکوز تیار کرتے ہیں۔

مائٹوکائڈریا کی طرح کلورو پلاسٹ بھی ڈبل ممبرین میں لپٹے

ہوتے ہیں۔ اس کی اندرونی ممبرین اندرونی طرف گھٹے بناتی ہے۔ ان گھٹوں کو گرنیا (grana; singular granum) کہتے ہیں۔ ایک گرنیم تھیلیوں جیسے ساختوں سے مل کر بنتا ہے جنہیں تھیلایوکائڈز (thylakoids) کہتے ہیں۔ فوٹو سنتھی سز کے پگمنٹ ان تھیلایوکائڈز کی سطح پر ہوتے ہیں۔

تھیلایوکائڈز کے گرد ایک سیال مائع ہے جسے سٹروما (stroma) کہتے ہیں۔ مائٹوکائڈریا کی طرح کلورو پلاسٹ میں بھی DNA اور رابیوسوم ہوتے ہیں۔

کرومو پلاسٹ (chromoplast): یہ ایسے پلاسٹڈز ہیں جن میں سبز کے علاوہ دوسرے مختلف چمک دار رنگوں کے پگمنٹ ہوتے ہیں۔ ان سے آئیں

اقسام:


رَف (rough) اینڈو پلازمک ریٹی کولم: اس کی سطح پر بے شمار رابیوسومز جڑے ہوتے ہیں۔ یہ پروٹینز کی تیاری کے فعل میں شامل ہوتا ہے۔

سُوتھ (smooth) اینڈو پلازمک ریٹی کولم: اس کی سطح ہموار ہے کیونکہ اس کے ساتھ رابیوسومز نہیں جڑے ہوتے۔ یہ والا اینڈو پلازمک ریٹی کولم لپڈز کے مینا یولزم اور سیل کے اندر مختلف مادوں کی نقل و حمل کا ذمہ دار ہے۔ یہ سیل میں داخل ہونے والے زہریلے مادوں کا زہریلا اثر ختم کرنے کا کام بھی کرتا ہے۔ سسز کے سیلز میں موجود سوتھ اینڈو پلازمک ریٹی کولم سکر نے کے عمل میں بھی حصہ لیتا ہے۔

سوال 10: گالگی اپریٹس کی تشکیل اور افعال بیان کریں۔

جواب: دریافت: 1898ء میں ایک اطالوی فزیشن کیمیلو گالگی (Camillo Golgi) نے سائٹوپلازم میں چھٹی تھیلیوں (sacs) کا ایک سیر دریافت کیا۔ یہ چھٹی تھیلیاں سسزنی (cisternae) کہلاتی ہیں۔ بہت سی سسزنی ایک دوسرے پر لگ کر ایک گٹھ بناتی ہیں جسے گالگی اپریٹس کہتے ہیں۔ مقام: گالگی اپریٹس پودوں اور جانوروں دونوں کے سیلز میں پایا جاتا ہے۔


گالگی اپریٹس کا کام: اس کا کام زَف (rough) اینڈو پلازمک ریٹی کولم سے آنے والی پروٹینز میں ردوبدل کرنا اور انہیں ممبرین میں لپٹنا ہے۔ اس طرح یہ تھیلیاں بناتا ہے جنہیں گالگی ویکسل (Golgi vesicles) کہتے ہیں۔ ان تھیلیوں کو یا تو سیل میں ہی رکھا جاتا ہے یا رطوبت (secretion) کی شکل میں باہر نکال دیا جاتا ہے۔



1906ء میں گالگی کو فزیا لوجی اور میڈیسن کا نوبل پرائز (Nobel Prize) دیا گیا۔

سوال 11: لائوسوم پروٹ لکھیں اور لیبل شدہ ڈائیگرام بھی بنائیں۔

جواب: لائوسوم (Lysosome): لائوسوم کو کیم (Belgium) کے سائنسدان کرچن ری ڈی ڈیو (Christian Rene De Duve) نے دریافت کیا تھا۔ یہ ممبرین میں لپٹی چھوٹی تھیلیاں ہیں جن کے اندر ہضم کرنے والے یعنی ڈائی جیسٹو (digestive) اینزائمز ہوتے ہیں۔



مقام: لائوسوم بنیادی طور پر جانور کے سیل میں ہوتے ہیں۔ فعل: لائوسوم کے اینزائمز فوڈ ویکسل میں موجود خوراک کو توڑ دیتے ہیں۔ لائوسوم میں سیل کے بے کار مادوں کو توڑنے والے اینزائم بھی ہوتے ہیں۔ لائوسوم خراب آرگنیلز کو بھی نکل کر توڑ دیتے ہیں۔ اس طرح وہ جسم کے مدافعتی نظام میں کردار ادا کرتے ہیں۔ لائوسوم ان مالکیولز کو خیرہ بھی کر لیتے ہیں جنہیں بعد میں استعمال کرنا ہو۔

عمومی پگمنت کا نام کیروٹینائیڈ (carotenoid) ہے۔ کرومoplast پھولوں کی پتلاتوں (petals) اور پھلوں کے سبز میں پائے جاتے ہیں۔ کرومoplast ان حصوں کو رنگ دیتے ہیں۔ اس طرح کرومoplast پودے کی پلینٹیشن اور پھلوں اور پتوں کی پگمنت اور پگمنت کی مدد کرتے ہیں۔ لیوکوپلاست (leucoplast): یہ وہ پلاسٹ ہیں جن میں کوئی پگمنت نہیں ہوتا۔ یہ شارچ، لیڈ ز اور پروٹینز ذخیرہ کرتے ہیں۔ یہ پودے کے ان حصوں کے سبز میں پائے جاتے ہیں جہاں خوراک ذخیرہ کی جاتی ہے، جیسے زیر زمین تنے، بیج، جڑیں وغیرہ۔


سوال 14: ویکیلوں کی وضاحت کریں۔

جواب: ویکیل (Vacules): یہ منسلک ممبرین میں لپٹی ہوئے تھیلی نما آرگنیلز ہیں جو فلوئڈ سے بھرے ہوتے ہیں۔ جانوروں کے سبز میں بہت سے چھوٹی اور عارضی ویکیل ہوتے ہیں۔ ان کے اندر پانی اور خوراک کے اجزاء ہوتے ہیں۔ تازہ پانی کے کچھ جاندار جیسے امیبا اور سپونج (sponge) میں سکنے والے یعنی کنٹریکٹائل (contractile) ویکیل ہوتے ہیں۔ یہ ویکیل اضافی پانی اور دیگر بے کار مادوں کو جمع کر کے باہر نکالتے ہیں۔ کچھ سبز خوراک نغصے کے لیے فوڈ ویکیل بناتے ہیں۔ فوڈ ویکیل خوراک کو ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں۔

خور کرنے کا نکتہ!

☆ ویکیل کو سبز کا کوڑا دان کیوں کہا جاتا ہے؟

جواب: کیونکہ ویکیل اضافی پانی، دیگر بے کار اور نقصان دہ مادوں کو جمع کر لیتے ہیں تاکہ سیل اور دوسری آرگنیلز اپنے افعال سرانجام دے سکیں۔



پودے اور جانور کے سبز میں ویکیل

پودے کے اکثر بالغ سبز میں ایک بڑا، مرکزی ویکیل ہوتا ہے۔ یہ کئی چھوٹے ویکیلز کے انضمام سے بنتا ہے۔ پودے کے ویکیل کی ممبرین کو ٹونوپلاست کہتے ہیں۔ پودے کے ویکیل میں موجود مائع سیل ساپ (cell sap) کہا جاتا ہے۔ سیل ساپ پانی اور نمکیات کے محلول پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس بڑے مرکزی ویکیل کی وجہ سے سیل کا سائیکو پلازم ایک طرف دھکیلا جاتا ہے اور ویکیل کی طرف سے سائیکو پلازم اور سیل وال پر باہر کی

طرف پر پریشر لگتا۔ اندر سے باہر کی طرف اس پر پریشر کی وجہ سے سیل تن جاتا ہے یعنی ٹرجڈ (turgid) ہو جاتا ہے۔ اس پر پریشر کو ٹرگر پریشر (turgor pressure) کہتے ہیں اور یہ عمل ٹرگر کہلاتا ہے۔ ٹرگر پریشر سبز کی شکل برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے۔


سینٹر یول (Centriole): یہ بیرل (barrel) نما آرگنیلز ہیں جو جانوروں اور زیادہ تر پریٹکٹس کے سبز میں پائے جاتے ہیں۔ پروٹیکریوس، اعلیٰ درجے کے پودوں اور فنجائی میں سینٹر یول موجود نہیں ہوتے۔ سینٹر یولز ایک جوڑے کی صورت میں ہوتے ہیں جن میں دونوں سینٹر یول ایک دوسرے کے ساتھ عمودی زاویہ بناتے ہیں۔ جانوروں کے سبز میں اس جوڑے کو سینٹروسوم (centrosome) کہا جاتا ہے جو ٹیکسٹریائیولیوپ کے قریب پایا جاتا ہے۔ ہر سینٹر یول مائیکرو ٹیوبول کے نو (9) ٹریپلز (triplets) پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ مائیکرو ٹیوبولز ایک پروٹین ٹیوبولن (tubulin) سے بنی ہوئی ہیں۔ سیل ڈویژن کے آغاز میں سینٹر یولز کا جوڑا ڈبل ہو جاتا ہے اور دونوں جوڑے سیل کے مخالف قطبوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہاں یہ سپنڈل فائبرز (spindle fibers) بناتے ہیں۔ سپنڈل فائبرز سیل ڈویژن کے دوران کروموسومز کو الگ الگ کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ جن سبز میں سیلیا (cilia) یا فلیجلا (flagella) ہوتے ہیں۔ ان میں سینٹر یول سیل ممبرین کے قریب پایا جاتا ہے۔ ان سینٹر یولز کو بیسل باڈیز (basal bodies) کہا جاتا ہے۔ یہ بیسل باڈیز سیلیا اور فلیجلا بنانے کے ذمہ دار ہیں۔



سینٹر یول کی ساخت

سوال 15: سیلیا اور فلیجلا کے درمیان فرق کریں۔

جواب: سیلیا اور فلیجلا (Cilia and Flagella): کچھ سبز میں پتی دم جیسی ساختیں ہوتی ہیں جنہیں سیلیا (واحد: cilium) اور فلیجلا (واحد: فلیجلم) (flagellum) کہتے ہیں۔ سیلیا لمبائی میں چھوٹے اور عام طور پر تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں۔ جبکہ فلیجلا لمبے مگر تعداد میں کم ہوتے ہیں۔ پروکیریوٹک سیلیا اور فلیجلا مائیکرو ٹیوبولز کے 9 جوڑوں پر مشتمل ہوتے ہیں جو ایک مرکزی جوڑے کو گھیرے ہوتے ہیں۔ سیلیا اور فلیجلا سیل کے اندر بیسل باڈی (basal body) سے جڑے ہوتے ہیں۔ پروکیریوٹک سبز میں بھی فلیجلا ہوتے ہیں لیکن ان کی ساخت پروکیریوٹک سیل کے فلیجلا سے مکمل طور پر مختلف ہوتی ہے۔ پروکیریوٹک فلیجلا ایک پروٹین، فلیجیلن (flagellin) سے بنے ہوتے ہیں۔ سیلیا اور فلیجلا کا کام حرکت کرنا ہے۔



سوال 16: پودے اور جانور کے سبز میں موازنہ کریں۔

جواب: پودے اور جانور کے سبز میں موازنہ:

سیل کا حصہ	بیان	کہاں پایا جاتا ہے	کام
پودے اور جانور کے سیل میں	جیلی جیسا مادہ جس میں سیل کے آرگنیلز موجود ہیں	سیل ممبرین اور نیوکلیئر اینولیوپ کے درمیان	سیل آرگنیلز کو جگہ فراہم کرتا ہے، کئی مینٹا بولک ری ایکشنز کے لیے جگہ فراہم کرتا ہے۔
سیل ممبرین	ایک سلکیٹولی پری ایبل ممبرین جو سائیکوپلازم کے گرد بنائی ہے۔	سائیکوپلازم کے گرد	سیل کے اندر اور باہر آنے جانے والے مادوں کو کنٹرول کرتی ہے۔
نیوکلیس	ایک گول یا بیضی آرگنیل جس میں DNA پایا جاتا ہے	جانور کے سیل میں درمیان میں، پودے کے سیل میں ایک طرف	سیل ڈویژن کو کنٹرول کرتا ہے، سیل کی سرگرمیوں کو کنٹرول کرتا ہے
سیل وال	ایک سخت بے جان بیرونی دیوار جو سیلولوز کی بنی ہوئی ہے	پودے کے سیل کی بیرونی جانب کے باہر	سیل کو سہارا فراہم کرتی ہے، پانی اور نمکیات کو گزرنے دیتی ہے
بڑا ویکیل	سیل مائع سے بھری تھیلی جس کے گرد ممبرین ہوتی ہے	پودے کے سیل کے سائیکوپلازم میں	اس کے اندر نمکیات اور پانی ہے، پودے کے سیل کو ٹرجرڈ رکھنے میں مدد دیتا ہے
کلوروپلاسٹ	کلوروفل رکھنے والا ایک آرگنیل	پودوں کے کچھ سبز کے سائیکوپلازم میں	فوٹو سنتھیسز کے لیے روشنی جذب کرتا ہے

پودے اور جانور کے سبز کے ساختی فوائد

3.3

(Structural advantages of plant and animal cells)

سیل کی سپیشلائزیشن (Cell Specialization)

3.4

سوال 17: پودے اور جانور کے سبز کے ساختی فوائد لکھیں۔

جواب: پودے اور جانور کے سبز کے ساختی فوائد (Structural Advantages of Plant and Animal Cells):

پودوں اور جانوروں کے سبز ساخت میں واضح فرق موجود ہیں جو ان کے مخصوص افعال اور مطالبات کو ظاہر کرتے ہیں۔ مندرجہ ذیل ہیں اور جانوروں کے سبز کے کچھ ساختی فوائد ہیں۔

پودے کے سیل کی ساخت کے فوائد (Advantages of Plant Cell Structures)

- پودوں کے سبز میں سیلولوز سے ملی ایک سخت سیل وال ہوتی ہے جو سیل کو سہارا اور تحفظ فراہم کرتی ہے۔
- ان سبز میں کلوروپلاسٹ ہوتے ہیں جو فوٹوسنتھس سبز کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ کلوروپلاسٹ روشنی کی توانائی کو کیمیائی توانائی میں تبدیل کرتے ہیں جس سے پودے خوراک پیدا کر سکتے ہیں۔
- بڑا مرکز، ویکیکول پانی، غذائی اجزاء اور بے کار مواد کو ذخیرہ کرتا ہے۔ یہ سیل میں مرکز پریش کرتا ہے جو سیل کی شکل کو برقرار رکھتا ہے۔
- پودوں کے سبز کی سیل والز کے درمیان سوراخ موجود ہوتے ہیں جنہیں پلازموڈیسما (plasmodesmata) کہتے ہیں۔
- پلازموڈیسما جینٹلو کے طور پر کام کرتے ہیں اور سبز کے درمیان براہ راست رابطے اور مواد کی منتقلی کو ممکن بناتے ہیں۔


جانور کے سیل کی ساخت کے فوائد (Advantages of Animal Cell Structures)

- جانوروں کے سبز میں سینٹریول ہوتے ہیں جو سینڈل فابریز بناتے ہیں۔ یہ سیل ڈویژن کے دوران کروموسمز کی درست تقسیم کو یقینی بناتے ہیں۔
- ان سبز میں لائوسوسم ہوتے ہیں جو اینزائم سے بھرے ہوتے ہیں اور بے کار مادوں کو توڑنے کا کام کرتے ہیں۔ لائوسوسم سیل کی صفائی اور سامیکلائنگ (recycling) میں مدد کرتے ہیں۔
- جانوروں کے کچھ سبز میں "فلے جیلا" اور "سیلیا" جیسی ساختیں ہوتی ہیں جو حرکت کے عمل میں شامل ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر، سپرم سلز ایک فلے جیلم ہوتا ہے جس کی وجہ سے سپرم انڈے کی طرف حرکت کرتے ہیں تاکہ فرٹیلائزیشن ہو سکے۔
- ان میں سخت سیل وال موجود نہیں ہوتی، جس سے یہ سیل آسانی سے شکل تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ فلک سیل کی حرکت کے لیے بہت اہم ہے جیسے کہ وائٹ بلڈ سیلز (white blood cells) انفلکشن یا چوٹ کی جگہوں کی طرف بڑھتے ہیں۔

سوال 18: پودوں کے کچھ مخصوص سبز کی وضاحت کریں۔

جواب: پودوں کے کچھ مخصوص سبز:

میزوفیل سبز (Mesophyll Cells): یہ سبز سبز ہیں جو چوٹوں میں پائے جاتے ہیں اور فوٹو سنتھس سبز کے لیے مخصوص ہوتے ہیں۔ ان سبز میں بڑی تعداد میں کلوروپلاسٹ ہوتے ہیں۔ کلوروپلاسٹ میں روشنی کی توانائی کو جذب کرنے کے لیے ضروری سبز پگمنت کلوروفل ہو جاتا ہے۔ ان سبز کی شکل اور چوٹوں میں ان کی ترتیب اسی طرح ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ روشنی جذب ہو سکے۔



چوٹ کی اندرونی ساخت میں میزوفیل

اپنی ڈرمل سبز (Epidermal Cells): یہ چوٹوں اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے سبز ہیں جو پودوں کے آرگنز کی بیرونی تہہ بنتی ہیں۔

ڈرمس (epidermis) بناتے ہیں۔ اپنی ڈرمس اندرونی نشوونما کی حفاظت کرتی ہے۔ کچھ جگہوں پر اپنی ڈرمل سبز دوسرے افعال کے لیے تبدیل (modified) ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر چڑکی اپنی ڈرمس میں روٹ ہیئر (root hair) سبز ہوتے ہیں۔ یہ سبز باریک بال نما ساختیں یعنی روٹ ہیئر (root hairs) بناتے ہیں۔ روٹ ہیئر زمینی سے پانی اور معدنیات کو جذب کرنے کے لیے سطحی رقبہ بڑھاتے ہیں۔ چوٹوں کی زیریں اپنی ڈرمس میں گارڈ سبز (guard cells) ہوتے ہیں جو سٹوما (stomata) کے کھلنے اور بند ہونے کو کنٹرول کرتے ہیں۔



چوٹ اور چڑکی اپنی ڈرمس


سوال 19: جانوروں کے کچھ مخصوص سبز کی وضاحت کریں۔

جواب: جانوروں کے کچھ مخصوص سبز:

مسل سبز (Muscle Cells): مسل سبز جانوروں کے مخصوص سبز ہیں جو سکڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ لمبے سبز ہوتے ہیں جو ایکٹن (actin) اور سکڑنے والی دیگر پروٹینز سے بھرے ہوتے ہیں۔

اقسام: سبز بنیادی طور پر تین اقسام کے ہیں:

- (i) سکلیٹل مسل (skeletal muscles): سکلیٹل مسل سبز لمبے اور دھاری دار ہوتے ہیں۔ یہ ہڈیوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ یہ مسل سبز ارادی طور پر کام کرتے ہیں۔ ان کے سکڑنے سے دھانچے کی حرکت ہوتی ہے جس سے جسم کی نقل و حرکت ممکن ہوتی ہے۔
- (ii) کارڈیک مسل (cardiac muscle): کارڈیک مسل سبز شاخ دار اور دھاری دار ہوتے ہیں۔ یہ دل کی دیواروں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ غیر ارادی طور پر کام کرتے ہیں اور ان کے سکڑنے سے دل کی دھڑکن ممکن ہوتی ہے۔



(iii) سموٹھ مسل (smooth muscles): سموٹھ مسل سبز ٹکون نما

(spindle-shaped)۔ یہ دھاری دار نہیں ہوتے اور غیر ارادی طور پر کام کرتے

ہیں۔ سموٹھ مسل سبز کی اندرونی آرگنزی دیواروں میں پائے جاتے ہیں۔ مثال کے

طور پر، غذائی نالی میں موجود سموٹھ مسل غذا کو آگے بڑھانے کے لیے سکڑتے ہیں، جبکہ

خون کی نالیوں میں موجود سموٹھ مسل خون کے بہاؤ کو ممکن بناتے ہیں۔

2- نیورانز (Neurons): یہ نروس سسٹم کے مخصوص سبز ہیں۔

کام: نیورانز کا کام جسم کے مختلف حصوں میں پیغامات پہنچانا ہے۔ یہ پیغامات نروائس (nerve impulses)

کی شکل میں پہنچائے جاتے ہیں۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے نیوران کی ایک منفرد ساخت ہوتی ہے۔

ساخت: ایک نیوران ایک سیل باڈی (cell body) اور سائٹوپلازم کی شاخیں (cytoplasmic

extensions) دو اقسام پر مشتمل ہیں۔ ڈینڈرائٹس (dendrites) چھوٹی شاخیں ہیں جو نروائس وصول کر کے

انہیں سیل باڈی تک پہنچاتے ہیں۔ ایکسون (axon) لمبی شاخیں ہیں جو نروائس کو سیل باڈی سے دور لے جاتے

ہیں۔



3- ریڈ بلڈ سیلز (اقرورسائٹس) (Red blood cells (Erythrocytes): خون کے یہ سیلز آکسیجن کو پھیلانے والوں سے جسم کے ٹیڑ (tissues) تک لے جانے کے لیے مخصوص ہیں۔




ساخت: یہ دو طرفہ گہرے ڈسک (biconcave disc) کی شکل کے سیلز ہیں۔ ان کی شکل آکسیجن کے جذب اور خارج ہونے کے لیے زیادہ سطح مہیا کرتی ہے۔ ریڈ بلڈ سیلز ایک پروٹین ہیموگلوبن (haemoglobin) سے بھرے ہوتے ہیں جو آکسیجن کو ٹرانسپورٹ (transport) کی ذمہ دار پروٹین ہے۔ ممالیہ جانوروں میں بالغ ریڈ بلڈ سیلز میں نیوکلیس، مائٹوکانڈریا، اور اینڈوپلازمک ریٹیکولم وغیرہ موجود نہیں ہوتے۔ یہ زیادہ ہیموگلوبن کے لیے جگہ مہیا کرنے میں مدد دیتا ہے۔

4- جگر کے سیلز (Liver Cells): انھیں ہپٹوسائٹس (hepatocytes) بھی کہتے ہیں۔

کام: جگر کے سیلز بہت سے اہم افعال کے لیے مخصوص ہوتے ہیں، جیسے گلیکوجن، آئرن اور کچھ دوائی کا ذخیرہ: زہریلے مادوں کا زہر ختم کرنا (detoxification)؛ خون کی کلاٹنگ (clotting) والی پروٹین بنانا؛ پرائے ریڈ بلڈ سیلز کی ری سائیکلنگ وغیرہ۔

ساخت: ان سیلز میں واضح نیوکلیس موجود ہے تاکہ ایزائٹروم اور دیگر پروٹین بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ سرگرمیاں انجام دی جاسکیں۔ مائٹوکانڈریا کی بڑی تعداد زیادہ توانائی والے اعمال کے لیے درکار ATP فراہم کرتی ہے۔ سوتھائینڈوپلازمک ریٹیکولم کا وسیع نیٹ ورک زہریلے مادوں کا زہر ختم کرتا ہے اور لیڈ بنانے میں مدد دیتا ہے۔ جگر کے سیلز میں ایک آرگنیل کی بڑی تعداد موجود ہوتی ہے جسے پراکسیسوم (peroxisome) کہتے ہیں۔ پراکسیسوم کے پاس زہریلے مادوں کو بے اثر کرنے والے ایزائٹروم ہوتے ہیں۔ جگر کے سیلز کے درمیان چھوٹے مانی ٹرائسٹ موجود ہوتے ہیں جو ان کی ربطت (بائل) کو جمع کر کے بائل ڈکسٹ تک پہنچاتے ہیں۔



جگر کے سیلز

سوال 20: کام کی تقسیم کے تصور کی وضاحت کریں اور یہ بیان کریں کہ یہ ملٹی سیلولر جانداروں میں کیسے لاگو ہوتا ہے۔ کم از کم تین مثالیں دیں۔

جواب: سیلز کے اندر اور ان کے درمیان کام کی تقسیم (Division of labour within and across cells)

کام کی تقسیم سے مراد کسی سسٹم کے حصوں کا مخصوص (specialized) ہو جانا ہے تاکہ مخصوص کام زیادہ موثر طریقے سے سرانجام دیے جاسکیں۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے جو بائیولوجیکل سسٹمز (سیلز کے اندر اور ان کے درمیان) میں کارکردگی اور فعالیت کو بڑھاتا ہے۔

سیلز کے اندر کام کی تقسیم: سیل کے اندر کام کی تقسیم کی مثال کئی آرگنیلز ہیں۔ ہر آرگنیل سیل کی بقا کے لیے ضروری افعال سرانجام دیتا ہے۔ مثلاً، مائٹوکانڈریا توانائی پیدا کرتے ہیں، اینڈوپلازمک ریٹیکولم پروٹین اور لیڈ زینا کرتے ہیں، اور لائوسوسوم بے کار مواد کو توڑتے ہیں۔ اس طرح، ہر آرگنیل کا کام سیل کی مجموعی بقا، نشوونما، اور فعالیت میں معاون ہوتا ہے۔


سیلز کے درمیان کام کی تقسیم: ملٹی سیلولر جانداروں میں سیلز کے درمیان بھی کام کی تقسیم پائی جاتی ہے۔ ہر قسم کا سیل مخصوص فعل سرانجام دیتا ہے اور جاندار کے مجموعی افعال میں حصہ لیتا ہے۔ مثال کے طور پر، مسل سیلز سکڑنے اور حرکت کے لیے مخصوص ہیں۔ نرڈ (nerve) سیلز یعنی نیورائز پیغامات پہنچانے

کے لیے اور ریڈ بلڈ سیلز آکسیجن لے جانے کے لیے مخصوص ہوتے ہیں۔ سیلز کے مابین (inter-cellular) یہ تخصیص یعنی سپیشلائزیشن (specialization) جانداروں کو وسیع اقسام کے افعال انجام دینے کے قابل بناتی ہے۔

3.5 سٹیم سیلز (Stem Cells)


سوال 21: سٹیم سیلز پر نوٹ لکھیں۔

جواب: سٹیم سیلز (Stem Cells): جنسی تولید یعنی میکوسٹل ریپروڈکشن کرنے والے جانداروں میں تمام مختلف اقسام کے سیلز ایک ہی سیل (زائیکوٹ) سے پیدا ہوتے ہیں۔ زائیکوٹ ایک غیر مخصوص (unspecialized) سیل ہے۔ لیکن زائیکوٹ میں ایسے سیلز بنانے کی صلاحیت ہوتی ہے جو تفریق (differentiation) کے بعد مخصوص سیلز بن جاتے ہیں۔ ایسا غیر مخصوص سیل جو مختلف اقسام کے مخصوص سیلز بنانے کی صلاحیت رکھتا ہو، سٹیم سیل (stem cell) کہلاتا ہے۔



جاندار کی نمو (development) کے دوران، جب سب سے پہلا سٹیم سیل (زائیکوٹ) تقسیم ہوتا ہے تو یہ مختلف سیل لائنز (cell lines) بناتا ہے۔ ہر لائن کے سیلز ایک مخصوص قسم میں تفریق پا جاتے ہیں جیسے جلد کے سیلز، مسلز، نرو سیلز، اور بلڈ سیلز وغیرہ۔

سٹیم سیلز جسم کے مختلف حصوں میں زندگی بھر بھی موجود رہتے ہیں۔ یہ سٹیم سیلز تقسیم ہو سکتے ہیں اور جسم کی ضرورت کے مطابق مخصوص سیلز میں تفریق پا سکتے ہیں۔ سٹیم سیلز خراب شدہ نشوونما کو دوبارہ بنا سکتے ہیں۔ مثلاً، جلد میں موجود سٹیم سیلز زخم بھرنے میں مدد دیتے ہیں۔ جگر میں موجود سٹیم سیلز نقصان کے بعد جگر کی مرمت میں معاون ہوتے ہیں۔ ہڈی کے گودے میں موجود سٹیم سیلز مختلف اقسام کے بلڈ سیلز اور مدافعتی یعنی ایسین (immune) سیلز بنانے کے لیے تفریق پاتے ہیں۔



جسم کے کچھ حصوں میں، جیسے آنت اور ہڈی کا گودا، بالغ سٹیم سیلز باقاعدگی سے تقسیم ہوتے ہیں تاکہ دیکھ بھال اور مرمت کے لیے نئے نشوونما پیدا کیے جاسکیں۔

سوال 22: سیل سپیشلائزیشن (یعنی سیلز کا مخصوص ہونا) پر نوٹ لکھیں۔

جواب: سیل کی سپیشلائزیشن (Cell Specialization): ملٹی سیلولر جانداروں میں مختلف اقسام کے سیلز پائے جاتے ہیں۔ ہر قسم کا سیل خاص ساخت رکھتا ہے اور ایک مخصوص کام سرانجام دیتا ہے۔ سیل ڈویژن کے ذریعے جب سیلز بنتے ہیں تو سب ایک جیسے ہوتے ہیں۔ بننے کے بعد سیلز سپیشلائزیشن یا مخصوص ہو جانے (differentiation) کے عمل سے گزرتے ہیں۔ سپیشلائزیشن کے دوران سیلز خاص جسامت، ساخت اور مینابولک خصوصیات حاصل کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں وہ مخصوص یعنی سپیشلائزڈ (Specialized) سیلز بن جاتے ہیں۔

انشائی طرز کنسیپچوئل (Conceptual) سوالات

سوال 1: سیل کی اہم آرگنلی کون سی ہے؟ اس کے فنکشنز لکھیں۔

جواب: نیوکلئس سیل کی اہم آرگنلی ہے کیونکہ:

- نیوکلئس کسی سیل کی جینیٹک خصوصیات کو کنٹرول کرتا ہے۔
- یہ پروٹینز اور اینزائمز کی ترکیب کو کنٹرول کرتا ہے۔
- یہ سیل کی ڈویژن اور گروتھ کو کنٹرول کرتا ہے۔
- یہ DNA + RNA اور رائبوسومز کو سنور کرتا ہے۔
- یہ رائبوسومز بناتا ہے۔
- یہ پروٹین، ٹرانسکرپشن کے لیے mRNA کو منظم کرتا ہے۔

سوال 2: سیل سیشلا نریشن کے فوائد پر بحث کریں۔

جواب: سیل سیشلا نریشن کے فوائد درج ذیل ہیں:

- ڈویژن آف لیبر: مخصوص سیلز مخصوص کام انجام دیتے ہیں جس سے کام کی نقل سے بچا جاسکتا ہے۔
- کارکردگی: مخصوص سیلز ایک وقت میں کم کاموں پر توجہ مرکوز کر کے کام کو موثر طریقے سے انجام دے سکتے ہیں۔
- انرجی کی بچت: مخصوص سیلز ہمیشہ تیار رہتے ہیں اس لیے وہ انرجی بچاتے ہیں۔
- تیز ارتقاء: مخصوص سیلز ان کاموں میں تیزی سے ارتقاء کرتے ہیں جو وہ ہر وقت انجام دیتے ہیں۔
- ڈی این اے کا تحفظ: سیل سیشلا نریشن جانداروں کو انفرادی سیلز میں کم خیر کا اظہار کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ جو ڈی این اے کو میوٹیشنز سے بچاتا ہے۔

سوال 3: اگر سائٹوپلازم کو سیل سے نکال دیا جائے تو کیا ہوگا؟

جواب: سائٹوپلازم: یہ جیسی جیسا ایک مادہ ہے جو سیل کی اندرونی جگہ میں بھرا ہوتا ہے۔

سائٹوپلازم کے افعال: سائٹوپلازم آرگنیلز کو افعال سرانجام دینے اور حرکت کرنے کے لیے میڈیم فراہم کرتا ہے۔ یہ سیل میں مختلف مادوں کی نقل و حرکت میں بھی مدد دیتا ہے۔ کئی اہم مینابولک ریکشنز بھی سائٹوپلازم میں وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ مثلاً گلیکولائسز، یہ خوراک اور بے کار مادوں کو بھی ذخیرہ کرتا ہے۔ سائٹوپلازم کو سیل سے ہٹا کر نکالنا: اگر سائٹوپلازم سیل سے نکال دیا جائے تو بالآخر وہ مر جائے گا۔ سیل سکڑ جائے گا اور مر جائے گا کیونکہ سائٹوپلازم کی عدم موجودگی میں تمام اہم مینابولک عمل نہیں ہوں گے۔

سوال 4: سیل میں اگر سائٹوپلازم موجود نہ ہو تو کیا ہوگا؟

جواب: پلاسٹڈز: پلاسٹڈز ممبرین میں لپے ایسے آرگنیلز ہیں جو پودوں اور فوٹو سنتھی سیز کرنے والے پرنٹس (الچی) کے سیلز میں پائے جاتے ہیں۔ پلاسٹڈز کی تین اہم اقسام ہیں:

کلوروپلاسٹ: اس میں سبز پگمنت کلوروفل موجود ہوتا ہے اور یہ فوٹو سنتھی سیز کرتے ہیں۔

کروموپلاسٹ: ان میں کیروٹینائڈ پگمنت ہوتا ہے اور یہ پتلا اور پھلور کورنگ دیتے ہیں۔

لیوکوپلاسٹ: ان میں کوئی پگمنت نہیں ہوتا، یہ سٹارچ واپڈز اور پروٹینز کو ذخیرہ کرتے ہیں۔

پلاسٹڈز کی عدم موجودگی: اگر سیلز میں پلاسٹڈز نہ ہوں تو پودوں کے سیلز فوٹو سنتھی سیز، سٹارچ اور خوراک کو ذخیرہ کرنا جیسے اہم کام سرانجام نہیں دے سکیں گے۔ پودوں سے آکسیجن بھی خارج نہیں ہوگی اور اسی طرح جاندار آکسیجن اور خوراک کے بغیر مر جائیں گے جس کے لیے وہ پودوں پر انحصار کرتے ہیں۔

سوال 5: پروکیریوٹک اور یوکیریوٹک سیلز میں فرق کریں۔

جواب: پروکیریوٹک اور یوکیریوٹک سیلز میں فرق:

پروکیریوٹک سیل	یوکیریوٹک سیل	آرگنیلز
بڑے	چھوٹے	رائبوسومز
موجود ہوتی ہے	موجود نہیں ہوتی	اینڈروپلازمک ریبی کولم
پودوں میں سیلولوز سے بنی، فنجائی میں کائین کی بنی اور جانوروں میں موجود نہیں ہوتی۔	پینٹاٹائیڈ وگلائکن	سیل وال
موجود ہوتے ہیں	موجود نہیں ہوتے	سینٹریولز
موجود نہیں ہوتا	موجود ہوتا ہے	گالجزی اپرنس
موجود ہوتا ہے جانوروں میں پودوں میں موجود نہیں ہوتا	موجود نہیں ہوتا	لائسوسوم
واضح	بہت واضح نہیں	نیوکلئس
DNA اور پروٹین پر مشتمل	صرف DNA پر مشتمل	کروموسوم
سادہ اور وسیع	سادہ	DNA

معروضی سوالات

مکمل تفہیم کی بنیادی تفہیم (Knowledge, Understanding, Application, Analytical & Conceptual) کی روشنی میں سوالات کیلئے منتخب سوالات

سیل (Cell)	3.1
سیل کی ساخت (Structure of Cell)	3.2

☆ درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔

1- زندگی کی بنیادی اکائی ہے:

(A) سیل وال (B) نیوکلئس (C) رائبوسوم (D) سیل

2- سیل کی بنیادی ساخت کس نے دریافت کی؟

(A) لوکس پاچرنے (B) رابرٹ براؤن نے (C) رابرٹ ہک نے (D) ارسطو نے

3- رابرٹ ہک نے سیل کی بنیادی ساخت کب دریافت کی؟

(A) 1664ء (B) 1665ء (C) 1666ء (D) 1667ء

4- 1831ء میں رابرٹ ہک نے دریافت کیا:

(A) مائٹوکانڈریا (B) سیل وال (C) نیوکلئس (D) سیل ممبرین

5- مڈل لمیٹلا، پرائمری وال اور سیکنڈری وال کس کی تین جہیں ہیں؟

(A) سیل وال (B) سیل ممبرین (C) سائٹوپلازم (D) سائٹوپلازم

- 6- سیل ممبرین کے بالکل اوپر موجود ہے:
(A) پرائمری وال (B) مڈل لیمینا (C) سیکنڈری وال (D) لپڈ بائی لیر
- 7- سیل وال بنیادی طور پر مشتمل ہوتی ہے:
(A) سیلولوز پر (B) بیسی سیلولوز پر (C) ہیکٹن پر (D) ان سب پر
- 8- مندرجہ ذیل میں سے سیل وال کی کوئی تہہ میں میکیشیم، بیلیشیم اور ہیکٹن موجود ہوتا ہے؟
(A) مڈل لیمینا (B) سیکنڈری وال (C) پرائمری وال (D) لپڈ بائی لیر
- 9- ایچی کی سیل وال کس کی بنی ہوئی ہے؟
(A) ہیکٹن (B) سیلولوز (C) بیسی سیلولوز (D) لگٹن
- 10- فنجائی کی سیل وال میں موجود ہوتا ہے:
(A) ہیکٹن (B) کاکٹن (C) بیسی سیلولوز (D) سیلولوز
- 11- فلوئڈ موزیک ماڈل میں ساخت کو بیان کیا جاتا ہے۔
(A) سیل وال (B) سیل ممبرین (C) سائٹوپلازم (D) کلوروپلاسٹ
- 12- سیل ممبرین بنی ہوئی ہے:
(A) ہیکٹن، کاکٹن اور سیلولوز (B) پروٹینز، لپڈز اور کاربوہائیڈریٹس (C) سیلولوز، کاکٹن اور بیلیشیم (D) میکیشیم، بیلیشیم اور کاربوہائیڈریٹس
- 13- جیلی جیسا مادہ جو سیل کی اندرونی جگہ میں بھرا ہوتا ہے کہلاتا ہے:
(A) ویکیل (B) نیوکلئس (C) سائٹوپلازم (D) کلوروپلاسٹ
- 14- سیلیکولی پری ایبل ممبرین ہے:
(A) سیل ممبرین (B) سیل وال (C) سائٹوپلازم (D) نیوکلئس
- 15- سیل کی کوئی آرگینلی کنٹرول سنٹر کا کام کرتی ہے؟
(A) سائٹوپلازم (B) نیوکلئس (C) رائبوسوم (D) ویکیل
- 16- نیوکلئس کے اندر جیلی جیسا مادہ کہلاتا ہے:
(A) سائٹوپلازم (B) میٹرکس (C) رائبوسوم (D) نیوکلئو پلازم
- 17- درج ذیل میں سے کونسا کروماٹن پر مشتمل ہوتا ہے؟
(A) رائبوسوم (B) سائٹوپلازم (C) نیوکلئس (D) لائوسوم
- 18- باریک ٹیوڈ اور فلامنس پر مشتمل ایک جال جو سائٹوپلازم میں پھیلا ہوتا ہے، کہلاتا ہے۔
(A) مائٹوکانڈریا (B) رائبوسوم (C) سائٹوسکیلیٹن (D) لائوسوم
- 19- مائیکروٹیوبولز کس پروٹین کی بنی ہوئی ہیں؟
(A) ایکٹن (B) کیراٹن (C) لگٹن (D) نیوبیلن
- 20- مائی ٹوس کا سینڈل، سلیمیا اور فلی جیلا بننے ہیں:
(A) مائیکرو فلامنس میں (B) مائیکرو ٹیوبولز میں (C) انٹرمیڈیٹ فلامنس میں (D) مڈل لیمینا میں

- 21- مختلف طرح کی پروٹینز بنیادی طور پر کیراٹن اور آئٹن سے بنے ہوئے راڈز ہیں۔
(A) مائیکرو ٹیوبولز (B) مائیکرو فلامنس (C) انٹرمیڈیٹ فلامنس (D) رائبوسوم
- 22- کونے فلامنس سیل ٹویسل جنکشن بناتے ہیں؟
(A) مائیکرو فلامنس (B) میکرو فلامنس (C) انٹرمیڈیٹ فلامنس (D) کروموسوم
- 23- چھوٹی دانے دار ساختیں ہیں:
(A) رائبوسوم (B) کروموسوم (C) لائوسوم (D) فلی جیلا
- 24- مندرجہ ذیل میں سے کوئی آرگینلی کے گرومبرین نہیں ہوتی۔
(A) سیل ممبرین (B) مائٹوکانڈریا (C) نیوکلئس (D) رائبوسوم
- 25- ممبرینز میں لپٹی ہوئی تالیوں کا ایک جال جو کہ سائٹوپلازم میں پھیلا ہوتا ہے، کہلاتا ہے:
(A) گالچی اپریش (B) کروموسوم (C) سائٹوسکیلیٹن (D) اینڈوپلازمک رینی کولم
- 26- گالچی کوکب فزیالوجی اور میڈیسن کا نوٹیل پرائیڈیا گیا؟
(A) 1905ء (B) 1906ء (C) 1907ء (D) 1908ء
- 27- پیچیم کے سائنسدان کرچن رینی ڈی ڈیو نے دریافت کیا:
(A) گالچی اپریش (B) لائوسوم (C) اینڈوپلازمک رینی کولم (D) مائٹوکانڈریا
- 28- 1898ء میں اطالوی فزیشن کیمپو گالچی نے دریافت کیا:
(A) لائوسوم (B) رائبوسوم (C) پلاسٹڈ (D) گالچی اپریش
- 29- گالچی اپریش کن جانداروں میں پائے جاتے ہیں:
(A) پودوں (B) جانوروں (C) (a) اور (b) دونوں (D) فنجائی
- 30- کوئی ممبرین میں لپٹی چھوٹی تھیلیاں ہیں جن میں ڈائی جیسٹو انزائمز ہوتے ہیں؟
(A) مائٹوکانڈریا (B) گالچی اپریش (C) لائوسوم (D) پلاسٹڈ
- 31- سیل کا پاور ہاؤس کہا جاتا ہے:
(A) لائوسوم (B) پلاسٹڈ (C) گالچی اپریش (D) مائٹوکانڈریا
- 32- یوکیروٹس میں پانی جانے والی ڈبل ممبرین ساختیں ہیں:
(A) رائبوسوم (B) سیل ممبرین (C) مائٹوکانڈریا (D) پلاسٹڈ
- 33- کرسٹی پائے جاتے ہیں:
(A) نیوکلئس میں (B) میٹرکس میں (C) نیوکلئو پلازم میں (D) مائٹوکانڈریا میں
- 34- کسی آرگینلی کے پاس اپنا ڈی این اے اور رائبوسوم ہوتا ہے؟
(A) پلاسٹڈ کے (B) سائٹوسکیلیٹن کے (C) سیل وال کے (D) مائٹوکانڈریا کے
- 35- کون سے بزرگ کے پلاسٹڈ ہیں جو کہ پودوں اور ایچی میں پائے جاتے ہیں؟
(A) کروموپلاسٹ (B) پلاسٹڈ (C) کلوروپلاسٹ (D) لیوکوپلاسٹ
- 36- مندرجہ ذیل میں سے کس میں کلوروپل موجود ہوتا ہے؟
(A) سیل وال (B) کروموپلاسٹ (C) کلوروپلاسٹ (D) لیوکوپلاسٹ

37- بہت سے تھیلیا کو انڈول کر جاتے ہیں:

- (A) سٹروما (B) کلوروفیل (C) گرینم (D) تھیلیا کو انڈول

38- گرین پائے جاتے ہیں:

- (A) ویکول (B) بیسل باڈیز (C) کلورو پلاسٹ (D) کرومو پلاسٹ

39- تھیلیا کو انڈول کے گرد ایک سیال مادہ کہلاتا ہے:

- (A) گرینم (B) میٹرکس (C) سٹروما (D) نیوکلیو پلازم

40- پلاسٹڈز کی وہ قسم جس میں کیروٹینائڈز موجود ہوتے ہیں:

- (A) لیوکوپلاسٹ (B) کرومو پلاسٹ (C) کلورو پلاسٹ (D) یہ تمام

41- کرومو پلاسٹ رنگ دیتے ہیں:

- (A) پیٹلو (B) پھولوں (C) پھلوں (D) مذکورہ تمام

42- لیوکوپلاسٹ ذخیرہ کرتے ہیں:

- (A) شارچ (B) لپڈز (C) پروٹینز (D) مذکورہ تمام

43- لیوکوپلاسٹ پائے جاتے ہیں:

- (A) تنے میں (B) جڑ میں (C) بیج میں (D) ان سب میں

44- فیکٹس نہ رکھنے والے پلاسٹڈز کی قسم کونسی ہے؟

- (A) کلورو پلاسٹ (B) کرومو پلاسٹ (C) لیوکوپلاسٹ (D) یہ تمام

45- پودوں کے ویکول کی ممبرین کو کیا کہتے ہیں؟

- (A) نیوکلیو پلازم (B) ڈبل لمبلا (C) ٹونوپلاسٹ (D) میٹرکس

46- پودوں کے ویکول کے اندر سیپ کو کیا کہتے ہیں؟

- (A) میٹرکس (B) سیل سیپ (C) سسٹونی (D) کرٹی

47- سینٹر پورکس میں نہیں پائے جاتے؟

- (A) پروکیرورٹس میں (B) ہائپر پلائس میں (C) فیکس (D) c.b.a تیلوں

48- جانوروں کے سیلز میں، سینٹرل پول کا جزا کس کے قریب موجود ہوتا ہے؟

- (A) نیوکلیئر ممبرین (B) سیل ممبرین (C) سیل وال (D) مائٹوکونڈریا

49- ہر سینٹرل پول مائیکروٹوبول کے کتنے نوٹس سے مل کر بنتا ہے؟

- (A) 3 (B) 6 (C) 9 (D) 12

50- سیلیا اور قلعے جیلا بنانے کے ذمہ دار ہیں:

- (A) سینٹرل سوسم (B) بیسل باڈیز (C) کرٹی (D) سسٹونی

51- یوکیریوٹک سیلیا اور قلعے جیلا مائیکروٹوبول کے جڑوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔

- (A) 6 (B) 9 (C) 12 (D) 15

52- سیلیا اور قلعے جیلا سیل کے اندر جڑے ہوئے ہیں:

- (A) سینٹرل سوسم (B) پلازموڈیسما (C) بیسل باڈیز (D) گالٹی باڈیز

53- پروکیر یوٹک قلعے جیلا کس پردیشن سے بنے ہوتے ہیں؟

- (A) نیویون (B) ایکٹین (C) کیرائٹن (D) فلیجیلین

54- پلازما ممبرین اور نیوکلیئر ایندولیوٹ کے درمیان موجود ہے:

- (A) سیل ممبرین (B) سیل وال (C) سائٹوپلازم (D) کلورو پلاسٹ

55- اس آرگنل کی کام تائیں جو جانوروں کے سیل میں درمیان میں اور پودوں کے سیل میں ایک طرف موجود ہوتا ہے؟

- (A) کلورو پلاسٹ (B) سیل وال (C) ویکول (D) نیوکلیئس

56- کون پودے کے سیل کو جڈ رکھنے میں مدد دیتا ہے؟

- (A) سیل وال (B) سیل ممبرین (C) ویکول (D) کلورو پلاسٹ

57- سیلز کا کوڑا دان کسے کہا جاتا ہے؟

- (A) سائٹوپلازم (B) لائسوسوم (C) گالٹی اپریش (D) ویکول

پودے اور جانور کے سیلز کے ساختی فوائد

3.3

(Structural advantages of plant and animal cells)

سیل کی سپیشلائزیشن (Cell Specialization)

3.4

58- پودوں کے سیلز جڑے ہوتے ہیں:

- (A) گالٹی اپریش (B) پلازموڈیسما (C) مائیکروٹوبول (D) سینٹرل سوسم

59- چوں میں موجود بزرگ سیلز کو کہتے ہیں:

- (A) ایپی ڈرل سیلز (B) میزوفیل سیلز (C) گارڈ سیلز (D) سٹومیٹا

60- کون سے سیلز سٹومیٹا کے کھلنے اور بند ہونے کو کنٹرول کرتے ہیں؟

- (A) میزوفیل سیلز (B) گارڈ سیلز (C) ایپی ڈرل سیلز (D) پلازموڈیسما

61- کون سے سیلز لمبے اور دھاری دار ہوتے ہیں؟

- (A) کارڈیک مس سیلز (B) سموٹھ مس سیلز (C) سکیلیبل مس سیلز (D) (a) اور (b) دونوں

62- کارڈیک مس سیلز پائے جاتے ہیں۔

- (A) دل (B) ہڈیوں (C) جگر (D) معدے

63- فروں سسٹم کے مخصوص سیلز ہیں۔

- (A) وائٹ بلڈ سیلز (B) ریڈ بلڈ سیلز (C) ارتھر و سائٹس (D) نیوروز

64- ایک نیورون بنا ہوتا ہے۔

- (A) سیل باڈی (B) ایکسون (C) ڈینڈرائٹس (D) مذکورہ تمام

65- نرو افسر و سول کرتے ہیں اور انھیں سیل باڈی تک پہنچاتے ہیں:

- (A) ایکسون (B) ڈینڈرائٹس (C) کارڈیک سیلز (D) سکیلیبل سیلز

66- نرو افسر کو سیل باڈی سے دور لے جاتے ہیں:

- (A) نیوروز (B) ایکسون (C) ڈینڈرائٹس (D) مس سیلز

50- سیل میں کتنی طرح کے پلاسٹڈ پائے جاتے ہیں؟

جواب: پلاسٹڈ کی تین بڑی اقسام ہیں:

(i) کلورو پلاسٹ (ii) کرومو پلاسٹ (iii) لیوکیو پلاسٹ

51- کلورو پلاسٹس کہاں پائے جاتے ہیں؟

جواب: کلورو پلاسٹس بزرگ کے پلاسٹڈ ہیں یہ پودے کے سبز حصے اور اعلیٰ میں پائے جاتے ہیں۔

52- پلاسٹڈ کی کوئی قسم میں کلورو فل ہوتا ہے؟

جواب: کلورو پلاسٹ میں بزرگ کلورو فل موجود ہوتا ہے جو نو سنتھی سیز کرنے میں مدد دیتا ہے۔

53- کلورو پلاسٹ کا فعل کیا ہے؟

جواب: کلورو پلاسٹ میں بزرگ کلورو فل موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے پودے نو سنتھی سیز کرتے ہیں۔ اپنے پگمنت کی مدد سے یہ روشنی انرجی کو جذب کر کے ایسی کیمیکل انرجی میں تبدیل کرتے ہیں۔

54- تھیلاکوائڈ کیسے بنتا ہے؟

جواب: کلورو پلاسٹ کی اندرونی ممبرین اندرونی طرف گھسے بناتی ہیں ان گھسوں کو گرینا کہتے ہیں۔ ایک گرینم تھیلیوں جیسی ساختوں سے مل کر ہوتا ہے۔ جنہیں تھیلاکوائڈز کہتے ہیں۔

55- سٹروما کی تعریف کریں۔

جواب: کلورو پلاسٹ میں تھیلاکوائڈ کے گرد ایک سیال مائع ہے جسے سٹروما کہتے ہیں۔

56- کرومو پلاسٹ اور لیوکیو پلاسٹ کے درمیان فرق کریں۔

جواب: کرومو پلاسٹ:

- یہ ایسے پلاسٹڈ ہیں جن میں سبز کے علاوہ دوسرے مختلف چمک دار رنگوں کے پگمنتس ہوتے ہیں۔
- کرومو پلاسٹ پھولوں کی پتلا اور پتلوں کے سیلز میں پائے جاتے ہیں۔
- کرومو پلاسٹ پودے کی پولی نیشن اور پتلوں اور بیجوں کے نکھڑاؤ میں مدد کرتے ہیں۔

لیوکیو پلاسٹ:

- یہ وہ پلاسٹڈ ہیں جن میں کوئی پگمنت نہیں ہوتا۔
- یہ پودوں کے اُن حصوں کے سیلز میں پائے جاتے ہیں جہاں خوراک ذخیرہ کی جاتی ہے۔
- یہ شارچ، لپڈز اور پروٹینز کو ذخیرہ کرتے ہیں۔

57- ویکیل سے کیا مراد ہے؟

جواب: یہ سنگل ممبرین میں لپٹی ہوئی تھیلی نما آرگینیلز ہیں جو فلوئڈ سے بھرے ہوتے ہیں۔

58- پودے کے سیل اور جانور کے سیل کے ویکیل میں کیا فرق ہے؟

جواب: پودے کے سیل میں ویکیل: پودے کے اکثر بالغ سیلز میں ایک بڑا مرکزی ویکیل ہوتا ہے۔ یہ کئی چھوٹے ویکیلز کے انضمام سے بنتا ہے۔ جانوروں کے سیل میں ویکیل: جانوروں کے سیلز میں بہت سے چھوٹے اور عارضی ویکیلز ہو سکتے ہیں۔ ان کے اندر پانی اور خوراک کے اجزاء ہوتے ہیں۔

59- کنٹریکٹائل ویکیل کن جانوروں میں پائے جاتے ہیں؟

جواب: کچھ جانوروں مثلاً امیبا اور ہیرامیٹم میں کنٹریکٹائل ویکیل ہوتے ہیں۔ یہ ویکیل اضافی پانی اور دیگر بے کار مادوں کو جمع کر کے باہر نکالتے ہیں۔

60- نوٹو پلاسٹ کیا ہے؟

جواب: پودے کے ویکیل کی ممبرین کو نوٹو پلاسٹ کہتے ہیں۔

61- سیل سیپ کیا ہے؟

جواب: پودے کے ویکیل میں موجود مائع کو سیل سیپ کہتے ہیں۔

62- نوٹو ویکیل کا کام کیا ہے؟

جواب: • نوٹو ویکیل خوراک کو نکلنے میں مدد دیتے ہیں۔ • نوٹو ویکیل خوراک کو ذخیرہ بھی کرتے ہیں۔

63- ٹرگر پریشر سے کیا مراد ہے؟

جواب: بڑے مرکزی ویکیل کی وجہ سے سیل کا سائٹوپلازم ایک طرف دھکیلا جاتا ہے اور ویکیل کی طرف سے سائٹوپلازم وال پر باہر کی حرف پریشر لگتا ہے۔ اندر سے باہر کی طرف اس پریشر کی وجہ سے سیل ٹرچڈ ہو جاتا ہے۔ اس پریشر کو ٹرگر پریشر کہتے ہیں۔

64- سینٹریول اور سینٹرو میمر کے درمیان فرق کریں۔

جواب: سینٹریول: یہ بیر نما آرگینیلز ہیں جو جانوروں اور زیادہ تر پروٹسٹس کے سیلز میں پائے جاتے ہیں۔

سینٹرو سوم: سینٹرو پلاز ایک جوڑے کی صورت میں ہوتے ہیں جن میں دونوں سینٹریول ایک دوسرے کے ساتھ عمودی زاویہ بناتے ہیں۔ جانوروں کے سیلز میں اس جوڑے کو سینٹرو سوم کہا جاتا ہے۔

65- مائٹو کاٹر یا اوکلو پلاسٹ میں مشابہتیں تحریر کریں۔

جواب: (i) دونوں پوکیروکس سیل میں پائے جاتے ہیں۔ (ii) دونوں ڈبل ممبرین میں لپٹی ساختیں ہیں۔

(iii) دونوں انرجی ٹرانسفر سے متعلق ہیں۔ (iv) دونوں کا اپنا DNA ہوتا ہے۔

(v) دونوں میں پروٹین بننے کا عمل ہوتا ہے۔

66- سینٹریول کا کام بیان کیجیے۔

جواب: یہ سیل ڈویژن کے دوران سپنڈل فائبرز بناتے ہیں۔ وہ سیلز جن میں سیلیا اور قلع جیلا بننے ہیں۔

67- سیلیا اور قلع جیلا کا کیا کام ہے؟

جواب: سیلیا اور قلع جیلا کا کام حرکت کرنا ہے۔

پودے اور جانور کے سیلز کے ساختی فوائد

3.3

(Structural advantages of plant and animal cells)

سیل کی سپیشلائزیشن (Cell Specialization)

3.4

سٹیم سیلز (Stem Cells)

3.5

68- پودوں کی سیل وال کس سے مل کر بنی ہوتی ہے؟

جواب: پودوں کی سیل وال ایک سخت بے جان اندرونی تہہ ہے جو سیلولوز کی بنی ہوتی ہے۔

69- پودوں کے ویکیل کا اہم کام کیا ہے؟

جواب: • ویکیل پودوں میں نمکیات اور پانی کو سٹور کرتا ہے۔ • ہر پودے کے سیل کو ٹرچڈ رکھنے میں مدد دیتا ہے۔

70- اُن سیل آرگینیلز کے نام لکھیں جو صرف پودوں میں پائی جاتی ہیں؟

جواب: سیل وال اور کلورو پلاسٹ ایسی آرگینیلز ہیں جو صرف پودوں میں پائی جاتی ہیں۔

83- ریڈ بلڈ سیلز کی ڈسک کی شکل ہونے کا کیا فائدہ ہے؟

جواب: ریڈ بلڈ سیلز کی ڈسک کی شکل آکسیجن کے جذب اور خارج ہونے کے لیے زیادہ سطح مہیا کرتی ہے۔

84- جگر کے سیلز کے افعال بیان کریں۔

جواب: جگر کے سیلز بہت سے اہم کام سرانجام دیتے ہیں:

- گلیکوجن، آئرن اور وٹامنز کو سٹور کرتا۔
- خون کی کلائنگ والی پروٹین بناتا۔
- زہریلے مادوں کا زہر ختم یا کم کرتا۔
- پرانے ریڈ بلڈ سیلز کی ری سائیکلنگ کرتا۔

85- جگر کے سیلز میں ہر آکسی سوم کا کیا فائدہ ہے؟

جواب: جگر کے سیلز میں ایک آرگینیل کی بڑی تعداد موجود ہوتی ہے جسے ہر آکسی سوم کہتے ہیں۔ ہر آکسی سوم کے پاس زہریلے مادوں کو بے اثر کرنے والے انزائمز ہوتے ہیں۔

86- کام کی تقسیم سے کیا مراد ہے؟

جواب: کام کی تقسیم سے مراد کسی سسٹم کے حصوں کا مخصوص ہو جانا ہے تاکہ مخصوص کام زیادہ موثر طریقے سے سرانجام دیے جاسکیں۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے جو بائیولوجیکل سسٹمز میں کارکردگی اور فعالیت کو بڑھاتا ہے۔

87- زائیکوٹ سے کیا مراد ہے؟

جواب: زائیکوٹ ایک مخصوص سیل ہے۔ لیکن زائیکوٹ میں ایسے سیلز بنانے کی صلاحیت ہوتی ہے جو تفریق (Differentiation) کے بعد مخصوص سیلز بن جاتے ہیں۔

88- سٹیم سیلز کی اہمیت بیان کریں۔

- سٹیم سیلز جسم کے مختلف حصوں میں زندگی بھر بھی موجود رہتے ہیں۔
- یہ سٹیم سیلز تقسیم ہو سکتے ہیں اور جسم کی ضرورت کے مطابق مخصوص سیلز میں تفریق پاسکتے ہیں۔
- سٹیم سیلز خراب شدہ ٹشو کو دوبارہ بنا سکتے ہیں۔

مختصر جوابی کنسپیکٹوئل (Conceptual) سوالات

☆ مختصر جواب دیں۔

1- کس آرگنیل کو سیل کا دماغ کہا جاتا ہے؟

جواب: نیوکلئیس کو سیل کا دماغ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سیل کی تمام سرگرمیوں کی نگرانی کرتا ہے۔

2- آنت اور ہڈی کے گودا میں سٹیم سیلز باقاعدگی سے کیوں تقسیم ہوتے رہتے ہیں؟

جواب: جسم کے کچھ حصوں میں، جیسے آنت اور ہڈی کا گودا میں بالغ سٹیم سیلز باقاعدگی سے تقسیم ہوتے رہتے ہیں۔ تاکہ دیکھ بھال اور مرمت کے لیے نئے ٹشو پیدا کیے جاسکیں۔

3- سیل کی سب سے چھوٹی آرگنیل کونسی ہے؟

جواب: رائبوسومز سیل کی سب سے چھوٹی آرگنیل ہے۔ یہ دانے دار ساختیں ہیں جو پروٹینز کی تیاری میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ پروکیروٹک اور یوکیروٹک دونوں قسم کے سیلز میں پائی جاتی ہیں۔

4- ایک آرگن اور ایک آرگنیل میں کیا فرق ہے؟

جواب: آرگن: آرگن ٹشو کا ایک مجموعہ ہے جو جسم میں مخصوص کام سرانجام دیتے ہیں۔

آرگنیل: آرگنیل ایک سیلولر ساخت ہے جو سیل کے اندر مخصوص کام سرانجام دیتی ہے۔

جواب: ریڈ بلڈ سیلز میں ہیموگلوبن نامی ایک پروٹین ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ مخصوص ہونی

جواب: یہ پچھلے دور کے دھڑکے کے ساتھ جوئے ہوئے سیلز ہیں جو پودوں کے آرگنز کی بیرونی تہہ یعنی اپنی ڈرس بناتے ہیں۔ اپنی ڈرس اندرونی

جواب: جڑ کی اپنی ڈرس میں روٹ ہیمز سیلز ہوتے ہیں۔ یہ سیلز فوٹو سنتھی سیز کے لیے مخصوص ہوتے ہیں۔

جواب: پتوں کی لوئر اپنی ڈرس کی اہمیت بیان کریں۔

جواب: پتوں کی لوئر اپنی ڈرس میں گارڈ سیلز ہوتے ہیں جو سٹومینا کے کھلنے اور بند ہونے کو کنٹرول کرتے ہیں۔

77- بنیادی طور پر مسل سیلز کی کتنی اقسام ہیں؟

جواب: مسل سیلز بنیادی طور پر تین قسم کے ہوتے ہیں۔

78- سکلیل مسل سیلز، سوتھ مسل سیلز سے کس طرح مختلف ہوتے ہیں؟

جواب: سکلیل مسل سیلز لمبے اور دھاری دار ہوتے ہیں جبکہ سوتھ مسل سیلز پنڈل کی شکل کے ہوتے ہیں اور یہ دھاری دار نہیں ہوتے۔

79- نروس سسٹم کے مخصوص سیلز کون سے ہیں؟

جواب: نروس سسٹم کے مخصوص سیلز ہیں۔

80- نروس سسٹم کی ساخت بیان کریں۔

جواب: نروس سسٹم کی ساخت منفرد ہوتی ہے۔ ایک نیوران ایک سیل باڈی اور سائٹوپلازم کی دو اقسام یعنی (ڈینڈرائٹس اور ایکسون) پر مشتمل ہوتا ہے۔

81- ڈینڈرائٹس اور ایکسون کے درمیان فرق کریں۔

جواب: ڈینڈرائٹس: ڈینڈرائٹس چھوٹے پھیلاؤ ہیں جو زواہلرس وصول کر کے انھیں سیل باڈی تک پہنچاتے ہیں۔

ایکسون: ایکسون لمبے پھیلاؤ ہیں جو زواہلرس کو سیل باڈی سے دور لے جاتے ہیں۔

82- ارتھروسائٹس سے کیا مراد ہے؟

جواب: ریڈ بلڈ سیلز (ارتھروسائٹس) آکسیجن کو ہیموگلوبن سے جسم کے ٹشو تک لے جانے کے لیے مخصوص ہیں۔ ریڈ بلڈ سیلز ایک پروٹین ہیموگلوبن

سے بھرے ہوتے ہیں۔

5- کروماتین اور کروموسوم کے درمیان فرق کریں۔

جواب: کروماتین عام حالت میں نیوکلیس میں پایا جانے والا وراثی مادہ جو ڈھیلا اور باریک دھاگوں کی شکل کا ہوتا ہے کروماتین کہلاتا ہے۔
کروموسوم: پروفیز کے آغاز میں کروماتین سکڑتا ہے اور موٹا ہوتا شروع ہو جاتا ہے اور باقاعدہ قسم کی ساختوں میں بدل جاتا ہے جو کروموسوم کہلاتی ہیں۔

اہم نکات

- نیل زندگی کی بنیادی تعمیراتی اکائی ہے۔
- نیل وال کی پرائمری وال سیلولوز اور بی سیلولوز پر مشتمل ہوتی ہے۔
- سینڈری نیل وال لکٹن سے بنی ہوتی ہے۔
- نیل بھریں لہڈ بانی لیز اور اس میں جڑی پروٹینز پر مشتمل ہوتی ہے۔
- سائٹوپلازمک مائیکروفلنٹس، مائیکروٹیوبلز اور انٹرمیڈیٹ فلامنٹس کے نیٹ ورک پر مشتمل ہوتا ہے۔
- رابوسوم رابوسول آر این اے (rRNA) اور پروٹین سے بنے ہوتے ہیں۔
- گالٹی اپریش کی چچی تھیلیوں (سٹرٹی) پر مشتمل ہوتا ہے جو ایک دوسرے کے اوپر لگ کر گھٹائی ہیں۔
- لائوسوم مضبوط انہضائی اینزائمز رکھتے ہیں جو مختلف بائیو مالیکولز کو سادہ مرکبات میں توڑنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں جو نیل استعمال کر سکتا ہے۔
- مائٹوکونڈریا کو نیل کا "پاور ہاؤس" کہتے ہیں کیونکہ یہ سیلولر ریسپیریشن کے ذریعے توانائی پیدا کرتے ہیں۔
- کلوروپلاسٹ فوٹوسنتھی سیز کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔
- سینٹریول مائیکروٹیوبلز کے 9 گروپس سے بنتے ہیں (جیوٹیوبولن پروٹین پر مشتمل ہوتے ہیں)۔
- نیوکلیس گول بائیضوی شکل کا ہوتا ہے اور درہری جھلی (نیوکلیئر اینولپ) سے گھرا ہوتا ہے۔
- کروموسومز ڈی آکسی رابو نیوکلیک ایسڈ (DNA) اور پروٹینز سے بنے ہوتے ہیں۔
- میزوفل سیز پودوں کے پتوں میں پائے جاتے ہیں اور فوٹوسنتھی سیز کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔
- اہی ڈرل سیز پودوں کے نشوونگی سب سے بیرونی تہ بناتے ہیں، جو ماحول کے خلاف حفاظتی رکاوٹ کا کام کرتی ہے۔
- نیوران اعصابی نظام کے خصوصی سیز ہیں جو پورے جسم میں نرد امپلسز منتقل کرتے ہیں۔
- مسل سیز حرکت کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔
- ریڈ بلڈ سیز خون کی ایک قسم ہیں جو آکسیجن کو پیچھے چھوڑنے سے جسم کے نشوونگی لے جاتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کو پیچھے چھوڑنے کا کام لے جاتے ہیں۔
- شیم سیز غیر تفریق شدہ یا غیر مخصوص سیز ہیں جو مخصوص سیز میں تفریق کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

حل مشقی سوالات

A- درج ذیل سوالات کے لیے درست جوابات منتخب کریں۔

- 1- سیلولر ریسپیریشن کہاں وقوع پذیر ہوتا ہے؟
(الف) نیوکلیس (ب) مائٹوکونڈریا (ج) رابوسوم (د) گالٹی اپریش
- 2- سموتھ اینڈوپلازمک رینی کولم (SER) بنیادی طور پر کس کی تیاری میں شامل ہے؟
(الف) پروٹینز (ب) لہڈز (ج) کاربوہائیڈریٹس (د) نیوکلیک ایسڈز

3- رابوسوم کی کیائی ساخت کیا ہے؟

(الف) RNA اور پروٹینز (ب) DNA اور پروٹینز (ج) کاربوہائیڈریٹس اور لہڈ (د) RNA اور کاربوہائیڈریٹس

4- رابوسوم کا بنیادی کام کیا ہے؟

(الف) توانائی پیدا کرنا (ب) پروٹین کی تیاری (ج) لہڈ کی تیاری (د) ڈی این اے کی تیاری

5- کون سا نیل آرگنیل پروٹینز کی پیکنگ اور تہیگی میں شامل ہے؟

(الف) نیوکلیس (ب) مائٹوکونڈریا (ج) گالٹی اپریش (د) اینڈوپلازمک رینی کولم

6- کون سا آرگنیل بے کارمواد کو توڑنے کا ذمہ دار ہے؟

(الف) گالٹی اپریش (ب) نیوکلیس (ج) مائٹوکونڈریا (د) لائوسوم

7- درج ذیل میں سے کون سی ساخت نیل کی شکل کو برقرار رکھنے میں مددگار ہے۔

(الف) سائٹوسکلیٹن (ب) سینٹریول (ج) نیوکلیس (د) لائوسوم

8- نیوکلیس کا کون سا خاص حصہ رابوسوم کی تیاری کا ذمہ دار ہے؟

(الف) نیوکلیول (ب) نیوکلیس (ج) کروماتین (د) نیوکلیئر اینولپ

9- نیوکلیئر پورز کا اہم کام کیا ہے؟

(الف) نیل ڈی این اے کو کنٹرول کرنا (ب) نیل کا pH کنٹرول کرنا

(ج) پروٹین کی تیاری (د) مالیکولی نقل و حرکت کا کنٹرول

10- درج ذیل میں سے کون سی ساخت جانور کے سیز میں پائی جاتی ہے اور نیل ڈی این اے میں مدد فراہم کرتی ہے؟

(الف) نیل بھریں (ب) سینٹریول (ج) پلازموزمینا (د) ویکول

11- کون سا آرگنیل نیل کے اندر توانائی پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے؟

(الف) اینڈوپلازمک رینی کولم (ب) گالٹی اپریش

(ج) مائٹوکونڈریا (د) لائوسوم

12- ایک مٹی سیلولر پودے میں نیل کی کون سی قسم گلوکوز کی تیاری کی ذمہ دار ہے؟

(الف) زائکم (ب) فلوئم (ج) اہی ڈرل (د) میزوفل

13- کون سا آرگنیل اپنی تعداد دو گنا کر سکتا ہے؟

(الف) رابوسوم (ب) لائوسوم (ج) مائٹوکونڈریا (د) گالٹی اپریش

14- کون سا آرگنیل زف اینڈوپلازمک رینی کولم کی سطح پر موجود ہوتا ہے؟

(الف) رابوسوم (ب) لائوسوم (ج) مائٹوکونڈریا (د) ویکول

جوابات

1- (ب)	2- (ب)	3- (الف)	4- (ب)	5- (ج)	6- (د)	7- (الف)	8- (ب)	9- (د)	10- (ب)
11- (ج)	12- (د)	13- (ج)	14- (الف)						

B- مختصر جوابات لکھیں۔

1- سیل ممبرین کے اہم افعال کون سے ہیں؟

جواب: سیل ممبرین کو باہر کے ماحول سے الگ کرتی ہے اور نقصان سے بچاتی ہے۔ یہ صرف چند مالکیولز کو ہی گزرنے کی اجازت دیتی ہے جبکہ باہر سے مالکیولز کو روک دیتی ہے۔

2- گالٹی اپریش یوکیروٹک سیلز میں کیا اہم کردار ادا کرتا ہے؟

جواب: یوکیروٹک سیلز میں، گالٹی اپریش پروٹینز اور لپڈز کو منتقل کرنے، ان میں ترامیم کرنے اور انہیں ویکیلز میں پیک کرنے کا ذمہ دار ہے تاکہ ان کے اصل مقام تک پہنچایا جاسکے۔

3- لائوسوم سیل کے افعال میں کس طرح معاون ہوتے ہیں؟

جواب: لائوسومز کے افعال: لائوسوم کے اینزائمز فروڈ ویکیلز میں موجود خوراک کو توڑ دیتے ہیں۔ لائوسومز میں سیل کے بے کار مادوں کو توڑنے والے اینزائمز بھی ہوتے ہیں۔ لائوسومز خراب آرگنیلز کو بھی نکل کر توڑ دیتے ہیں۔ لائوسومز ان مالکیولز کو بھی ذخیرہ کر لیتے ہیں جنہیں بعد استعمال کرنا ہو۔

4- کون سا آرگنیل نقصان دہ مادوں کو بے ضرر بناتا اور لپڈز کو توڑتا ہے؟

جواب: سموٹھ اینڈوپلازمک ریبی کولم (SER) نقصان دہ مادوں کو بے ضرر بناتا اور لپڈز کو توڑتا ہے۔

5- سموٹھ اینڈوپلازمک ریبی کولم کس کام کے لیے ذمہ دار ہے؟

جواب: سموٹھ اینڈوپلازمک ریبی کولم کی سطح ہموار ہوتی ہے کیونکہ اس کے ساتھ رائبوسومز نہیں جڑے ہوتے۔

افعال: • سموٹھ اینڈوپلازمک ریبی کولم لپڈز کی مینابولز میں مدد دیتا ہے۔

• یہ سیل کے اندر مختلف مادوں کی نقل و حمل کا ذمہ دار ہے۔

• یہ سیل کے اندر داخل ہونے والے ذریعے مادوں کا اثر ختم کرتا ہے۔

• سیل کے سیلز میں موجود سموٹھ اینڈوپلازمک ریبی کولم سکڑنے کے عمل میں بھی حصہ لیتا ہے۔

6- پودے کے سیلز میں ویکیلز جانوروں کے سیلز میں موجود ویکیلز سے کیسے مختلف ہوتے ہیں؟

جواب: پودے کے سیل میں ویکیلز: پودے کے اکثر بالغ سیلز میں ایک بڑا مرکزی ویکیل ہوتا ہے۔ یہ کی جھوٹے ویکیلز کے انضمام سے بنتا ہے۔

جانوروں کے سیل میں ویکیلز: جانوروں کے سیلز میں بہت سے چھوٹے اور عارضی ویکیلز ہو سکتے ہیں۔ ان کے اندر پانی اور خوراک کے اجزاء ہوتے ہیں۔

7- اگر لائوسوم کے اینزائمز صحیح طریقے سے کام کرنا بند کر دیں تو کیا ہو سکتا ہے؟

جواب: لائوسومل اینزائمز سیلولر فضلے کو توڑتے ہیں۔ جب لائوسومل اینزائمز صحیح طرح سے کام نہیں کریں گے تو شوگر اور فٹس استعمال یا خارج ہونے بجائے سیل میں جمع ہوتی جائیں گے۔

8- سیلولر میسجیرین کے لیے کرسٹائی (cristae) کیوں اہم ہیں؟

جواب: کرسٹی ایک بڑا سطحی رقبہ فراہم کرتے ہیں اور سیلولر ریپائریشن میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔

9- کروماتین اور کروموسوم آپس میں کیا تعلق ہے؟

جواب: کروماتین باریک دھاگے جیسا مواد ہے۔ یہ ڈی آکسی رائیونیکلک ایسڈ (DNA) اور پروٹین پر مشتمل ہے۔ جب ایک سیل تقسیم ہوتا ہے

کرتا ہے تو اس کا کروماتین گاڑھا ہوتا جاتا ہے اور موٹے کروموسوم کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔

10- کون سا نژدہ نامیہ بیجے کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے؟

جواب: نژدہ نامیہ نامیہ بیجے کے لیے ذمہ دار ہوتے ہیں۔

11- پودے کے جوں میں میزوفل سیلز کیا کرتے ہیں؟

جواب: میزوفل سیلز میں بڑی تعداد میں کلوروپلاسٹ موجود ہوتے ہیں، جن میں روشنی سے انرجی حاصل کرنے کے لیے ضروری سبز رنگ کا کلروفیل موجود ہوتا ہے۔ میزوفل سیلز فوٹو سنتھیسس کے لیے مخصوص ہوتے ہیں۔

12- آپ ٹیلم سیل کو کس طرح بیان کریں گے؟

جواب: ایسا غیر مخصوص سیل جو مختلف اقسام کے مخصوص سیلز بنانے کی صلاحیت رکھتا ہو، ٹیلم سیل کہلاتا ہے۔

13- ان کیمیائی مرکبات کے نام بتائیں، جن سے یہ ساختیں بنی ہوتی ہیں:

(الف) سیل ممبرین (ب) فجائی کی سیل وال (ج) پودے کی سیل وال

(د) بیکیٹریا کی سیل وال (ا) رائبوسوم (و) کروموسوم

جواب: (الف) سیل ممبرین: سیل ممبرین پر ڈیٹیز، لپڈز اور تھوڑی مقدار میں کاربوہائیڈریٹس سے مل کر بنی ہے۔

(ب) فجائی کی سیل وال: فجائی کی سیل وال کاٹن کی بنی ہے۔


(ج) پودوں کی سیل وال: پودوں کی سیل وال سیلولوز کی بنی ہوتی ہے۔

(د) بیکیٹریا کی سیل وال: بیکیٹریا کی سیل وال پیپٹائیڈ و گلیکین سے بنی ہوتی ہے۔

(ا) رائبوسوم: رائبوسومز پر ڈیٹیز اور رائبوسول (RNA) سے بنے ہوتے ہیں۔

(و) کروموسوم: کروموسومز DNA اور پروٹینز سے بنے ہوتے ہیں۔

سیل کی درج ذیل ڈیاگرامز کے حصوں کو لیبل کریں۔



جانور کا سیل

پودے کا سیل

جواب:

جانور کا سیل	پودے کا سیل
1- مائٹوکانڈریا	1- گالٹی اپریش
2- سیل ممبرین	2- نیوکلیئس
3- مائٹو پلازم	3- ریف اینڈوپلازمک ریبی کولم
4- سموٹھ اینڈوپلازمک ریبی کولم	4- ویکیلز
5- ویکیلز	5- مائٹوکانڈریا
6- رائبوسوم	6- مائٹو پلازم
7- لائوسوم	7- کلوروپلاسٹ

C- تفصیلی جوابات لکھیں۔

- 1- سیل ممبرین کے فلوئڈ موزیک ماڈل کی وضاحت کریں۔
- 2- سیل وال کی ساخت اور افعال بیان کریں۔
- 3- نیوکلیئس کے حصوں پر بحث کریں۔
- 4- لائوسوم اور اینڈوپلازمک رتنی کولم کی ساخت اور افعال بیان کریں۔
- 5- گالٹی اپریٹس کی تشکیل اور افعال بیان کریں۔
- 6- کلوروپلاسٹ کی ساخت اور افعال بیان کریں۔
- 7- پودے کے سیل میں مرکز پریش کیسے پیدا ہوتا ہے؟
- 8- پودے اور جانور کے سیلز کے درمیان کوئی چار فرق لکھیں۔
- 9- کام کی تقسیم کے تصور کی وضاحت کریں اور یہ بیان کریں کہ یہ ملٹی سیلولر جانداروں میں کیسے لاگو ہوتا ہے؟ کم از کم تین مثالیں دیں۔

جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال نمبر 20

10- سیلز کا مخصوص ہونا یعنی سیلز کی سپیشلائزیشن (cell specialization) پر نوٹ لکھیں۔

جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال نمبر 22

D- تحقیقی سوالات:

- 1- سیل میں کام کرنے کی دیگر آرگنیلوں کی صلاحیت پر مائٹوکونڈریل ڈیس فنکشن یا غیر موجودگی کا کیا اثر پڑ سکتا ہے؟
- جواب: چونکہ مائٹوکونڈریل یا کوسیل کا پاور ہاؤس کہا جاتا ہے اس لیے مائٹوکونڈریل یا خرابی یا غیر موجودگی سے سیل کے دوسرے آرگنیلز کے افعال بھی بڑی طرح متاثر ہوتے ہیں۔ اس سے سیل اور اس کے افعال میں خرابی، تاؤ اور جتنی کہ سیل کی موت بھی ہو سکتی ہے۔
- 2- اگر رائبوسومز اور نیوکلیئس کے مابین ہم آہنگی ناکام ہو جاتی ہے تو کیا ہو سکتا ہے، اور یہ اتنا اہم کیوں ہے؟
- جواب: سیل کے ہومیوسٹیس کو قائم رکھنے، باقاعدہ افعال کی ادائیگی اور پروٹین کے بننے کے لیے رائبوسومز اور نیوکلیئس کے درمیان کوآرڈینیشن انتہائی ضروری ہے۔ اگر کوآرڈینیشن میں خلل پیدا ہو جائے تو یہ سیل کی ساخت اور اس کے افعال کو بڑی طرح متاثر کرتی ہے۔

باب 4

سیل سائیکل

Cell Cycle

یہ باب پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہوں گے کہ:

- سیل سائیکل کی وضاحت کریں۔
- مائیٹوس اور اس کے مراحل کی وضاحت کریں (ڈائیاگرامز کے ساتھ)۔
- میٹوس اور اس کے مراحل کی وضاحت کریں (ڈائیاگرامز کے ساتھ)۔
- مائیٹوس اور میٹوس کے عمل کا موازنہ کریں۔
- مائیٹوس اور میٹوس کی اہمیت بیان کریں۔


انشائی طرز سوالات

یہ تعلیم کی نئی امتحانی تکنیکس (Knowledge, Understanding, Application, Analytical & Conceptual) کی روشنی میں مرتب کیے گئے انشائی طرز سوالات

سیل سائیکل (Cell Cycle)	4.1
مائیٹوس (Mitosis)	4.2

- سوال 1: سیل سائیکل کیا ہے اور اس کے بڑے مراحل کون سے ہیں؟
- جواب: سیل سائیکل (Cell Cycle): سیل سائیکل ان واقعات کا سلسلہ ہے جو ایک یوکیئر یوکیٹیل کے بننے سے لے کر تقسیم ہونے یعنی دو ڈاٹر سیلز (daughter cells) بنانے تک وقوع پذیر ہوتے ہیں۔
- سیل سائیکل کے مراحل: سیل سائیکل کے دو بڑے مراحل ہیں: انٹرفیز اور مائیٹوس (ڈویژن) فیئر۔
- سوال 2: انٹرفیز کی تفصیل سے وضاحت کریں۔
- جواب: انٹرفیز (Interphase): یہ مرحلہ سیل سائیکل کے مکمل دورانیے کے کم از کم 90 فیصد پر محیط ہے۔ انٹرفیز کے دوران سیل اپنی سپیشلائزیشن (specialization) کے مطابق زندگی کے افعال سرانجام دیتا ہے اور اپنے آپ کوئی ڈویژن کے لیے بھی تیار کرتا ہے۔
- انٹرفیز کے مراحل: انٹرفیز میں مندرجہ ذیل تین مراحل ہوتے ہیں:
- G-1 فیئر (First Gap Phase): یہ مائیٹوس کے مرحلے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اسے بڑھوتری یعنی نشوونما کا مرحلہ بھی کہتے ہیں۔ اس مرحلے کے دوران سیل اپنی پروٹینز اور آرگنیلز بناتا ہے۔ اس لیے سیل کی جسامت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سیل ایسے ایئر انٹرفیز بناتا ہے جو اگلے مرحلے یعنی S فیئر میں DNA کی نقل تیار کرنے یعنی اس کی ریپلیکیشن (replication) کے لیے ضروری ہیں۔
 - S فیئر (Synthesis Phase): اس مرحلے میں ہر کروموسوم کے DNA کی نقل تیار کی جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں کروموسومز کی ڈپلی کیشن (duplication) ہو جاتی ہے جس کے بعد ہر کروموسوم دو سسٹر (sister) کرومائیڈز پر مشتمل ہوتا ہے۔ سیل میں کروموسومز کی مکمل تعداد اتنی ہی رہتی ہے جتنی اس ڈپلی کیشن سے پہلے ہوتی ہے۔

● G-2 فیز (Second Gap Phase): سیل اس مرحلے میں اپنی نشوونما جاری رکھتا ہے اور مائی ٹوس کے لیے ضروری پروٹینز تیار کرتا ہے۔ سیل DNA میں کسی بھی ممکنہ خرابی کی جانچ کرتا ہے جو نقل کے دوران ہوئی ہو اور ضروری مرمت کرتا ہے۔ یہ مائی ٹوس کی تیاری کے لیے اپنے مواد کو دوبارہ ترتیب دینا بھی شروع کرتا ہے۔



ہو کیر وٹک سیل کا سیل سائیکل

انٹرفیر کے بعد سیل ڈیوڑن فیئر میں داخل ہو جاتا ہے اور دو ڈائریکٹریز میں تقسیم ہوتا ہے۔ مخصوص جینز (genes) سیل سائیکل کے تمام واقعات کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تمام مراحل ایک بار ترتیب سے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔

G-0 مرحله (G-0 Phase)

کئی سبز تقسیم ہونا دوک لیتے ہیں اور مخصوص افعال سرانجام دیتے ہیں۔ سیل سائیکل میں اس مرحلے کو G-0 فیز کہتے ہیں۔ بہت سے سیلز (مثلاً بخوراز) اس مرحلے میں غیر متعین عمر تک رہتے ہیں۔ کچھ سیلز (مثلاً جگر اور گردے کے سیلز) عارضی طور پر G-0 فیز میں داخل ہوتے ہیں۔ دوسرے سیلز (مثلاً اپی تھیلیا سیلز) G-0 فیز میں داخل نہیں ہوتے اور تمام عمر تقسیم ہوتے رہتے ہیں۔

میل: پوکر پوک میل کے میل سائیکل کے اہم مراحل

مرحلہ	بیان
انٹرفیز (Interphase)	سیل اپنی تقسیم کی تیاری کرتا ہے اور جسامت بڑھتا کرتا ہے۔ سیل کے DNA کی ریپلی کیشن بھی ہوتی ہے۔
G-1 مرحلہ (First Gap Phase)	سیل جسامت میں بڑھتا ہے اور معمول کے افعال سرانجام دیتا ہے۔ سیل DNA کی ریپلی کیشن کی تیاری کرتا ہے۔
S مرحلہ (Synthesis Phase)	سیل اپنے DNA کی ریپلی کیشن کرتا ہے جس سے اس کے جینیاتی مواد کی عین نقل بنتی ہے۔
G-2 مرحلہ (Second Gap Phase)	سیل مزید نشوونما کرتا ہے۔ وہ بات کو یقینی بناتا ہے کہ تقسیم کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔
G0 مرحلہ (Gap Phase)	سیل اپنے سائیکل سے باہر نکل جاتا ہے۔ تقسیم رک جاتی ہے، اپنے خصوصی افعال انجام دینے کے لیے (تمام سائیکل مرحلہ میں نہیں داخل ہوتے)۔
ڈویژن مرحلہ (Division Phase)	سیل اپنے جینیاتی مواد کو دو ایک جیسے نئے سیلز میں برابر تقسیم کرتا ہے۔

سوال 3: مائی ٹوکس کے دوران ہونے والے مراحل بیان کریں۔

جواب: مائی ٹوسس (Mitosis): مائی ٹوسس سیل ڈویژن کی وہ قسم ہے جس میں ایک آبائی یعنی پیرنٹ سیل (parent) دو ڈاؤنڈر سیلز میں تقسیم ہوتا ہے اور ہر ڈاؤنڈر سیل میں کروموسومز کی تعداد اتنی ہی ہوتی ہے جتنی کہ پیرنٹ سیل میں تھی۔

مائی ٹوسس کے مراحل (Phases of Mitosis): 1880 کی دہائی میں ایک جرمن بائیولوجسٹ والدر رفینگ (Walther Flemming) نے مائی ٹوسس کے مراحل دریافت کیے۔ مائی ٹوسس کے دو بڑے مراحل ہیں۔ کیریو کائینیسز (karyokinesis) یعنی نیوکلئیس کی تقسیم اور سائٹو کائینیسز (cytokinesis) یعنی سائٹوپلازم کی تقسیم ہیں۔

کیریو کائینیز (karyokinesis): اس کا مطلب ہے نیوکلئس کی تقسیم۔ کیریو کائینیز میں مزید 4 مراحل ہیں۔

i- **پروفیز (Prophase):** پروفیز میں دھاگے نما کروماتن (chromatin) سکڑ کر موٹا ہوتا ہے۔ اس طرح کروماتن دکھائی دیئے جانے والی موٹی ساختوں یعنی کروموسومز میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہر کروموسوم میں دو سکڑ کر موٹاڈز (sister chromatids) ہوتے ہیں جو ایک سینٹر ویمبر (centromere) سے جڑے ہوتے ہیں۔ پروفیز کے دوران، نیوکلیئر کے اینولپ اور نیوکلیولس (nucleolus) ٹوٹ جاتے ہیں۔ سیل کا سینٹر ویمبر دو میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ دونوں سینٹر ویمبر نیوکلیئس کی مخالف سمتوں میں جاتے ہیں۔ اس دوران وہ خاص مائیکروٹیوبولز یعنی سپنڈل فائبرز (spindle fibers) کا ایک جال بناتے ہیں۔ مکمل جال کو مائی ٹوئک سپنڈل (mitotic spindle) کہتے ہیں۔ پودوں کے سیلز میں سینٹر ویمبر نہیں ہوتا۔ ان کا مائی ٹوئک سپنڈل ساختوں پلازم میں بڑے سپنڈل فائبرز کے اکٹھا ہونے سے بنتا ہے۔


ii- **میٹافیز (Metaphase):** اس مرحلے میں کچھ سپنڈل فائبرز کروموسومز کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ وہ سینٹرو میمر پر ایسے مقام پر جڑتے ہیں جہاں خاص کاسٹیکل کور (kinetochore) برڈیننگ کی ہوتی ہیں۔

دونوں اطراف سے دو سپنڈل فائبرز ایک کروموسوم کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ سپنڈل فائبرز کے ساتھ لگے کروموسومز اپنے آپ کوکیل کے خط استوا پر تہب دے دیتے ہیں۔ اس طرح یہاں ایک پلیٹ بنتی ہے جسے میٹافیز پلیٹ (metaphase plate) کہتے ہیں۔

-iii- اینا فیز (Anaphase): کروموسومز

کے ساتھ لگے سپنڈل فائبرز کناروں (poles) کی طرف کھینچتے ہیں۔ اس کھینچاؤ کی وجہ سے ہر کروموسوم کے سسٹر کرومائیڈز الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کرومائیڈز کے دو ایک جیسے سیٹ بن جاتے ہیں جو سیل کے مخالف کناروں کی جانب چلے جاتے ہیں۔

iv- ٹیلوفیز (Telophase): اس مرحلے میں کروموسمز کے الگ الگ ہوجانے والے ہر سیٹ کے ارد گرد نیا نیوکلیئر اینویلوپ بن جاتا ہے۔ دونوں سیٹ کے کروموسمز دوبارہ کھل کر کردمان بن جاتے ہیں۔



سوال 4: جانور اور پودے کے سیلز میں سائٹو کینسز کی وضاحت کریں۔

جواب: سائٹو کینسز (Cytokinesis): سائٹو کینسز کا لفظی مطلب ہے سائٹوپلازم کی تقسیم۔

جانور کے سیل میں سائٹو کینسز: جانور کے سیل میں سائٹو کینسز کے دوران سیل کے خط استوا میں ایک جھری (furrow) بنتی ہے۔ اس جھری کے مقام پر سائٹوپلازم میں مائیکرو فلامنٹس کا ایک رینگ (ring) ہوتا ہے۔ یہ رینگ سکڑتا ہے اور جھری میں اندر کی جانب دیتا ہے۔ اس طرح ہیرنٹ سیل درمیان سے دب کر دو میں تقسیم ہو جاتا ہے۔

پودے کے سیل میں سائٹو کینسز: پودے کے سیل میں گالٹی اپریش چھوٹی وسیکلز (vesicles) بناتا ہے۔ یہ وسیکلز سیل کے وسط میں آتی ہیں اور ضم ہو کر ایک پلیٹ بناتی ہیں جسے فریکو پلاسٹ (phragmoplast) کہتے ہیں۔ یہ پلیٹ سائٹوپلازم کی طرف بڑھتی ہے اور اس کی ممبرینز سیل ممبرین کے ساتھ ضم ہو جاتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں دو ڈائریکٹریل بن جاتے ہیں۔

سوال 5: مائیٹوسس کی اہمیت بیان کریں۔

جواب: مائیٹوسس کی اہمیت (Significance of Mitosis)


نشو و نما (Growth): جانداروں میں نشو و نما سے مراد ہے جسامت میں اضافہ۔ یہ اضافہ دراصل نئے سیلز بننے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نئے سیلز مائیٹوسس سے بنتے ہیں جو بالکل پہلے سے موجود سیلز جیسے ہوتے ہیں۔ اس طرح مائیٹوسس نشو و نما میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔

سیلز کی تبدیلی (Cell replacement): ہمارے جسم میں ہر وقت بہت سیل مر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر رید بلڈ سیلز اور آنٹوں کی دیواروں کے سیلز اور جلد کے سیلز۔ ان سیلز کے بدلے نئے سیلز بنتے رہتے ہیں جو بالکل پرانے سیلز جیسے ہی ہوتے ہیں۔ نئے سیلز مائیٹوسس سے بنتے ہیں۔

ری جرنیشن (Regeneration): چند جاندار اپنے جسم کے حصوں کو دوبارہ بنا سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے وہ اپنے بقیہ حصوں میں مائیٹوسس کر کے نئے سیلز بناتے ہیں۔

اسے سیکسول ریپروڈکشن (Asexual reproduction):

جانداروں میں اسے سیکسول ریپروڈکشن مائیٹوسس کے ذریعے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہائیڈرا (Hydra) اسے سیکسول ریپروڈکشن کے لیے بڈنگ (budding) کرتا ہے۔ اس دوران مائیٹوسس سے ہائیڈرا کی سطح پر سیلز کا ایک مجموعہ بنتا ہے جسے بڈ (bud) کہتے ہیں۔ بڈ کے سیلز میں مائیٹوسس جاری رہتی ہے اور یہ سائز میں بڑھ کر نیا ہائیڈرا بنادیتی ہے۔



سائٹو کینسز: (a) جانور کے سیل، (b) پودے کے سیل میں


ایک پلیٹ بناتی ہیں جسے فریکو پلاسٹ (phragmoplast) کہتے ہیں۔ یہ پلیٹ سائٹوپلازم کی طرف بڑھتی ہے اور اس کی ممبرینز سیل ممبرین کے ساتھ ضم ہو جاتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں دو ڈائریکٹریل بن جاتے ہیں۔

سوال 5: مائیٹوسس کی اہمیت بیان کریں۔

آپ کا جسم تقریباً 200 ٹریلین (trillion) سیلز کا بنا ہوتا ہے۔ یہ تمام سیلز آپ زندگی کے آغاز پر موجود ایک سیل (زائیگوت: zygote) سے بنے تھے۔ آپ کے جسم کو موجودہ حالت تک پہنچنے کے دوران لاکھوں مرتبہ سیل ڈویژن ہوئیں۔ ان ڈویژنوں میں سے ہر ایک میں وراثتی مادے کو ڈائریکٹریل میں برابر تقسیم کیا گیا۔ یہ مائیٹوسس کی وجہ سے ہوا۔



سی شار (sea star) میں ری جرنیشن



ہائیڈرا میں بڈنگ

سوال 6: مائیٹوسس میں غلطیوں کی وضاحت کریں۔

جواب: مائیٹوسس میں غلطیاں (Errors in Mitosis): بعض اوقات مائیٹوسس کے عمل میں خرابی آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر مائیٹوسس کے اینٹائیمر سے ملے کے دوران کروموسومز کے سنسز کرومائیڈز الگ الگ ہونے میں ناکام ہو سکتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ایک ڈائریکٹریل میں تو دونوں سنسز کرومائیڈز چلے جاتے ہیں اور دوسرے میں کوئی نہیں جاتا۔ مائیٹوسس کے دوران کروموسومز ٹوٹ بھی سکتے ہیں۔

نیومرز: اگر مائیٹوسس کو کنٹرول کرنے والے جینز (genes) میں تبدیلی یعنی میوٹیشن (mutation) ہو جائے تو سیلز تقسیم ہوتا جاری رکھتے ہیں۔ اس بے قابو تقسیم کی وجہ سے سیلز کے ڈیڑھ بن جاتے ہیں۔ ان ڈیڑھوں کو سولیاں یعنی نیومرز (tumors) کہتے ہیں۔

لی تائن: اگر نیومرز اپنی جگہ ہی رہیں تو انھیں لی تائن (benign) نیومرز کہتے ہیں۔

ملیگنٹ (malignant): اگر یہ جاکر دوسرے نشو و نما پر حملہ کر دیں تو انھیں ملیگنٹ (malignant) نیومرز یعنی کینسر (cancer) کہتے ہیں۔ لی تائن نیومرز سے ملیگنٹ نیومرز بننے کو بیماری کا پھیلنا یعنی میٹاسٹیسس (metastasis) کہتے ہیں۔

می اوسس (Meiosis)

4.3

4.4 می اوسس اور مائیٹوسس کا موازنہ (Comparison between meiosis and mitosis)


سوال 7: می اوسس I کے مراحل کے دوران ہونے والے واقعات بیان کریں۔

جواب: می اوسس (Meiosis): یہ سیل ڈویژن کی دو قسم ہے جس میں بننے والے ہر ڈائریکٹریل میں کروموسومز کی تعداد ہیرنٹ سیل کی نسبت آدھی ہوتی ہے۔ می اوسس میں ڈیپلائڈ (diploid) ہیرنٹ سیل میں تقسیم ہوتا ہے اور ہاپلوئڈ (haploid) ڈائریکٹریل بناتا ہے۔

می اوسس کے مراحل (Phases of Meiosis): 1876 میں جرمن بائیولوجسٹ آسکر ہرٹ وگ (Oskar Hertwig) نے می اوسس کو دریافت کیا۔ می اوسس کے دوران ایک ہیرنٹ سیل دو مرتبہ تقسیم ہوتا ہے۔ اس طرح می اوسس دو ڈیپلائڈ ہیرنٹ سیل بناتا ہے۔ یعنی می اوسس I اور می اوسس II۔

می اوسس I (Meiosis-I): می اوسس I میں کروموسومز کے ہر جوڑے کے کروموسومز الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ہر ڈائریکٹریل میں جوڑے کا ایک کروموسوم آتا ہے۔ می اوسس I کے مزید مراحل ہیں پروڈیٹر-1، مینائیٹر-1، اینٹائیٹر-1 اور ٹیلوڈیٹر-1۔


پروڈیٹر-1 (Prophase-I): اس مرحلے کے دوران کرومائیڈز سکڑتا ہے اور کروموسومز کی شکل اختیار کرتا ہے۔ می اوسس I سے پہلے DNA ڈگنا ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے ہر کروموسوم میں دو سنسز کرومائیڈز ہوتے ہیں۔ ہومولوجس کے کروموسومز قریب آ کر لمبائی کے رخ ایک دوسرے کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ اس عمل کو سائنیپسس (synapsis) کہتے ہیں۔ ساتھ لگے کروموسومز کے ہر جوڑے کو ٹیٹرائڈ (tetrad) کہتے ہیں۔ اب ہومولوجس کے کروموسومز کے دو ٹان سنسز (non-sister) کرومائیڈز آپس میں "زپ" ہو کر X-شکل کی ساختیں بناتے ہیں جنہیں کیا زینا (chiasmata) کہتے ہیں۔ ہر کیا زینا (chiasma) اور کا مقام ہوتا ہے۔ کراسنگ اوور (crossing over) سے مراد ہے ٹان سنسز کرومائیڈز کے درمیان کروموسوم کے حصوں کا تبادلہ۔ کراسنگ اوور سے جینیاتی مواد کی نئی ترکیب بنتی ہے یعنی ری کبیشن (recombination) ہوتا ہے۔



کراسنگ اوور

پروفیزر I کے دوسرے واقعات مائی ٹوسس کی پروفیزر جیسے ہی ہیں۔ نیوکلےائی اور نیوکلیر اینو لپوٹ ٹوٹ جاتے ہیں۔ سینٹروسوم دو میں تقسیم ہوتا ہے۔ دونوں سینٹروسوم سیل کے مخالف کناروں کی طرف جاتے ہیں اور سپنڈل فائبرز بناتے ہیں۔ سپنڈل فائبرز کے ساتھ کروموسومز جوڑ جاتے ہیں۔

میٹافیزر I (Metaphase-I): سپنڈل فائبرز کے ساتھ جوڑے نیوکلئوس کے خط استوا کے ساتھ ترتیب پاتے ہیں۔ اس طرح وہ میٹافیز پلیٹ (metaphase plate) بنا دیتے ہیں۔ مائی ٹوسس I کی میٹافیز پلیٹ میں ہومو لوگس کروموسوم کے ہر جوڑے کے ساتھ کناروں سے آنے والے سپنڈل فائبرز جوڑے ہوتے ہیں۔




اینافیز I (Anaphase-I): کروموسوم کے ساتھ جڑا ہر سپنڈل فائبر اپنے کنارے کی طرف کھینچتا ہے۔ اس طرح جوڑے میں لگے کروموسوم الگ ہو جاتے ہیں۔ ہر جوڑے کا ایک کروموسوم ایک کنارے کی طرف جبکہ دوسرا کروموسوم دوسرے کنارے کی طرف کھینچتا ہے۔ اس طرح کروموسومز کے دو ہپلائڈ سیٹ بن جاتے ہیں۔ ہر کروموسوم میں ابھی بھی دوسرے کروماتڈز ہوتے ہیں۔

ٹیلوفیز I (Telophase-I): سپنڈل ختم ہو جاتے ہیں اور کروموسومز کے ہر ہپلائڈ سیٹ کے گرد نیوکلیر اینو لپوٹ بن جاتا ہے۔ کروموسوم دوبارہ کھل کر کروماتڈ بن جاتے ہیں۔ سائٹو کائٹیکسز کا عمل ہوتا ہے اور دو ڈائریکٹریٹ بن جاتے ہیں۔

سوال 8: مائی ٹوسس II پر نوٹ لکھیں۔

جواب: مائی ٹوسس II (Meiosis-II): مائی ٹوسس II کے مراحل مائی ٹوسس جیسے ہی ہیں۔ اس کے مزید مراحل ہیں پروفیزر II، میٹافیزر II، اینافیزر II، ٹیلوفیزر II۔



پروفیزر II: پروفیزر II میں نیوکلےائی اور نیوکلیر اینو لپوٹ غائب ہو جاتے ہیں اور کروماتڈ سکڑتا ہے۔ سینٹریول کناروں کی طرف جاتے ہیں اور سپنڈل فائبرز بناتے ہیں۔

میٹافیزر II: میٹافیزر II میں سپنڈل فائبرز کروموسومز کے کائینیو کور کے ساتھ جڑتے ہیں۔ کروموسوم سیل کے خط استوا پر ترتیب پاتے ہیں۔

اینافیزر II: اینافیزر II میں سپنڈل فائبرز کروماتڈز کو مخالف قطبین کی جانب کھینچ کر الگ الگ کر دیتے ہیں۔

ٹیلوفیزر II: ٹیلوفیزر II میں کروموسوم دوبارہ کھل جاتے ہیں اور کروماتڈ بن جاتے ہیں۔ نیوکلیر اینو لپوٹ دوبارہ بن جاتے ہیں اور سائٹو کائٹیکسز ہو جاتی ہے۔ اس طرح 4 ڈائریکٹریٹ بن جاتے ہیں۔ ہر ڈائریکٹریٹ میں کروموسومز کی ہپلائڈ تعداد ہوتی ہے۔

سوال 9: مائی ٹوسس کی اہمیت بیان کریں۔


جواب: مائی ٹوسس کی اہمیت (significance of Meiosis)

1- مائی ٹوسس کی وجہ سے کروموسوم کی تعداد کا مستقل رہنا: جانوروں کے تولیدی اعضا یعنی ریپرڈکٹو آرگنز میں موجود مخصوص سیلز میں مائی ٹوسس

ہوتی ہے۔ بننے والے ڈائریکٹریٹ یعنی گیمٹس (gametes) میں کروموسوم کی تعداد دوسرے جسمانی سیلز کی نسبت آدھی ہوتی ہے۔ سیکسول ریپرڈکشن کے دوران نر اور مادہ گیمٹس مل کر نئی نسل کا پہلا سیل یعنی زائیکوٹ بناتے ہیں، جس میں کروموسوم کی تعداد دوبارہ مکمل ہو جاتی ہے۔ زائیکوٹ میں کئی مرتبہ مائی ٹوسس ہوتی ہے اور یہ نئے جاندار میں ٹو پاجاتا ہے۔

پھول دار پودوں میں، پھول میں موجود مخصوص سیلز میں مائی ٹوسس ہوتی ہے۔ بننے والے ڈائریکٹریٹ یعنی سپورز (spores) میں کروموسوم کی تعداد نصف ہوتی ہے۔ یہ سپورز پھول کے اندر ہی نئی نسل میں ٹو پاتے ہیں جس میں کروموسوم کی تعداد آدھی ہوتی ہے۔ یہ نسل مائی ٹوسس کے ذریعے ہی گیمٹس بناتے ہیں جو زائیکوٹ بناتے ہیں جس میں کروموسوم کی تعداد پوری ہو جاتی ہے۔ زائیکوٹ مائی ٹوسس کے ذریعے نئے پودے میں ٹو پاجاتا ہے۔

2- مائی ٹوسس سے وراثی تغیرات کا پیدا ہونا: کراسنگ اور سے کروموسومز پر جینز (genes) کی نئی ترکیب (combinations) بنتی ہیں۔ گیمٹ میں موجود ہر کروموسوم کے پاس جینز کا ایک منفرد امتزاج ہوتا ہے۔ جب دو والدین کے وراثی والے گیمٹس ملتے ہیں تو نتیجے میں بننے والا زائیکوٹ وراثی طور پر دونوں والدین سے مختلف ہوتا ہے۔ اس طرح، پاپولیشن میں وراثی تغیرات پیدا ہوتے ہیں۔



مائی ٹوسس سے ایسے سیلز بنے ہیں جن میں جنٹریکٹریٹ ہوتی ہے

3- مائی ٹوسس میں غلطیاں: مائی ٹوسس I میں کروموسومز الگ الگ ہوتے ہیں جبکہ مائی ٹوسس II میں سسٹر کروماتڈز الگ الگ ہوتے ہیں۔ اسے ڈس جنکشن (disjunction) کہتے ہیں۔ بعض اوقات یہ غلطی گیمٹس میں ہو پاتی ہے۔ اسے ٹان ڈس جنکشن (non-disjunction) کہتے ہیں۔ ٹان ڈس جنکشن کی وجہ سے ڈائریکٹریٹ گیمٹس میں کروموسومز کی تعداد نارمل سے زیادہ کم ہو جاتی ہے۔ اگر ایسے گیمٹس کا ملاپ ہوتا ہے تو زائیکوٹ میں کروموسومز کی درست تعداد نہیں آتی۔ اگر ایسا ایٹارل زائیکوٹ ٹو پاتا ہے تو بننے والا نیا جاندار شدید طبی مسائل کا شکار ہوتا ہے۔


سوال 10: مائی ٹوسس اور مائی ٹوسس کا موازنہ کریں۔

جواب: مماثلت

- 1- مائی ٹوسس اور مائی ٹوسس سے پہلے انٹرفیز (S-فیز) میں DNA کی ریپلی کیشن (replication) ہوتی ہے۔
- 2- دونوں تقسیم ایسے بیرونی سیل سے شروع ہوتی ہیں جس میں کروموسومز جوڑوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔
- 3- دونوں میں پروفیزر کے دوران کروماتڈ سکڑتا ہے اور کروموسومز واضح ہو جاتے ہیں۔
- 4- دونوں میں سپنڈل ایپریٹس بنتا ہے۔
- 5- دونوں میں پروفیزر، میٹافیزر، اینافیزر اور ٹیلوفیز شامل ہیں، تاہم مائی ٹوسس میں دو بڑے مراحل ہوتے ہیں یعنی مائی ٹوسس I اور مائی ٹوسس II۔
- 6- دونوں میں سسٹر کروماتڈز الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ مائی ٹوسس میں یہ اینافیز کے دوران ہوتا ہے، جبکہ مائی ٹوسس میں یہ اینافیزر II دوران ہوتا ہے۔
- 7- دونوں کے اختتام پر سائٹو کائٹیکسز ہوتی ہے، جس میں سائٹو پلازم تقسیم ہو کر دو نئے سیلز بنتے ہیں۔

فرق:

مائیٹوسس: Mitosis	میائوسس: Meiosis
ایک پیرنٹ سیل صرف ایک باریقہم ہوتا ہے اور دو ڈائریکٹریڈ پیدا ہوتے ہیں۔	ایک پیرنٹ سیل دو بار تقسیم ہوتا ہے اور چار ڈائریکٹریڈ پیدا ہوتے ہیں۔
ڈائریکٹریڈز میں کروموسومز کی تعداد پیرنٹ سیل کے برابر رہتی ہے۔	ڈائریکٹریڈز میں کروموسومز کی تعداد پیرنٹ سیل کی نسبت آدھی ہو جاتی ہے۔
تغییرات نہیں پیدا ہوتے۔	کراسنگ اوور کی وجہ سے تغیرات پیدا ہوتے ہیں۔
سومٹیک (somatic) سیلز میں ہوتی ہے۔	جرم لائن (germ-line) سیلز میں ہوتی ہے۔
ہومو لوگس کروموسومز جوڑے نہیں بناتے۔	ہومو لوگس کروموسومز جوڑے بناتے ہیں۔
پروفیز کے دوران کراسنگ اوور نہیں ہوتی۔	پروفیز کے دوران کراسنگ اوور ہوتی ہے۔
دو سینڈل فائبرز پر ایک ایک کروموسوم ترتیب پا کر میٹافیز پلیٹ بناتے ہیں۔	دو سینڈل فائبرز پر ہومو لوگس کروموسومز کے جوڑے ترتیب پا کر میٹافیز پلیٹ بناتے ہیں۔
ایٹافیز کے دوران کروموسومز نوٹ جاتے ہیں اور انفرادی کرومائیڈز کو کناروں کی طرف کھینچا جاتا ہے۔	ایٹافیز کے دوران انفرادی کروموسومز کو کناروں کی طرف کھینچا جاتا ہے۔
یہ تقسیم ملٹی سیلولر آرگنزمز کی نشوونما، ترقی، اور بقا کے لیے ہوتی ہے۔	یہ تقسیم سیکسول ریپروڈکشن میں جانوروں میں گیمیٹ بنانے کے لیے اور پودوں میں سپور بنانے کے لیے ہوتی ہے۔



میائوسس اور مائیٹوس کا موازنہ

انشائی طرز کنسیپچوئل (Conceptual) سوالات

- سوال 1: جانور کے سیلز میں میائوسس کے دوران میٹافیز I اور میٹافیز II کیسے مختلف ہو سکتی ہیں؟
- جواب: میٹافیز I کے اختتام پر ڈیپلائنڈ ہوتے ہیں لیکن میٹافیز II کے اختتام پر چپلائنڈ ہوتے ہیں۔ ڈائریکٹریڈز I کے دوران تقسیم کرنے کے لیے سیل پلیٹ بناتے ہیں لیکن میٹافیز II کے دوران سائٹوکائینز کے ذریعے تقسیم ہوتے ہیں۔
- سوال 2: مائیٹوسس میں کونسا مرحلہ شناخت کرنا سب سے مشکل ہے؟
- جواب: مائیٹوسس کے پروفیز مرحلے میں ڈی این اے کو دیکھنا مشکل ہے۔
- وضاحت: پروفیز مرحلے میں، کوئی واضح کروموسومز موجود نہیں ہوتے ہیں۔ DNA پٹے کروماتین ریٹشوں کی شکل میں موجود ہوتا ہے جسے مائیکروسکوپ کے نیچے دیکھنا مشکل ہوتا ہے۔
- سوال 3: کیا DNA کے بغیر مائیٹوسس ہو سکتی ہے؟
- جواب: جی نہیں مائیٹوسس میں سینٹر ویمپر پر کروموسومز کی تقسیم شامل ہوتی ہے۔ جس سے ریپلی کیڈ کروموسومز الگ ہو جاتے ہیں۔ DNA کی ریپلی کیڈشن کے بغیر، ڈی این اے کو دو ڈائریکٹریڈز میں یکساں طور پر تقسیم نہیں کیا جاسکتا۔
- سوال 4: اگر مائیٹوسس کبھی موجود نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟
- جواب: اگر مائیٹوسس نہ ہوتا تو:

- (i) جاندار بڑھنے کے قابل نہیں ہوگا اور یہ مردہ سیلز کو تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ زخموں کو بھرنے کے قابل بھی نہیں ہوگا۔
- (ii) بچے کے بالغ ہونے کا واحد راستہ مائیٹوسس ہے۔

سوال 5: میائوسس II مائیٹوسس سے کیسے ملتی جلتی ہے؟

جواب: میائوسس II مائیٹوسس سے ملتی جلتی ہے کیونکہ:

- (i) دونوں ہر کروموسوم سے کرومائیڈ کو علیحدہ کر کے دو ایک جیسے نیوکلیائی بناتے ہیں۔
- (ii) ہر ڈائریکٹریڈ میں کروموسومز کی تعداد پیرنٹ سیل میں کروموسوم کی تعداد کے برابر رہتی ہے۔
- (iii) دونوں میں پروفیز، میٹافیز، اینٹافیز اور ٹیلوفیز مرحلے ہوتے ہیں۔
- (iv) دونوں سیل ڈویژن کے دوران سینٹر ویمپر ڈپلیکیٹ ہوتا ہے۔

معروضی سوالات

مکمل تقسیم کی نئی امتحانی تکنیک (Knowledge, Understanding, Application, Analytical & Conceptual) کی روشنی میں درج ذیل کے تین سوالات

سیل سائیکل (Cell Cycle)	4.1
مائیٹوسس (Mitosis)	4.2

☆ درست جواب کے گرو دائرہ لگائیں۔

- 1- اینٹرفیز سیل سائیکل کے مکمل دورے کے کتنے فیصد پر محیط ہے؟
- (A) کم از کم 60 (B) کم از کم 70 (C) کم از کم 80 (D) کم از کم 90
- 2- سیل سائیکل کا سب سے طویل مرحلہ ہے۔
- (A) پروفیز (B) میٹافیز (C) اینٹرفیز (D) ٹیلوفیز

3- مائی ٹوکس فیئر کے اختتام سے شروع ہونے والا مرحلہ ہے۔

4- گردتھ فیئر کا دور نام ہے۔
(A) G1 (B) G2 (C) S (D) پرو فیئر

5- کس فیئر کے دوران سیل پروٹین اور آگلیٹیر بناتا ہے اور سائز میں بڑھتا ہے؟
(A) G0 (B) G1 (C) S (D) پرو فیئر

6- کروموسوم کی ڈبلی کیشن ہوتی ہے۔
(A) G1 (B) S (C) G2 (D) پرو فیئر

7- ہر کروموسوم کتنے سسز کروماٹوز پر مشتمل ہوتا ہے؟
(A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 8

8- کس مرحلے میں سیل اپنی نشوونما جاری رکھتا ہے اور پروٹین بناتا ہے؟
(A) مینا فیئر (B) سائٹو کائیز (C) G1 (D) G2

9- ڈویژن فیئر میں ایک سیل تقسیم ہوتا ہے۔
(A) 2 ڈائیزل (B) 4 ڈائیزل (C) 6 ڈائیزل (D) 8 ڈائیزل

10- بہت سے سیل تقسیم ہونا بند کر دیتے ہیں اور اپنے مخصوص افعال سرانجام دیتے ہیں۔
(A) S (B) G1 (C) G0 (D) مینا فیئر

11- کون سے سیل G-0 فیئر میں داخل نہیں ہوتے اور تمام تقسیم ہوتے رہتے ہیں؟
(A) جگر کے سیل (B) اپنی تحصیل سیل (C) گردے کے سیل (D) دماغ کے سیل

12- سیل اپنے DNA کی رپہلی کیشن کرتا ہے، جس سے اس کے جینیٹک مواد کی کاپی بنتی ہے۔
(A) انٹرفیئر (B) ڈویژن فیئر (C) M (D) S

13- سیل اپنے جینیٹک مواد کو دو ایک جیسے نئے سیل میں برابر تقسیم کرتا ہے۔
(A) G1 (B) M (C) S (D) G2

14- یوکیروٹس میں مائی ٹوکس ہوتی ہے۔
(A) سویٹک سیل (B) ڈائیزل (C) جرم لائن سیل (D) پیرنٹ سیل

15- 1880ء کی دہائی میں والد فلیمنگ نے مراحل دریافت کیے۔
(A) می اوکس (B) مائی ٹوکس (C) انٹرفیئر (D) مینا فیئر

16- کیریو کائیسٹ ہے۔
(A) ویکول کی ڈویژن (B) سائٹوپلازم کی ڈویژن (C) نیوکلئس کی ڈویژن (D) رائبوسوم کی ڈویژن

17- سائٹو کائیسٹ تقسیم ہے۔
(A) مائٹو کائیریا (B) رائبوسومز (C) سائٹوپلازم (D) سیل ممبرین

18- دھماکا کرمانا کس فیئر میں سکتا ہے اور کروموسوم بناتا ہے؟
(A) پرو فیئر (B) مینا فیئر (C) اینا فیئر (D) نیو فیئر

19- نیوکلیر اینو پلوپ اور نیوکلئس کس فیئر کے دوران ٹوٹ جاتے ہیں؟

(A) G1 (B) مینا فیئر (C) پرو فیئر (D) اینا فیئر

20- سینٹرو سومر پنڈل فابریز بناتے ہیں:

(A) اینا فیئر (B) پرو فیئر (C) نیو فیئر (D) مینا فیئر

21- مینا فیئر پلیٹ بنتی ہے:

(A) G0 (B) M (C) S (D) مینا فیئر

22- کروموسوم کے ساتھ لگے پنڈل فابریز کناروں (Poles) کی طرف کھینچے جاتے ہیں۔

(A) انٹرفیئر (B) نیو فیئر (C) مینا فیئر (D) اینا فیئر

23- نیوکلئس میں جینیٹک مواد ڈھیلے دھماکے کی شکل میں ہوتا ہے جسے کہتے ہیں:

(A) سینٹرو میئر (B) کروماٹن (C) پنڈل فابریز (D) نیوکلئس

24- ہمارا جسم سیلز کا بنا ہوتا ہے:

(A) تقریباً 200 ٹریلیں (B) تقریباً 300 ٹریلیں (C) تقریباً 400 ٹریلیں (D) تقریباً 500 ٹریلیں

25- نئے سیلز بنتے ہیں:

(A) مائی ٹوکس (B) می اوکس (C) انٹرفیئر (D) سائٹو کائیز

26- سیل میں بننے والے پنڈل فابریز کے مکمل سیٹ کو کہتے ہیں۔

(A) کروماٹن (B) کائینو کور (C) مائی ٹوکس پنڈل (D) کلیوٹیج

27- می اوکس کے کھوئے ہوئے بازو حاصل کرتی ہے بذریعہ:

(A) ری جرنیشن (B) می اوکس (C) مائی ٹوکس (D) فریکیشنیشن

28- ہائیڈرامین اے سیکسول ری پروڈکشن ہوتی ہے بذریعہ:

(A) مائی ٹوکس (B) بڈنگ (C) کنگ (D) سپور فارمیشن

29- نئے ٹیومرز بننے کا عمل ہے:

(A) سائیٹو پسر (B) کراسنگ اوور (C) میناٹس (D) ری جرنیشن

30- کون سا مرحلہ نیو فیئر کا الٹ ہے؟

(A) مینا فیئر (B) اینا فیئر (C) انٹرفیئر (D) پرو فیئر

31- پروکیروٹک سیلز میں سیل ڈویژن ایک طریقے سے ہوتی ہے جو کہلاتی ہے:

(A) می اوکس (B) ملٹی پل فیشن (C) بائری فیشن (D) بڈنگ

32- بڈنگ کا پروکس کس میں پایا جاتا ہے:

(A) پیاز (B) سٹارش (C) ہائیڈرا (D) ادوک

33- اگر ٹیومرز دوسرے ٹیومرز پر حملہ کر دیں تو انہیں کہتے ہیں:

(A) میٹکینٹ ٹیومرز (B) بی ٹائن ٹیومرز (C) نیومرز (D) میناٹس

34- کس میں غلطیوں کی وجہ سے ٹیومرز بنتے ہیں؟

(A) می اوکس I (B) می اوکس II (C) مائی ٹوکس (D) بائری فیشن

می اوسس (Meiosis)

4.3

4.4 می اوسس اور مائی ٹوسس کا موازنہ (Comparison between meiosis and mitosis)

35- می اوسس میں ایک ڈپلائڈ ہیٹ سیل تقسیم ہو کر کتنے ہیپلائڈ سیلز بناتا ہے۔

(A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 8

36- آسکر ہرٹ دگ نے کب می اوسس دریافت کیا:

(A) 1875ء (B) 1876ء (C) 1785ء (D) 1768ء

37- می اوسس کا طویل ترین مرحلہ ہے:

(A) مینا فیز 1 (B) اینا فیز 1 (C) نیو فیز 1 (D) پرو فیز 1

38- ہومولوجس کروموسومز قریب آ کر لہائی کے رخ ایک دوسرے کے ساتھ لگ جاتے ہیں اس عمل کو کہتے ہیں۔

(A) مینائٹس (B) ہائز فشن (C) سائی پلس (D) کراسنگ اوور

39- می اوسس کے دوران ایک ہیٹ سیل تقسیم ہوتا ہے:

(A) 1 بار (B) 2 بار (C) 3 بار (D) 4 بار

40- کراسنگ اوور می اوسس کے کس فیز میں ہوتی ہے؟

(A) پرو فیز 1 (B) مینا فیز 1 (C) اینا فیز 1 (D) نیو فیز 1

41- ہر بائی ویلنٹ میں کرومائیڈز کی تعداد ہوتی ہے۔

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

42- می اوسس کون سے سیلز میں ہوتی ہے:

(A) سویٹک سیلز (B) جرم لائن سیلز (C) ڈائریسیلز (D) جیمرٹ سیلز

43- کس فیز میں کائیٹوکورینڈل فائبرز چھوٹے ہو جاتے ہیں؟

(A) پرو فیز 1 (B) مینا فیز 1 (C) اینا فیز 1 (D) نیو فیز 1

44- ہومولوجس کروموسومز کے نان سنز کرومائیڈ کے جڑنے کا مقام ہے:

(A) کراسنگ اوور (B) بائی ویلنٹ (C) کیا زینا (D) مینا فیز

45- جنوم میں تبدیلی کہلاتی ہے:

(A) ری جزیٹن (B) میوٹیشن (C) گروتھ (D) ہڈنگ

46- کون سے سینڈل فائبرز کروموسومز کے کائیٹوکور سے جڑتے ہیں؟

(A) اینڈرو سینڈل (B) کائیٹوکور سینڈل (C) مائیکرو ٹیوبول سینڈل (D) ایکٹن

جوابات

(D) -1	(C) -2	(A) -3	(A) -4	(B) -5	(B) -6	(A) -7	(D) -8	(A) -9	(C) -10
(B) -11	(D) -12	(B) -13	(A) -14	(B) -15	(C) -16	(C) -17	(A) -18	(C) -19	(B) -20
(D) -21	(D) -22	(B) -23	(A) -24	(A) -25	(C) -26	(A) -27	(B) -28	(C) -29	(D) -30

(C) -31	(C) -32	(B) -33	(C) -34	(B) -35	(B) -36	(D) -37	(C) -38	(B) -39	(A) -40
(C) -41	(B) -42	(C) -43	(C) -44	(B) -45	(B) -46				

کثیر الانتخابی کنسیپچوئل (Conceptual) سوالات

☆ درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔

1- مائی ٹوسس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟

(A) جینیاتی طور پر مختلف سیلز بنانا (B) جینیاتی طور پر ایک جیسے سیلز بنانا

(C) میٹائس بنانا (D) کروموسومز کی تعداد کم کرنا

2- می اوسس کی کوئی سٹیج ہے جو مائی ٹوسس میں نہیں ہوتی؟

(A) پرو فیز (B) مینا فیز (C) اینا فیز (D) پرو فیز 1

3- پروکیریوٹس میں سیلز کیسے تقسیم ہوتے ہیں؟

(A) مائی ٹوسس (B) می اوسس (C) ہائز فشن (D) مینائٹس

4- سیل ڈویشن کی کوئی قسم جنم کے نئے کوئٹیشن کے ساتھ سیلز بناتی ہے؟

(A) مائی ٹوسس (B) می اوسس (C) ہڈنگ (D) ہائز فشن

5- سیل ریپلی کیٹ ہوتا ہے اور اپنے جینیٹک مینیریل کی صحیح کاپی بناتا ہے۔

(A) G1 فیز (B) G2 فیز (C) S فیز (D) M فیز

6- سینٹر ویمبر موجود نہیں ہوتا:

(A) پروکیریوٹس (B) یوکاریوٹس میں فنجائی (C) الچی (D) فنجائی

(A) -1	(B) -2	(D) -3	(C) -4	(C) -5	(A) -6
--------	--------	--------	--------	--------	--------

جوابات

محکمہ تعلیم کی نئی امتحانی تکنیکیں (Knowledge, Understanding, Application, Analytical & Conceptual) کی روشنی میں مرتب کیے گئے مختصر جوابی سوالات

سیل سائیکل (Cell Cycle)

4.1

مائی ٹوسس (Mitosis)

4.2

☆ مختصر جواب دیں۔

1- سیل سائیکل کیا ہے؟

جواب: سیل سائیکل ان واقعات کا سلسلہ ہے جو ایک یوکاریوٹک سیل کے بننے سے لے کر تقسیم ہونے یعنی دو ڈائریسیلز بنانے تک وقوع پذیر ہوتے ہیں۔

2- سیل سائیکل کے بنیادی دو مراحل کون سے ہیں؟

جواب: سیل سائیکل کے دو بڑے مراحل ہیں۔ (i) انٹرفیز (ii) ڈویشن فیز

3- سیل سائیکل کا سب سے طویل مرحلہ کونسا ہے؟ تعریف لکھیں۔

جواب: انٹرفیز سیل سائیکل کا سب سے طویل مرحلہ ہے۔ یہ مرحلہ سیل سائیکل کے مکمل دورانیے کے کم از کم 90 فیصد پر محیط ہے۔ انٹرفیز کے دوران سیل

اپنی پیشلائزیشن کے مطابق زندگی کے افعال سرانجام دیتا ہے اور آپ کوئی ڈویشن کے لیے تیار کرتا ہے۔

4- انٹرفیز کے مراحل کونسے ہیں؟ نام بتائیں۔

جواب: انٹرفیز میں مندرجہ ذیل تین مراحل ہوتے ہیں۔

• G1 فیز • S فیز • G2 فیز

5- انٹرفیز کی کوئی فیز کو گرتھ فیز کہتے ہیں؟

جواب: انٹرفیز کی G1 فیز کو گرتھ فیز بھی کہتے ہیں۔

6- G1 فیز کی اہمیت تحریر کریں۔

جواب: G1 فیز میں سیل پروٹین کی پہلائی کو بڑھاتے ہیں اور اپنے سائز کو بڑھاتے ہیں۔ G1 فیز میں ایسے انزائمز کی تیاری ہوتی ہے جو S فیز میں کروموسومز کی ڈپلیکیشن کے لیے ضروری ہوتی ہے۔

7- انٹرفیز کے کس مرحلے میں کروموسوم کا ڈی این اے کاپی (ریپلی کیٹ) ہوتا ہے؟

جواب: S فیز کے دوران کروموسوم کا ڈی این اے ریپلی کیٹ ہوتا ہے۔

8- G2 میں کوئی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں؟

جواب: • سیل اس مرحلے میں اپنی نشوونما جاری رکھتا ہے اور مائیٹوس کے لیے ضروری پروٹینز تیار کرتا ہے۔

• سیل DNA میں کسی بھی ممکنہ خرابی کی جانچ کرتا ہے جو ریپلی کیٹیشن کے دوران ہوئی ہو۔

• یہ مائیٹوس کی تیاری کے لیے اپنے مواد کو دوبارہ ترتیب دینا بھی شروع کرتا ہے۔

9- G0 فیز کی وضاحت کیجیے۔

جواب: کئی سیلز تقسیم ہونا روک لیتے ہیں اور مخصوص افعال سرانجام دیتے ہیں۔ سیل سائیکل میں اس مرحلے کو G0 فیز کہتے ہیں۔ بہت سے سیلز (مثلاً نیوراز) اس مرحلے میں غیر متعین عرصہ تک رہتے ہیں۔ کچھ سیلز (مثلاً جگر اور گردے کے سیلز) عارضی طور پر G0 فیز میں داخل ہوتے ہیں۔

دوسرے سیلز (مثلاً اپی تھیلیل سیلز) G0 فیز میں داخل نہیں ہوتے اور تمام عمر تقسیم ہوتے رہتے ہیں۔

10- کونسے سیلز عارضی طور پر G0 فیز میں داخل ہوتے ہیں؟

جواب: جگر اور گردے کے سیلز عارضی طور پر G0 فیز میں داخل ہوتے ہیں۔

11- مائیٹوس کیا ہے؟ اس کا ایک فائدہ لکھیں۔

جواب: یہ ایک سیل ڈویژن ہے جس میں ایک سیل دو ڈاٹر سیلز میں تقسیم ہوتا ہے اور ہر ڈاٹر سیل میں وراثتی مادہ پرنٹ سیل کے وراثتی مادہ کے برابر ہوتا ہے۔

12- ڈپلائڈ اور ہپلائڈ سیلز میں فرق کریں۔

جواب: ڈپلائڈ: ایسے سیلز جن میں کروموسومز جوڑوں کی شکل میں ہوتے ہیں انھیں ڈپلائڈ سیلز کہتے ہیں۔

ہپلائڈ: ایسے سیلز جن میں کروموسومز کی تعداد آدھی ہوتی ہے یعنی (n) ہپلائڈ سیلز کہلاتے ہیں۔

13- مائیٹوس کا عمل کب اور کس نے دریافت کیا؟

جواب: 1880ء کی دہائی میں ایک جرمن بائیولوجسٹ، والدرفلیگ نے مائیٹوس کے مراحل دریافت کیے۔

14- مائیٹوس کے بڑے مراحل کونسے ہیں؟

جواب: مائیٹوس کے 2 بڑے مراحل ہیں:

• کیریو کینیسز (نیوکلیس کی تقسیم)

• سائٹوپلازم (سائٹوپلازم کی تقسیم)

15- کیریو کینیسز کی تعریف کریں نیز اس کے چار مراحل کے نام لکھیں۔

جواب: نیوکلیس کی تقسیم کیریو کینیسز کہلاتی ہے۔

کیریو کینیسز کے مراحل: کیریو کینیسز کے 4 مراحل ہیں:

(i) پروٹینز (ii) میناٹینز (iii) ایناٹینز (iv) نیوٹینز

16- کروماتین اور کروموسوم کے درمیان فرق کریں۔

جواب: کروماتین: انٹرفیز کے دوران یعنی جب سیل ڈویژن نہیں ہو رہی ہوتی یہ باریک دھاگے نما ساختوں کی شکل میں ہوتے ہیں جنھیں کروماتین کہتے ہیں۔

کروموسوم: نیوکلیس میں راڈ کی شکل میں پائے جانے والے ایسے اجسام ہیں جن کے پاس جینیٹک انفارمیشن یعنی DNA ہوتا ہے کروموسومز کہلاتے ہیں۔

17- سویٹک اور جرم لائن سیلز کی تعریف لکھیں۔

جواب: سویٹک سیلز: جانداروں کے اجسام بنانے والے سیلز کو سویٹک سیلز کہتے ہیں۔ یہ مائیٹوس کرتے ہیں۔

جرم لائن سیلز: وہ سیلز جو جنینش پیدا کرتے ہیں جرم لائن سیلز کہلاتے ہیں۔ جرم لائن سیلز میٹوس کرتے ہیں۔

18- فریکو پلاسٹ کیسے بنتی ہے؟

جواب: پودے کے سیلز میں گالٹی اپریش چھوٹی ویکھو بناتا ہے۔ جو سیل کے وسط میں آتی ہیں اور ضم ہو کر ایک پلیٹ بناتی ہیں جسے فریکو پلاسٹ کہتے ہیں۔

19- گرتھ میں مائیٹوس کا کیا کردار ہے؟

جواب: جانداروں میں نشوونما سے مراد ہے جسامت میں اضافہ یہ اضافہ دراصل نئے سیلز بننے کی وجہ سے ہوتا ہے نئے سیلز مائیٹوس سے بنتے ہیں۔

20- سی شار میں ری جزیٹین کیسے ہوتی ہے؟

جواب: چند جاندار (جیسے سی شار) اپنے جسم کے حصوں کو دوبارہ بنا سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے وہ اپنے بقیہ حصوں میں مائیٹوس کر کے نئے سیلز بناتے ہیں۔

21- ہائیڈرا کیسے ری پروڈیوس کرتا ہے؟

جواب: ہائیڈرا اے سیکسول ری پروڈکشن کے لیے بڈنگ کرتا ہے۔

22- بی ٹائن اور میکینٹ ٹیومرز کے درمیان فرق کریں۔

جواب: بی ٹائن ٹیومرز: اگر ٹیومرز اپنی جگہ ہی رہیں تو انھیں بی ٹائن ٹیومرز کہتے ہیں۔

میکینٹ ٹیومرز: اگر ٹیومرز جاکر دوسرے ٹیوز پر حملہ کر دیں تو انھیں میکینٹ ٹیومرز کہتے ہیں۔

23- میناٹینس کا کنسر میں کیا کردار ہے؟

جواب: بی ٹائن ٹیومرز سے میکینٹ ٹیومرز بننے کو میناٹینس کہتے ہیں۔ میناٹینس میں جب ٹیومرز جسم میں پھیلنے تو یہ وہ کنسر کے ٹیومرز بنانے کے لیے مزید تاریل سیلز کو تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ عمل کنسر کے پھیلاؤ میں مدد کرتا ہے۔

4.3 می اوس (Meiosis)

4.4 می اوس اور مائیٹوس کا موازنہ (Comparison between meiosis and mitosis)

24- می اوس کیا ہے؟

جواب: یہ سیل ڈویژن کی وہ قسم ہے جس میں بننے والے ہر ڈاٹر سیل میں کروموسوم کی تعداد پرنٹ سیل کی نسبت آدھی ہوتی ہے۔ می اوس میں ڈپلائڈ جیٹ سیل تقسیم ہوتا ہے اور اے ہپلائڈ ڈاٹر سیلز بناتا ہے۔

25- می اوس کب اور کس نے دریافت کی؟

جواب: 1876ء میں جرمن بائیولوجسٹ آسکر برٹ وگ نے می اوس دریافت کی۔

26- سائی پوس سے کیا مراد ہے؟

جواب: ہومولوجس کروموسمز قریب آکر لسانی کے رخ ایک دوسرے کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ اس عمل کو سائی پوس کہتے ہیں۔

27- کیا زینا کیا ہے؟

جواب: ہومولوجس کروموسمز کے دو مان سز و کرومانڈز آپس میں 'زپ' ہو کر x کی شکل کی ساختیں بناتے ہیں۔ جنہیں کیا زینا کہتے ہیں۔

کیا زینا کراسنگ اور کامقام ہوتا ہے۔

28- کراسنگ اور کیسے ہوتی ہے؟

جواب: کراسنگ اور میں دو ہومولوجس کروموسمز کے مان سز کرومانڈز آپس پیکٹنس کا تبادلہ کرتے ہیں اس کو کراسنگ اور کہتے ہیں۔ کراسنگ اور سے جینیاتی مواد کی نئی ترکیب بنتی ہے یعنی ری کمینیشن ہوتا ہے۔

29- ڈس جنکشن اور مان ڈس جنکشن کے درمیان فرق کریں۔

جواب: ڈس جنکشن: اینا فیز II کے دوران سز کرومانڈز نارمل طریقے سے الگ الگ ہوتے ہیں۔ یہ عمل ڈس جنکشن کہلاتا ہے۔

مان ڈس جنکشن: بعض اوقات اینا فیز II کے دوران ہونے والی علیحدگی نارمل نہیں ہوتی اسے مان ڈس جنکشن کہتے ہیں۔

30- ہائی وٹلٹ کی تعریف کیجیے اور اسے ٹریڈ کیوں کہتے ہیں؟

جواب: کروموسوم کا ہر جوڑا ہائی وٹلٹ کہلاتا ہے۔ ہر ہائی وٹلٹ میں چونکہ 4 کرومانڈز ہوتے ہیں اس لیے اسے ٹریڈ کہتے ہیں۔

31- کائی نیو کو کیا ہے؟

جواب: کروموسوم کے سینٹر و میر میں پروٹین سے بنی ایک پیچیدہ ساخت ہوتی ہے۔ جسے کائی نیو کو کہتے ہیں۔ اس مقام پر سپنڈل فائبرز جڑتے ہیں۔

32- می اوس اور مائی ٹوس میں دو مماثلتیں لکھیں۔

جواب: (i) دونوں ڈویژنز ایسے ہیں جن میں کروموسوم جوڑوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔

(ii) دونوں میں پروٹیز کے دوران کرومانڈس سز ہوتے ہیں اور کروموسوم واضح ہو جاتے ہیں۔

33- انسانی جسم میں کتنے سز ہوتے ہیں؟

جواب: انسانی جسم تقریباً 200 ٹریبلین سز مل کر بنائے۔ تمام سز آغاز پر موجود ایک سیل زائیکوٹ سے بنے تھے۔

34- مائی ٹوس اور می اوس میں بھی ساٹو کائیکس کیوں ہوتی ہے؟

جواب: ساٹو کائیکس دونوں ڈویژنز کے بعد ہوتی ہے۔ ساٹو کائیکس کے دوران ساٹو پلازٹم تقسیم ہوتا ہے اور دو سز بنتے ہیں۔

35- می اوس کی اہمیت میں کون سے مراحل شامل ہیں؟

جواب: (i) می اوس کی وجہ سے کروموسمز کی تعداد مستقل رہتی ہے۔ (ii) می اوس سے وراثی تغیرات پیدا ہوتے ہیں۔

مختصر جوابی کنسیپچوئل (Conceptual) سوالات

☆ مختصر جواب دیں۔

1- مائی ٹوس کے پروٹیز میں کون سے عوامل وقوع پذیر ہوتے ہیں؟

جواب: پروٹیز کے دوران کرومانڈس سز کرومانڈس ہوتا ہے۔

نیوکلیئر اینولیپ اور نیوکلیوس نوٹ جاتے ہیں اور سینٹر و سوم ڈپلکٹ ہو جاتا ہے۔

2- ہائیڈرا میں اسے سیکوئل ریپروڈکشن کیسے ہوتی ہے؟

جواب: جانداروں میں اسے سیکوئل ریپروڈکشن مائی ٹوس کے ذریعے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہائیڈرا (Hydra) اسے سیکوئل ریپروڈکشن کے لیے بڈنگ (budding) کرتا ہے۔ اس دوران مائی ٹوس سے ہائیڈرا کی سطح پر سز کا ایک مجموعہ بنتا ہے جسے بڈ (bud) کہتے ہیں۔ بڈ کے سز میں مائی ٹوس جاری رہتی ہے اور یہ سز میں بڑھ کر نیا ہائیڈرا بنادیتی ہے۔

3- کیا زینا اور کراسنگ اور میں فرق کریں۔

جواب: کیا زینا: ہومولوجس کروموسوم کے مان سز کرومانڈز ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر (زپ کی طرح) ایکس (X) شکل بناتے ہیں جسے کیا زینا کہتے ہیں۔

کراسنگ اور: مان سز کرومانڈز کروموسوم کے مابین کروموسومز کے حصوں کا تبادلہ کراسنگ اور کہلاتا ہے۔

4- کون سے عوامل پروٹیز اور پروٹیز I میں مشترک ہیں؟

جواب: پروٹیز اور پروٹیز I کے دوران نیوکلیائی کا غائب ہونا۔ نیوکلیئر اینولیپ کا نوٹ جانا۔ سینٹر یولز کا مخالف پول کی طرف جانا اور سپنڈل فائبر بنانا جن سے کروموسوم جڑتے ہیں دونوں فیوز میں مشترک ہیں۔

5- می اوس I کے بعد می اوس II کیوں ضروری ہے؟

جواب: می اوس I کے بعد می اوس II اس لیے ضروری ہے کہ یہ بات یقینی بنائی جائے کہ ہر ڈائریسل میں کروموسوم کا ایک سیٹ موجود ہے۔

(ایک اور سپرم) میں کروموسوم کی درست تعداد کو قائم رکھا جائے۔

مختصر جوابی کنسیپچوئل سوالات

سیل سائیکل ان واقعات کا سلسلہ ہے جو سیل ڈویژن کے بعد سے لے کر اگلی ڈویژن تک محیط ہیں۔

مائی ٹوس میں ایک سیل دو ڈائریسلز میں تقسیم ہوتا ہے اور ہر ڈائریسل میں کروموسومز کی تعداد اتنی ہی ہوتی ہے جتنی کہ پیرنٹ سیل میں تھی۔

مائی ٹوس کی پروٹیز میں کرومانڈس سز کروموسومز کی شکل اختیار کرتا ہے۔ سینٹر یولز دگنے ہو کر سپنڈل فائبرز بناتے ہیں۔

مائی ٹوس کی مینا فیز میں ہر کروموسوم دونوں کناروں سے آنے والے دو سپنڈل فائبرز کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔

مائی ٹوس کی اینا فیز میں کروموسومز کے سینٹر و میرز تقسیم ہوتے ہیں اور سز کرومانڈز الگ الگ ہو جاتے ہیں۔

مائی ٹوس کی ٹیلو فیز میں کروموسومز کے ہر سیٹ کے گرد نیا نیوکلیئر اینولیپ بنتا ہے۔

نیو، نشو و نما، سز کی تبدیلی، ری جرنیشن اور اسے سیکوئل ریپروڈکشن کے دوران مائی ٹوس ہوتی ہے۔

می اوس سیل کی ایسی تقسیم ہے جس میں بننے والے ہر ڈائریسل میں پیرنٹ سیل کی نسبت کروموسومز کی ڈی جی تعداد آتی ہے۔

می اوس کی پروٹیز I میں ہومولوجس کروموسومز جوڑے بناتے ہیں۔ ہومولوجس کروموسومز کے مان سز کرومانڈز کراسنگ اور میں اپنے حصوں کا تبادلہ کرتے ہیں۔

می اوس کی مینا فیز I میں ہومولوجس کروموسومز کا ہر جوڑا مخالف کناروں سے آنے والے دو سپنڈل فائبرز کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔

می اوس کی اینا فیز I میں ہومولوجس کروموسومز کو ایک دوسرے سے دور کھینچ لیا جاتا ہے اور اس طرح مخالف کناروں پر کروموسومز کے دو پھیلائیڈ سیٹ بن جاتے ہیں۔

می اوس کی ٹیلو فیز I میں سپنڈل فائبرز ختم ہو جاتے ہیں اور ہر پھیلائیڈ سیٹ کے گرد نیا نیوکلیئر اینولیپ بن جاتا ہے۔

می اوس II میں ہر پھیلائیڈ سیٹ کے گرد نیا نیوکلیئر اینولیپ بن جاتا ہے۔

می اوس II میں ہر پھیلائیڈ سیٹ کے گرد نیا نیوکلیئر اینولیپ بن جاتا ہے۔

می اوس II میں ہر پھیلائیڈ سیٹ کے گرد نیا نیوکلیئر اینولیپ بن جاتا ہے۔

حل مشقی سوالات

- A درج ذیل سوالات کے لیے درست جوابات منتخب کریں۔
- 1- سیل سائیکل کے کس مرحلے میں سیل میں سب سے زیادہ بڑھوتری ہوتی ہے؟
(الف) M-فیز (ب) S-فیز (ج) G1-فیز (د) G2-فیز
- 2- سیل سائیکل کے کس مرحلے میں کروموسومز ڈیپلیٹ ہوتے ہیں؟
(الف) مائیٹوسس (ب) G1-فیز (ج) G2-فیز (د) S-فیز
- 3- مندرجہ ذیل میں سے کون سی خصوصیت مائیٹوسس کی نہیں ہے؟
(الف) یہ سوئیک سائیکل میں ہوتا ہے (ب) یہ جینیاتی طور پر ایک جیسی ڈائریکٹریز ہوتا ہے
(ج) ڈائریکٹریز میں کروموسومز کی تعداد آدھی ہو جاتی ہے (د) اس کے نتیجے میں دو ڈائریکٹریز بنتے ہیں
- 4- مائیٹوسس کے کس مرحلے میں کروموسومز سیل کے درمیان میں ترتیب پاتے ہیں؟
(الف) پروفیز (ب) میٹافیز (ج) اینٹافیز (د) ٹیلوفیز
- 5- اگر آپ کسی سیل کا مشاہدہ کریں جس میں نیوکلیئر ممبرین دو کروموسومز کے سیٹ کے درمیان دو بارہ بن رہی ہو تو یہ سیل سائیکل کا کون سا مرحلہ ہے؟
(الف) اینٹافیز (ب) ٹیلوفیز (ج) پروفیز (د) میٹافیز
- 6- سینٹرومائیٹوسس میں کیا کردار ادا کرتا ہے؟
(الف) ڈی این اے ریپلیکیشن کا آغاز کرتا ہے (ب) مائیٹوٹک اسپنڈل بناتا ہے
(ج) نیوکلیئر اینویلوپ بناتا ہے (د) آرگنیلز کو ڈیپلیٹ کرتا ہے
- 7- کن میں سینٹرومائیٹوٹک اسپنڈل بناتے ہیں؟
(الف) جانور کے سیلز (ب) پودے کے سیلز (ج) پروکاریوٹک سیلز (د) ان سب میں
- 8- ایک جاندار میں 4 جوڑے کروموسومز ہیں۔ مائیٹوسس کے بعد ہر ڈائریکٹریز میں کتنے کروموسومز اور کرومائیڈز ہوں گے؟
(الف) 8 کروموسومز اور 16 کرومائیڈز (ب) 4 کروموسومز اور 8 کرومائیڈز
(ج) 4 کروموسومز اور 4 کرومائیڈز (د) 8 کروموسومز اور 8 کرومائیڈز
- 9- کس واقعہ کا تعلق صرف مائیٹوسس سے ہے جبکہ مائیٹوسس میں ایسا نہیں ہوتا؟
(الف) ڈی این اے ریپلیکیشن (ب) کروموسومز کی صف بندی
(ج) کرائسٹ اور (د) نیوکلیئر ڈیوٹن
- 10- مائیٹوسس کے بعد مائیٹوسس II کیوں ضروری ہے؟
(الف) کروموسومز کو ریپلیکٹ کرنے کے لیے (ب) کروموسومز کی تعداد کم کرنے کے لیے
(ج) سینٹرکرومائیڈز کو الگ کرنے کے لیے (د) جینیاتی ریگولیشن کو یقینی بنانے کے لیے

1- (ج)	2- (د)	3- (ج)	4- (ب)	5- (ب)	6- (ب)	7- (الف)	8- (ب)	9- (ج)	10- (ج)
--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	--------	--------	---------

مختصر جوابات لکھیں۔

- 1- انٹرفیز کے G1 مرحلے کے دوران ہونے والے واقعات کی فہرست بنائیں۔
جواب: انٹرفیز کی G1 فیز کے دوران مندرجہ ذیل مراحل سے گزرتا ہے:
- اس مرحلے کے دوران سیل اپنی پروٹینز اور آرگنیلز بناتا ہے۔ اس لیے سیل کی جسامت میں اضافہ ہوتا ہے۔
 - سیل ایسے انزائمز بھی بناتا ہے جو اگلے مرحلے یعنی S فیز میں DNA کی ریپلیکیشن کے لیے ضروری ہوں۔
- 2- سیل سائیکل کی S فیز کا اہم مقصد کیا ہے؟
جواب: سیل سائیکل میں S فیز کا بنیادی مقصد DNA کی نقل (کاپی) تیار کرنا ہے، جو کہ سیل میں DNA کی مقدار کو ڈبل کر دیتی ہے۔
- 3- مائیٹوسس کے کس مرحلے کے دوران سینٹرکرومائیڈز الگ ہوتے ہیں؟
جواب: مائیٹوسس کی اینٹافیز کے دوران سینٹرکرومائیڈز الگ ہوتے ہیں اور سیل کے پولز کی طرف حرکت کرتے ہیں۔
- 4- مائیٹوسس کے کس مرحلے میں مائیٹوٹک اسپنڈل اور کرائسٹ اور کس طرح جینیاتی متغیر میں مدد کرتی ہے؟
جواب: کرائسٹ اور ایک جینیٹک عمل ہے جو مائیٹوسس کے دوران ہوتا ہے جب ایک جیسے کروموسومز اپنے DNA کا تبادلہ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں جینیٹک ریگولیشن بنتی ہے اور جینیٹک تغیر پیدا ہوتا ہے، جو مائیٹوٹک اسپنڈل اور کرائسٹ اور کے لیے ضروری ہوتا ہے۔
- 5- مائیٹوسس میں سپنڈل فائبرز کا کیا کردار ہے؟
جواب: مائیٹوسس کے دوران سپنڈل فائبرز جنھیں مائیٹوٹک سپنڈل بھی کہتے ہیں، ایک پروٹین بناتے ہیں جو سیل میں جینیٹک مواد کو تقسیم کرتی ہے۔ یہ سپنڈل فائبرز سیلز میں کروموسومز کو دو ڈائریکٹریز میں برابر تقسیم کرنے کے لیے ضروری ہے۔
- 6- جانوروں کے سیلز میں سائٹوکائینیسس پودے کے سیلز سے کیسے مختلف ہے؟
جواب: جانوروں کے سیل میں سائٹوکائینیسس: جانور کے سیل میں سائٹوکائینیسس کے دوران سیل کے خط استوا میں ایک جھری (Furrow) بنتی ہے۔ اس جھری کے مقام پر سائٹوپلازم میں مائیکروفلامنٹس کا ایک رینگ (ring) ہوتا ہے۔ یہ رینگ سکڑتا ہے اور جھری اندر کی جانب دیتی ہے۔ اس طرح جراثیم سیل درمیان سے دب کر دو میں تقسیم ہو جاتا ہے۔
- پودوں میں سائٹوکائینیسس: پودے کے سیل میں گالکٹو پریشر جھری (Furrow) بناتا ہے۔ یہ ویزیکلز سیل کے وسط میں آتی ہیں اور ضم ہو کر ایک پلیٹ بناتی ہیں جسے فریکٹو پلاسٹ کہتے ہیں۔ یہ پلیٹ سائٹوپلازم میں باہر کی طرف بڑھتی ہے اور اس کی ممبرینز سیل ممبرین کے ساتھ ضم ہو جاتی ہے اس کے نتیجے میں دو ڈائریکٹریز بنتے ہیں۔
- 7- مائیٹوسس کے پروٹینز اور مائیٹوسس I کے پروٹینز I میں کیا فرق ہے؟
جواب: مائیٹوسس کی پروٹینز اور مائیٹوسس I کی پروٹینز I میں مندرجہ ذیل فرق ہیں:

مائیٹوسس کی پروٹینز	مائیٹوسس I کی پروٹینز
اس کا دورانیہ چھوٹا ہوتا ہے۔	اس کا دورانیہ طویل ہوتا ہے۔
ہومولوجس کروموسومز الگ رہتے ہیں۔	ہومولوجس کروموسومز ایک جوڑا بنانے کے لیے قریب آتے ہیں۔
کرائسٹ اور نہیں ہوتی۔	کرائسٹ اور ہوتی ہے جس سے کرومائیڈز وضو کا تبادلہ ہوتا ہے۔

- 8- کروموسومز کی تعداد کے اعتبار سے مائیٹوسس I اور مائیٹوسس II میں کیا فرق ہے؟
جواب: مائیٹوسس I اور مائیٹوسس II میں کروموسومز کی تعداد جراثیم کے برابر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر جراثیم سیل میں 46 کروموسومز ہیں تو ڈائریکٹریز میں بھی 46 کروموسومز ہوں گے۔

دوسری طرف، می اوکس جوڈائیز بناتا ہے، اس میں ہر ایک میں کروموسومز کی تعداد پیرنٹ سیل سے آدھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر پیرنٹ سیل میں 46 کروموسومز ہیں، تو ڈائیز میں ہر ایک میں 23 کروموسومز ہوں گے۔

9۔ مائیٹوسس میں اینانیفر کے اہم واقعات کون سے ہیں؟

- جواب: • اینانیفر میں کروموسومز کے ساتھ لگے پنڈل فائبرز کناروں کی طرف کھینچے جاتے ہیں۔
• سسٹر کرومانڈز الگ الگ ہو جاتے ہیں۔
• کرومانڈز کے دو ایک جیسے سیٹ بن جاتے ہیں جو سیل کے مخالف کناروں کی طرف چلے جاتے ہیں۔

10۔ سیل ڈویژن کے دوران سینٹرل سوسم کا کیا کام ہے؟

جواب: سیل ڈویژن کے دوران سینٹرل سوسم کا کام ہائیکرونیوکلئوس کو ترتیب دینا ہے جو مائیٹوسس پنڈل بناتے ہیں اور پتیلی کینڈ کروموسومز کو ڈائیز میں تقسیم کرتے ہیں۔

11۔ سسٹر کرومانڈز کیا ہیں، اور می اوکس کے دوران یہ کب الگ ہوتے ہیں؟

جواب: سسٹر کرومانڈز کروموسوم کی ایک جیسی کاپیاں ہیں جو ڈی این اے کی ریپلی کیشن کے دوران بنتی ہیں اور سینٹرل سوسم پر جڑی ہوتی ہیں۔ سسٹر کرومانڈز می اوکس II میں اینانیفر کے دوران الگ ہوتے ہیں۔

12۔ مائیٹوسس کا ری جزیٹن کے عمل سے کیا تعلق ہے؟

جواب: مائیٹوسس ایک سیل ڈویژن ہے جو سیل کی ایک جیسی کاپیاں پیدا کر کے ری جزیٹن میں مدد کرتا ہے، جو خراب یا ختم شدہ سیلز کو تبدیل کر سکتے ہیں۔
C تفصیلی جوابات لکھیں۔

- 1۔ مائیٹوسس کے مراحل کے دوران ہونے والے واقعات بیان کریں۔
2۔ جانوروں اور پودوں کے سیلز میں سائٹوکینسیس کو بیان کریں۔
3۔ مائیٹوسس کی اہمیت بیان کریں۔
4۔ می اوکس-I کے مراحل کے دوران ہونے والے واقعات بیان کریں۔
5۔ می اوکس-II کی اہمیت بیان کریں۔
جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال نمبر 3
جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال نمبر 4
جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال نمبر 5
جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال نمبر 7
جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال نمبر 9

D تحقیقی سوالات:

- 1۔ کینسر کے ظہور میں سیل سائیکل جو کیوں کی غلطیوں میں کیا کردار ادا ہو سکتا ہے؟
جواب: سیل سائیکل چیک پوائنٹس کینسر کو روکنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ خراب سیلز تقسیم نہ ہوں، جینیٹک میوٹیشن والے سیلز ڈویژن نہ کرے، اور کینسر کے سیلز کو فروغ نہ ملے۔ سیل سائیکل میں مندرجہ ذیل چیک پوائنٹس کی نگرانی کی جاسکتی ہے: G1، G2، S، M، N۔
2۔ کیوں کسی حیاتیات کے وجود میں جلد کا سیل مستقل طور پر تقسیم ہوتا ہے، لیکن اعصاب اور ہڈوں کے خلیات مستقل طور پر سیل سائیکل سے باہر نکل جاتے ہیں؟

جواب: جلد کے سیلز زندگی بھر خراب یا مردہ سیلز کو تبدیل کرنے کے لیے تقسیم ہوتے رہتے ہیں، جبکہ زرد اور مسل سیلز کی ری جزیٹن کی مدت محدود ہوتی ہے اور وہ اپنے مخصوص افعال اور سیل کے محدود تقسیم کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے مستقل پوسٹ مائیٹوسس حالت میں رہتے ہیں۔

باب 5

نشوز، آرگنز اور آرگن سسٹمز

Tissues, Organs and Organ Systems

یہ باب پڑھنے کے بعد آپ کو درج ذیل باتیں پتہ چلیں گی:

- نشوز، آرگنز اور آرگن سسٹمز میں فرق بیان کریں اور جانوروں اور پودوں سے مثالیں دیں۔
- انسانی جسم میں آرگن معدہ کو تشکیل دینے والے مختلف اقسام کے نشوز کی فہرست بنائیں۔
- انسانی جسم کو تشکیل دینے والے مختلف آرگنز سسٹمز پر گفتگو کریں۔
- ہومیوسٹیسس کے فوائد بیان کریں۔
- بحث کریں کہ کس طرح انسانی جسم کے مختلف آرگنز اور آرگن سسٹمز ہومیوسٹیسس کو برقرار رکھتے ہیں۔
- پتے کو تشکیل دینے والے مختلف اقسام کے نشوز پر گفتگو کریں۔
- پودوں کی فزیالوجی کو مختلف پودوں کے آرگنز کی ساخت اور کردار کے حوالے سے بیان کریں۔

انشائی طرز سوالات

محکمہ تعلیم کی نئی امتحانی تکنیکس (Knowledge, Understanding, Application, Analytical & Conceptual) کی روشنی میں نئے انشائی طرز سوالات

5.1 عظیم کے لیولز (Levels of organization)

5.2 پودے میں آرگنز اور آرگن سسٹمز (Organs and organ systems in plants)

سوال 1: ملٹی سیلولر جانداروں میں عظیم کے لیولز کی وضاحت کریں۔ ہر لیول ایک جاندار کے مجموعی کام میں حصہ کیسے ڈالتا ہے؟
جواب: عظیم کے لیولز (Levels of Organization): جانداروں کی ساخت کے پٹرن (pattern) میں کم سے زیادہ پیچیدگی کا رجحان دکھائی دیتا ہے۔ تنظیم کے مختلف لیولز (levels) ہیں۔ جہاں نچلے لیول سادہ ہوتے ہیں اور اوپر والے لیول زیادہ پیچیدہ ہوتے جاتے ہیں۔ ملٹی سیلولر جانداروں میں تنظیم کے لیولز سب سے چھوٹے اور سادہ لیول یعنی ایٹم سے شروع ہوتے ہیں اور سب سے بڑے اور پیچیدہ لیول یعنی مکمل جاندار تک جاتے ہیں۔

- 1۔ ایٹم (atom): ایٹم مادے کا سب سے چھوٹا یونٹ ہے جو کسی عنصر کی خصوصیات کو برقرار رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن۔
- 2۔ مالیکیول (molecule): ایٹمز کا گروپ بناتے ہیں جو ان ایٹمز سے بالکل مختلف خصوصیات رکھتے ہیں جن پر یہ مشتمل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر پانی، پروٹین، نیوکلیک ایسڈ۔
- 3۔ آرگنل (organelle): مالیکیولز خاص ترتیب میں جو کہ سب سیلولر (subcellular) لیول یعنی آرگنل بناتے ہیں۔ ہر آرگنل ایک مخصوص فعل کے لیے مختص ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مائٹوکونڈریا سیلولر سپریشن کے لیے ذمہ دار ہیں اور ریبوسوم پروٹین کی تیاری کے لیے مختص ہیں۔
- 4۔ سیل (cell): جب آرگنل جمع ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ عمل کرتے ہیں تو وہ سیل بناتے ہیں۔ سیل زندگی کی خصوصیات کی حامل سب سے چھوٹی اکائی ہیں۔ یہ زندگی کے افعال سرانجام دے سکتے ہیں اور پیرڈکشن بھی کر سکتے ہیں۔ یونی سیلولر جاندار صرف ایک سیل سے بنتے ہیں جبکہ ملٹی سیلولر جاندار بہت سے سیل سے بنتے ہیں۔

5- ٹشوز (tissues): سیلور جانداروں میں سیلز کرٹشوز بناتے ہیں۔ ٹشوز ایک جیسے سیلز کا گروہ ہے۔ جوئل کر ایک یا ایک سے زیادہ مخصوص افعال سرانجام دیتا ہے، ٹشوز کی مثالیں درج ذیل ہیں:

- جانوروں کے ٹشوز:
- اپنی قسطنطیل (epithelial) ٹشوز: جسم کی سطح کو ڈھانپتا ہے اور جسم میں جوفوں (cavities) کی دیواریں بناتا ہے۔ اس ٹشوزی مثال ہے جلد۔
- مسل (muscle) ٹشوز: حرکت کو ممکن بناتا ہے مثلاً دل میں کارڈیک مسلز۔
- پودوں کے ٹشوز:

اپنی ڈرل (epidermal) ٹشوز: پودے کے اندرونی حصوں کی حفاظت کرتا ہے، مثلاً پتے کی اپنی ڈرل۔

وہیکل (vascular) ٹشوز: پانی اور غذائی اجزاء کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے۔ مثلاً زائلم اور فلوئم۔


6- آرگن (organ): آرگن ایک ساخت ہے جو ایسے متعلق ٹشوز کی بنی ہوئی ہے جوئل کر مخصوص افعال سرانجام دیتے ہیں۔ آرگن کی مثالیں یہ ہیں: جانوروں کے آرگن کی مثالیں ہیں دل (سرکولیٹری سسٹم میں خون کو سرکولٹ کرتا ہے)، پیچیرہ (گیسوں کے تبادلے کو دلاتے ہیں)۔

پودوں کے آرگن کی مثالیں ہیں۔ پتے (فونوٹھسی سیز کرتے ہیں) جڑیں (مٹی سے پانی اور غذائی اجزاء جذب کرتی ہیں)۔

آرگن سسٹم (organ system): ایک دوسرے سے وابستہ کام کرنے والے آرگنوں کا ایک آرگن سسٹم بناتا ہے۔ آرگن سسٹم کی مثالیں ہیں: جانوروں میں سرکولیٹری (circulatory) سسٹم جو جسم میں غذائی اجزاء اور آکسیجن کو منتقل کرتا ہے اور ڈائیجسٹو (digestive) سسٹم جو خوراک کو توڑ کر غذائی اجزاء کو جذب کرتا ہے۔

• پودوں میں جڑوں کا نظام (root system) جو پودے کو زمین میں جکڑتا ہے اور پانی اور غذائی اجزاء جذب کرتا ہے اور شاخوں کا نظام (shoot system) جو پودے کو سہارا فراہم کرتا ہے اور فونوٹھسی سیز کرتا ہے۔

جاندار (organism): جاندار ایک ایسا زندہ وجود ہے جو اپنے آرگن سسٹمز کے صحیح کام کرنے کی بنیاد پر آزادانہ اپنے افعال سرانجام دیتا ہے۔ مثلاً انسان اور درخت۔



تنظیم کے لیولز

سوال 2: چھوٹے لیولز کر اعلیٰ لیولز کیسے بناتے ہیں؟ ان کی ابھرتی ہوئی خصوصیات بیان کریں۔

جواب: ابھرتی خصوصیات (Emergent Properties):

جانداروں میں ہر لیول پر موجود حصے اکیسے کام نہیں کرتے۔ بلکہ وہ آپس میں تعامل (interact) کرتے ہیں۔ ان کے تعاملات کی وجہ سے نئے افعال وجود میں آتے ہیں جنہیں ابھرتی اجزاء کے مجموعے سے زیادہ بڑی ہوتی ہے۔

خصوصیات کہا جاتا ہے۔ ابھرتی خصوصیات میں وہ افعال یا صلاحیتیں شامل ہیں جو تنظیم کے اعلیٰ لیولز میں تو موجود ہوتی ہیں لیکن انفرادی انداز میں ممکن نہیں ہوتیں۔

1- آرگنیلز سے سیلز تک (from organelles to cells): انفرادی آرگنیلز کے مخصوص افعال ہوتے ہیں۔ تاہم جب یہ آرگنیلز ایک سیل میں آپس میں تعامل کرتے ہیں تو یہ ایک پیچیدہ نظام بناتے ہیں۔ یہ نظام مختلف افعال سرانجام دیتا ہے جیسے سیل ڈویژن، پروٹین کی تیاری اور توانائی کی پیداوار۔

2- سیلز سے ٹشوز تک (from cells to tissues): انفرادی سیلز میں وہ خصوصیات نہیں ہوتیں جو ان ٹشوز میں ہوتی ہیں جنہیں وہ تشکیل دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر مسل (muscle) سیلز کر مسل ٹشوز بناتے ہیں جو سکڑ سکتا ہے اور قوت پیدا کر سکتا ہے۔

3- ٹشوز سے آرگن تک (from tissues to organs): ایک آرگن وہ پیچیدہ افعال سرانجام دیتا ہے جو اس کے انفرادی ٹشوز سے نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پر، دل مختلف ٹشوز سے تشکیل پاتا ہے جن میں مسل ٹشوز، کنیکٹو (connective) ٹشوز اور اپنی قسطنطیل ٹشوز شامل ہیں۔ ان ٹشوز کا مربوط (coordinated) عمل دل کو پورے جسم میں خون پمپ کرنے کے قابل بناتا ہے۔

4- آرگنوں سے آرگن سسٹمز تک (from organs to organ systems): متعدد آرگن جب ایک ساتھ کام کرتے ہیں تو وہ آرگن سسٹمز بناتے ہیں جو اہم افعال سرانجام دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ڈائیجسٹو (digestive) سسٹم، ایسوفیگس (esophagus)، معدہ، انٹسٹائن (intestines) اور جگر جیسے آرگن پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ انفرادی آرگن خود خوراک کو ہضم نہیں کر سکتے لیکن ان آرگنوں کے مربوط عمل جو خوراک کے ہضم ہونے اور غذائی اجزاء کے جذب ہونے کو ممکن بناتے ہیں۔

5- آرگن سسٹمز سے جاندار تک (from organ systems to organism): ایک فرد میں مختلف آرگن سسٹمز کا تعامل ابھرتی خصوصیات پیدا کرتا ہے جیسے شعور، سوچنا اور ماحول کے مطابق ڈھالنا۔ یہ پیچیدہ رویے انفرادی آرگن سسٹمز میں موجود نہیں ہوتے، بلکہ ان کے مربوط تعاملات سے جنم لیتے ہیں۔

سوال 3: پودے میں آرگنوں کی وضاحت کریں۔

جواب: پودے میں آرگن اور آرگن سسٹمز (Organs and organ system in plants):

پودے میں آرگنوں (Organs in Plants): پودوں میں مختلف آرگنوں کے مخصوص افعال انجام دیتے ہیں جو پودے کی نشوونما، بقا اور ریپروڈکشن کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ پودے کے بنیادی آرگنوں میں جڑ، تاج، پتہ اور پھول شامل ہیں۔ ہر آرگن کا ایک منفرد کردار ہوتا ہے۔ تمام آرگن ہم آہنگی کے ساتھ کام کرتے ہیں تاکہ پودا مزوٹھریلے سے نشوونما کر سکے اور اپنے ماحول کی تبدیلیوں پر رد عمل دے سکے۔ درج ذیل میں پودوں کے آرگنوں کے اہم افعال بیان کیے گئے ہیں۔

جڑیں (roots): یہ پودے کو مٹی میں مضبوطی سے گاڑے رکھتی ہیں اور مٹی سے پانی اور ضروری معدنیات جذب کرتی ہیں۔ جڑیں غذا کو ذخیرہ بھی کرتی ہیں جو پودے کو اپنی نشوونما کے لیے استعمال کرتے ہیں۔

تاج (Stem): تاج کا ایک کام پتوں، پھولوں اور پھلوں کو سہارا دینا ہے۔ تاج میں موجود وہیکل (vascular) ٹشوز (زائلم اور فلوئم) جڑوں اور پتوں کے درمیان پانی، معدنیات اور غذائی اجزاء کی ترسیل کو ممکن بناتے ہیں۔

پتہ (leaf): پتے فونوٹھسی اور ٹرانسپائریشن (transpiration) کے بنیادی مقامات ہیں۔ پتوں سے ہونے والی ٹرانسپائریشن سے مراد پتوں میں موجود چھوٹے سوراخوں (stomata) کے ذریعے پانی کے بخارات کا اخراج ہے۔

پھول (flower): پھول پودے کا تولیدی ریبروڈکٹو حصہ ہے۔ یہ پودے کی سیکسوال ریپروڈکشن میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔

سوال 4: پتے میں موجود ٹشوز کی ساخت کی وضاحت کریں۔ ہر ٹشوپتے کے افعال میں کن طرح کردار ادا کرتا ہے؟ بیان کریں۔

جواب: پتہ بطور ایک آرگن (Leaf as an Organ): پودوں میں پتہ ایک پیچیدہ آرگن ہے جو مختلف ٹشوز پر مشتمل ہوتا ہے اس میں موجود اہم ٹشوز درج ذیل ہیں:

5.3 انسان میں آرگنز اور آرگن سسٹم (Organs and organ systems in humans)

5.4 ہومیوسٹیسس (Homeostasis)

سوال 6: انسانی جسم کے اہم آرگنز اور ان کے افعال لکھیں۔

جواب: انسان میں آرگنز اور آرگن سسٹم (Organs and organ system in humans)

انسانی جسم میں آرگنز (Organs in human body): انسانی جسم میں مختلف آرگنز موجود ہیں اور ہر آرگن مخصوص افعال کا ذمہ دار ہے۔ یہاں انسانی جسم کے چند اہم آرگنز درج ذیل ہیں:

دل (heart): دل ایک مسکولر (muscular) آرگن ہے جو پورے جسم میں خون پمپ کرتا ہے۔ یہ سبز کو آکسیجن اور غذائی اجزاء پہنچانے اور بے کار مواد کو نکالنے کے لیے ضروری ہے۔

پھیپھڑے (lungs): پھیپھڑے تنفس کے عمل (breathing) کے ذمہ دار ہیں۔ یہ جسم اور ماحول کے درمیان آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کے تبادلے کو ممکن بناتے ہیں۔

دماغ (brain): دماغ جسم کا کنٹرول سینٹر ہے، جو تمام دوسرے آرگنز کے درمیان رابطہ کرانے کے علاوہ سوچنے اور فیصلہ سازی کا بھی ذمہ دار ہے۔ جگر (liver): جگر خون کو فلٹر کرنے، بائل (bile) جوس بنانے اور گلوکوز ذخیرہ کرنے سمیت کئی اہم افعال سرانجام دیتا ہے۔

گردے (kidneys): گردے خون سے بے کار مواد کو فلٹر کرنے اور پیہ شایب بنانے کے ذمہ دار ہیں۔

معدہ (stomach): معدہ ایک مسکولر آرگن ہے جو ذیاتی جسنو (digestive) اینزائمز کے ذریعے خوراک کو ہضم کرتا ہے۔

آنتیں (intestines): آنتیں جسنو میں خوراک کو ہضم کرتی ہیں اور ہضم شدہ خوراک سے غذائی اجزاء جذب کرتی ہیں۔

لبہ (pancreas): یہ ذیاتی جسنو (digestive) اینزائمز تیار کرتا ہے۔ لبہ اہم ہارمون (hormone) جیسے انسولین اور گلوکاگون بھی بناتا ہے۔

سوال 7: معدے کے نشوونما کی ساخت بیان کریں۔ معدہ میں موجود نشوونما کی ساخت اور افعال لکھیں۔

جواب: معدہ بطور ایک آرگن (stomach as an organ)

معدہ ذیاتی جسنو سسٹم (digestive system) کا اہم آرگن ہے۔ یہ پروٹین کی جزوی ذیاتی جسن (partial digestion) کا ذمہ دار

ہے۔ معدہ ذیاتی جسن سے پہلے خوراک کو ذخیرہ بھی کرتا ہے۔ معدہ درج ذیل نشوونما پر مشتمل ہوتا ہے:

1- اپی تھیلیئل نشو (epithelial tissue): معدے کی اندرونی دیوار اپی تھیلیئل نشو پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ نشو نمدودی یعنی گھینڈر (glandular) خصوصیات رکھتا ہے اور میوکس (mucus) خارج کرتا ہے۔ یہ میوکس معدے کی اندرونی دیوار پر تہہ بنا کر اسے تیزاب سے محفوظ رکھتا

ہے۔ یہ نشو کیسٹرک جوس (gastric juice) بھی خارج کرتا ہے جس میں پروٹین کو ہضم کرنے کے لیے اینزائم پیپسینوجن (pepsinogen) اور اینزیم روٹوکرک ایسڈ شامل ہوتے ہیں۔ ہائیڈروکلورک ایسڈ پیپسینوجن کو فعال کر کے پیپسن (pepsin) اینزائم میں تبدیل کرتا ہے۔

2- کنیکٹیو ٹشو (connective tissue): یہ اپی تھیلیئل نشو کے نیچے موجود ہے۔ یہ ساختی سہارا فراہم کرتی ہے۔ اس کے اندر خون کی نالیاں (بلڈ ویسلز)، نروڈز اور لنف (lymph) کی ویسلز موجود ہوتی ہیں۔


3- مسل نشو (muscle tissue):

معدہ میں سوچھ مسلر (smooth muscles) کی تین جہیں ہیں: بیرونی

طویل عمودی (longitudinal) تہہ، درمیانی دائروی (circular) تہہ،

تہہ، اور اندرونی ترچھی (oblique) تہہ۔ ان مسلر کے سکڑنے اور

پھیلنے سے معدے میں خوراک کیسٹرک جوس کے ساتھ کھسکتی ہے۔




معدہ میں موجود نشوونما

1- اپی ڈرمل نشو (epidermal tissues): پتے کی سب سے بیرونی تہہ اپی ڈرمل نشو پر مشتمل ہوتی ہے۔ بالائی اپی ڈرمس (upper epidermis) عام طور پر ایک موئی کیوٹیکل (cuticle) سے ڈھکی ہوتی ہے۔ یہ کیوٹیکل پانی کے ضیاع کو کم کرتی ہے اور تحفظ فراہم کرتی ہے۔ زیریں اپی ڈرمس (lower epidermis) میں گارڈ سیلز (guard cells) پائے جاتے ہیں۔ دو گارڈ سیلز کے درمیان ایک باریک سوراخ یعنی سٹوما (stoma) جمع سٹوما (stomata) ہوتا ہے۔ سٹوما کا کام پتے اور ماحول کے درمیان گیسوں کے تبادلے اور پتے سے پانی کے بخارات کے نکلنے یعنی ٹرانسپائریشن کو کنٹرول کرنا ہے۔

2- میزوفیل نشو (Mesophyll tissue): یہ نشو بالائی اور زیریں اپی ڈرمس کے درمیان موجود ہے۔ یہ ایسے سیلز پر مشتمل ہے جن میں بہت سے کلوروپلاسٹ ہوتے ہیں۔ یہ نشو زوہ مقام ہے جہاں فوٹوسنتھی سرگام عمل ہوتا ہے۔ پتے میں میزوفیل کی دو اقسام پائی جاتی ہیں:

- پالیسیڈ میزوفیل (palisade mesophyll): یہ بالائی اپی ڈرمس کے بالکل نیچے موجود ہے اور لمبے اور تیزے ہوئے سیلز پر مشتمل ہے۔
- سپونجی میزوفیل (spongy mesophyll): یہ پالیسیڈ میزوفیل کے نیچے موجود ہوتا ہے۔ یہ ڈھیلے انداز میں ترتیب دیے گئے سیلز پر مشتمل ہے جن کے درمیان ہوا کی جگہیں ہوتی ہیں۔ یہ ہوا کی جگہیں پتے میں گیسوں کی ڈیفیوژن ممکن بناتی ہیں۔

3- ویکسکولر نشو (vascular tissue): یہ نشو پتے کی درمیانی رگ یعنی منڈرب (midrib) اور رگوں (veins) میں موجود ہے۔ اسے پیچیدہ نشو کہا جاتا ہے کیونکہ یہ نشو زوہ مقام پر مشتمل ہے یعنی زائیم نشو اور فلوئم نشو۔ پتے کا زائیم نشو پانی اور معدنیات کو تنے کے زائیم سے پتے کے سیلز تک پہنچاتا ہے۔ فلوئم نشو فوٹوسنتھی میں سے براؤنٹ (شوگر) کو پتے کے سیلز سے تنے کے فلوئم تک پہنچاتا ہے۔




پتے میں موجود نشوونما

سوال 5: پودے کے روٹ اور شوٹ سسٹم کے درمیان فرق کریں۔

جواب: پودے میں آرگن سسٹم (Organ system in plants)

آرگن سسٹم ایسے آرگنز پر مشتمل ہوتا ہے جو ضروری افعال سرانجام دینے کے لیے مل کر کام کرتے ہیں۔ جانوروں کے برعکس، پودے ساکن جاندار ہیں، اس لیے ان کے آرگن سسٹم کی پیچیدہ ہوتے ہیں۔ پودوں میں دو بڑے آرگن سسٹم ہیں یعنی روٹ سسٹم (root system) اور شوٹ سسٹم (shoot system)۔ روٹ سسٹم جڑوں پر مشتمل ہے۔ جڑیں پودے کو مٹی میں بکڑتی ہیں۔ جڑیں مٹی سے پانی اور نمکیات بھی جذب کرتی ہیں، اور بعض اوقات خوراک کو ذخیرہ بھی کرتی ہیں۔ شوٹ سسٹم میں تنے، شاخیں، پتے، اور پھول (اور پھول سے بننے والے پھل) شامل ہوتے ہیں۔ یہ آرگنز فوٹوسنتھی میں زائیم اور پیروڈکشن جیسے افعال کو ممکن بنانے کے لیے کام کرتے ہیں۔



4- بیرونی لنکیوٹشو (outer connective tissue): یہ معدے کی سب سے بیرونی تہ ہے جو معدے کو سہارا فراہم کرتی ہے۔

سوال 8: انسانی جسم کی تشکیل کے لیے آرگن سسٹم کیسے اکٹھے کام کرتے ہیں؟ وضاحت کریں۔

جواب: انسانی جسم میں آرگن سسٹم (Organ systems in human body)

مندرجہ ذیل انسانی جسم میں موجود آرگن سسٹم کی چند مثالیں ہیں۔

سکلیٹل سسٹم (Skeletal system): یہ ہڈیوں، کارٹیلاج (cartilage) اور ٹینڈنز (tendons) پر مشتمل ہے۔ یہ جسم کو ساخت، سپورٹ اور تحفظ فراہم کرتا ہے۔ یہ سسٹم کو جڑنے کے لیے ایک فریم ورک فراہم کرتا ہے، جس سے حرکت ممکن ہوتی ہے۔ یہ معدنیات ذخیرہ کرنے اور خون کے سبز پیدا کرنے کا بھی کام کرتا ہے۔



ڈائیجسٹو سسٹم (Digestive system): یہ منہ، ایسوفیگس، معدہ، چھوٹی آنت، اور بڑی آنت جیسے آرگنز پر مشتمل ہے۔ یہ سسٹم خوراک ہضم کرنے اور ہضم شدہ خوراک کو جذب کرنے کا ذمہ دار ہے۔

ریسپیریٹری سسٹم (Respiratory system): اس میں پیچھے دھڑے، ٹریکیا (trachea) (ہوا کی نالی)، اور برونکائی (bronchi) شامل ہیں۔ یہ سسٹم جسم اور ماحول کے درمیان گیسوں (آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ) کے تبادلے کا ذمہ دار ہے۔

میسکلر سسٹم (Muscular system): اس میں سکلیٹل سسٹم شامل ہیں جو ہڈیوں سے جڑے ہوتے ہیں۔ یہ سسٹم سسٹم کے ہڈیوں میں حرکت پیدا کرتے ہیں۔ اس سے جسم میں حرکت اور نقل مکانی (locomotion) ہوتی ہے۔

نروئس سسٹم (Nervous system): اس میں دماغ، ریڑھ کی ہڈی، اور نروئس شامل ہیں۔ نروئس سسٹم نروئس کے ذریعے جسم کے افعال کو ہم آہنگ اور کنٹرول کرتا ہے۔

بلڈ سرکولیٹری سسٹم (Blood circulatory system): اس میں دل، خون کی نالیاں (شریانیں) یعنی آرٹریز (arteries)، وریدیں یعنی وینز (veins)، اور کیپیلریز (capillaries) اور خون شامل ہیں۔ یہ سسٹم پورے جسم میں آکسیجن، غذائی اجزاء، ہارمون، اور بے کار مادوں کو ترانسپورٹ کرتا ہے۔



انسانی جسم میں اہم آرگن سسٹم


سوال 9: ہومیوسٹیس کی تعریف کریں اور اس کی اہمیت کی وضاحت کریں۔

جواب: ہومیوسٹیس (Homeostasis)

جسم کے آرگنز اور آرگن سسٹمز کا کام کرتے ہیں تاکہ ایک مستحکم اور متوازن اندرونی ماحول کو برقرار رکھا جاسکے۔ بیرونی ماحول میں تبدیلیوں کے باوجود جسم کے مستحکم اور متوازن اندرونی ماحول کو برقرار رکھنے کی صلاحیت کو ہومیوسٹیس کہتے ہیں۔ ہومیوسٹیس کی مثالوں میں جسمانی درجہ حرارت، خون کا دباؤ یعنی بلڈ پریشر، خون میں شوگر کی سطح، اور تیزابیت یعنی pH کی سطح کو برقرار رکھنا شامل ہیں۔

ہومیوسٹیس کی اہمیت (Importance of homeostasis): ہومیوسٹیس کی صلاحیت ہونا جسم کے تمام افعال کے ساتھ ساتھ جسم کی مجموعی صحت کے لیے لازمی ہے۔ مثال کے طور پر:

- ہر سیل ایک پیچیدہ مشین ہے جو جسم کے اندر ایک مخصوص کردار ادا کرتا ہے۔ سیل کا درست کام صرف اس وقت ممکن ہے جب سیل کے بیرونی حالات مثلاً درجہ حرارت، pH، اور نمکیات، گلوکوز اور آکسیجن کی مقدار نارمل حد میں رہیں۔
- جب ہم سخت محنت کرتے ہیں تو ہمارے مسلز حرارت پیدا کرتے ہیں جو جسم کے درجہ حرارت کو بڑھا دیتی ہے۔ ایسی صورت میں، دماغ میں درجہ حرارت کنٹرول کرنے والا مرکز پسینے پیدا کرنے والے گلیٹنڈز (glands) کو پیغام بھیجتا ہے۔ اس کے نتیجے میں پسینہ آتا ہے اور جسم کا درجہ حرارت کم ہو کر نارمل ہو جاتا ہے۔
- جب جسم کا درجہ حرارت گر جاتا ہے تو درجہ حرارت کنٹرول کرنے والا مرکز مسلز کو پیغام بھیجتا ہے، جس کے نتیجے میں کپکپاہٹ پیدا ہوتی ہے تاکہ حرارت پیدا کی جاسکے۔



جسم کے درجہ حرارت کی ہومیوسٹیس

• جب ہم جوس پیٹے ہیں تو خون میں گلوکوز کی سطح بڑھ جاتی ہے۔ اس صورت میں پانکریاس (pancreas) خون میں ایک ہارمون انسولین (insulin) خارج کرتا ہے۔ یہ ہارمون خون میں گلوکوز کی سطح کو کم کر کے معمول پر لاتا ہے۔

• جب ہم سخت ورزش یا کام کرتے ہیں تو ہمارے مسلز کو زیادہ آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں تنفس (breathing) کی رفتار اور دل کی دھڑکن کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔ تیز تنفس اور دل کی دھڑکن سے مسلز کو زیادہ آکسیجن اور خوراک فراہم ہوتی ہے تاکہ وہ مسلسل کام کر سکیں۔

سوال 10: ہومیوسٹیس کو برقرار رکھنے کے لیے مختلف آرگن سسٹم کیسے کام کرتے ہیں؟ وضاحت کریں۔

جواب: ہومیوسٹیس میں آرگن سسٹم کا کردار (Role of organ systems in homeostasis)

متعدد آرگن سسٹم ہومیوسٹیس کو برقرار رکھنے کے لیے مل کر کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر:

معروضی سوالات

مکمل تعلیم کی نئی امتحانی تفکیک (Knowledge, Understanding, Application, Analytical & Conceptual) کی روشنی میں مرتب کیے گئے تین امتحانی سوالات

5.1 تنظیم کے لیولز (Levels of organization)

5.2 پودے میں آرگنز اور آرگن سسٹمز (Organs and organ systems in plants)

☆ درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔

1- مادے کا سب سے چھوٹا یونٹ کونسا ہے؟

(A) مالیکیول (B) ایٹم (C) آرگنیکل (D) سیل

2- ایٹمز مل کر بناتے ہیں:

(A) ٹشو (B) کمپاؤنڈ (C) آرگن (D) مالیکیول

3- ایٹم کی مثال ہے:

(A) پانی (B) پروٹین (C) آکسیجن (D) نیوکلیک ایسڈ

4- مالیکیول کی مثال کیا ہے؟

(A) کاربن (B) ہائیڈروجن (C) آکسیجن (D) پروٹین

5- مالیکیول خاص ترتیب میں جڑ کر بناتے ہیں:

(A) سیل (B) آرگن سسٹم (C) آرگنیکل (D) آرگن

6- سیلولر ریپائریشن کے ذمہ دار ہیں:

(A) مائٹوکانڈریا (B) رائبوسومز (C) لائوسومز (D) سینٹریولز

7- زندگی کی خصوصیات کی حامل سب سے چھوٹی اکائی ہے:

(A) ٹشو (B) ایٹم (C) آرگن (D) سیل

8- کونسا ٹشو جسم کی سطح کو ڈھانپتا ہے اور جسم میں کیوٹیکل بناتا ہے؟

(A) اپی ڈرمل ٹشو (B) مس ٹشو (C) ڈیسکولر ٹشو (D) اپی تحلیلی ٹشو

9- مٹی سیلولر جاندار بننے ہیں۔

(A) ایک سیل سے (B) 2 سیلز سے (C) بہت سے سیلز سے (D) کسی سیل سے بھی نہیں

10- ایک جیسے سیلز کا گروہ جو مل کر ایک یا ایک سے زیادہ مخصوص افعال انجام دیتا ہے، کہلاتا ہے۔

(A) آرگن سسٹم (B) سیل (C) مالیکیول (D) ٹشو

11- مندرجہ ذیل میں سے کونسا ٹشو پانی اور غذائی اجزاء کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے؟

(A) مس ٹشو (B) اپی ڈرمل ٹشو (C) ڈیسکولر ٹشو (D) اپی تحلیلی ٹشو

12- دل اور پیچھے پھر دے مثالیں ہیں۔

(A) آرگن (B) ٹشو (C) مالیکیول (D) سیل

13- ایک دوسرے سے وابستہ کام کرنے والے آرگنز مل کر بناتے ہیں۔

(A) آرگن سسٹم (B) آرگنزم (C) آرگنیکل (D) ٹشو

- نروس سسٹم اور اینڈوکرائن سسٹم دل کی دھڑکن، سانس اور مینا بولزم جیسی سرگرمیوں کو منظم اور مربوط کرتے ہیں۔ وہ ماحول میں ہونے والی تبدیلیوں پر بھی رد عمل کرتے ہیں۔
- ریپیریٹری سسٹم اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ جسم سیلولر ریپیریٹن کے لیے کافی آکسیجن حاصل کرتا ہے۔ یہ سسٹم جسم سے اضافی کاربن ڈائی آکسائیڈ کو بھی خارج کرتا ہے۔
- کارڈیو اسکولر (cardiovascular) سسٹم جسم کے درجہ حرارت اور pH کی سطح کو کنٹرول کرنے میں کردار ادا کرتا ہے۔ یہ اس بات کو بھی یقینی بناتا ہے کہ تمام سیلز اپنے افعال کے لیے ضروری مادے حاصل کرتے ہیں۔
- ڈائیجسٹو (digestive) سسٹم سیلز کو غذائی اجزاء کی مناسب تقسیم کے لیے کام کرتا ہے جو توانائی، ہشووہ نما اور مرمت کے لیے ضروری ہیں۔
- مسلز کا سسٹم اور سکیلیٹل سسٹم جسم کی پوزیشن، سہارے اور نقل و حرکت کے ذمہ دار ہیں۔
- یورینری (urinary) سسٹم جسم سے بے کار مواد کو ختم کرتا ہے۔ یہ جسم کے ٹشوز میں پانی اور نمکیات کے کی سطح کو بھی منظم کرتا ہے۔ اس طرح پے خون کے حجم، بلڈ پریشر اور pH کی سطح کو برقرار رکھتا ہے۔
- انٹیگومینٹری (integumentary) سسٹم جسم کو بیرونی عوامل سے بچانے کے لیے ایک رکاوٹ کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ پسینے کے ذریعے درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے میں بھی مدد کرتا ہے۔

انسانی طرز تکمیل (Conceptual) سوالات

سوال 1: اگر کسی پودے سے زائیم ٹشو کو ہٹا دیا جائے تو کیا ہوگا؟

جواب: زائیم ایک ویسکولر ٹشو ہے۔ یہ جڑوں سے پانی اور دوسری معدنیات کو پتوں اور پودوں کے دوسرے حصوں تک پہنچاتا ہے جو نو فوٹو سنتھی سیز، ٹرانسپائریشن اور ہشووہ نما میں مدد دیتا ہے۔

اگر کسی پودے سے زائیم ٹشو ہٹا دیا جائے تو پودے میں پانی کی حرکت رک جائے گی جس کے نتیجے میں نو فوٹو سنتھی سیز، ٹرانسپائریشن اور ہشووہ نما نہیں ہوگی۔ اس سے پتے مرجھا جائیں گے اور بالآخر پودے کی موت واقع ہو جائے گی۔

سوال 2: اگر انسانی جسم میں کوئی ایک نظام ٹھیک سے کام نہ کرے تو کیا ہوگا؟

جواب: انسانی جسم میں تمام آرگن سسٹمز ہومیو سٹیسس کو برقرار رکھنے کے لیے مل کر کام کرتے ہیں۔ اگر انسانی جسم میں کوئی ایک نظام ٹھیک سے کام نہیں کرتا ہے تو یہ دوسرے نظاموں کو بھی متاثر کرے گا اور بیماری کا باعث بنے گا۔

مثال کے طور پر ڈائجسٹو سسٹم انرجی اور ہشووہ نما کے لیے غذائی اجزاء کو توڑنے، جذب کرنے اور تقسیم کرنے کا ذمہ دار ہے۔ اگر ڈائجسٹو سسٹم پانی جذب نہیں کرے گا تو سرکولٹری سسٹم کو خون کی مستقل مزاجی میں پریشانی ہوگی۔ اگر ڈائجسٹو سسٹم خوراک کو توڑ دے لیکن خون کا بہاؤ غذائی اجزاء کو جذب نہ کرے تو جسم بھوک سے مر جائے گا۔

سوال 3: اگر سٹومینٹھیک سے کام نہ کرے تو کیا ہوگا؟

جواب: سٹومینٹھیکس میں موجود سوراخ ہیں جو گیہوں اور پانی کے بخارات کو گزرنے دیتے ہیں وہ کھلنے اور بند ہونے کے لیے سکتے اور پھلتے ہیں، جو گیہوں کے تبادلے اور پانی کے ضیاع کو منظم کرنے کے لیے اہم ہے۔

اگر سٹومینٹھیک طریقے سے کام نہیں کریں گے تو:

- ٹرانسپائریشن کی شرح کم ہو جائے گی۔
- پودا کم ٹرانسپائریشن کی وجہ سے مرجھا سکتا ہے۔
- نو فوٹو سنتھی سیز بہت متاثر ہوگی کیونکہ آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کا کوئی تبادلہ نہیں ہوگا۔
- گیہوں کا تبادلہ نہ ہونے کی وجہ سے سانس لینے پر بھی اثر پڑے گا۔

14- آرگن کی مثالیں ہیں۔

(A) جے (B) جڑیں (C) دل (D) یہ تمام

15- کونسا سسٹم جسم میں غذائی اجزاء اور آکسیجن کو منتقل کرتا ہے؟

(A) ڈائجسٹو سسٹم (B) سرکولیٹری سسٹم (C) روٹ سسٹم (D) شوٹ سسٹم

16- پودوں میں روٹ سسٹم:

(A) پودے کو سہارا دیتا ہے (B) غذائی اجزاء جذب کرتا ہے (C) پانی جذب کرتا ہے (D) یہ تمام کام کرتا ہے

17- "ایک مکمل چیز اپنے اجزاء سے زیادہ بڑی ہوتی ہے" یہ کس کا قول ہے:

(A) نیٹن (B) ارسطو (C) مارگولس (D) رابرٹ ویکر

18- دل کو نئے ٹشو سے مل کر بناتا ہے؟

(A) مسٹر ٹشو (B) کنیکٹو ٹشو (C) اپنی تحصیل ٹشو (D) یہ سب

19- مندرجہ ذیل میں سے کون سے آرگن گیسوں کے تبادلے کے ذمہ دار ہیں؟

(A) دل (B) جگر (C) معدہ (D) پیچہ پڑے

20- ڈائی ہلوسسٹم مشتمل ہوتا ہے:

(A) ایڈونکس پر (B) معدہ پر (C) انیسٹائن پر (D) ان تمام پر

21- تنے (stem) کا کام ہے:

(A) پانی جذب کرنا (B) خوراک کی فراہمی (C) سہارا دینا (D) غذائی اجزاء کو ذخیرہ کرنا

22- پتے بنیادی مقامات ہیں۔

(A) فوٹو سنتھی سیز کے (B) ٹرانسپائریشن کے (C) اور (A) اور (B) دونوں کے (D) کسی بھی نہیں

23- تنے کا کام سہارا دینا ہے:

(A) پتوں کو (B) پھولوں کو (C) پھلوں کو (D) ان سب کو

24- پتوں کے ذریعے پانی کے بخارات کا اخراج کہلاتا ہے:

(A) فوٹو سنتھی سیز (B) ریسپائریشن (C) ٹرانسپائریشن (D) گیٹیشن

25- شوٹیا موجود ہوتے ہیں:

(A) پتوں میں (B) تنے میں (C) جڑ میں (D) پھول میں

26- پودے کی بڑائی بڑھانے کا حصہ ہے:

(A) پتے (B) جڑ (C) تنے (D) پھول

27- پانا ہوتا ہے:

(A) اپنی ڈرل ٹشو (B) میزوفل ٹشو (C) ڈیسکولر ٹشو (D) یہ تمام

28- پتے کی سب سے بڑی تہہ ہوتی ہے:

(A) سپونجی ٹشو کی (B) میزوفل ٹشو کی (C) اپنی ڈرل ٹشو کی (D) ڈیسکولر ٹشو کی

29- وکسی کیڈنیکل سے ڈھکی ہوتی ہے:

(A) بالائی اپنی ڈرل (B) ذریل اپنی ڈرل (C) گارڈ سبز (D) شوٹیا

30- ماحول کے درمیان گیسوں کے تبادلے اور پتے سے پانی کے بخارات کے نکلنے کو کنٹرول کرتا ہے۔

(A) کلورو پلاسٹ (B) کروموپلاسٹ (C) گارڈ سبز (D) شوٹیا

31- فوٹو سنتھی سیز کا مکمل ہوتا ہے۔

(A) اپنی ڈرل ٹشو میں (B) میزوفل ٹشو میں (C) ڈیسکولر ٹشو میں (D) سپونجی میزوفل ٹشو میں

32- پتے میں گیسوں کی ڈیفیوژن ممکن بناتا ہے۔

(A) اپنی ڈرل ٹشو (B) ڈیسکولر ٹشو (C) سپونجی میزوفل ٹشو (D) اپنی ڈرل ٹشو

33- ڈیسکولر ٹشو کی بڑائی:

(A) زائیم سے (B) فلوئم سے (C) (A) اور (B) دونوں سے (D) ان میں سے کوئی نہیں

34- کونسا فوٹو سنتھی سیز کے پراڈکٹ (شوگر) کو پتے کے سبزے سے تنے کے فلوئم تک پہنچاتا ہے؟

(A) اپنی ڈرل ٹشو (B) میزوفل ٹشو (C) زائیم ٹشو (D) فلوئم ٹشو

35- پودے میں پائے جانے والے ٹشو ہیں۔

(A) اپنی ڈرل ٹشو (B) میزوفل ٹشو (C) ڈیسکولر ٹشو (D) یہ تمام

5.3 انسان میں آرگن اور آرگن سسٹمز (Organs and organ systems)

5.4 ہومیوسٹیسس (Homeostasis)

36- تنفس کے عمل کے ذمہ دار ہیں۔

(A) گردے (B) جگر (C) معدہ (D) پیچہ پڑے

37- سبز کو آکسیجن اور غذائی اجزاء پہنچانے اور بے کار مواد کو نکالنے والا آرگن ہے؟

(A) پیچہ پڑے (B) دل (C) گردے (D) انیسٹائن

38- جسم کا کنٹرول سینٹر ہے۔

(A) معدہ (B) جگر (C) دل (D) دماغ

39- جالوروں کے آرگن ہیں:

(A) پیچہ پڑے (B) دل (C) دماغ (D) یہ تمام

40- مندرجہ ذیل میں سے کونسا ٹشو پودوں میں نہیں پایا جاتا۔

(A) میزوفل ٹشو (B) ڈیسکولر ٹشو (C) اپنی تحصیل ٹشو (D) اپنی ڈرل ٹشو

41- خون کو فلٹر کرنے، بائل جوس بنانے اور گلوکوز ذخیرہ کرنے کے افعال سرانجام دیتا ہے:

(A) دل (B) دماغ (C) جگر (D) معدہ

42- کونسا ٹشو میڈکس خارج کرتا ہے؟

(A) مسل ٹشو (B) کنیکٹو ٹشو (C) اپنی تحصیل ٹشو (D) اپنی ڈرل ٹشو

43- کیڈرک جوس میں شامل ہوتا ہے۔

(A) پیپی نوجن (B) ہائیڈروکلورک ایسڈ (C) سلفیورک ایسڈ (D) (A) اور (B) دونوں

44- پیپی نوجن کو پیپسن میں تبدیل کرتا ہے۔

(A) فارک ایسڈ (B) نائٹرک ایسڈ (C) ہائیڈروکلورک ایسڈ (D) سلفیورک ایسڈ

45- اپنی تحصیل نشو کے نیچے موجود ہے۔

(A) مسل نشو (B) کنیکٹو نشو (C) اپنی تحصیل نشو (D) میزوفل نشو

46- کنیکٹو نشو میں موجود ہوتی ہیں۔

(A) بلڈ ویسلز (B) نرڈ اور لفٹ کی ویسلز (C) (A) اور (B) دونوں (D) کوئی نہیں

47- کونے مسلز کے سکڑنے سے معدے میں خوراک کیہ سرک جوس کے ساتھ کس ہوتی ہے؟

(A) کنیکٹو نشو (B) مسل نشو (C) اپنی تحصیل نشو (D) میزوفل نشو

48- کونسا آرگن سٹم ہڈیوں، کارباج اور ٹینڈنز پر مشتمل ہوتا ہے۔

(A) مسکولر سٹم (B) سکلیلیل سٹم (C) ریسی ریزی سٹم (D) ڈائی جنسٹو سٹم

49- کونسا سٹم خوراک کو ہضم کرنے اور ہضم شدہ خوراک کو جذب کرنے کا ذمہ دار ہے؟

(A) نرڈ سٹم (B) ریسی ریزی سٹم (C) مسکولر سٹم (D) ڈائی جنسٹو سٹم

50- ریسی ریزی سٹم میں شامل ہیں۔

(A) ٹریکیا (B) برونگائی (C) پیپیرس (D) یہ تمام

51- جسم اور ماحول کے درمیان کوئی گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے؟

(A) کاربن ڈائی آکسائیڈ (B) آکسیجن (C) آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ (D) نائٹروجن

52- جسم میں حرکت اور نقل مکانی کا ذمہ دار ہے۔

(A) مسکولر نشو (B) نرڈ نشو (C) سکلیلیل نشو (D) ریسی ریزی نشو

53- نرڈ سٹم میں شامل ہے۔

(A) دماغ (B) ریزہ کی ہڈی (C) نرڈ (D) یہ تمام

54- بیرونی ماحول میں تبدیلیوں کے باوجود جسم کے مستحکم اور متوازن اندرونی ماحول کو برقرار رکھنے کی صلاحیت ہے۔

(A) ریپاریشن (B) فونو پتھسیز (C) ہومیوسٹیسس (D) ٹرانسپاریشن

55- ہومیوسٹیسس کی مثالوں میں شامل ہے۔

(A) درج حرارت (B) بلڈ پریشر (C) pH (D) یہ تمام

56- جوس پینے سے بڑھ جاتا ہے۔

(A) انسولین لیول (B) گلوکوز لیول (C) بلڈ لیول (D) پریشر

57- کونسا ہارمون خون میں گلوکوز کی سطح کو کم کر کے معمول پر لاتا ہے؟

(A) گلوکاکون (B) انسولین (C) گلوٹاٹھائیون (D) پنکریاز

58- ہمارے جسم میں پینا آتا ہے:

(A) درج حرارت زیادہ کرنے کے لیے (B) جسم کو خنڈا کرنے کے لیے (C) نیکیپاٹ کے لیے (D) گرمی پیدا کرنے کے لیے

59- جسم کو بیرونی عوامل سے بچانے کے لیے ایک رکاوٹ کے طور پر کام کرتا ہے۔

(A) کارڈیو اسکولر سٹم (B) یوریزی سٹم (C) نرڈ سٹم (D) ایٹیکو مٹری سٹم

60- دل کی دھڑکن، سانس اور مینا بولزم جیسی سرگرمیوں کو مربوط کرتا ہے۔

(A) ریپریزی سٹم (B) سکلیلیل سٹم (C) کارڈیو اسکولر سٹم (D) نرڈ سٹم

61- یوریزی سٹم جسم میں برقرار رکھتا ہے۔

(A) خون کے حجم کو (B) بلڈ پریشر کو (C) pH کو (D) ان تمام کو

62- یہ نظام جسم میں فضلات کو خارج کرتا ہے۔

(A) کارڈیو اسکولر سٹم (B) نرڈ سٹم (C) یوریزی سٹم (D) ڈائی جنسٹو سٹم

مسائل

(D) -10	(C) -9	(D) -8	(D) -7	(A) -6	(C) -5	(D) -4	(C) -3	(D) -2	(B) -1
(D) -20	(D) -19	(D) -18	(B) -17	(D) -16	(B) -15	(D) -14	(A) -13	(A) -12	(C) -11
(D) -30	(A) -29	(C) -28	(D) -27	(D) -26	(A) -25	(C) -24	(D) -23	(C) -22	(C) -21
(C) -40	(D) -39	(D) -38	(B) -37	(D) -36	(D) -35	(D) -34	(C) -33	(C) -32	(B) -31
(D) -50	(D) -49	(B) -48	(B) -47	(C) -46	(B) -45	(C) -44	(D) -43	(C) -42	(C) -41
(D) -60	(D) -59	(B) -58	(B) -57	(B) -56	(D) -55	(C) -54	(D) -53	(A) -52	(C) -51
									(C) -62

کثیر الانتخابی کنسیپچوئل (Conceptual) سوالات

☆ درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔

1- یہ مختلف آرگنز کا مجموعہ ہے جو ایک متعلقہ کام انجام دینے کے لیے مل کر کام کرتے ہیں۔

(A) نشو (B) آرگنٹی (C) آرگن سٹم (D) آرگنزم

2- یہ وہ نشو ہے جو پودوں میں پانی اور غذائی اجزاء کی نقل و حمل کرتا:

(A) مسل نشو (B) ویسکولر نشو (C) اپنی تحصیل نشو (D) اپنی ڈفل نشو

3- پودے کا کونسا حصہ جنسی تولید میں اہم کردار ادا کرتا ہے؟

(A) جڑ (B) تا (C) پھول (D) پتے

4- انسانی جسم میں تنظیم کے لیولز کی سب سے زیادہ پیچیدہ سے لے کر کم پیچیدہ تک کی صحیح ترتیب کونسی ہے؟

(A) آرگنزم، آرگن سٹم، آرگن، نشو، سیل (B) آرگنزم، آرگن، آرگن سٹم، نشو، سیل

(C) آرگنزم، سیل، نشو، آرگن سٹم، آرگن (D) سیل، نشو، آرگن، آرگن سٹم، آرگنزم

5- کسی خاص نشو میں سیلز:

(A) تمام مختلف قسم کے ہوتے ہیں (B) ایک کام انجام دینے کے لیے مل کر کام کرتے ہیں

(C) مختلف کام انجام دیتے ہیں (D) مل کر آرگن سٹم بناتے ہیں

مسائل

(B) -5	(A) -4	(C) -3	(B) -2	(C) -1
--------	--------	--------	--------	--------

تعلیمی کی نئی امتحانی تکنیکس (Knowledge, Understanding, Application, Analytical & Conceptual) کی روشنی میں مرتب کیے گئے مختصر جوابی سوالات

5.1	تنظیم کے لیولز (Levels of organization)
5.2	پودے میں آرگنز اور آرگن سسٹمز (Organs and organ systems in plants)

☆

مختصر جواب دیں۔

- 1- ملٹی جانداروں میں تنظیم کے لیولز کس سے شروع ہوتے ہیں؟
جواب: ملٹی سیلولر جانداروں میں تنظیم کے لیولز سب سے چھوٹے اور سادہ لیول یعنی ایٹم سے شروع ہوتے ہیں۔
- 2- ایٹمز کیا ہیں؟
جواب: ایٹم مادے کا سب سے چھوٹا یونٹ ہے جو کسی عنصر کی خصوصیات کو برقرار رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن۔
- 3- مالیکیولز کیسے بنتے ہیں؟
جواب: ایٹمز مل کر مالیکیول بناتے ہیں جو ان ایٹمز سے بالکل مختلف خصوصیات رکھتے ہیں جن پر یہ مشتمل ہوتے ہیں مثال کے طور پر پانی، پروٹین، نیوکلیک ایسڈ۔
- 4- مائٹوکائڈز یا کائیباؤڈی کام کیا ہے؟
جواب: مائٹوکائڈز یا سیلولر ریسیریشن کے ذمہ دار ہیں۔
- 5- سائیکل کی کچھ خصوصیات لکھیں۔
جواب: سائیکل کی خصوصیات:
• سائیکل زندگی کے افعال سرانجام دے سکتے ہیں۔
• یہ ری پروڈکشن کر سکتے ہیں۔
- 6- یونی سیلولر اور ملٹی سیلولر جانداروں کے درمیان فرق کریں۔
جواب: یونی سیلولر جاندار صرف ایک سیل سے بنتے ہیں۔ جبکہ ملٹی سیلولر جاندار بہت سارے سیلز سے مل کر بنتے ہیں۔
- 7- نشوونما کی تعریف لکھیں۔ نیز جانوروں کے نشوونما کے نام لکھیں۔
جواب: نشوونما جیسے سیلز کا گروہ ہے جو مل کر ایک یا ایک سے زیادہ مخصوص افعال سرانجام دیتا ہے۔
جانوروں کے نشوونما: (i) اپنی تحصیل نشوونما (ii) مسل نشوونما
- 8- اپنی تحصیل نشوونما کا کام کیا ہے؟
جواب: اپنی تحصیل نشوونما جسم کی سطح کو ڈھانپتا ہے اور جسم میں جوفوں (cavities) کی دیواریں بناتا ہے۔ مثلاً: جلد کا نشوونما
- 9- نشوونما آرگن کے درمیان فرق لکھیں۔
جواب: نشوونما: نشوونما جیسے سیلز کا گروہ ہے جو مل کر ایک یا ایک سے زیادہ مخصوص افعال سرانجام دیتا ہے۔
مثلاً: اپنی تحصیل نشوونما، مسل نشوونما، اپنی ڈرل نشوونما
- 10- آرگن: آرگن ایک ساخت ہے جو ایسے متعلقہ نشوونما کی بنی ہوئی ہے جو مل کر مخصوص افعال سرانجام دیتے ہیں۔
مثلاً: دل، پیچھے پڑے جانوروں کے آرگن ہیں۔
- 11- پودوں میں پائے جانے والے آرگنوں کے نام لکھیں اور ان کے کام بتائیں۔
جواب: پودوں کے آرگنوں میں جڑیں، تپتے اور پھول شامل ہیں۔
جڑیں: یہ مٹی سے پانی اور ضروری معدنیات جذب کرتی ہیں۔

- 12- تپتے: تپتے، پھولوں اور پھولوں کو سہارا دیتا ہے۔
یہ فوٹو سنتھیس سیز اور ٹرانسپائریشن کرتے ہیں۔
پھول: یہ پودے کی سیکسوال ری پروڈکشن میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔
- 11- آرگن سسٹم کیسے بنتا ہے؟
جواب: ایک دوسرے سے وابستہ کام کرنے والے آرگنوں کا ایک آرگن سسٹم بناتے ہیں۔
مثلاً: سرکولیٹری سسٹم، ڈائجسٹو سسٹم۔
- 12- ابھرتی خصوصیات (Emergent properties) کیا ہیں؟
جواب: جانداروں میں ہر لیول پر موجود حصے اکیلے کام نہیں کرتے بلکہ وہ آپس میں تعامل کرتے ہیں۔ ان کے تعاملات کی وجہ سے نئے افعال وجود میں آتے ہیں جنہیں ابھرتی خصوصیات کہا جاتا ہے۔
- 13- جب آرگنیزم سیلز کے ساتھ تعامل کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟
جواب: انفرادی آرگنیزم کے مخصوص افعال ہوتے ہیں۔ تاہم جب یہ آرگنیزم ایک سیل میں آپس میں تعامل کرتے ہیں تو یہ ایک پیچیدہ نظام بناتے ہیں۔ یہ نظام مختلف سیلولر افعال سرانجام دیتے ہیں جیسے سیل ڈیوٹن، پروٹین کی تیاری اور توانائی کی پیداوار۔
- 14- ایک فرد میں مختلف آرگن سسٹمز کا تعامل ابھرتی خصوصیات کیسے پیدا کرتا ہے؟
جواب: ایک فرد میں مختلف آرگن سسٹمز کا تعامل ابھرتی خصوصیات پیدا کرتا ہے جیسے شعور، سوچنا اور ماحول کے مطابق ڈھالنا۔ یہ پیچیدہ رویے انفرادی آرگن سسٹمز میں موجود نہیں ہوتی بلکہ ان کے مربوط تعاملات سے جنم لیتے ہیں۔
- 15- سیل کی بہت نشوونما زیادہ خصوصیات ہوتی ہیں۔ مثال سے واضح کریں۔
جواب: انفرادی سیلز میں وہ خصوصیات نہیں ہوتیں جو ان نشوونما میں ہوتی ہیں جنہیں وہ تشکیل دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر، مسل سیلز مل کر مسل نشوونما بناتے ہیں جو سٹریکٹسکتا ہے اور قوت پیدا کر سکتا ہے۔
- 16- جڑیں کیا کام کرتی ہیں؟
جواب: جڑیں مندرجہ ذیل کام کرتی ہیں۔
• جڑیں مٹی سے پانی اور ضروری معدنیات جذب کرتی ہیں۔
• جڑیں غذائی اجزاء کو ذخیرہ کرتی ہیں۔
• جڑیں پودے کو مٹی میں مضبوطی سے تھامے رکھتی ہیں۔
- 17- مٹے میں کون سے نشوونما پائے جاتے ہیں؟
جواب: مٹے میں دو سیکلر نشوونما (ڈائنامک، فلوئم) پائے جاتے ہیں جو جڑوں اور پھول کے درمیان پانی، معدنیات اور غذائی اجزاء کی ترسیل کو ممکن بناتے ہیں۔
- 18- پھول کی خصوصیات بیان کریں۔
جواب: پھول فوٹو سنتھیس سیز اور ٹرانسپائریشن کے بنیادی مقامات ہیں۔ پھول سے ہونے والی ٹرانسپائریشن سے مراد پھول میں موجود چھوٹے سوراخوں سٹوما کے ذریعے پانی کے بخارات کا اخراج ہے۔
- 19- پودے کا ریپروڈکشن کونسا ہے؟
جواب: پھول پودے کا ریپروڈکشن حصہ ہے۔ یہ پودے کی سیکسوال ری پروڈکشن میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔
- 20- پھول نشوونما سے مل کر بنتا ہے؟
جواب: پھول ایک پیچیدہ آرگن ہے جو مختلف نشوونما، اپنی ڈرل نشوونما، میزوفل نشوونما اور دیگر نشوونما سے مل کر بنتا ہے۔

- 33- انسانی جسم میں دل کی کیا اہمیت ہے؟
جواب: دل ایک مسکولر آرگن ہے جو پودے جسم میں خون پمپ کرتا ہے۔ یہ سیکڑ کو آکسیجن اور غذائی اجزاء پہنچانے اور بے کار مواد کو نکالنے کے لیے ضروری ہے۔
- 34- پیچھے پڑے کیا افعال سرانجام دیتے ہیں؟
جواب: پیچھے پڑے تنفس کے عمل کے ذمہ دار ہیں۔ یہ جسم اور ماحول کے درمیان آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کے تبادلے کو ممکن بناتے ہیں۔
- 35- جسم کا کنٹرول سینٹر کونسا ہے اور اس کا کیا کام ہے؟
جواب: دماغ جسم کا کنٹرول سینٹر ہے۔ یہ تمام دوسرے آرگنز کے درمیان رابطہ کر دینے کے علاوہ فیصلہ سازی کا بھی ذمہ دار ہے۔
- 36- جگر اور گردے کے افعال بیان کریں۔
جواب: جگر: جگر خون کو فلٹر کرنے، بائل جوس بنانے اور گلوکوز کو ذخیرہ کرنے سمیت کئی اہم افعال سرانجام دیتا ہے۔
گردے: گردے خون سے بیکار مادے کو فلٹر کرنے اور پیشاب بنانے کے ذمہ دار ہیں۔
- 37- ڈائی جنسٹو سٹم کا اہم آرگن کونسا ہے؟
جواب: معدہ ڈائی جنسٹو سٹم کا اہم آرگن ہے۔ یہ پروٹین کی جزوی ڈائی جیشن کا ذمہ دار ہے۔
- 38- معدہ کن ٹشو پر مشتمل ہے؟
جواب: معدہ درج ذیل ٹشوز پر مشتمل ہے۔ (i) اپی تھیلیئل ٹشو (ii) مسل ٹشو (iii) کنیکٹو ٹشو (iv) بیرونی کنیکٹو ٹشو
- 39- معدہ کی اندرونی دیوار کیا خارج کرتی ہے؟
جواب: معدہ کی اندرونی دیوار اپی تھیلیئل ٹشو پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ میوکس اور کیسٹرک جوس خارج کرتی ہے۔
- 40- معدہ میں میوکس کا کیا کام ہے؟
جواب: میوکس معدے کی اندرونی دیوار پر تہہ بنا کر اسے تیزاب سے محفوظ رکھتا ہے۔
- 41- کیسٹرک جوس میں کون سے انزائمز موجود ہوتے ہیں؟
جواب: کیسٹرک جوس میں پروٹین کو ہضم کرنے کے لیے انزائمز پتھینو جین اور ہائیڈرولیکورک ایسڈ شامل ہوتے ہیں۔
- 42- کونسا انزائم پتھینو جین کو پپسن میں تبدیل کرتا ہے؟
جواب: ہائیڈرولیکورک ایسڈ پتھینو جین کو فعال کر کے پپسن انزائمز میں تبدیل کرتا ہے۔
- 43- معدہ میں مسل ٹشو کی کونسی اقسام ہیں؟
جواب: معدہ میں مسوٹھ مسلز کی تین قسمیں ہیں: بیرونی طویل عمودی تہہ، درمیانی دائروی تہہ اور اندرونی ترچھی تہہ۔ ان مسلز کے سکڑنے اور پھیلنے سے معدے میں خوراک کیسٹرک جوس کے ساتھ کس ہوتی ہے۔
- 44- انسانی جسم بنانے والے آرگن سسٹمز کی کچھ مثالیں دیں۔
جواب: سکیلیبل سسٹم، ڈائی جنسٹو سسٹم، ریڈی سسٹم، مسکولر سسٹم، نروس سسٹم اور بلڈ سرکولیٹری سسٹم انسانی جسم میں موجود آرگن سسٹمز کی مثالیں ہیں۔
- 45- سکیلیبل سسٹم کس پر مشتمل ہوتا ہے؟
جواب: سکیلیبل سسٹم ہڈیوں، کاربج اور ٹینڈنز پر مشتمل ہوتا ہے۔
- 46- سکیلیبل سسٹم کے افعال بیان کریں۔
جواب: سکیلیبل سسٹم: • جسم کو ساخت، سپورٹ اور تحفظ فراہم کرتا ہے۔
• مسلز کو جڑنے کے لیے ایک فریم ورک فراہم کرتا ہے۔ جس سے حرکت ممکن ہوتی ہے۔
• معدنیات ذخیرہ کرنے اور خون کے سیلز پیدا کرنے کا بھی کام کرتا ہے۔

- 21- پتے کی سب سے بیرونی تہہ کس کی بنی ہوئی ہے؟
جواب: پتے کی سب سے بیرونی تہہ اپی ڈرمل ٹشوز کی بنی ہوئی ہے۔
- 22- بالائی اور زیریل اپی ڈرمل پر مختصر نوٹ لکھیں۔
جواب: بالائی اپی ڈرمل: بالائی اپی ڈرمل عام طور پر کیوٹیکل سے ڈھکی ہوتی ہے۔ یہ کیوٹیکل پانی کے ضیاع کو کم کرتی ہے اور تحفظ فراہم کرتی ہے۔
زیریل اپی ڈرمل: زیریل اپی ڈرمل میں گارڈ سیلز پائے جاتے ہیں۔
- 23- کیوٹیکل کا کیا کام ہے؟
جواب: کیوٹیکل بالائی اپی ڈرمل پر ایک تہہ ہے۔ یہ پانی کے ضیاع کو کم کرتی ہے اور تحفظ فراہم کرتی ہے۔
- 24- سٹومیٹا کا کیا کام ہے؟
جواب: سٹومیٹا پتے اور ماحول کے درمیان گیہوں کے تبادلے اور پتے سے پانی کے بخارات کے نکلنے یعنی ٹرانسپائریشن کو کنٹرول کرتا ہے۔
- 25- ٹشو کا نام بتائیں جو بالائی اور زیریل اپی ڈرمل کے درمیان موجود ہوتا ہے؟
جواب: میزوفل ٹشو بالائی اور زیریل اپی ڈرمل کے درمیان موجود ہوتا ہے۔
- 26- پبلی سڈ اور سپونجی میزوفل کے درمیان فرق کریں۔
جواب: پبلی سڈ میزوفل: یہ بالائی اپی ڈرمل کے بالکل نیچے موجود ہے اور لمبے اور جڑے ہوئے سیلز پر مشتمل ہے۔
سپونجی میزوفل: یہ پبلی سڈ میزوفل کے نیچے موجود ہے۔ یہ ڈھیلے انداز میں ترتیب دیے گئے سیلز پر مشتمل ہے جن کے درمیان ہوا کی جگہیں ہوتی ہیں۔
- 27- ویکسکولر ٹشو کہاں موجود ہوتے ہیں؟
جواب: ویکسکولر ٹشو پتے کی درمیانی رگ یعنی ہڈ رگ اور رگوں یعنی ویز میں موجود ہوتے ہیں۔
- 28- ویکسکولر ٹشو کیسٹیکس ٹشوز کہاں جاتا ہے؟
جواب: ویکسکولر ٹشو کیسٹیکس ٹشو کہاں جاتا ہے کیونکہ یہ وٹشوز پر مشتمل ہوتا ہے یعنی زائیم اور فلوئم۔
- 29- فلوئم ٹشو کا پودے میں کیا کام ہے؟
جواب: فلوئم ٹشو فوٹو سنتھیسس کے پراڈکٹ (شوگر) کو پتے کے سیلز سے تنے کے فلوئم تک پہنچاتا ہے۔
- 30- روٹ سسٹم اور شوٹ سسٹم کے درمیان فرق کریں۔
جواب: روٹ سسٹم: روٹ سسٹم جڑوں پر مشتمل ہے۔ جڑیں پودے کو مٹی میں جکڑتی ہیں۔ جڑیں مٹی سے پانی اور نمکیات بھی جذب کرتی ہیں، اور بعض اوقات خوراک بھی ذخیرہ کرتی ہیں۔
شوٹ سسٹم: شوٹ سسٹم میں تنے، شاخیں، پتے اور پھول شامل ہوتے ہیں۔ یہ آرگنز فوٹو سنتھیسس اور رری پروڈکشن جیسے افعال کو ممکن بنانے کے لیے کام کرتے ہیں۔
- 31- پودوں کے آرگن سسٹمز کو پیچیدہ کیوں ہوتے ہیں؟
جواب: جانوروں کے برعکس، پودے ساکن جاندار ہیں، اس لیے ان کے آرگن سسٹمز پیچیدہ ہوتے ہیں۔

انسان میں آرگن اور آرگن سسٹمز (Organs and organ systems in humans)

5.3

ہومسٹیسس (Homeostasis)

5.4

32- انسانی جسم کے آرگنز کون سے ہیں؟

جواب: انسانی جسم کے آرگنز میں دل، پیچھے پڑے، دماغ، جگر، گردے، معدہ اور انشائنا شامل ہیں۔

47- ذاتی جٹو سٹم کس پر مشتمل ہوتا ہے؟

جواب: ذاتی جٹو سٹم، ایسوفیگس، معدہ، چھوٹی آنت اور بڑی آنت پر مشتمل ہوتا ہے۔

48- کونسا آرگن سٹم گیسوں کے تبادلے کا ذمہ دار ہے؟

جواب: ریسپریٹری سٹم جسم اور ماحول کے درمیان گیسوں (آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ) کے تبادلے کا ذمہ دار ہے۔

49- نروس سٹم کیا کام کرتا ہے؟

جواب: نروس سٹم دماغ، ریزہ کی ہڈی اور نروسز پر مشتمل ہے۔ یہ نروسز آپس کے ذریعے جسم کے افعال کو ہم آہنگ اور کنٹرول کرتا ہے۔

50- بلڈ سرکولیری سٹم ہمارے جسم میں کیا کردار ادا کرتا ہے؟

جواب: بلڈ سرکولیری سٹم پورے جسم میں آکسیجن، غذائی اجزاء، ہارمون اور بے کار مادوں کو ترانسپورٹ کرتا ہے۔

51- اصطلاح ہومیو سٹیسس کی تعریف کریں۔

جواب: بیرونی ماحول میں تبدیلیوں کے باوجود جسم کے مستحکم اور متوازن اندرونی ماحول کو برقرار رکھنے کی صلاحیت کو ہومیو سٹیسس کہتے ہیں۔

مثالیں: ہومیو سٹیسس کی مثالوں میں جسمانی درجہ حرارت، خون کا دباؤ یعنی بلڈ پریشر، خون میں شوگر کی سطح اور تیزابیت یعنی pH کی سطح برقرار رکھنا شامل ہے۔

52- ایک سیل کب درست طریقے سے کام کر سکتا ہے؟

جواب: ہر سیل ایک پیچیدہ مشین ہے جو جسم کے اندر ایک مخصوص کردار ادا کرتا ہے۔ سیل کا درست کام صرف اس وقت ممکن ہے جب سیل کے بیرونی حالات مثلاً درجہ حرارت، pH اور نمکیات، گلوکوز اور آکسیجن کی مقدار تارل حد میں رہے۔

53- پینے کیسے آتا ہے؟

جواب: جب ہم تھکتے ہوئے ہیں تو ہمارے مسلز حرارت پیدا کرتے ہیں جو جسم کے درجہ حرارت کو بڑھا دیتی ہے۔ ایسی صورت میں، دماغ میں درجہ حرارت کنٹرول کرنے والا مرکز پینے پیدا کرنے والے گھینڈز کو پیغام بھیجتا ہے۔ اس کے نتیجے میں پینے آتا ہے اور جسم کا درجہ حرارت کم ہو کر نارمل ہو جاتا ہے۔

54- جب جسم کا درجہ حرارت کم ہوتا ہے تو جسم اسے کیسے بڑھاتا ہے؟

جواب: جب جسم کا درجہ حرارت گر جاتا ہے تو درجہ حرارت کنٹرول کرنے والا مرکز مسلز کو پیغام بھیجتا ہے، جس کے نتیجے میں کچکپاٹ پیدا ہوتی ہے تاکہ حرارت پیدا کی جاسکے۔

55- جسم میں ہومیو سٹیسس کو برقرار رکھنے کے لیے کونے آرگن سٹم کام کرتے ہیں؟

جواب: متعدد آرگن سٹم ہومیو سٹیسس کو برقرار رکھنے کے لیے مل کر کام کرتے ہیں مثلاً کے طور پر نروس سٹم، اینڈوکرائن سٹم، ذاتی جٹو سٹم، یورینری سٹم، کارڈیو اسکولر سٹم اور اینٹیو مٹری سٹم۔

56- کونسا ہارمون بلڈ گلوکوز لیول کو نارمل کرتا ہے؟

جواب: جب ہم جوں پیتے ہیں تو خون میں گلوکوز کی سطح بڑھ جاتی ہے۔ اس صورت میں ہنکر یا زخون میں ایک ہارمون انسولین خارج کرتا ہے۔ یہ ہارمون خون میں گلوکوز کی سطح کو کم کر کے معمول پر لاتا ہے۔

57- نروس سٹم اور اینڈوکرائن سٹم ہومیو سٹیسس میں کیا کردار ادا کرتے ہیں؟

جواب: نروس سٹم اور اینڈوکرائن سٹم دل کی دھڑکن، سانس اور مینا بولزم جیسی سرگرمیوں کو منظم اور مربوط کرتے ہیں۔ وہ ماحول میں ہونے والی تبدیلیوں پر بھی رد عمل کرتے ہیں۔

58- اینٹیو مٹری سٹم کا ہومیو سٹیسس میں کیا کردار ہے؟

جواب: اینٹیو مٹری سٹم جسم کو بیرونی عوامل سے بچانے کے لیے ایک رکاوٹ کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ پینے کے ذریعے درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے میں بھی مدد کرتا ہے۔

مختصر جوابی کنسیپچوئل (Conceptual) سوالات

☆ مختصر جواب دیں۔

1- انسانی جسم ایک پیچیدہ مشین کے طور پر کیسے کام کرتا ہے؟

جواب: ایک کپلیکس مشین کی طرح، انسانی جسم ایک سے زیادہ حصوں پر مشتمل ہوتا ہے جو مخصوص فنکشنز، انجام دینے کے لیے مل کر کام کرتے ہیں۔

2- سکیلیبل سٹم اور سکولر سٹم ایک ساتھ کیسے کام کرتے ہیں؟

جواب: سکیلیبل سٹم ہڈیوں، کارٹیلج اور ٹینڈنز پر مشتمل ہوتا ہے۔ دوسری طرف سکولر سٹم میں سکیلیبل مسلز شامل ہیں جو ہڈیوں سے جڑے ہوتے ہیں۔ دونوں نظام جسم کی حرکت کو فعال کرنے کے لیے مل کر کام کرتے ہیں۔

3- انسانی جسم کے درجہ حرارت کو منظم کرنے میں کونے آرگن سٹم شامل ہیں؟

جواب: انسانی جسم کے درجہ حرارت کو منظم کرنے میں ریسیپریٹری سٹم، اینٹیو مٹری سٹم اور کارڈیو اسکولر سٹم شامل ہیں۔

4- اگر سٹو پیما صحیح طریقے سے کام نہ کریں تو کیا ہوگا؟

جواب: اگر سٹو پیما صحیح طریقے سے کام نہ کریں تو ٹرانسپائریشن نہیں ہوگی۔ فوٹوسنتھی میز اور ریپائریشن کے عمل پر بھی اثر پڑے گا۔

5- پیپسینو جن اور پیپسن میں فرق لکھیں۔

جواب: پیپسینو جن:

- پیپسین کی غیر فعال شکل ہے۔
- یہ جگر میں پیدا ہوتا ہے۔
- جب یہ معدے میں جاتا ہے تو ہائیڈروکلورک ایسڈ سے فعال (active) کر دیتا ہے۔
- پیپسن:
- یہ ایک پروٹین ہضم کرنے والا انزائم ہے۔
- یہ معدے میں پروٹین کو ایمائو ایسڈز میں توڑ دیتا ہے۔
- یہ صرف ایسڈک (acidic) ماحول میں کام کرتا ہے۔

اہم نکات

- سیل سائیکل ان واقعات کا سلسلہ ہے جو سیل ڈویژن کے بعد سے لے کر اگلی ڈویژن تک محیط ہیں۔
- آرگنیلر سیل کے سب یونٹس (subunits) ہیں جو مختلف افعال سرانجام دیتے ہیں۔
- نشوونما کی طرح کے سلاز کا ایک گروپ ہے جو ایک مخصوص فعل سرانجام دینے کے لیے مل کر کام کرتا ہے۔
- آرگنلر ایک سے زیادہ قسم کے نشوونما پر مشتمل ساختیں ہیں جن میں متعلقہ افعال ہوتے ہیں اور جو ایک ساتھ کام کرتے ہیں۔
- آرگنلر سٹم مختلف آرگنلر کا ایک مجموعہ ہے جو متعلقہ کام انجام دینے کے لیے مل کر کام کرتے ہیں۔
- معدے کا اپنی سکیلیبل نشوونما جس کا خارج کرتا ہے۔ گیسٹرک جوس میں میو سکس، HCl، اور پیپسی نو جن اینزائم ہوتے ہیں۔ میو سکس معدے کے اندرونی دیوار کی حفاظت کرتا ہے۔

- معدے کے سوتھ سلاز خوراک کو چھوڑنے نکلنے میں توڑنے میں مدد کرتے ہیں۔
- میزوفل نشو پتے میں پایا جاتا ہے۔ اس کے سلاز میں کلورو پلاسٹ ہوتے ہیں۔ یہ فوٹوسنتھی سلاز کا مقام ہے۔
- پبلی سڈ میزوفل مضبوطی سے جڑے ہوئے سلاز پر مشتمل ہوتا ہے۔ سپونجی میزوفل ڈھیلے ترتیب والے سلاز پر مشتمل ہے۔
- زائیکم اور فلوئم پانی اور غذائی اجزاء کی نقل و حمل کے ذمہ دار نالی نما نشو ہیں۔
- بیرونی ماحول میں تبدیلیوں کے باوجود جسم کے مستحکم اور متوازن اندرونی ماحول کو برقرار رکھنے کی صلاحیت کو ہومیوسٹیس کہتے ہیں۔
- آرگن سسٹمز ہومیوسٹیس کے لیے مل کر کام کرتے ہیں۔

حل مشقی سوالات

- A- درج ذیل سوالات کے لیے درست جوابات منتخب کریں۔
- 1- تنظیم کا ایک اعلیٰ لیول ابھرتی ہوئی خصوصیات (emergent properties) کا مظاہرہ کرتی ہے جب:
- (الف) اس کے حصے آزادانہ طور پر کام کرتے ہیں۔ (ب) اس کے حصوں کا مجموعہ پورے سے زیادہ ہے۔ (ج) انفرادی حصے پورے سے زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ (د) اس کے حصے زیادہ افعال انجام دینے کے لیے تعامل (interact) کرتے ہیں۔
- 2- مندرجہ ذیل میں سے کون سا جسم کی تنظیم کے لیو کو ظاہر کرتا ہے، سب سے سادہ سے سب زیادہ پیچیدہ تک؟
- (الف) سیل ← آرگن ← آرگنلٹی ← آرگنلٹی ← سیل ← آرگن ← آرگن سسٹم
(ج) آرگنلٹی ← آرگنلٹی ← آرگنلٹی ← آرگنلٹی ← آرگنلٹی ← آرگنلٹی ← آرگنلٹی
- 3- جسم میں جگہ جسم اور ماحول کے درمیان گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے، یہ تنظیم کون سا لیول ہوتا ہے؟
- (الف) آرگنلٹی لیول یعنی مائیکرو کونڈریا میں (ب) سیلول لیول یعنی ایلیو لیائی (alveoli) کے سلاز میں
(ج) آرگنلٹی لیول یعنی ایلیو لیائی (alveoli) کے سلاز میں (د) آرگن سسٹم کی سطح یعنی ری-سپریٹری سسٹم میں
- 4- معدے کی دیوار میں موجود ایلیو لیائی (alveoli) کے سلاز میں
- (الف) میوکس (ب) پیپسی نوجن (ج) ہائیڈروکلورک ایسڈ (د) یہ سب
- 5- معدے کی دیوار میں کون سے نشو میں خون کی نالیوں اور زونڈ بھی ہوتے ہیں؟
- (الف) ایلیو لیائی (ب) سلاز (ج) اندرونی لیکیکلوٹو (د) بیرونی لیکیکلوٹو
- 6- ایک پتے میں کون سا نشو پتے فوٹوسنتھی سلاز کا ذمہ دار ہے؟
- (الف) زائیکم (ب) میزوفل (ج) اپی ڈرمس (د) فلوئم
- 7- پتے میں زائیکم نشو کا بنیادی کام کیا ہے؟
- (الف) پودے کے دوسرے حصوں میں شوگر پمپنا (ب) پتوں کے حصوں تک پانی پہنچانا
(ج) کلورو فل تیار کرنا (د) سٹوینا کے کھلنے اور بند ہونے کو کنٹرول کرنا
- 8- انسان کا سکیلیل سسٹم کون سا فاصلہ سرانجام دیتا ہے؟
- (الف) معدنیات ذخیرہ کرنا اور خون کے سلاز پیدا کرنا (ب) خون سے کاربن ڈائی آکسائیڈ کو نکالنا
(ج) بے کار مادے نکالنے کے لیے خون کو فلٹر کرنا (د) توانائی کے لیے کھانے کو توڑنا

- 9- پودوں کے جسم میں خوراک کی نقل و حمل کے لیے کون سی ساختیں ذمہ دار ہیں؟
- (الف) زائیکم نشو (ب) پبلی سڈ میزوفل (ج) فلوئم نشو (د) سپونجی میزوفل
- 10- پودے میں پھول کا بنیادی کام کیا ہے؟
- (الف) پانی اور معدنیات کی نقل و حمل (ب) پتوں کی نشو نمایاں مدد
(ج) پولی نیشن کے ذریعے ریپروڈکشن میں مدد کرنا (د) گیسوں کے تبادلے کو کنٹرول کرنا

جوابات

- 1- (د) 2- (ب) 3- (د) 4- (د) 5- (ج) 6- (ب) 7- (ب) 8- (الف) 9- (ج) 10- (ج)
- B- مختصر جوابات لکھیں۔
- 1- سلاز سے آرگن سسٹم تک تنظیم کے لیو کی فہرست بنائیں۔
- جواب: سلاز سے آرگن سسٹم تک تنظیم کے لیو ہیں:
- سیل ← آرگنلٹی ← آرگنلٹی ← آرگنلٹی ← آرگنلٹی ← آرگنلٹی ← آرگنلٹی
- 2- معدے میں موجود ایلیو لیائی (alveoli) کے سلاز میں
- جواب: معدے میں ایلیو لیائی (alveoli) کے سلاز میں
- یہ میوکس خارج کرتا ہے جو معدے کی اندرونی دیوار پر تہہ بنا کر اسے تیزاب سے محفوظ رکھتا ہے۔
- یہ کیسٹرک جوس خارج کرتا ہے جس میں پروٹین کو ہضم کرنے کے لیے انزائمز شامل ہوتے ہیں۔
- یہ ہائیڈروکلورک ایسڈ خارج کرتا ہے جو پیپسی نوجن کو پیپسن میں تبدیل کرتا ہے۔
- 3- معدے میں سوتھ سلاز کیا کردار ادا کرتے ہیں؟
- جواب: معدے میں سوتھ سلاز کی تین چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ معدے میں ان سلاز کے سکڑنے اور پھیلنے سے خوراک کیسٹرک جوس کے ساتھ کس ہوتی ہے۔
- 4- پتے میں پبلی سڈ میزوفل کا کیا کام ہے؟
- جواب: پبلی سڈ میزوفل اپی ڈرمس کے بالکل نیچے موجود ہے اور یہ لے اور جڑے ہوئے سلاز پر مشتمل ہے۔ پتے میں میزوفل کا کام فوٹوسنتھی سلاز کرنا ہے۔
- 5- پودوں میں شوٹ (shoot) سسٹم کا کیا کردار ہے؟
- جواب: شوٹ سسٹم میں تھے، شائع پتے اور پھول شامل ہیں۔ یہ آرگنلٹی فوٹوسنتھی سلاز اور ریپروڈکشن جیسے افعال کو کنٹرول کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔
- 6- ہومیوسٹیس کیا ہے، اور یہ جانداروں کے لیے کیوں اہم ہے؟
- جواب: ہومیوسٹیس بیرونی ماحول میں تبدیلیوں کے باوجود جسم کے مستحکم اور متوازن اندرونی ماحول کو برقرار رکھنے کی صلاحیت کو ہومیوسٹیس کہتے ہیں۔
- اہمیت: ہومیوسٹیس ایک اہم عمل ہے جو جسم کے تمام اعضاء کو صحیح طریقے سے کام کرنے کے لیے مستحکم حالات فراہم کرتی ہے۔ ہومیوسٹیس کی وجہ سے جسم بیماریوں سے بچ رہتا ہے اور صحت مند رہتا ہے۔
- 7- انسانی جسم ایک متوازن اندرونی درجہ حرارت کیسے برقرار رکھتا ہے؟
- جواب: انسانی جسم درجہ حرارت کو متوازن رکھنے کے لیے پیسٹ نکالنے، کپکانے اور خون کی رگوں کو پھیلائے یا سکڑانے جیسے طریقوں کا استعمال کرتا ہے۔ مثلاً جب جسم کا درجہ حرارت گر جاتا ہے تو درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے والا مرکز سلاز کو پیغام بھیجتا ہے، جس کے نتیجے میں کپکاہٹ پیدا ہوتی ہے تاکہ حرارت پیدا کی جاسکے۔

8- مندرجہ ذیل کے درمیان فرق کریں:

- i- نشو و نما آرگن ii- روٹ سٹم اور شوٹ سٹم iii- اپی ڈرل اور میزوفل شوٹ iv- پبلی سیڈ میزوفل اور سپوئی میزوفل

جواب: i- نشو و نما آرگن:

نشو: نشو ایک جیسے سبز کارگوہ ہے جو لکڑی یا ایک سے زیادہ مخصوص افعال سرانجام دیتا ہے۔

مثلاً: اپی ٹھیلٹل نشو، سسل نشو، اپی ڈرل نشو۔

آرگن: آرگن ایک ساخت ہے جو ایسے متعلقہ نشو کی بنی ہوئی ہے جو مل کر مخصوص افعال سرانجام دیتے ہیں۔

مثلاً: دل، پیچھڑے جانوروں کے آرگن ہیں۔

ii- روٹ سٹم اور شوٹ سٹم:

روٹ سٹم: روٹ سٹم جڑوں پر مشتمل ہے۔ جڑیں پودے کو مٹی میں جکڑتی ہیں۔ جڑیں مٹی سے پانی اور نمکیات بھی جذب کرتی ہیں، اور بعض اوقات خوراک بھی ذخیرہ کرتی ہیں۔

شوٹ سٹم: شوٹ سٹم میں تپے، شاخیں، پتے اور پھول شامل ہوتے ہیں۔ یہ آرگن فوٹوسنتھی میز اور ری پروڈکشن جیسے افعال کو ممکن بنانے کے لیے کام کرتے ہیں۔

iii- اپی ڈرل اور میزوفل نشو:

اپی ڈرل نشو: پتے کی سب سے بیرونی تہ اپی ڈرل نشو پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ پانی کے ضیاع کو کم کرتا ہے، تحفظ فراہم کرتا ہے اور ٹرانسپائریشن کو کنٹرول کرتا ہے۔

میزوفل نشو: میزوفل نشو بالائی اور زیریں اپی ڈرل کے درمیان موجود ہے۔ یہ نشو وہ مقام ہے جہاں فوٹوسنتھی سبز کا عمل ہوتا ہے۔

iv- پبلی سیڈ میزوفل اور سپوئی میزوفل:

پبلی سیڈ میزوفل: یہ بالائی اپی ڈرل کے بالکل نیچے موجود ہے اور لمبے اور جڑے ہوئے سبز پر مشتمل ہے۔

سپوئی میزوفل: یہ پبلی سیڈ میزوفل کے نیچے موجود ہے۔ یہ ڈھیلے انداز میں ترتیب دیے گئے سبز پر مشتمل ہے جن کے درمیان ہوا کی جگہیں ہوتی ہیں۔

C- تفصیلی جوابات لکھیں۔

1- مٹی سیلر جانداروں میں تنظیم کے لیول کی وضاحت کریں۔ ہر لیول کی طرح جاندار کے مجموعی افعال میں کردار ادا کرتا ہے؟

جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال 1

2- نشو کے لیول سے کیا مراد ہے؟ پودوں اور جانوروں کے نشو کی وضاحت کریں۔

جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال 7,4

3- معدے کے نشو کی وضاحت کریں۔ ہر نشو معدے کے ڈائی جین (digestion) کے کام میں کیا کردار ادا کرتا ہے؟

جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال 7

4- پتے کی نشو ساخت کی وضاحت کریں۔ ہر نشو پتے کے افعال میں کیا کردار ادا کرتا ہے؟

جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال 4

5- انسانی جسم کی تشکیل کے لیے آرگن سسٹم کی طرح اکٹھے ہوتے ہیں؟

جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال 8

6- ہومیو سٹیس میں ڈائی جینٹو سٹم اور یوریزو سٹم کے افعال بیان کریں۔

جواب: ہومیو سٹیس: بیرونی ماحول میں تبدیلیوں کے باوجود جسم کے مستحکم اور متوازن اندرونی ماحول کو برقرار رکھنے کی صلاحیت کو ہومیو سٹیس کہتے ہیں۔

ہومیو سٹیس میں ڈائی جینٹو سٹم کا کردار: ڈائی جینٹو سٹم سبز کو غذائی اجزاء کی مناسب تقسیم کے لیے کام کرتا ہے جو توانائی، نشو و نما اور مرمت کے لیے ضروری ہیں۔

ہومیو سٹیس میں یوریزو سٹم کا کردار: یوریزو سٹم جسم میں بے کار مواد کو ختم کرتا ہے۔ یہ جسم کے نشو میں پانی اور نمکیات کی سطح کو بھی منظم کرتا ہے۔ اس طرح یہ خون کے حجم، بلڈ پریشر اور pH کی سطح کو برقرار رکھتا ہے۔

7- پودوں کے مختلف آرگنوں کے افعال کی وضاحت کریں۔

جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال 3

8- پودوں کے روٹ سٹم کی ساخت اور افعال کی وضاحت کریں۔

جواب: پودے کا روٹ سٹم روٹ سٹم جڑوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ جڑیں پودے کو مٹی میں جکڑتی ہیں۔ جڑیں مٹی سے پانی اور نمکیات بھی جذب کرتی ہیں، اور بعض اوقات خوراک بھی ذخیرہ بھی کرتی ہیں۔

9- ہومیو سٹیس کی تعریف لکھیں اور اس کی اہمیت کی وضاحت کریں۔ اس بات پر تبادلہ خیال کریں کہ ہومیو سٹیس کے لیے مختلف آرگن سسٹم کیلئے کام کرتے ہیں۔

جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال 10,9

10- بیان کریں کہ جسم میں آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کی سطح کو برقرار رکھنے کے لیے ریسپیریٹری سٹم اور سرکولیٹری سٹم کس طرح مل کر کام کرتے ہیں؟

جواب: جسم میں آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کی سطح کو برقرار رکھنے کے لیے مندرجہ ذیل طریقوں سے مل کر کام کرتے ہیں۔

گیسوں کا تبادلہ: ریپیریٹری سٹم سیلر ریپیریٹری سٹم کے لیے جسم میں آکسیجن لاتا ہے۔ یہ جسم میں اضافی کاربن ڈائی آکسائیڈ کو بھی خارج کرتا ہے۔

آکسیجن پیچھڑوں سے خون کی نالیوں میں جاتی ہے، جو اسے پورے جسم میں لے جاتی ہے۔ سرکولیٹری سٹم کاربن ڈائی آکسائیڈ والے خون کو دوبارہ جسم میں بھیجتا ہے جو سانس کے ذریعے خارج کر دیا جاتا ہے۔

غذائی اجزاء کی فراہمی: سرکولیٹری سٹم مناسب طریقے سے کام کرنے کے لیے جسم کے تمام سبز تک آکسیجن اور گلوکوز پہنچاتا ہے۔

جسم کے درجہ حرارت اور pH کو منظم کرتا ہے: سرکولیٹری سٹم جسم کے درجہ حرارت اور pH کو منظم کرتا ہے۔

فضلات کا اخراج: سرکولیٹری سٹم سبز سے کاربن ڈائی آکسائیڈ کو پیچھڑوں تک لے جاتا ہے تاکہ انھیں سانس کے ذریعے خارج کیا جاسکے۔

D- تحقیقی سوالات:

1- آپٹھیلٹل نشو کی ساخت کا جسم کے مختلف حصوں میں اس کے کام سے کیا تعلق ہے؟

جواب: اپی ٹھیلٹل نشو انسانی جسم میں بنیادی نشو میں سے ایک ہے۔ اپی ٹھیلٹل نشو جسم کے ہومیو سٹیس کو برقرار رکھنے، بیرونی عوامل سے بچانے، مادے کے تبادلے، رکاوٹ، تحفظ، مختلف مادوں کے انجذب اور اخراج وغیرہ میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔

2- ہم آہنگی کے ساتھ کام کرنے والے اعضاء کے نظام کی اہمیت کا اندازہ کریں اور دوسرے نظام میں ناکامی کے نتائج کا اندازہ لگائیں۔

جواب: انسانی جسم مختلف بڑے آرگن پر مشتمل ہوتا ہے جو ہومیو سٹیس اور مجموعی صحت کو برقرار رکھنے کے ہم آہنگی سے کام کرتے ہیں۔ یہ نظام اپنے مخصوص افعال سرانجام دیتا ہے۔

اور اس کا کردار اور مربوط کوششیں جسم کے مناسب فنکشنز کو یقینی بناتی ہیں۔ ایک نظام میں خرابی جسم کے دوسرے افعال میں خرابی اور ہومیو سٹیس کے استحکام کا باعث بن سکتی ہے۔

باب 6

بائیو مالیکولز

Biomolecules

یہ باب پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہوں گے کہ:

- بائیو کیمسٹری / بائیولوجی کی تعریف لکھیں۔
- مختلف اقسام کے عام بائیو مالیکولز (کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز، لیپڈز، ڈی این اے، آراین اے) کا خاکہ پیش کریں، بشمول سیل کے اندر ان کے مقامات اور مرکزی افعال۔
- کاربوہائیڈریٹس کی تعریف کریں اور ان کی ساخت، فعل اور ذرائع کا خاکہ پیش کریں۔
- کاربوہائیڈریٹس کو مونوسیکرائڈز، ڈائی سیکرائڈز اور پولی سیکرائڈز کے طور پر شناخت کریں۔
- امینو ایسڈ کے ساتھ پروٹین کی ساخت اور افعال اور ذرائع کا خاکہ بتائیں۔
- لیپڈز کی ساخت، افعال اور ذرائع کا خاکہ بتائیں۔
- ڈی این اے کی ساخت کو مختصر طور پر بیان کریں۔
- موروثی معلومات کے کیریئر کے طور پر ڈی این اے کے کام کا خاکہ بتائیں۔
- آراین اے کی ساخت کو مختصر طور پر بیان کریں۔
- موروثی معلومات کو پروٹین میں تبدیل کرنے میں مدد کے طور پر آراین اے کے کام کا خاکہ بتائیں۔
- ڈی این اے میں موجود معلومات کو آراین اے پر معلومات میں تبدیل کرنے اور پھر پروٹین میں تبدیل کرنے کا خاکہ پیش کریں۔

انشائی طرز سوالات

تفکر و تعلیم کی نئی امتحانی تکنیکس (Knowledge, Understanding, Application, Analytical & Conceptual) کی روشنی میں مرتب کیے گئے انشائی طرز سوالات

6.1 بائیو مالیکولز (Biomolecules)

6.2 کاربوہائیڈریٹس (Carbohydrates)

سوال 1: بائیو کیمسٹری اور بائیولوجی کی تعریف کریں۔

جواب: بائیو کیمسٹری: بائیو کیمسٹری (biochemistry) جانداروں کے اندر ہونے والے کیمیائی عوامل کا مطالعہ ہے (مثلاً فوٹوسنتھسی سزاور سیلر اور سپریشن)۔
 بائیولوجی: بائیولوجی (molecular biology) بائیو مالیکولز (مثلاً کاربوہائیڈریٹس (carbohydrates)، پروٹینز (proteins)، نیوکلیک ایسڈز (nucleic acids) کی ساخت اور افعال کا مطالعہ ہے۔

سوال 2: بائیو مالیکولز اور ان کے افعال پر نوٹ لکھیں۔

جواب: بائیو مالیکولز (Biomolecules): جانداروں میں پیدا ہونے والے مالیکولز کو بائیو مالیکولز یا بائیولوجیکل مالیکولز کہا جاتا ہے۔ ان میں کاربوہائیڈریٹس، لیپڈز (lipids)، پروٹین اور نیوکلیک ایسڈ (ڈی این اے اور آراین اے) شامل ہیں۔ اکثر یہ مالیکول سائز میں بڑے ہوتے

ہیں۔ اس لیے انہیں میکرو مالیکولز (macromolecules) بھی کہا جاتا ہے۔ جانداروں کی ساخت اور افعال میں بائیو مالیکولز اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مندرجہ ذیل ٹیبل میں اہم بائیو مالیکولز اور ان کے افعال کا ذکر کیا گیا ہے۔

ٹیبل: اہم بائیو مالیکولز اور ان کے افعال

بائیو مالیکول	سیل میں مقام	اہم افعال
کاربوہائیڈریٹس	• سائٹوپلازم • سیل ممبرین	• توانائی کے ذرائع کے طور پر کام کرتے ہیں • توانائی ذخیرہ کرنے والے مالیکولز کے طور پر کام کرتے ہیں
پروٹینز	• سیل ممبرین • سائٹوپلازم • اینڈوپلازمک ریٹیکولم • گالجی آپریٹس • لائسوسوم، مائٹوکانڈریا	• بہت سی پروٹینز انزائمز کے طور پر کام کرتی ہیں۔ • کچھ ہارمونز پروٹین ہیں • خلیوں میں ممبرینز اور دوسری ساختیں بناتی ہیں • سیلولر ٹینک کو کنٹرول کرتی ہیں
لیپڈز	• سیل ممبرین • سائٹوپلازم	• توانائی ذخیرہ کرنے والے مالیکولز کے طور پر کام کرتے ہیں • حرارت کے انسولیٹر (Insulator) کے طور پر کام کرتے ہیں • سیل ممبرین کی ساخت بناتے ہیں۔
ڈی این اے	• پوکیریوس میں نیوکلیس • پوکیریوس میں نیوکلائڈ (nucleoid) علاقہ • مائٹوکانڈریا • کلورپلاسٹ	• جاندار کی نشوونما، کام کرنے اور خصوصیات کے لیے جینیاتی معلومات رکھنا اور اگلی نسل تک پہنچانا ہے
آراین اے	• نیوکلیس • رائبوسوم • سائٹوپلازم	• پروٹین کی تیاری کے لیے جینیاتی معلومات کو ڈی این اے سے رائبوسوم تک لے جاتا ہے

سوال 3: پروٹوپلازم کی خشک کیت (dry mass) میں بائیو مالیکولز کی فیصدی مقدار کتنی ہے؟

جواب: پروٹوپلازم کی خشک کیت (dry mass) کا 93 فیصد بائیو مالیکولز ہوتے ہیں۔ باقی 7 فیصد خشک ماس دھات اور نامیاتی اداروں جیسے کاربن، ڈائی آکسائیڈ، ایسڈ، بیسز (bases) اور نمکیات پر مشتمل ہوتی ہے۔

ٹیبل: پروٹوپلازم کی خشک کیت میں بائیو مالیکولز کی فیصدی مقدار

بائیو مالیکولز	خشک کیت کی مقدار (فی صد میں)
پروٹین	50
نیوکلیک ایسڈ	18
کاربوہائیڈریٹ	15
لیپڈ	10

سوال 4: مینابولزم کیا ہے؟ اس کی اقسام کی وضاحت کریں۔

جواب: مینابولزم: کسی جاندار میں ہونے والے تمام کیمیائی اعمال کی مجموعی طور پر مینابولزم (metabolism) کہا جاتا ہے۔ مینابولزم کی دو اقسام ہیں: (i) اینابولزم (ii) کٹابولزم۔

(i) اینابولزم: اینابولزم (anabolism) مینابولزم کی وہ قسم ہے جس میں سادہ مادوں کو ملا کر پیچیدہ مادے بنائے جاتے ہیں۔ ان اعمال میں توانائی کا استعمال کیا جاتا ہے۔

(ii) کٹابولزم: کٹابولزم (catabolism) مینابولزم کی وہ قسم ہے جس میں پیچیدہ مالیکیولز کو سادہ مالیکیولز میں توڑا جاتا ہے۔ ان اعمال میں توانائی خارج ہوتی ہے۔

سوال 5: کاربوہائیڈریٹس کے گروپس کی ساخت اور افعال پر جامع نوٹ لکھیں۔


جواب: کاربوہائیڈریٹس (Carbohydrates): "کاربوہائیڈریٹ" کا مطلب ہے "ہائیڈریٹڈ کاربن (hydrated carbon)"۔ یہ ایسے تائیائی مرکبات ہیں جن میں H اور O کا تناسب 2:1 ہوتا ہے (پانی کے مالیکیول کی طرح)، انہیں "سکرائڈز" (یعنی شوگر: sugar) بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا جنرل فارمولا $C_n(H_2O)_n$ ہے۔ یہاں n سے مراد کاربن ایٹم کی تعداد ہے۔ کاربوہائیڈریٹس کی تین اقسام ہیں: مونوسکرائڈز، ڈائی سکرائڈز اور پولی سکرائڈز۔

1- مونوسکرائڈز (Monosaccharides): مونوسکرائڈز (سادہ شوگر) سنگل شوگر مالیکیول سے بنے ہوتے ہیں۔ یہ پانی میں آسانی سے حل پذیر (soluble) ہیں اور میٹھا ذائقہ رکھتے ہیں، ان میں 3 سے 7 کاربن ایٹم ہو سکتے ہیں۔ 5 کاربن والے پینٹوز (pentose) اور 6 کاربن والے ہیکسوز (hexose) عام مونوسکرائڈز ہیں۔


مثال:

پینٹوز کی مثالیں ہیں: رائبوز (ribos) جس کا فارمولا $(C_5H_{10}O_5)$ ہے اور ڈی آکسی رائبوز (deoxyribose) جس کا فارمولا $(C_5H_{10}O_4)$ ہے۔

ہیکسوز کی مثالیں ہیں: گلوکوز (glucose)، فروکٹوز (fructose) اور گالیکٹوز (galactose) جن کا فارمولا $(C_6H_{12}O_6)$ ہے۔



عام پینٹوزز (pentoses)




عام ہیکسوز (hexoses)

2- ڈائی سکرائڈز (Disaccharides): ڈائی سکرائڈز دو (2) مونوسکرائڈز اکائیوں سے بنے ہیں۔ یہ پانی میں کم حل پذیر ہوتے ہیں اور ذائقہ میں کم پیچیدگی ہوتے ہیں۔

مثالیں:

• سکروز (sucrose) یعنی خوردنی چینی (نیمبل شوگر) دو مونوسکرائڈز یعنی گلوکوز اور فروکٹوز سے بنی ہوتی ہے۔
• مالتوز (maltose) دو گلوکوز مالیکیولز سے بنی ہوتی ہے۔



عام ڈائی سکرائڈز

3- پولی سکرائڈز (Polysaccharides):

پولی سکرائڈز بڑے مالیکیول ہیں جو سینکڑوں سے ہزاروں مونوسکرائڈز اکائیوں پر مشتمل ہیں۔ یہ پانی میں حل پذیر نہیں ہیں اور بے ذائقہ ہیں۔

مثالیں:

• نشاستہ یعنی سٹارچ (starch): پودوں میں پایا جانے والا ایک سنورج (storage) پولی سکرائڈ ہے۔ یہ گلوکوز اکائیوں کی سیدھی اور شاخوں والی زنجیروں پر مشتمل ہے۔
• گلیکوجن (glycogen): جانوروں کا نشاستہ ہے جو بنیادی طور پر جگر اور عضلات میں ذخیرہ ہوتا ہے۔ یہ گلوکوز کو بہت زیادہ شاخوں والی زنجیروں (branched chains) پر مشتمل ہے جو توانائی کی ضرورت پرنے پر توڑی جاتی ہیں۔
• سیلولوز (cellulose): ایک پولی سکرائڈ ہے جو گلوکوز اکائیوں کی سیدھی زنجیروں پر مشتمل ہے۔ یہ پودوں کے سیل کی سیل وال میں پایا جاتا ہے۔
• کائٹن (chitin): سیلولوز کی ایک ترمیم شدہ شکل ہے، یہ کیڑے، لوہستر اور حشرات کے بیرونی سکلیٹن (exoskeleton) میں پایا جاتا ہے۔ یہ فیفائی کی سیل وال بھی بناتا ہے۔



پولی سکرائڈز (polysaccharides)

سوال 6: کاربوہائیڈریٹس کے اہم ذرائع اور افعال بیان کریں۔

جواب: کاربوہائیڈریٹس کے ذرائع اور افعال (Sources and Functions of Carbohydrates):

ذرائع: مونوسکرائڈز: گلوکوز، فروکٹوز اور گالیکٹوز پھلوں، سبز یوں، شہد اور اناج میں پائے جاتے ہیں۔

ڈائی سکرائڈز: چندر، گنے اور پھلوں میں سکر واپایا جاتا ہے۔ لیٹوز (lactose) دودھ اور ذیری مصنوعات میں پایا جاتا ہے، مالتوز اناج میں پایا جاتا ہے۔

پولی سکرائڈز: نشاستہ، اناج (گندم، جو، کئی، چاول وغیرہ) سے حاصل ہوتے ہیں۔

سوال 8: پروٹینز کے مختلف افعال اور ذرائع کون سے ہیں؟

جواب: پروٹینز کے ذرائع اور افعال (Sources and Functions of Proteins):

پروٹین کے ذرائع میں گوشت (مٹن، بیف، چکن) مچھلی، انڈے، دودھ، دالیں، پھلیاں وغیرہ شامل ہیں۔ پروٹینز ہمارے جسم میں مختلف افعال سرانجام دیتی ہیں۔ مثلاً:


- پروٹینز تمام سیل ممبرین کا ایک اہم حصہ ہیں۔
- کچھ پروٹین جیسے کولاجین (collagen) اور کیراٹین (keratin) کارٹیج، بالوں اور ناخنوں کی قریباً پوری ساخت بناتے ہیں۔
- اینزائم وہ پروٹینز ہیں جو جانداروں میں ہونے والے تمام بائیو کیمیکل ری ایکشنز میں عمل کیا کٹالسٹ (catalyst) کا کردار ادا کرتے ہیں۔
- کچھ پروٹین ہارمون ہیں۔ وہ جسم کے عمل کو منظم (regulate) کرتی ہیں۔
- ہیموگلوبن پروٹین خون میں آکسیجن کی نقل و حمل کرتی ہے۔
- ایکٹن (actin) اور مائیوسین (myosin) پروٹینز مسل کے سب سے اہم اجزاء ہیں۔ وہ مسل کے سکڑنے کے ذمہ دار ہیں۔
- فائبرن (fibrin) خون کو جمانے والی ایک پروٹین ہے۔ یہ پروٹین چوٹ کے بعد خون کے فیصاع کو روکنے کے لیے خون کا لٹھڑا بناتی ہے۔
- کچھ پروٹینز جنہیں اینٹی باڈیز (antibodies) کہتے ہیں۔ ہمارے مدافعتی نظام کا حصہ ہیں۔ اینٹی باڈیز نقصان دہ جراثیموں یعنی پاتھوجنز (pathogens) کے خلاف جسم کا دفاع کرتی ہیں۔

لیپڈز (Lipids)

6.4

سوال 9: لیپڈز پر نوٹ لکھیں۔

جواب: لیپڈز (Lipids): لیپڈز ایسے نامیاتی مرکبات ہیں جو پانی میں حل پذیر نہیں ہیں لیکن نامیاتی سالوینٹس (solvents) جیسے (الکول، ایٹر، بنزین) (benzene) میں حل پذیر ہیں۔ ساخت میں لیپڈز گلیسرول (glycerol) اور فیٹی ایسڈز (fatty acids) پر مشتمل ہیں۔ گلیسرول: ایک الکول ہے جس میں تین کاربن ایٹم ہوتے ہیں۔ ہر کاربن کے ساتھ ایک ہائیڈروکسل (OH) گروپ لگا ہوتا ہے۔



فیٹی ایسڈز طویل ہائیڈروکاربن (hydrocarbon) زنجیریں ہیں جس کے آخر میں کاربوکسل گروپ (COOH) لگا ہوتا ہے۔ فیٹی ایسڈز کی دو اقسام ہیں۔

- 1- سچھڑے (saturated) فیٹی ایسڈز میں اندرونی کاربن ایٹمز کے ساتھ ہائیڈروجن ایٹمز کی زیادہ سے زیادہ تعداد بانڈ (bond) بناتے ہوتی ہے۔ ان میں کاربن ایٹموں کے درمیان ڈبل بانڈ نہیں ہوتے۔ سچھڑے فیٹی ایسڈز کمرے کے درجہ حرارت پر ٹھوس ہوتے ہیں۔
- 2- اُن سچھڑے (unsaturated) فیٹی ایسڈز: میں کاربن ایٹمز کے درمیان ایک یا زیادہ ڈبل بانڈ ہوتے ہیں۔ ایسے فیٹی ایسڈز کمرے کے درجہ حرارت پر مائع ہوتے ہیں۔

افعال:

- کاربوہائیڈریٹ توانائی کا بنیادی ذریعہ ہیں۔ سب سے زیادہ استعمال کر کے سیلولر سپریشن میں توانائی پیدا کرتے ہیں۔
- غذائی فائبر (dietary fiber) میں ناقابل ہضم کاربوہائیڈریٹ مثلاً سیلولوز موجود ہوتے ہیں۔ یہ انشٹائن کی مناسب حرکات میں مدد کرتا ہے۔
- پیٹینوز (رائبوز اور ڈی آکسی رائبوز) نیوکلیک ایسڈز (پارٹیٹیپ آراین اے اور ڈی این اے) کے لازمی حصے ہیں۔
- پودے اپنے جسم کے حصوں کے درمیان موٹو سیکرینڈز کی نقل و حمل کے لیے انھیں ڈائی نیکرائڈز (مثلاً سکروز) میں تبدیل کرتے ہیں۔
- سیلولوز سب سے زیادہ مقدار میں پایا جانے والا کاربوہائیڈریٹ ہے۔ یہ پودوں کے سبز اور بالآخر پورے پودے کو سہارا فراہم کرتا ہے۔
- کاشن ایک پولی سیکرائڈ ہے جو حشرات کے بیرونی سکیلیٹن اور فحالی کی سیل وال میں پایا جاتا ہے۔ یہ ان جانداروں کو طاقت اور سہارا فراہم کرتا ہے۔

پروٹینز (Proteins)

6.3


سوال 7: پروٹینز کیا ہے؟ پروٹینز کی ساخت کی وضاحت کریں۔

جواب: پروٹینز (Proteins): سب سے زیادہ مقدار میں پائے جانے والے بائیو کیمیکل پروٹینز ہیں۔ انھیں امینو ایسڈز (amino acids) کے پولیمر (polymer) کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ پروٹین سب سے زیادہ مقدار میں ہر فعل میں بھی حصہ لیتے ہیں جو جاندار سرانجام دیتے ہیں۔


پروٹینز کی ساخت (Structure of Proteins): پروٹینز جن مونومرز (monomers) سے بنے ہوتے ہیں انھیں امینو ایسڈز کہا جاتا ہے۔ مختلف پروٹینز میں امینو ایسڈز کی تعداد مختلف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر انسولین پروٹین میں 51 امینو ایسڈز اور ہیموگلوبن میں 574 امینو ایسڈز ہوتے ہیں۔


امینو ایسڈز (Amino acids): امینو ایسڈز وہ نامیاتی مالیکول ہیں جو مخصوص ضروری امینو ایسڈز (essential amino acids): یہ ایسے 20 امینو ایسڈز ہیں جو ہمارے جسم میں تیار نہیں کیے جاسکتے اور کھانے کے ذریعے فراہم کیے جاتے ہیں۔ غیر ضروری امینو ایسڈز (non-essential amino acids): یہ 11 امینو ایسڈز ہیں جو ہمارے جسم میں تیار کیے جاسکتے ہیں۔

امینو ایسڈز ایک نامیاتی مالیکول ہے جو ایک امینو گروپ (NH₂) ایک کاربوکسل گروپ (COOH) ایک ہائیڈروجن گروپ (H) اور ایک سائیڈ گروپ (R) سے بنا ہوتا ہے جو مرکزی کاربن ایٹم سے منسلک ہوتا ہے:



مختلف امینو ایسڈز میں مختلف R گروپ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر، امینو ایسڈز گلائین (glycine) میں R گروپ H ہے اور امینو ایسڈز ایلانین (alanine) میں R گروپ CH₃ ہے۔






سوال 10: لپڈز کے اہم گروپس کون سے ہیں؟ وضاحت کریں۔

جواب: لپڈز کے اہم گروہ (Main Groups of Lipids):

1- چربی اور تیل (Fats and Oils): چربی اور تیل سب سے زیادہ معروف لپڈز ہیں۔ ان میں ایک گیسرول اور تین فیٹی ایسڈ ہوتے ہیں۔ چربی میں سچو سڈ فیٹی ایسڈ ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ کمرے کے درجہ حرارت پر ٹھوس ہوتے ہیں مثلاً جانوروں کی چربی۔ دوسری طرف، تیل میں ان سچو سڈ (unsaturated) فیٹی ایسڈ ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ کمرے کے درجہ حرارت پر رنچ ہوتے ہیں مثلاً پودوں کے تیل جیسے زیتون کا تیل، کنکی کا تیل اور ناریل کا تیل۔



2- فاسفولپڈز (Phospholipids): یہ لپڈ تمام ممبرینز (membranes) کا مرکزی حصہ ہوتے ہیں۔ فاسفولپڈ کا مالیکیول ایک گیسرول، دو فیٹی ایسڈ اور ایک فاسفیٹ گروپ پر مشتمل ہوتا ہے۔

سوال 11: لپڈز کے ذرائع اور افعال (Sources and Functions of Lipids):

جواب: لپڈز کے ذرائع اور افعال (Sources and Functions of Lipids):
ذرائع: جانوروں سے لپڈز کے ذرائع گوشت اور ذیری مصنوعات ہیں جبکہ پودوں سے لپڈز کے ذرائع میوے، بیج، زیتون کا تیل وغیرہ ہیں۔ جانوروں سے لپڈز کے ذرائع گوشت اور ذیری مصنوعات ہیں جبکہ پودوں سے لپڈز کے ذرائع میوے، بیج، زیتون کا تیل وغیرہ ہیں۔ پودے تیل بناتے ہیں اور انھیں بیجوں میں ذخیرہ کرتے ہیں جیسے سورج مکھی کا تیل، ناریل کا تیل، مونج پھلی کا تیل اور کنکی کا تیل۔

افعال:

- لپڈز ایسے بائیو مالیکیولز ہیں جو سب سے زیادہ توانائی رکھتے ہیں۔ ایڈپوز (adipose) نشو میں موجود چربی کی شکل میں لپڈز توانائی کے طویل مدتی ذخائر کے طور پر کام کرتے ہیں۔ جب جسم کو توانائی کی ضرورت ہوتی ہے تو ان ذخیرہ شدہ لپڈز کو فیٹی ایسڈ اور گیسرول میں توڑ دیا جاتا ہے۔ فیٹی ایسڈ اور گیسرول کو توانائی کے لیے ایندھن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔
- لپڈز ممبرین کے لازمی اجزاء ہیں۔
- لپڈز انسولیٹر (insulator) کے طور پر کام کرتے ہیں اور اہم آگنیز کی حفاظت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آگنیز کے ارد گرد موجود ایڈپوز ٹشو ان آگنیز کو ایک ٹیک (cushioning) دیتے ہیں اور گرمی سے انسولیشن فراہم کرتے ہیں۔
- کچھ لپڈز ہارمونز کی تیاری میں استعمال ہوتے ہیں۔ سٹیرائڈ (steroid) ہارمونز ایک لپڈز کو لیٹرول (cholesterol) سے تیار کیے جاتے ہیں۔
- لپڈزانی جیسوسسٹم میں چربی میں حل پذیر وٹامنز fat-soluble vitamins (وٹامن E, A اور K) کو جذب کرنے میں مدد کرتے ہیں۔

نیوکلیک ایسڈز (Nucleic Acids)

6.5

ڈی این اے اور آر این اے کے کام کا طریقہ (The working of DNA and RNA)

6.6

سوال 12: نیوکلیک ایسڈ کیا ہے؟ مختصر بیان کریں۔

جواب: نیوکلیک ایسڈز (Nucleic Acids): نیوکلیک ایسڈ ایسے بائیو مالیکیول ہیں جو نیوکلیوٹائڈ (nucleotide) نامی اکائیوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ایک نیوکلیوٹائڈ کے تین حصے ہوتے ہیں:

- 1- پینٹوز شوگر (رابٹوز یا ڈی آکسی رابٹوز: Ribose or Deoxyribose)
- 2- نائٹروجن والی بیس (Nitrogenous base)
- 3- فاسفیٹ گروپ (PO₄: Phosphate group)

نیوکلیک ایسڈ کی دو اقسام ہیں:

- 1- ڈی آکسی رابٹو نیوکلیک ایسڈ
- 2- رابٹو نیوکلیک ایسڈ



سوال 13: ڈی این اے کی ڈبل ہیلکس ساخت کی وضاحت کریں اور اس ساخت میں نائٹروجن والی بیس کے مابین جوڑے بننے پر تبادلہ خیال کریں۔

جواب: ڈی آکسی رابٹو نیوکلیک ایسڈ (Deoxyribonucleic Acid (DNA):

ڈی این اے نیوکلیک ایسڈ کی وہ قسم ہے جو ڈی آکسی رابٹو نیوکلیوٹائڈز (deoxy-ribo-nucleotides) سے بنا ہوتا ہے۔ اس نیوکلیوٹائڈ میں، پینٹوز شوگر ڈی آکسی رابٹوز ہے جبکہ نائٹروجن والی بیس ایڈنین (Adenine:A)، تھائمین (Thymine:T)، سائٹوسین (Cytosine:C)، یا گوانین (Guanine:G) ہو سکتی ہے۔

1953 میں امریکی ماہر بائیولوجسٹ جیمز واٹسن (James Watson) اور برطانوی بائیولوجسٹ فرانسس کرک (Francis Crick) نے DNA کا ڈبل چکر دار یعنی ڈبل ہیلکس (double helix) ماڈل تجویز کیا۔ اس ماڈل کے مطابق:

- ڈی این اے ایک ڈبل ہیلکس مالیکیول ہے۔ یہ مالیکیول نیوکلیوٹائڈز کی دو لڑیوں (strands) سے بنا ہے۔
- دونوں لڑیاں ایک دوسرے کے گرد لپٹی ہوئی ہوتی ہیں۔
- ایک لڑی کے نائٹروجن بیس مخالف لڑی کے نائٹروجن بیس کے ساتھ ہائیڈروجن بانڈ بناتے ہیں۔
- نائٹروجن بیسز (bases) مخصوص طریقے سے جوڑے بناتے ہیں یعنی ایک لڑی کی ایڈنین (A) مخالف لڑی کی تھائمین (T) کے ساتھ جوڑا بناتی ہے۔ اسی طرح ایک لڑی کی سائٹوسین (C) دوسری لڑی کی گوانین (G) کے ساتھ جوڑا بناتی ہے۔
- ایڈنین اور تھائمین کے درمیان دو ہائیڈروجن بانڈ جبکہ سائٹوسین اور گوانین کے درمیان تین ہائیڈروجن بانڈز ہوتے ہیں۔



ڈی این اے کا کام: ڈی این اے کے پاس وراثی (hereditary) معلومات ہوتی ہیں۔ یہ معلومات نیوکلیوٹائیڈز کی ترتیب کی شکل میں ہے۔ یہ ترتیب پروٹین کی تیاری کے دوران امینو ایسڈ کی ترتیب کا تعین کرتی ہے۔ ڈی این اے کا وہ حصہ جس میں نیوکلیوٹائیڈز کی ترتیب پروٹین (پولی پپٹائیڈ چین) کی تیاری کا تعین کرتی ہے، اسے جین (gene) کہا جاتا ہے۔ ریپروڈکشن کے دوران، ڈی این اے ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتا ہے۔ اس طرح، ڈی این اے وراثی معلومات کو اگلی نسل تک پہنچاتا ہے۔

سوال 14: آراین اے کیا ہے؟ آراین اے کے مختلف اقسام کی وضاحت کریں۔

جواب: رائبونیوکلک ایسڈ (Ribonucleic Acid (RNA)

آراین اے سینگل لائی (strand) پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کی لڑی رائبونیوکلک ٹائیڈز (ribonucleotides) پر مشتمل ہوتی ہے۔ ایک رائبونیوکلک ٹائیڈز میں ڈی آکسی رائبوز شوگر کی بجائے رائبوز شوگر ہوتی ہے۔ رائبونیوکلک ٹائیڈز میں، نائٹروجن والی بیس ایڈنین (Adenine: A)، یوراسل (Uracil: U)، سائٹوسین (Cytosine: C)، یا گوانین (Guanine: G) ہو سکتی ہے۔

آراین اے کی تین اقسام ہیں:

a. میسجر آراین اے (mRNA): Messenger RNA


پروٹین کی تیاری کے دوران وراثی معلومات کو ڈی این اے سے رائبوسوم تک پہنچاتا ہے۔

b. ٹرانسفر آراین اے (tRNA): Transfer RNA

خصوصی امینو ایسڈ رائبوسوم کو منتقل کرتا ہے۔ اس طرح یہ پروٹین کی تیاری میں امینو ایسڈ کی صحیح ترتیب یقینی بناتا ہے۔


c. رائبوسومل آراین اے (rRNA): Ribosomal RNA

پروٹین کی تیاری کی ذمہ دار مشینری یعنی رائبوسوم کے ساختی اور فعلی حصے بناتا ہے۔



سوال 15: وضاحت کریں کہ ڈی این اے میں موجود معلومات کو پہلے آراین اے اور پھر پروٹین میں کیسے تبدیل کیا جاتا ہے؟

جواب: ڈی این اے اور آراین اے کے کام کا طریقہ (The working of DNA and RNA)



کروموسوم میں ڈی این اے مالیکول ہزاروں نیوکلیوٹائیڈز پر مشتمل ہوتا ہے۔ ڈی این اے مالیکول کی لمبائی کے ساتھ مخصوص حصے ہیں جنہیں جینز (genes) کہتے ہیں۔ ہر جین نیوکلیوٹائیڈز کی مخصوص ترتیب پر مشتمل ہوتا ہے جو ایک مخصوص پروٹین کی تیاری کے لیے معلومات رکھتا ہے۔

جین کے کام کے دوران، ڈی این اے نیوکلیوٹائیڈز کی مخصوص ترتیب کی نقل (copy) تیار کی جاتی ہے۔ یہ کاپی میسجر آراین اے (mRNA) کہلاتی ہے۔ امینو ایسڈ (amino acids) کے مالیکول کی شکل میں ہوتی ہے۔ امینو ایسڈ آراین اے کی شکل میں ڈی این اے کے نقل بنانے کے عمل کو ٹرانسکرپشن (transcription) کہتے ہیں۔ امینو ایسڈ آراین اے اپنے نیوکلیوٹائیڈز کی ترتیب کو رائبوسوم تک لے جاتا ہے۔ رائبوسوم اس ترتیب کو پڑھتا ہے اور پروٹین بنانے کے لیے مخصوص امینو ایسڈز کو جوڑتا ہے۔ اس عمل کو ٹرانسلیشن (translation) کہتے ہیں۔

انشائی طرز کنسپیکوئل (Conceptual) سوالات

سوال 1: روزمرہ کی سرگرمیوں میں بائیو مالیکولز کی اہمیت پر تبادلہ خیال کریں۔

جواب: بائیو مالیکولز جانداروں میں پیدا ہونے والے مالیکولز کو بائیو مالیکولز کہا جاتا ہے۔ ان میں کاربوہائیڈریٹس، لیپڈز، پروٹینز اور نیوکلیک ایسڈز شامل ہیں۔ بائیو مالیکولز کی اہمیت: بائیو مالیکولز روزمرہ کی سرگرمیوں میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔

- کولیسٹرول کی نقل و حرکت کے لیے فیٹی ایسڈز اور لیپڈز (بائیو مالیکولز) ضروری ہیں۔
- وٹامن اور ہارمونز کی ترکیب کا بہت زیادہ انحصار بائیو مالیکولز پر ہوتا ہے۔
- نئے سیلز، نشوونما، بونز، سلاز اور جسم کے دیگر حصوں کو بنانے کے لیے جو انرجی درکار ہوتی ہے وہ زیادہ تر بائیو مالیکولز سے آتی ہے۔

سوال 2: ہمیں کچھ فیٹس کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟

جواب: چکنائی (فیٹ) کی تھوڑی مقدار صحت مند اور متوازن غذا کا لازمی حصہ ہے۔ چربی ضروری فیٹی ایسڈز کا ذریعہ ہے جسے جسم خود نہیں بنا سکتا۔ چکنائی جسم کو وٹامن A، D، E اور K کے جذب کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ وٹامنز فیٹ سولیبل ہیں، جس کا مطلب ہے کہ انہیں صرف فیٹ کی مدد سے ہی جذب کیا جاسکتا ہے۔ کوئی بھی چکنائی جو ہمارے جسم کے سیلز استعمال نہیں کرتی وہ انرجی میں بدل جاتی ہے۔ اس طرح غیر استعمال شدہ کاربوہائیڈریٹس اور پروٹین بھی جسم کی چربی میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔

صحت مند غذا کے ایک حصے کے طور پر آپ کو ایسی غذاؤں اور مشروبات کو کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جن میں سچے سچے فیٹ زیادہ ہوتی ہے۔

سوال 3: کیرائٹین اور کولیجن کیا ہیں؟ ہماری زندگی میں ان کی کیا اہمیت ہے؟

جواب: کیرائٹین: کیرائٹین ایک فائبرس پروٹین ہے جو ہمارے بالوں، جلد اور ناخنوں میں پائی جاتی ہے۔

کیرائٹین کے افعال: کیرائٹین اپنی تصفیعی سیلز کی حفاظت کرتی ہے، جلد اور اندرونی آرگنز کو مضبوط کرتی ہے، اپنی تصفیعی سیلز کی گروتھ کو کنٹرول کرتی ہے اور جلد میں پگھلے برقرار رکھتی ہے۔

کولیجن: کولیجن ہمارے جسم میں سب سے اہم پروٹین ہے۔ یہ کینکروٹائز، کارٹیلاج اور ہڈیوں کا ایک اہم جزو ہے۔ کولیجن جلد کی مضبوطی اور پگھلے کو برقرار رکھتا ہے۔ لائٹس اور جھریوں کو کم کرتا ہے۔ یہ جلد کو زیادہ جوان اور چمکدار بناتا ہے۔ یہ بالوں کی نشوونما اور موٹائی کو فروغ دیتا ہے۔ یہ جوڑوں کے درد اور کھینچاؤ کو کم کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔

معروضی سوالات

مختصر جوابی سوالات (Knowledge, Understanding, Application, Analytical & Conceptual) کی بنیاد پر تیار کیے گئے ہیں۔

6.1	بائیو مالیکولز (Biomolecules)
6.2	کاربوہائیڈریٹس (Carbohydrates)

☆ درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔

1- جانداروں کے اندر ہونے والے کیمیائی عوامل کا مطالعہ کہلاتا ہے:

(A) بائیو بائیولوجی (B) ایکولوجی (C) بائیوفزکس (D) بائیو کیمسٹری

2- بائیو مالیکولز (پروٹینز، کاربوہائیڈریٹس، نیوکلیک ایسڈ) کی ساخت اور افعال کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔

(A) میرین بائیولوجی (B) بائیو کیمسٹری (C) بائیوفزکس (D) مالیکولر بائیولوجی

- 3- ہائیڈالکیمز میں شامل ہیں:
- 4- کاربوہائیڈریٹس، لیڈز (B) پروٹینز، نیوکلک ایسڈ (C) اور (A) دونوں (D) کاربن، ہائیڈروجن
- 5- ہائیڈالکیمز پر ڈیو پلازم کا کتنے فیصد حصہ ہوتا ہے؟
- 6- کسی بھی جامعہ میں ہونے والے تمام کیمیائی اعمال کو مجموعی طور پر کہتے ہیں:
- 7- سادہ مادوں کو ملا کر پیچیدہ مادے بنائے جاتے ہیں۔
- 8- کاربوہائیڈریٹس میں C اور H کا تناسب ہے:
- 9- کن ہائیڈالکیمز کو "سکرائڈز" بھی کہا جاتا ہے؟
- 10- ڈیوز (A) لیڈز (B) کاربوہائیڈریٹس (C) پروٹینز (D) نیوکلک ایسڈ
- 11- ڈیوز (A) لیڈز (B) کاربوہائیڈریٹس (C) پروٹینز (D) نیوکلک ایسڈ
- 12- شکل شوگر مالکیمز سے بنے ہوتے ہیں۔
- 13- مولو سکرائڈز میں کاربن ایٹم کی تعداد ہے:
- 14- کاربوہائیڈریٹس کی اقسام ہیں۔
- 15- 6 کاربن ایٹم والے مولو سکرائڈز کو کہتے ہیں۔
- 16- مندرجہ ذیل میں سے کوئی ایکسوز کی مثالیں ہیں؟
- 17- ڈی آکسی رائبوز کا فارمولہ ہے:
- 18- کاربوہائیڈریٹس جو 2 مولو سکرائڈز کا مجموعہ (units) سے بنے ہیں۔

- 19- کون سے کاربوہائیڈریٹس پانی میں کم حل پذیر اور ذائقہ میں کم میٹھے ہوتے ہیں؟
- 20- سکرورینی ہوتی ہے۔
- 21- سکرور کتنے مولو سکرائڈز سے مل کر بنی ہوتی ہے؟
- 22- مالٹوز بنی ہوتی ہے:
- 23- پودوں میں پایا جانے والا ایک شعور بن پولی سکرائڈ ہے:
- 24- جانوروں کا شارچ ہے:
- 25- سیلولوز کس میں پایا جاتا ہے:
- 26- کیکڑے، مشرات اور لوبستر میں پایا جاتا ہے:
- 27- کائنات کی سیل وال بناتا ہے:
- 28- دودھ اور دیری مصنوعات میں پایا جاتا ہے:
- 29- مالٹوز پایا جاتا ہے:
- 30- سکرور پایا جاتا ہے:
- 31- گندم، جو، چاول اور کئی سے حاصل ہوتا ہے۔
- 32- ڈائٹری فائبر میں موجود ہوتا ہے:
- 33- سب سے زیادہ مقدار میں پایا جانے والا کاربوہائیڈریٹ ہے:
- 34- سلیزیم سب سے زیادہ مقدار میں پائے جانے والے ہائیڈالکیمز ہیں۔

لیڈز (Lipids)

6.4

پروٹینز (Proteins)

6.3

کاربوہائیڈریٹس (D)

پروٹینز (C)

نیوکلک ایسڈ (B)

لیڈز (A)

- 51- کچھ ریڈیفنٹی ایسڈز کمرے کے درجہ حرارت پر ہوتے ہیں۔
 (A) غوس (B) مانع (C) گیس (D) (A) اور (B) دونوں
- 52- ان کچھ ریڈیفنٹی ایسڈز میں دو کاربن ایٹمز کے درمیان باغ ہوتا ہے۔
 (A) سنکلی (B) ڈبل (C) ٹرپل (D) کوئی نہیں
- 53- لیٹس اور اسٹر میں فنی ایسڈز ہوتے ہیں۔
 (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5
- 54- آئل کس کی مثال ہے:
 (A) کچھ ریڈیفنٹی ایسڈز (B) ان کچھ ریڈیفنٹی ایسڈز (C) (A) اور (B) دونوں (D) ان میں سے کسی کی بھی نہیں
- 55- سب سے زیادہ توانائی رکھنے والے مالکیمو ل ہیں:
 (A) پروٹینز (B) لیڈز (C) نیوکلیک ایسڈ (D) کاربوہائیڈریٹس
- 56- لڈز لازمی اجزاء ہیں:
 (A) سیل وال کے (B) سیل ممبرین کے (C) سائٹوپلازم کے (D) مائٹوکونڈریا کے

نیوکلیک ایسڈز (Nucleic Acids)

6.5

ڈی این اے اور آراین اے کے کام کا طریقہ (The working of DNA and RNA)

6.6

- 57- نیوکلیک ایسڈز کی اکائیوں (units) کا نام ہے:
 (A) مونومرز (B) فنی ایسڈز (C) امینو ایسڈز (D) نیوکلیوٹائڈز
- 58- ایک نیوکلیوٹائڈ کتنے کپوٹینٹس سے مل کر بنا ہوتا ہے؟
 (A) دو (B) تین (C) چار (D) پانچ
- 59- DNA کا ڈبل ہیکلس ماڈل کب تجویز کیا گیا؟
 (A) 1960ء (B) 1961ء (C) 1962ء (D) 1963ء
- 60- جیمز واٹس اور فرانسس کرک کو کب نوبل پرائز دیا گیا؟
 (A) 1963ء میں (B) 1962ء میں (C) 1970ء میں (D) 1972ء میں
- 61- ایڈین اور تھامین کے درمیان ہائیڈروجن باغ ہوتے ہیں۔
 (A) دو (B) تین (C) ایک (D) چار
- 62- سائٹوسین جوڑا بناتی ہے۔
 (A) ایڈین کے ساتھ (B) سائٹوسین کے ساتھ (C) گوانین کے ساتھ (D) (A) اور (B) دونوں
- 63- ڈی این اے کے پاس وراثی معلومات کس شکل میں ہوتی ہے؟
 (A) امینو ایسڈز کی (B) رائبونیوکلیک ایسڈز کی (C) نیوکلیوٹائڈز کی (D) پروٹین کی
- 64- آراین اے کی اقسام ہیں:
 (A) دو (B) تین (C) چار (D) پانچ
- 65- پروٹین کی تیاری کے دوران وراثی معلومات کو ڈی این اے سے رائبوسوم تک پہنچاتا ہے۔
 (A) ٹرانسفر آراین اے (B) میسجر آراین اے (C) رائبوسومل آراین اے (D) ڈی این اے

- 35- انسولین پروٹین میں امینو ایسڈز کی تعداد ہے:
 (A) 51 (B) 54 (C) 574 (D) 286
- 36- پروٹینز کے مونومرز کو کہتے ہیں:
 (A) فنی ایسڈز (B) نیوکلیک ایسڈز (C) امینو ایسڈز (D) رائبونیوکلیک ایسڈز
- 37- مختلف امینو ایسڈز میں مختلف ہوتے ہیں۔
 (A) H گروپس (B) R گروپس (C) ایمائونو گروپس (D) کاربوکسل گروپ
- 38- امینو ایسڈ ایلائین میں R گروپ ہے:
 (A) COOH (B) NH₂ (C) CH₃ (D) H
- 39- کاربوکسل گروپ کو ظاہر کیا جاتا ہے:
 (A) NH₂ سے (B) H سے (C) R سے (D) COOH سے
- 40- جانداروں میں پائے جانے والے امینو ایسڈز کی تعداد ہے:
 (A) 160 (B) 170 (C) 150 (D) 180
- 41- کتنی قسم کے امینو ایسڈز زیادہ تر پروٹینز بنانے میں حصہ لیتے ہیں؟
 (A) 10 (B) 20 (C) 30 (D) 40
- 42- کولہجن اور کیرائٹن تقریباً پوری ساخت بناتے ہیں:
 (A) کاربج (B) بالوں (C) ناخنوں (D) مذکورہ تمام
- 43- کوئی پروٹین خون میں آکسیجن کی نقل و حمل کرتی ہے؟
 (A) کیرائٹن (B) مایوسن (C) ایکٹین (D) ہیموگلوبن
- 44- درج ذیل میں سے کون سے پروٹینز مسٹر کے اہم اجزاء ہیں؟
 (A) فائبرن اور ایکٹین (B) مایوسن اور فائبرن (C) ایکٹین اور مایوسن (D) فائبرن اور ہیموگلوبن
- 45- خون کو جانے والی پروٹین ہے:
 (A) ایکٹین (B) مایوسن (C) فائبرن (D) ہیموگلوبن
- 46- لڈز مل پذیر ہوتے ہیں:
 (A) الکول (B) ایٹر (C) بیڑین (D) مذکورہ تمام
- 47- لڈز مشتعل ہوتے ہیں:
 (A) گیسرول (B) فنی ایسڈز (C) گیسرول اور فنی ایسڈز (D) امینو ایسڈز
- 48- مندرجہ ذیل میں سے کون سے کپاؤٹڈ گیسرول اور فنی ایسڈز پر مشتمل ہیں؟
 (A) کاربوہائیڈریٹس (B) پروٹینز (C) لیڈز (D) نیوکلیک ایسڈ
- 49- گیسرول ہے:
 (A) پروٹین (B) فیت (C) الکول (D) ایٹر
- 50- گیسرول میں کاربن ایٹمز کی تعداد ہے:
 (A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6

66- آراین اے سے پروٹین بننے کے عمل کو کہتے ہیں:
(A) ٹرانسکرپشن (B) ٹرانسلیشن (C) ٹرانسپارٹیشن (D) سینٹرل ڈوگما

● جوابات

(D) -1	(D) -2	(C) -3	(C) -4	(D) -5	(A) -6	(B) -7	(C) -8	(B) -9	(C) -10
(B) -11	(A) -12	(B) -13	(B) -14	(B) -15	(D) -16	(B) -17	(B) -18	(B) -19	(C) -20
(A) -21	(D) -22	(C) -23	(B) -24	(A) -25	(D) -26	(B) -27	(C) -28	(D) -29	(D) -30
(C) -31	(C) -32	(B) -33	(C) -34	(A) -35	(C) -36	(B) -37	(C) -38	(D) -39	(B) -40
(B) -41	(D) -42	(D) -43	(C) -44	(C) -45	(D) -46	(C) -47	(C) -48	(C) -49	(A) -50
(A) -51	(B) -52	(B) -53	(B) -54	(B) -55	(B) -56	(D) -57	(B) -58	(C) -59	(B) -60
(A) -61	(C) -62	(C) -63	(B) -64	(B) -65	(B) -66				

● کثیر الانتخابی کنسیپچوئل (Conceptual) سوالات

☆ درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔

- مندرجہ ذیل میں سے کون سے فیٹ سویولیوٹ وٹامنز ہیں؟
(A) A, B, C, D (B) A, C, E, K (C) A, D, E, K (D) B, C, E, D
- تمام ڈی این اے کی ٹائٹروجن بیسز ہیں سوائے:
(A) ایڈینین (B) سائٹوسین (C) گوانین (D) یوراسل
- کونسا اینزائم کاربوہائیڈریٹس کو توڑتا ہے؟
(A) پروٹیٹاز (B) لائیپز (C) ایمائی لیز (D) نیوکلایز
- کونسا بائیو مالکیول جینٹک معلومات کو ذخیرہ کرتا ہے؟
(A) پروٹینز (B) لیپڈز (C) کاربوہائیڈریٹس (D) نیوکلک ایسڈ
- یوکیروٹس میں ڈی این اے سیل کے کس حصے میں پایا جاتا ہے؟
(A) نیوکلئس (B) سائٹوپلازم (C) نیوکلائڈ (D) کلوروپلاسٹ

(A) -1	(C) -2	(D) -3	(C) -4	(D) -5
--------	--------	--------	--------	--------

● جوابات

● محکمہ کی نئی امتحانی تکنیک (Knowledge, Understanding, Application, Analytical & Conceptual) کی روشنی میں مرتب کیے گئے مختصر جوابی سوالات

6.1	بائیو مالکیولز (Biomolecules)
6.2	کاربوہائیڈریٹس (Carbohydrates)

☆ مختصر جواب دیں۔

- بائیو کیمسٹری کیا ہے؟
جواب: بائیو کیمسٹری جانداروں کے اندر ہونے والے کیمیائی اعمال کا مطالعہ ہے۔ مثلاً: فوٹوسنتھیسی، سیز اور سیلولر ریپیریشن۔
- بائیو مالکیولز سے کیا مراد ہے؟
جواب: جانداروں میں پیدا ہونے والے مالکیولز کو بائیو مالکیولز یا بائیو جینک مالکیولز کہا جاتا ہے۔ ان میں کاربوہائیڈریٹس، لیپڈز، پروٹین اور نیوکلک ایسڈ شامل ہیں۔

- کاربوہائیڈریٹس سیل میں کہاں پائے جاتے ہیں؟
جواب: کاربوہائیڈریٹس سیل میں سائٹوپلازم اور سیل ممبرین میں پائے جاتے ہیں۔
- کاربوہائیڈریٹس کے اہم افعال کی وضاحت کریں۔
جواب: کاربوہائیڈریٹس کے افعال:
• یہ توانائی کے ذریعے کے طور پر کام کرتے ہیں۔
• یہ توانائی ذخیرہ کرنے والے مالکیولز کے طور پر کام کرتے ہیں۔

- پروٹینز کے اہم افعال کی لسٹ بتائیں۔
جواب: پروٹینز کے افعال:
• بہت سی پروٹینز اینزائمز کے طور پر کام کرتی ہیں۔
• یہ سیلز میں ممبرینز اور دوسری ساختیں بناتی ہیں۔
• سیلز میں ایک کنٹرول کرتی ہیں۔
• کچھ ہارمونز پروٹینز ہیں۔
- پروٹوپلازم کی خشک کیت (dry mass) میں بائیو مالکیولز کی مقدار بتائیں۔
جواب: پروٹوپلازم کا 93% حصہ بائیو مالکیولز پر مشتمل ہوتا ہے۔

بائیو مالکیولز	خشک کیت کی مقدار (فی صد میں)
پروٹین	50
نیوکلک ایسڈ	18
کاربوہائیڈریٹ	15
لیپڈز	10

- میتابولزم کی تعریف کیجیے۔
جواب: کسی جاندار میں ہونے والے تمام کیمیائی عوامل کو مجموعی طور پر میتابولزم کہتے ہیں۔
- میتابولزم کی کتنی اقسام ہیں؟ نام لکھیں۔
جواب: میتابولزم کی دو اقسام ہیں۔ (i) کٹیا بولزم (ii) ایٹا بولزم
- کٹیا بولزم اور ایٹا بولزم میں فرق لکھیں۔
جواب: کٹیا بولزم: کٹیا بولزم میتابولزم کی وہ قسم ہے جس میں پیچیدہ مالکیولز کو سادہ مالکیولز میں توڑا جاتا ہے۔
• ان عوامل میں انرجی خارج ہوتی ہے۔
ایٹا بولزم: ایٹا بولزم کٹیا بولزم کی وہ قسم ہے جس میں سادہ مالکیولز کو مل کر پیچیدہ مالکیولز بنائے جاتے ہیں۔
• ان عوامل میں توانائی کا استعمال کیا جاتا ہے۔

- کاربوہائیڈریٹس کیا ہیں؟
جواب: کاربوہائیڈریٹس ایسے نامیاتی مرکبات ہیں جن میں H اور O کا تناسب 2:1 ہوتا ہے۔ انہیں "سیکرائڈز" (یعنی شوگر) بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا جنرل فارمولا $C_n(H_2O)_n$ ہے۔ یہاں n سے مراد کاربن ایٹم کی تعداد ہے۔
- لفظ کاربوہائیڈریٹ کا مطلب کیا ہے؟
جواب: "کاربوہائیڈریٹ" کا مطلب ہے "ہائیڈرہڈ کاربن"۔
- کاربوہائیڈریٹس کا جنرل فارمولا کیا ہے؟
جواب: کاربوہائیڈریٹس کا جنرل فارمولا $C_n(H_2O)_n$ ہے۔

13- کاربوہائیڈریٹس کی کتنی اقسام ہیں؟ نام لکھیں۔

جواب: کاربوہائیڈریٹس کی تین اقسام ہیں۔

(i) مونوسیکرائیڈز (ii) ڈائی سیکرائیڈز (iii) پولی سیکرائیڈز

14- مونوسیکرائیڈز کی خصوصیات کیا ہیں؟

جواب: • مونوسیکرائیڈز سنگل شوگر مالیکیول سے بنے ہوتے ہیں۔ • یہ پانی میں آسانی سے حل پذیر ہوتے ہیں۔

• ان کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے۔

15- مونوسیکرائیڈز میں کتنے کاربن ایٹمز ہو سکتے ہیں؟

جواب: مونوسیکرائیڈز میں 3 سے 7 کاربن ایٹمز ہو سکتے ہیں۔

16- میکوزمونوسیکرائیڈ کی کوئی سی دو مثالیں لکھیں۔

جواب: گلوکوز، فروکٹوز اور گلیکٹوز جن کا فارمولا $(C_6H_{12}O_6)$ ہے میکوز شوگر کی مثالیں ہیں۔

17- ڈائی سیکرائیڈز کی خصوصیات لکھیں۔

جواب: • ڈائی سیکرائیڈز دو مونوسیکرائیڈز کا یون سے بنے ہیں۔ • یہ پانی میں کم حل پذیر ہوتے ہیں۔

• یہ ذائقے میں مونوسیکرائیڈز کی نسبت کم میٹھے ہوتے ہیں۔

18- مالٹوز کس سے بنی ہوتی ہے؟

جواب: مالٹوز دو گلوکوز مالیکیول سے بنی ہوتی ہے۔

19- فطرت میں سب سے وافر مقدار میں پائے جانے والے کاربوہائیڈریٹس کون سے ہیں؟

جواب: پولی سیکرائیڈز فطرت میں سب سے وافر مقدار میں پائے جانے والے کاربوہائیڈریٹس ہیں۔

20- پولی سیکرائیڈز کی کوئی سی دو مثالیں دیں۔

جواب: (a) گلیکوجن: یہ جانوروں کا سٹارج ہے جو بنیادی طور پر جگر اور مسلز میں ذخیرہ ہوتا ہے۔ یہ گلوکوز کی بہت زیادہ شاخوں والی زنجیروں پر مشتمل ہوتا ہے جو انرجی کی ضرورت پڑنے پر توڑی جاتی ہیں۔

(b) سٹارج: یہ پودوں میں پایا جانے والا ایک سٹورج پولی سیکرائیڈ ہے۔ یہ گلوکوز اکائیوں کی سیدھی اور شاخوں والی زنجیروں پر مشتمل ہوتا ہے۔

21- کالکین کیسے سیلولوز سے مختلف ہے؟

جواب: سیلولوز اور کالکین دونوں پولی سیکرائیڈز ہیں لیکن سیلولوز پودوں کے سلز کی سل وال میں پایا جاتا ہے۔ جبکہ کالکین فنجائی کی سل وال میں پایا جاتا ہے۔

22- ڈائی سیکرائیڈز کن ذرائع سے حاصل کیے جاتے ہیں؟

جواب: • سکروز چھدر، گنے اور پھلوں میں پایا جاتا ہے۔

• لیکٹوز دودھ اور ذیری مصنوعات میں پایا جاتا ہے۔

• مالٹوز اناج میں پایا جاتا ہے۔

23- جسم میں کاربوہائیڈریٹس کے اہم افعال کون سے ہیں؟

جواب: • کاربوہائیڈریٹس انرجی کا بنیادی ذریعہ ہیں۔ سلز گلوکوز کو استعمال کر کے سیلولر ریپائریشن میں انرجی پیدا کرتے ہیں۔

• سیلولوز سب سے زیادہ مقدار میں پایا جانے والا کاربوہائیڈریٹ ہے۔ یہ پودوں کے سلز اور بالآخر پورے پودے کو سہارا فراہم کرتا ہے۔

24- سلز میں سب سے زیادہ مقدار میں پایا جانے والا بائیو مالیکیول کونسا ہے؟

جواب: سلز میں سب سے زیادہ مقدار میں پایا جانے والا بائیو مالیکیول پروٹینز ہیں۔ پروٹینز کم از کم 50 فیصد حصہ پروٹینز پر مشتمل ہے۔

25- پروٹینز کی ساخت پر لوٹ لکھیں۔

جواب: پروٹینز جن مونومرز سے بنے ہوتے ہیں انھیں امائنو ایسڈ کہا جاتا ہے۔ مختلف پروٹینز میں امائنو ایسڈز کی تعداد مختلف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر انسولین پروٹین میں 51 امائنو ایسڈز ہوتے ہیں۔

26- ہیموگلوبن میں کتنے امائنو ایسڈز ہوتے ہیں؟

جواب: ہیموگلوبن میں 574 امائنو ایسڈز ہوتے ہیں۔

27- ضروری اور غیر ضروری امائنو ایسڈز میں کیا فرق ہے؟

جواب: ضروری امائنو ایسڈز: یہ ایسے 9 امائنو ایسڈز ہیں جو ہمارے جسم میں تیار نہیں کیے جاسکتے اور کھانے کے ذریعے فراہم کیے جاتے ہیں۔

غیر ضروری امائنو ایسڈز: یہ 11 امائنو ایسڈز ہیں جو ہمارے جسم میں تیار کیے جاتے ہیں۔

28- جانداروں میں کتنی قسم کے امائنو ایسڈز پائے جاتے ہیں؟

جواب: جانداروں میں تقریباً 170 قسم کے امائنو ایسڈز پائے جاتے ہیں۔

29- امائنو ایسڈز کیا ہے اور یہ کیسے بنتا ہے؟

جواب: امائنو ایسڈز آرکینک مالیکیول ہیں جو مخصوص تعداد اور ترتیب میں جڑ کر پروٹین بناتے ہیں۔ ایک امائنو ایسڈ ایک امائنو گروپ (NH_2) ، ایک کاربوکسل گروپ $(COOH)$ ، ایک ہائیڈروجن گروپ (H) اور ایک سائیڈ گروپ (R) سے بنا ہوتا ہے جو مرکزی کاربن ایٹم سے منسلک ہوتا ہے۔

30- گلیکسین امائنو ایسڈز ایلامین سے کیسے مختلف ہے؟

جواب: امائنو ایسڈز گلیکسین میں R گروپ H اور امائنو ایسڈز ایلامین میں R گروپ CH_3 ہوتا ہے۔

31- پروٹینز کے ذرائع کون سے ہیں؟

جواب: پروٹین کے ذرائع میں گوشت (مٹن، پیٹ، چکن)، مچھلی، انڈے، دودھ، دالیں اور پھلیاں وغیرہ شامل ہیں۔

32- پروٹینز کے افعال لکھیں۔

جواب: پروٹینز کے افعال: • پروٹینز تمام سل بمبرزین کا ایک اہم حصہ ہیں۔

• کچھ پروٹین جیسے کولیلجن اور کیرائٹن کارٹیلیج، بالوں اور ناخنوں کی تقریباً پوری ساخت بناتے ہیں۔

• کچھ پروٹین ہارمون ہیں۔ وہ جسم کے عمل کو منظم کرتی ہیں۔

33- فائبرن پروٹین کیا کام کرتی ہے؟

جواب: فائبرن خون کو جمانے والی ایک پروٹین ہے۔ یہ پروٹین چوٹ کے بعد خون کے ضیاع کو روکنے کے لیے خون کا لوتھڑا بناتی ہیں۔

34- ایکٹن اور مائیوسین کیا ہیں؟

جواب: ایکٹن اور مائیوسین پروٹینز سلز کے سلز کے اہم اجزاء ہیں۔ وہ مسلز کے سکڑنے کے ذمہ دار ہیں۔

35- اینٹی باڈیز کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟

جواب: کچھ پروٹینز اینٹی باڈیز ہوتی ہیں۔ یہ ہمارے مدافعتی نظام کا حصہ ہیں۔ اینٹی باڈیز نقصان دہ جراثیموں یعنی پتھو جنز کے خلاف جسم کا دفاع کرتی ہیں۔

36- لیڈز سے کیا مراد ہے؟

جواب: لیڈز ایسے نامیاتی مرکبات (organic compounds) ہیں جو پانی میں حل پذیر نہیں ہیں لیکن نامیاتی سالونش (جیسے الکحل، ایٹھر، بنزین) میں حل پذیر ہیں۔

37- لپڈز کس پر مشتمل ہیں؟

جواب: ساخت کے لحاظ سے لپڈز گیسرول اور فینی ایسڈز پر مشتمل ہیں۔

38- گیسرول اور فینی ایسڈز میں کیا فرق ہے؟

جواب: گیسرول: گیسرول ایک الکحل ہے جس میں 3 کاربن ایٹم ہوتے ہیں۔ ہر کاربن کے ساتھ ایک ہائیڈروکسل (OH) گروپ لگا ہوتا ہے۔

فینی ایسڈز: فینی ایسڈز ہائیڈروکاربنز کی چیز ہیں جن کے آخر میں کاربوکسل گروپ (COOH) لگا ہوتا ہے۔

39- کچھ سٹھ اور ان کچھ سٹھ فینی ایسڈز کے درمیان فرق کریں۔

جواب: (i) کچھ سٹھ فینی ایسڈز: کچھ ریڈ فینی ایسڈز کے درمیان ڈبل بانڈ نہیں ہوتے۔ یہ روم ٹمپرچر پر ٹھوس ہوتے ہیں۔

(ii) ان کچھ سٹھ فینی ایسڈز: ان کچھ سٹھ فینی ایسڈز میں کاربن ایٹموں کے درمیان ایک سے زیادہ ڈبل بانڈ ہوتے ہیں۔ ایسے فینی ایسڈز روم ٹمپرچر پر مائع ہوتے ہیں۔

40- فاسفولیڈز کی ساخت بیان کریں۔

جواب: فاسفولیڈز تمام ممبریز کا مرکزی حصہ ہوتے ہیں۔ فاسفولیڈز کا مالیکیول ایک گیسرول، دو فینی ایسڈز اور ایک فاسفیٹ گروپ پر مشتمل ہوتا ہے۔

41- جانوروں اور پودوں میں لپڈز کن کن اشیاء میں پائے جاتے ہیں؟

جواب: جانوروں میں لپڈز کے ذرائع گوشت اور ذیری مصنوعات ہیں جبکہ پودوں سے لپڈز کے ذرائع میوے، بیج، زيتون کا تیل وغیرہ ہیں۔

42- سب سے زیادہ انرجی رکھنے والے بائیو مالیکیولز کون سے ہیں؟

جواب: لپڈز سب سے زیادہ انرجی رکھنے والے بائیو مالیکیولز ہیں۔

43- جب جسم کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے تو لپڈز کیسے انرجی مہیا کرتے ہیں؟

جواب: ایڈوزیشن میں موجود چربی کی شکل میں لپڈز انرجی کے طویل مدتی ذخائر کے طور پر کام کرتے ہیں۔ جب جسم کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے تو ان ذخیرہ شدہ لپڈز کو فینی ایسڈ اور گیسرول میں توڑ دیا جاتا ہے۔ فینی ایسڈز اور گیسرول کو انرجی کے لیے ایندھن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔

44- لپڈز کیسے انسولیٹر کے طور پر کام کرتے ہیں؟

جواب: لپڈز انسولیٹر کے طور پر کام کرتے ہیں اور اہم آرگنز کی حفاظت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آرگنز کے ارد گرد موجود ایڈیپوٹیشن آرگنز کو ایک فیک (cushining) دیئے ہیں اور گرمی سے انسولیشن فراہم کرتے ہیں۔

45- سٹیرائڈ ہارمونز کو لپڈز سے حاصل کیے جاتے ہیں؟

جواب: سٹیرائڈ ہارمونز ایک لپڈ کو لیسرول سے تیار کیے جاتے ہیں۔

46- فیٹ سویلیبل وٹامنز کون سے ہیں؟

جواب: وٹامن E، D، A اور K فیٹ سویلیبل وٹامنز ہیں۔

نیوکلیک ایسڈز (Nucleic Acids)

6.5

ڈی این اے اور آراین اے کے کام کا طریقہ (The working of DNA and RNA)

6.6

47- نیوکلیک ایسڈز کیا ہیں اور نیوکلیک ایسڈز کی کتنی اقسام ہیں؟

جواب: نیوکلیک ایسڈز ایسے بائیو مالیکیولز ہیں جو نیوکلیوٹائیڈ اکائیوں پر مشتمل ہوں۔

نیوکلیک ایسڈز کی دو اقسام ہیں:

(i) ڈی آکسی رائبونیوکلیک ایسڈ (ii) رائبونیوکلیک ایسڈ

48- نیوکلیوٹائیڈ کے حصوں کے نام لکھیں۔

جواب: ایک نیوکلیوٹائیڈ کے تین حصے ہوتے ہیں:

(i) پینٹوز شوگر (ii) نائٹروجن والی بیس (iii) فاسفیٹ گروپ

49- ڈی این اے کس سے مل کر بنتا ہے؟

جواب: ڈی این اے نیوکلیک ایسڈ کی وہ قسم ہے جو ڈی آکسی رائبونیوکلیوٹائیڈز سے بنا ہوتا ہے۔ اس نیوکلیوٹائیڈ میں پینٹوز شوگر ڈی آکسی رائبوز ہے

جبکہ نائٹروجن بیس ایڈینین، تھائیمین، سائٹوسین یا گوانین ہو سکتی ہے۔

50- ڈی این اے کا ڈبل ہیکلس ماڈل کس نے تجویز کیا؟

جواب: 1953ء میں امریکی ماہر بائیولوجسٹ جیمز واٹسن اور فرانس کرک نے ڈی این اے کا ڈبل ہیکلس ماڈل تجویز کیا۔

51- جیمز واٹسن اور فرانس کرک کو نوٹیل انعام کیوں دیا گیا؟

جواب: 1962ء میں جیمز واٹسن اور فرانس کرک کو ڈی این اے کی ڈبل ہیکلس ساخت دریافت کرنے پر نوٹیل انعام دیا گیا۔

52- ایڈینین اور تھائیمین کے درمیان کتنے ہائیڈروجن بانڈز ہوتے ہیں؟

جواب: ایڈینین اور تھائیمین کے درمیان دو ہائیڈروجن بانڈز ہوتے ہیں۔

53- ڈی این اے کا کام کیا ہے؟

جواب: ڈی این اے کے پاس وراثی معلومات ہوتی ہے۔ یہ معلومات نیوکلیوٹائیڈز کی ترتیب کی شکل میں ہے۔ یہ ترتیب پروٹین کی تیاری کے دوران

امائنو ایسڈز کی ترتیب کا تعین کرتی ہے۔ ڈی این اے وراثی معلومات کو اگلی نسل تک پہنچاتا ہے۔

54- جین سے کیا مراد ہے؟

جواب: ڈی این اے کا وہ حصہ جس میں نیوکلیوٹائیڈز کی ترتیب پروٹین کی تیاری کا تعین کرتی ہے، اسے جین کہتے ہیں۔

55- رائبونیوکلیک ایسڈ پر مختصر نوٹ لکھیں۔

جواب: آراین اے سنگل سٹریٹڈ پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کا سٹریٹڈ رائبونیوکلیوٹائیڈز پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک رائبونیوکلیوٹائیڈ میں ڈی آکسی رائبوز شوگر کی بجائے رائبوز شوگر ہوتی ہے۔ رائبونیوکلیوٹائیڈ میں نائٹروجن والی بیس ایڈینین، یوراسل، سائٹوسین یا گوانین ہو سکتی ہے۔

56- آراین اے کی کتنی اقسام ہیں نام بتائیں؟

جواب: آراین اے کی تین اقسام ہیں۔

(i) مسیجر آراین اے (ii) ٹرانسفر آراین اے (iii) رائبوسول آراین اے

57- ٹرانسفر آراین اے کا کیا کام ہے؟

جواب: یہ مخصوص امائنو ایسڈ کو رائبوسوم کو منتقل کرتا ہے۔ اس طرح یہ پروٹین کی تیاری میں امائنو ایسڈ کی صحیح ترتیب یقینی بناتا ہے۔

58- ٹرانسکرپشن کیا ہے؟

جواب: جین کے کام کے دوران، مسیجر آراین اے (mRNA) کی شکل میں ڈی این اے نیوکلیوٹائیڈز کی ایک مخصوص ترتیب کی کاپی تیاری جاتی

ہے۔ اس عمل کو ٹرانسکرپشن کہا جاتا ہے۔

59- ٹرانسلیشن کی تعریف لکھیں۔

جواب: رائبوسوم اہم آراین اے کی ترتیب کو پڑھتا ہے اور اس کے مطابق پروٹین بنانے کے لیے مخصوص امائنو ایسڈز کو جوڑتا ہے اس مرحلے کو ٹرانسلیشن

کہا جاتا ہے۔

مختصر جوابی کنسیپچوئل (Conceptual) سوالات

☆ مختصر جواب دیں۔

1- DNA اور RNA میں کیا فرق ہے؟

جواب: DNA اور RNA میں فرق:

- ڈی این اے میں دوسرے بنڈز ہوتے ہیں جبکہ آراین اے میں ایک سٹرینڈ ہوتا ہے۔
- ڈی این اے میں ڈی آکسی رائبوز شوگر ہوتی ہے جبکہ آراین اے میں رائبوز شوگر ہوتی ہے۔

2- اگر تمام کاربوہائیڈریٹس ختم ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟

جواب: اگر تمام کاربوہائیڈریٹس ختم ہو جائیں گے تو انسانی جسم کو توانائی کے بحران کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ کاربوہائیڈریٹس جسم کی اہم توانائی کا ذریعہ ہے۔ یہ دماغ سمیت تمام اجزاء کو انرجی فراہم کرتے ہیں۔

3- وٹامنز کو غذائی اجزاء کیوں نہیں سمجھا جاتا؟

جواب: وٹامنز کو غذائی اجزاء نہیں سمجھا جاتا کیونکہ جسم انہیں خود نہیں بنا سکتا۔ انہیں غذا کے ذریعے لینا پڑتا ہے۔ جبکہ کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز اور فیٹس کو جسم خود بنا سکتا ہے یا دیگر غذائی اجزاء سے حاصل کر سکتا ہے۔

4- کیسے ممکن ہے کہ مختلف قسم کے پروٹینز ایک جیسے امائنو ایسڈ سے بن سکتے ہیں؟

جواب: مختلف قسم کے پروٹینز ایک جیسے امائنو ایسڈ سے مختلف ترتیب میں مل کر بنتے ہیں۔ یہی ترتیب پروٹین کی ساخت اور اس کے افعال کو متعین کرتی ہے۔

5- اگر جسم میں انیٹرائزنگ مقدار کم ہو جائے گی تو ڈائجسٹو سسٹم پر کیا اثر پڑے گا؟

جواب: انیٹرائزنگ سسٹم کے عمل کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اگر ان کی مقدار کم ہو جائے گی تو ڈائجسٹو سسٹم کا عمل سست ہو جائے گا۔ جس سے بد ہضمی گیس اور دیگر مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔

اہم نکات

- بائیو کیمسٹری جانداروں کے اندر موجود مادوں اور کیمیائی اعمال کا مطالعہ ہے۔
- مائیکرو بائیولوجی بائیو مائیکرو لری ساخت اور افعال کا مطالعہ ہے۔
- بائیو مائیکرو لری جانداروں کے پیدا کردہ مائیکرو لری، لپڈز، پروٹین اور نیوکلیک ایسڈز شامل ہیں۔
- کاربوہائیڈریٹس کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن پر مشتمل نامیاتی مرکبات ہیں جن میں H اور O کا تناسب 2:1 (پانی کی طرح) ہے۔
- مونوسیکرائڈز ایک شوگر مائیکرو لری سے بنے ہوتے ہیں۔ یہ پانی میں آسانی سے حل پذیر ہیں اور میٹھا ذائقہ رکھتے ہیں۔
- ڈائی سیکرائڈز دو مونوسیکرائڈز سے بنے ہوتے ہیں۔ یہ پانی میں کم حل پذیر ہیں اور ذائقہ میں کم میٹھے ہوتے ہیں۔
- پولی سیکرائڈز سینکڑوں سے ہزاروں مونوسیکرائڈز پر مشتمل ہوتے ہیں۔ یہ پانی میں حل پذیر نہیں ہیں اور بے ذائقہ ہیں۔
- نشاستہ (سارچ) پودوں میں پایا جانے والا ایک سٹورج پولی سیکرائڈ ہے۔ گلیکوجن جانوروں کا نشاستہ ہے جو بنیادی طور پر جگر اور مسلز میں ذخیرہ ہوتا ہے۔
- سیلولوز ایک پولی سیکرائڈ ہے جو پودوں کی سیل والز میں پایا جاتا ہے۔
- کاکین سیلولوز کی ایک ترمیم شدہ شکل ہے۔ یہ لکڑے، لوہڑ اور کیزوں کے ایکسٹریکٹ میں پایا جاتا ہے۔ یہ فحاشی کی سیل وال بھی بناتا ہے۔
- کاربوہائیڈریٹ توانائی کا بنیادی ذریعہ ہیں۔
- پروٹین سیل میں سب سے زیادہ مقدار میں پائے جانے والے میکرو مائیکرو لری ہیں۔

پروٹین امائنو ایسڈ سے بنے ہوتے ہیں۔

• امائنو ایسڈ پروٹین کی ساختی اکائیاں ہیں۔ ایک امائنو ایسڈ میں ایک امائنو گروپ، ایک کاربوکسل گروپ، ایک ہائیڈروجن گروپ اور ایک سائیڈ گروپ ہوتا ہے جو مرکزی کاربن ایٹم سے جڑے ہوتے ہیں۔

• پروٹین تمام سٹیز کی ممبریز کا ایک اہم حصہ ہیں۔

• لپڈ ایسے نامیاتی مرکبات ہیں جو پانی میں حل پذیر نہیں ہیں لیکن نامیاتی سالوینٹس میں حل پذیر ہیں۔

• کچھ ریڈیفی ایسڈز کاربن سے کاربن ایٹموں میں تمام سنگل بانڈ رکھتے ہیں۔

• ان کچھ ریڈیفی ایسڈز میں کاربن ایٹموں کے درمیان ایک یا زیادہ ڈبل بانڈ ہوتے ہیں۔

• لپڈز ایڈ پیٹرنشوز میں چربی کی شکل میں توانائی کے طویل مدتی ذخائر کے طور پر کام کرتے ہیں۔

• لپڈ سیل ممبرین کے ضروری اجزاء ہیں۔

• ڈی این اے ایک ڈبل لڑی والا مائیکرو لری ہے جبکہ آراین اے سنگل لڑی والا مائیکرو لری ہے۔ ڈی این اے اور آراین اے دونوں نیوکلیوٹائیڈ اکائیوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔

• ڈی این اے کے نیوکلیوٹائیڈز میں، ڈی آکسی رائبوز، ایک فاسفیٹ گروپ اور چار نائٹروجن والی بیس میں سے ایک ہے۔ اس میں نائٹروجن والی بیس ایڈنین (A)، تھائیمنین (T)، سائٹوسین (C)، یا گوانین (G) ہو سکتی ہے۔

• آراین اے کے نیوکلیوٹائیڈز میں رائبوز شوگر، فاسفیٹ گروپ اور چار نائٹروجن والی بیس میں سے ایک ہے۔ اس میں نائٹروجن والی بیس ایڈنین (A)، یوراسل (U)، سائٹوسین (C)، یا گوانین (G) ہو سکتی ہے۔

• مسیجر آراین اے (ایم آراین اے) کی شکل میں ڈی این اے نیوکلیوٹائیڈز کی ایک مخصوص ترتیب کی نقل بننے کے عمل کو ٹرانسکرپشن کہا جاتا ہے۔ رائبوسوم ایم آراین اے کی ترتیب کو پڑھتا ہے اور اس کے مطابق، پروٹین بنانے کے لیے مخصوص امائنو ایسڈز کو جوڑتا ہے۔ اس مرحلے کو ٹرانسلیشن کہا جاتا ہے۔

حل مشقی سوالات

A- درج ذیل سوالات کے لیے درست جوابات منتخب کریں۔

1- کاربوہائیڈریٹ کا بنیادی کام کیا ہے؟

- (الف) توانائی فراہم کرتے ہیں
- (ب) انیٹرائزنگ کے طور پر کام کرتے ہیں
- (ج) اعمال کو منظم کرتے ہیں
- (د) ممبریز بناتے ہیں

2- مونوسیکرائڈز اور پولی سیکرائڈز کے درمیان کیا فرق ہے؟

- (الف) مونوسیکرائڈز سنگل شوگر پر مشتمل ہیں
- (ب) پولی سیکرائڈز ذائقے میں میٹھے ہوتے ہیں
- (ج) مونوسیکرائڈز پودوں کی سیل والز میں موجود ہیں
- (د) پولی سیکرائڈز آسانی سے حل ہو جاتے ہیں

3- سیلولوز کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟

- (الف) یہ ذائقہ میں میٹھا ہے
- (ب) یہ انسان کے ڈائیجسٹو سسٹم میں ہضم ہو جاتا ہے
- (ج) یہ پودوں میں ساختی سہارا فراہم کرتا ہے
- (د) یہ پانی میں حل پذیر ہے

4- مندرجہ ذیل میں سے کون سی پروٹین آکسیجن کی نقل و حمل میں شامل ہے؟

- (الف) انسولین
- (ب) ہیموگلوبن
- (ج) کولیسین
- (د) کیرائین

5- امینو ایسڈ کا کون سا جزو اس کی منفرد خصوصیات کا ذمہ دار ہے؟

- (الف) امینو گروپ
(ج) R گروپ (سائڈ گروپ)
(ب) کاربوکسل گروپ
(د) ہائیڈروجن گروپ

6- پتھوجنز کے خلاف دفاع کرنے میں کون سی پروٹین شامل ہیں؟

- (الف) اینٹی باڈیز (ب) مائیزین (ج) فبرینوجن (د) ہیموگلوبن

7- زیادہ تر پلڈز کی اکائیاں کون سی ہے؟

- (الف) امینو ایسڈز (ب) فٹی ایسڈ اور گلیسرول (ج) نیوکلئوٹائیڈز (د) سادہ شوگرز

8- ان پتھوجن فٹی ایسڈز کس طرح سے پتھوجن فٹی ایسڈ سے مختلف ہیں؟

- (الف) ان کے پاس زیادہ ہائڈروجن ایٹم ہیں (ب) ان کی ہائڈروکاربن زنجیر میں ڈبل بانڈ ہوتے ہیں
(ج) کمرے کے درجہ حرارت پر یہ ٹھوس ہوتے ہیں (د) یہ صرف جانوروں کی چربی میں پائے جاتے ہیں

9- درج ذیل میں سے کون سا فٹل پروٹین سرائیج نہیں دیتا؟

- (الف) خون میں آکسیجن ٹرانسپورٹ کرتا (ب) وراثتی معلومات رکھتا
(ج) خوراک کی ڈائی جین میں مدد کرتا (د) پتھوجنز کے خلاف لڑتا

10- کون سے اجزاء مل کر نیوکلیوٹائیڈ بناتے ہیں؟

- (الف) شوگر، فاسفیٹ، نائٹروجن والی بیس (ب) امینو ایسڈ، شوگر، نائٹروجن والی بیس
(ج) فٹی ایسڈ، فاسفیٹ، نائٹروجن والی بیس (د) پروٹین، شوگر، نائٹروجن والی بیس

11- کون سی نائٹروجن والی بیس آراین اے میں تو ہوتی ہے لیکن ڈی این اے میں نہیں؟

- (الف) ایڈنین (ب) تھائمین (ج) یوراسل (د) گوائین

○ جواب

1- (الف)	2- (الف)	3- (ج)	4- (ب)	5- (ج)	6- (الف)	7- (ب)	8- (ج)	9- (ب)	10- (الف)
11- (ج)									

B- مختصر جوابات لکھیں۔

کاربوہائیڈریٹس کے جسم میں اہم کام کون سے ہیں؟

جواب: کاربوہائیڈریٹس کے افعال:

- کاربوہائیڈریٹس توانائی کا اہم ذریعہ ہیں۔ سیزگھوکوز کو استعمال کر کے سیلولر ریپریشن میں توانائی پیدا کرتے ہیں۔
- غذائی قابض میں ناقابل ہضم کاربوہائیڈریٹ مثلاً سیلولوز موجود ہوتے ہیں۔ یہ انسان کی مناسب حرکات میں مدد کرتا ہے۔

2- کاربوہائیڈریٹس کے تین گروپ ڈانڈ میں کس طرح ایک دوسرے سے مختلف ہیں؟

- مونوسیکرائڈز (سادہ شوگرز) کا ڈانڈ ٹھٹھا ہوتا ہے۔ ڈائی سیکرائڈز مونوسیکرائڈز کی نسبت کم پیٹھے ہوتے ہیں۔
- پولی سیکرائڈز بے ڈانڈ ہوتے ہیں۔

3- دو عام مونوسیکرائڈز اور دو ڈائی سیکرائڈز کا نام لکھیں۔

جواب: مونوسیکرائڈز میں رائبوز اور گھوکوز شامل ہیں۔ ڈائی سیکرائڈز میں سکرور اور مالٹوز شامل ہیں۔


4- سکرور کا مالکیول کون سے مونوسیکرائڈ کے ملنے سے بنا ہوتا ہے؟

جواب: سکرور (نیل شوگر) دو مونوسیکرائڈ یعنی گلوکوز اور فروکٹوز سے بنی ہوتی ہے۔

5- پودوں میں مشہور پتھوجن پولی سیکرائڈ کی مثال دیں۔

جواب: سارچ پودوں میں پایا جانے والا ایک مشہور پتھوجن پولی سیکرائڈ ہے۔

6- امینو ایسڈ کی تعریف کریں اور اس کی ساخت بتائیں۔



امینو ایسڈ کی ساخت

جواب: امینو ایسڈ: امینو ایسڈ ایک آرگینک مالکیول ہے۔ جو ایک امینو گروپ (NH₂)، ایک کاربوکسل


گروپ (COOH)، ایک ہائیڈروجن گروپ (H) اور ایک سائڈ گروپ (R) سے بنا ہوتا ہے۔ جو مرکزی

کاربن ایٹم سے منسلک ہوتا ہے۔

7- لڈ کے بنیادی اجزاء کیا ہیں؟ ان کی ساخت بتائیں۔

جواب: لڈز ایسے آرگینک کمپائونڈز ہیں جو پانی میں حل پذیر نہیں ہوتے لیکن آرگینک سالوینٹس (جیسے الکل، ایٹر، بنزین) میں حل پذیر ہوتے ہیں۔

ساخت: لڈز گلیسرول اور فٹی ایسڈز پر مشتمل ہوتے ہیں۔



ان پتھوجن ایسڈ

پتھوجن ایسڈ

گلیسرول

8- آراین اے کی اقسام کون سی ہیں؟ ان کے افعال لکھیں۔

جواب: آراین اے کی تین اقسام ہیں۔ (i) مسیجر آراین اے (ii) رائبوسول آراین اے (iii) ٹرانسفر آراین اے

(i) مسیجر آراین اے کا کام: پروٹین کی تیاری کے دوران وراثتی معلومات کو ڈی این اے سے رائبوسوم تک پہنچانا۔

(ii) رائبوسول آراین اے کا کام: پروٹین کی تیاری کی ذمہ دار مشینری یعنی رائبوسوم کے ساختی اور فعلی حصے بناتا ہے۔

(iii) ٹرانسفر آراین اے: مخصوص امینو ایسڈ کو رائبوسوم کو منتقل کرتا ہے۔ اس طرح یہ پروٹین کی تیاری میں امینو ایسڈ کی صحیح ترتیب یقینی بناتا ہے۔

9- مختصر طور پر ڈی این اے کا کام بیان کریں۔

جواب: ڈی این اے وراثتی معلومات کو اگلی نسل تک پہنچاتا ہے۔

10- مندرجہ ذیل کے درمیان فرق بیان کریں:

i- بائیو کیمسٹری اور مالکیولر بائیولوجی

جواب: بائیو کیمسٹری: بائیو کیمسٹری (biochemistry) جانداروں کے اندر ہونے والے کیمیائی عوامل کا مطالعہ ہے (مثلاً فوٹوسنتھیس سزاور سیلولر ریپریشن)۔

مالکیولر بائیولوجی: مالکیولر بائیولوجی (molecular biology) بائیو مالکیولز (مثلاً کاربوہائیڈریٹس (carbohydrates)، پروٹینز

(proteins)، نیوکلیک ایسڈز (nucleic acids) کی ساخت اور افعال کا مطالعہ ہے۔

ii- ڈی این اے اور آراین اے کی ساخت

جواب: جواب کے لیے دیکھیے 13 اور 14

iii- ڈی این اے اور آراین اے کی کیمیائی ترکیب

جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال 13 اور 14

iv- مونوسکرائڈ اور ڈائی سکرائڈز

جواب:

مونوسکرائڈز	ڈائی سکرائڈز
• مونوسکرائڈز سنگل شوگر مالکیول سے بنے ہوتے ہیں۔ • یہ پانی میں آسانی سے حل پذیر ہوتے ہیں۔ • ان کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے۔	• ڈائی سکرائڈز دو مونوسکرائڈز کا ایکوٹا سے بنے ہیں۔ • یہ پانی میں کم حل پذیر ہوتے ہیں۔ • یہ ذائقے میں مونوسکرائڈز کی نسبت کم میٹھے ہوتے ہیں۔

v- گلیکوجن اور نشاستہ

جواب:

گلیکوجن	نشاستہ
یہ جانوروں کا شارچ ہے جو بنیادی طور پر جگر اور مسلز میں ذخیرہ ہوتا ہے۔ یہ گلوکوز کی بہت زیادہ شاخوں والی زنجیروں پر مشتمل ہوتا ہے جو انرجی کی ضرورت پڑنے پر تیزی سے جاتی ہیں۔	یہ پودوں میں پایا جانے والا ایک ستورنچ پولی سکرائڈ ہے۔ یہ گلوکوز اکائیوں کی سیدھی اور شاخوں والی زنجیروں پر مشتمل ہوتا ہے۔

vi- گلیسین اور امیلاٹین

جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال 7

vii- کچھ سٹڈ اور آن کچھ سٹڈ فٹسی ایسڈ

جواب:

کچھ سٹڈ فٹسی ایسڈ	آن کچھ سٹڈ فٹسی ایسڈ
کچھ سٹڈ (saturated) فٹسی ایسڈ میں اندرونی کاربن ایٹمز کے ساتھ ساتھ زیادہ تعداد بانڈ (bond) بنائے ہوتے ہیں۔ ان میں کاربن ایٹموں کے درمیان ڈبل بانڈ نہیں ہوتے۔ کچھ سٹڈ فٹسی ایسڈ کمرے کے درجہ حرارت پر ٹھوس ہوتے ہیں۔	آن کچھ سٹڈ (unsaturated) فٹسی ایسڈ میں کاربن ایٹمز کے درمیان ایک یا زیادہ ڈبل بانڈ ہوتے ہیں۔ ایسے فٹسی ایسڈ کمرے کے درجہ حرارت پر مائع ہوتے ہیں۔

viii- چربی اور تیل

جواب:

چربی	تیل
چربی میں کچھ سٹڈ فٹسی ایسڈ ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ کمرے کے درجہ حرارت پر ٹھوس ہوتے ہیں مثلاً جانوروں کی چربی۔	تیل میں آن کچھ سٹڈ (unsaturated) فٹسی ایسڈ ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ کمرے کے درجہ حرارت پر مائع ہوتے ہیں مثلاً پودوں کے تیل جیسے زیتون کا تیل، کئی کا تیل اور ناریل کا تیل۔

C- تفصیلی جوابات لکھیں۔

1- کاربوہائیڈریٹ کے تین گروہس کی ساخت اور انفعال پر ایک جامع نوٹ لکھیں۔ جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال 5

2- پروٹین کے افعال پر تبادلہ خیال کریں۔ جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال 8

3- فٹسی ایسڈ کیا ہیں؟ ان کی اقسام کی وضاحت کریں۔ جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال 9

4- چربی اور تیل کی بنیادی ساخت کی وضاحت کریں۔ وضاحت کریں کہ لپڈ تو آسانی سے ذخیرہ کرنے میں کس طرح کردار ادا کرتے ہیں۔ جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال 11

5- ڈی این اے کی ڈبل ہیکلس ساخت کی وضاحت کریں اور اس ساخت میں مائٹروجن والی بیس کے مابین جوڑے بننے (pairing) پر تبادلہ خیال کریں۔ جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال 13

6- وضاحت کریں کہ ڈی این اے میں موجود معلومات کو پہلے آراین اے اور پھر پروٹین میں کیسے تبدیل کیا جاتا ہے؟ جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال 15

D- تحقیقی سوالات:

1- بائیو مالکیولز کے کام کرنے میں پانی کی اہمیت کا تجزیہ کریں۔

جواب: بائیو مالکیولز زندگی کے بلندنگ بلاکس ہیں جن کے افعال میں پانی اہم کردار ادا کرتا ہے۔

• جانداروں میں نمبر پچ کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔

• پانی بہترین سالوینٹ ہے جو بائیو مالکیولز کے مختلف اجزاء کو حل کرنے، ٹرانسپورٹ کرنے اور آپس میں انٹرایکشن میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔

• پانی نیلی ممبرین کی ساخت، فلیوئیڈ موشی اور اینزائم کی ایکٹیوٹی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔

2- درج ذیل مصنوعات میں کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، چکنائی اور پانی کی مقدار فیصد تلاش کریں اور ان کا ایک دوسرے سے موازنہ کریں۔

روٹی (40 گرام)، برگر، کھیرا، انڈا، چاول (100 گرام) آلو کے فراٹز (100 گرام)، گاجر۔

جواب:

فوڈ پروڈکٹ	کاربوہائیڈریٹس (فی صد)	پروٹین (فی صد)	فٹس (فی صد)	پانی
روٹی 40 گرام	25-30 گرام	1-2 گرام	4-5 گرام	
برگر	40-45 گرام	20-30 گرام	20-25 گرام	30-50 فی صد
کھیرا	4 گرام	0.2 گرام	0.7 گرام	96 فی صد
چاول 100 گرام	28-30 گرام	0.5-1 گرام	2-3 گرام	68-70 گرام
آلو	20-25 گرام	0.1-0.2 فی صد	0.1-0.2 فی صد	2-3 %
فراٹز 100 گرام	25-30 گرام	17 گرام	3-4 گرام	55-65 فی صد
گاجر	10-9 فی صد	0.2-0.3 فی صد	1-2 فی صد	80-90 فی صد

باب 7

اینزائمز

Enzymes

یہ باب پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہوں گے کہ:

- مثالوں کے ساتھ مینابولزم، کینابولزم اور مینابولزم کی تعریف کریں۔
- اینزائم کی تعریف کریں اور اس کی خصوصیات بیان کریں۔
- اینزائم ایکشن کے میکانزم کی وضاحت کریں اور خاکہ بنائیں۔
- ان عوامل کی وضاحت کریں جو اینزائم کی سرگرمی کو متاثر کر سکتے ہیں۔
- اینزائم کے کام میں مسابقتی اور غیر مسابقتی مزاحمت کی وضاحت کریں۔

انشائی طرز سوالات

مختصر قسم کی نئی اور سچی تکنیکس (Knowledge, Understanding, Application, Analytical & Conceptual) کی روشنی میں مرتب کیے گئے انشائی طرز سوالات

7.1	مینابولزم (Metabolism)
7.2	اینزائمز (Enzymes)
7.3	اینزائمز کے کام کرنے کا طریقہ (Mechanism of Enzyme Action)

سوال 1: مینابولزم سے کیا مراد ہے؟ اس کی اقسام بیان کریں۔

جواب: مینابولزم (Metabolism): جانداروں میں زندگی برقرار رکھنے کے لیے ہونے والے کیمیائی ری ایکشنز کو مجموعی طور پر مینابولزم کہتے ہیں۔ مینابولزم کی دو اقسام ہیں یعنی کینابولزم اور مینابولزم۔

- 1- کینابولزم (catabolism) میں پیچیدہ مالیکیولز کو سادہ میں توڑا جاتا ہے۔ ان ری ایکشنز میں توانائی خارج ہوتی ہے۔ مثالوں میں شامل ہیں:
 - سیلولوز پر تھن جنس میں خوراک (گلوکوز) کے مالیکیول کو کاربن ڈائی آکسائیڈ اور H_2O میں توڑا جاتا ہے اور توانائی حاصل کی جاتی ہے۔
 - لیپولائسز (lipolysis) جس میں لیڈز (چربی) کو فٹسی ایسڈ اور گیسرول میں توڑا جاتا ہے، جنھیں بعد میں توانائی حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔


- 2- اینابولزم (anabolism) میں سادہ مالیکیولز سے پیچیدہ مالیکیولز بنائے جاتے ہیں۔ مثالوں میں شامل ہیں:
 - ہنگ برڈ (hummingbird) میں مینابولزم کی رفتار کسی بھی جانور سے زیادہ ہوتی ہے۔ اسے اپنی توانائی کی سطح کو برقرار رکھنے کے لیے مسلسل کھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔
 - فوٹوسنتھس (photosynthesis) جس میں سورج کی روشنی کا استعمال کرتے ہوئے کاربن ڈائی آکسائیڈ اور پانی کو گلوکوز تیار کیا جاتا ہے۔ اس ری ایکشن میں آکسیجن ایک بائی پراڈکٹ (byproduct) کے طور پر پیدا ہوتی ہے۔



ہنگ برڈ (hummingbird) میں مینابولزم کی رفتار کسی بھی جانور سے زیادہ ہوتی ہے۔ اسے اپنی توانائی کی سطح کو برقرار رکھنے کے لیے مسلسل کھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔

کرتے ہوئے کاربن ڈائی آکسائیڈ اور پانی کو گلوکوز تیار کیا جاتا ہے۔ اس ری ایکشن میں آکسیجن ایک بائی پراڈکٹ (byproduct) کے طور پر پیدا ہوتی ہے۔

پروٹین کی تیاری (protein synthesis) جس میں امائنو ایسڈز جوڑ کر پروٹین بنائی جاتی ہے۔



مینابولزم کی اقسام

سوال 2: اینزائمز کی خصوصیات بیان کریں۔

جواب: اینزائمز (Enzymes)

اینزائم بائیولوجیکل محرک یعنی کیتالسٹ (catalyst) ہیں جو جانداروں میں کیمیائی ری ایکشنز کو تیز کرتے ہیں۔ اس فعل کے دوران اینزائمز خود استعمال ہو کر ختم نہیں ہوتے۔ اینزائمز کیمیائی طور پر پروٹین ہوتے ہیں۔ اینزائمز اپنے سبسٹریٹ (substrate) کے لیے انتہائی مخصوص ہیں۔ سبسٹریٹ وہ مالیکیولز ہیں جو اینزائمز کے کنٹرول والے ری ایکشنز میں حصہ لیتے ہیں۔ اکثر اینزائمز اپنے ری ایکشنز کو ان ری ایکشنز کی نسبت لاکھوں گنا تیز کر سکتے ہیں جن کو کیتالائز (catalyze) نہیں کیا جاتا۔

اینزائمز کی خصوصیات (Characteristics of Enzymes)

اینزائمز کی کیمیائی نوعیت: اینزائمز بنیادی طور پر پروٹین ہیں۔ عام طور پر ان میں 100 سے 1,000 تک امینو ایسڈ ہوتے ہیں۔
 گلوبل ساخت: اینزائمز ایک تین جہتی (3-dimensional) گلوبل ساخت رکھتے ہیں۔ اس ساخت کی وجہ سے اینزائمز میں ایکٹو سائٹس (active sites) ہوتی ہیں جو مخصوص سبسٹریٹس کے ساتھ جڑ سکتی ہیں۔
 کچھ آراین اے مالیکیولز بھی اینزائمز کے طور پر کام کرتے ہیں۔ اس طرح کے آراین اے کو رائبوزائم (ribozyme) کہتے ہیں۔ رائبوزائم بنیادی طور پر رائبوسوم میں پائے جاتے ہیں۔ وہ مخصوص وائرس اور بیکٹیریا میں بھی پائے جاتے ہیں۔

اینزائمز کا مقصد ہوتا: اینزائمز ان ری ایکشنز کے لیے انتہائی مخصوص ہیں جن کو وہ تیز یعنی کیتالائز (catalyze) کرتے ہیں۔ وہ سبسٹریٹ کی نوعیت کے لیے بھی بہت مخصوص ہیں۔ مثال کے طور پر، ایمیلایز (amylase) اینزائمز صرف شارج کوئی سادہ شکر میں توڑنے والے ری ایکشنز کو تیز کرتا ہے۔ انٹراسیلولر (intracellular) اور ایکسٹراسیلولر (extracellular) اینزائمز: کام کرنے کے مقام کی بنیاد پر اینزائمز کی گروہ بندی کی جاسکتی ہے۔ انٹراسیلولر اینزائمز انٹرسیل کے اندر ہی کام کرتے ہیں، مثلاً سیلولر سپریشن کے اینزائمز۔ ایکسٹراسیلولر اینزائمز سیل کے باہر خارج کیے جاتے ہیں جہاں وہ ری ایکشنز کو کیتالائز کرتے ہیں، مثلاً وہ اینزائمز جو معدے کی دیواروں کے سیلز سے معدے کی کیوینی (cavity) میں خارج کیے جاتے ہیں جہاں وہ خوراک کی ڈائی جیشن کرتے ہیں۔

اینزائمز کے کو-فیکٹرز (co-factors): بہت سے اینزائمز کو مکمل طور پر فعال ہونے کے لیے اضافی غیر پروٹین (non-protein) مالیکیولز کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے غیر پروٹین مالیکیولز کو-فیکٹرز (co-factors) کہلاتے ہیں۔ کو-فیکٹرز کے دو بڑے گروہ ہیں یعنی ان آرگینک (inorganic) کو-فیکٹرز اور آرگینک (organic) کو-فیکٹرز۔ ان آرگینک کو-فیکٹرز میں میٹل آئنز (metal ions) شامل ہیں جیسے آئرن اور میگنیشیم آئنز۔ آرگینک کو-فیکٹرز کی مزید دو اقسام ہیں:

- ایسے آرکینک کو۔ فیکٹرز جو اینزائم کے ساتھ مضبوطی سے جڑتے ہیں، پراسٹھیک گروپ (prosthetic group) کہلاتے ہیں۔ چر وٹامنز (مثلاً بائیوٹن) اور ہیم (haeme) گروپ ان کی مثالیں ہیں۔
- ایسے آرکینک کو۔ فیکٹرز جو اینزائم کی ساتھ کمزور جڑتے ہیں، کو۔ اینزائم (coenzyme) کہلاتے ہیں۔ بہت سے وٹامنز اور نیوکلکوٹائڈز (این اے ڈی NAD اور این اے ڈی پی NADP) ان کی مثالیں ہیں۔
- پچیدہ مینابولک ری ایکشنز میں اینزائم کی روایاں: پچیدہ مینابولزم میں ری ایکشنز کا سلسلہ ہوتا ہے۔ ایسے پچیدہ مینابولزم کو کینالائز کرنے کے لیے متعدد اینزائم ایک ترتیب میں کام کرتے ہیں۔ ری ایکشنز کے سلسلے میں ہر اینزائم ایک مخصوص ری ایکشن کو کینالائز کرتا ہے۔ ری ایکشن کو تیز کرنے کے بعد، پراڈکٹ (product) کو سلسلے کے اگلے ری ایکشن کے لیے اگلے اینزائم میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے۔
- سوال 3: مختلف مصنوعات میں اینزائمز کے استعمالات لکھیں۔


جواب: مصنوعات میں اینزائمز کا استعمال: مختلف مصنوعات میں اینزائمز کے استعمال بہت وسیع ہیں۔ مثال کے طور پر:

- فوڈ اسٹری: شارج کو سادہ شکر میں توڑنے والے اینزائم سفید روٹی (white bread)، بن (bun) اور رولز (rolls) تیار کرنے میں استعمال ہوتے ہیں۔ پنیر (cheese) کی پیداوار کے لیے بھی اینزائم کا استعمال کیا جاتا ہے۔
- کافہ کی صنعت: اینزائم شارج کو توڑ کر اس کے گاڑھے پن کو کم کرتے ہیں۔ اس طرح یہ کافہ بنانے میں مدد کرتے ہیں۔
- بائیولوجیکل ڈٹرجنٹ (detergent): پروٹی ایز (protease) اینزائم کپڑوں پر لگے پروٹینز کے دھبے اتارنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایمیلیز (amylase) اینزائم برتن دھونے میں استعمال ہوتے ہیں اور اینزائم پر لگے شارج اتارتے ہیں۔
- فرمینٹیشن (fermentation) اسٹری: اینزائم شارج اور پروٹین کو توڑ کر سادہ شوگر، امائنو ایسڈ اور پیپٹائڈز پیدا کرتے ہیں۔ مائیکرو آرگنزمز مثلاً سیسٹ (yeast) ان مادوں کو فرمینٹیشن میں استعمال کرتے ہیں اور انسانی استعمال کی مختلف مصنوعات تیار کرتے ہیں۔

- سوال 4: اینزائم ایکشن کے لاک اینڈ کی اور اینڈریوسٹ ماڈل کی وضاحت کریں۔

جواب: اینزائم کے کام کرنے کا طریقہ (Mechanism of enzyme action)

ایک اینزائم کی سطح پر ایک یا زیادہ پاکٹ (pocket) یا شکاف ہوتے ہیں جنہیں ایکٹو سائٹس (active sites) کہا جاتا ہے۔ ایکٹو سائٹس کینالائس (catalysis) میں براہ راست حصہ لیتی ہیں۔ اینزائم کے کام کرنے کے طریقہ کی وضاحت کے لیے دو ماڈل تجویز کیے گئے ہیں۔



اینزائم کی ایکٹو سائٹ

1- لاک اینڈ کی ماڈل (Lock and key model)

2- اینڈریوسٹ ماڈل (Induced fit model)

1- اینزائم ایکشن کالاک اینڈ کی ماڈل (Lock and Key Model of Enzyme Action)


یہ ماڈل 1894 میں ایک جرمن کیمسٹ ایمل فشر (Emil Fischer) نے تجویز کیا تھا۔ اس کے مطابق اینزائم کی ایکٹو سائٹ کی ایک مستقل ساخت ہوتی ہے۔ سبسٹریٹ مائیکولیول ایکٹو سائٹ میں بالکل فٹ بیٹھتا ہے اور اینزائم سبسٹریٹ کمپلکس (Enzyme substrate complex) بناتا ہے۔ اینزائم ری ایکشن کی کینالائس (catalysis) کرتا ہے اور سبسٹریٹ کو پراڈکٹ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اینزائم پراڈکٹ سے الگ ہو جاتا ہے۔



اینزائم کے کام کرنے کا لاک، اینڈ کی ماڈل

2- اینزائم ایکشن کا اینڈریوسٹ ماڈل (Induced Fit Model of Enzyme Action):


یہ ماڈل 1958ء میں امریکی بائیولوجسٹ ڈینیل کوش لینڈ (Daniel Koshland) نے پیش کیا۔ اس ماڈل کے مطابق اینزائم کی ایکٹو سائٹ غیر چلک دار نہیں ہوتی۔ جب سبسٹریٹ اور اینزائم کا تعامل ہوتا ہے تو اینزائم کی ایکٹو سائٹ کی شکل میں تبدیلی آتی ہے تاکہ اینزائم اپنا کام کرے۔



اینزائم کے کام کرنے کا اینڈریوسٹ ماڈل

7.4- اینزائم کے کام پر اثر انداز ہونے والے عوامل (Factors that Affect the Activity of Enzymes)

7.5- اینزائم کی مزاحمت (Enzyme Inhibition)



جواب: 5- اینزائم کی سرگرمی کو متاثر کرنے والے عوامل بیان کریں۔

نمبر پچر (Temperature):


ہر اینزائم ایک مخصوص ٹمپریچر پر تیز ترین رفتار سے کام کرتا ہے۔ ایسے ٹمپریچر کو اس اینزائم کا مناسب ترین یعنی آئٹیم (optimum) ٹمپریچر کہتے ہیں۔ انسان کے زیادہ تر اینزائمز کا آئٹیم ٹمپریچر 37°C ہے۔ ٹمپریچر میں جب مخصوص حد تک اضافہ ہوتا ہے تو حرارت مائیکولیولز کی حرکت میں شامل ہو جاتی ہے اور اینزائم کے کام کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔ لیکن جب ٹمپریچر کو آئٹیم ٹمپریچر سے بہت زیادہ بڑھا دیا جائے تو حرارت اینزائم کے مائیکولیول میں موجود بائڈز کو توڑ دیتی ہے۔ اس طرح اینزائمز کی گلوب جیسی (globular) ساخت قائم نہیں رہتی۔ اسے اینزائم کا ڈی نیچر (denature) ہو جانا یعنی ڈی نیچریشن (denaturation) کہتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں اینزائم کے کام کرنے کی رفتار میں بہت تیزی سے کمی آتی ہے۔

پH

جس فلوئڈ میں اینزائم کام کرتے ہیں وہ اس میں ہائیڈروجن آئنز کے ارتکاز یعنی pH لیے حساس ہوتے ہیں۔ مخصوص pH پر اینزائم تیز

ترین رفتار سے کام کرتے ہیں۔ اسے ان کی آئٹیم pH کہتے ہیں۔ pH میں تبدیلی سے انزائم کی ایکٹو سائٹ پر موجود امینو ایسڈز کی آئیونائزیشن (ionization) پر اثر پڑتا ہے۔ اس سے انزائم کی سرگرمی سست ہو جاتی ہے یا مکمل طور پر رک جاتی ہے۔ مختلف انزائمز کی آئٹیم pH مختلف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر معدہ میں کام کرنے والا پینسن انزائم تیزابی میڈیم (pH 1.5 to 2.0) میں کام کرتا ہے جبکہ سالشٹائن میں کام کرنے والا ٹریپسن (trypsin) انزائم الکلائن میڈیم (pH 7 to 8) میں کام کرتا ہے۔

سسپنڈنٹ کی مقدار (Substrate concentration): سسپنڈنٹ کی مقدار میں اضافہ ری ایکشن کی رفتار کو بڑھاتا ہے۔ سسپنڈنٹ کی مقدار ایک حد سے زیادہ ہونے پر انزائمز کی تمام ایکٹو سائٹس پُر ہو جاتی ہیں۔ ایسی صورت میں سسپنڈنٹ کے مزید مالیکیولز کو آزاد ایکٹو سائٹس نہیں ملتیں۔ اس حالت کو ایکٹو سائٹس کی سچو ریٹن (saturation) کہتے ہیں اور اس دوران ری ایکشن کی رفتار مزید نہیں بڑھتی۔



انزائم کے کام پر سسپنڈنٹ کی مقدار کا اثر

انزائم کے کام پر pH کا اثر

سوال 6: انزائم کی حرارت پر نوٹ لکھیں۔


جواب: انزائم کی حرارت (Enzyme Inhibition): کچھ مادے، جنہیں انزائم کے انہیٹرز (inhibitors) یا مزاحم کہتے ہیں، انزائم سے جو جاتے ہیں اور اس کی سرگرمی کو کم کر دیتے ہیں۔ اس عمل کو انزائم کی رکاوٹ یا حرارت (inhibition) کہتے ہیں۔

1- مسابقتی حرارت (Competitive Inhibition): انزائمز کے کچھ مزاحم مالیکیول سسپنڈنٹ سے مماثلت رکھتے ہیں۔ ایسے مزاحم انزائم کی ایکٹو سائٹس سے جوڑنے کے لیے سسپنڈنٹ کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ جب مزاحم مالیکیول ایکٹو سائٹ سے جو جاتا ہے تو وہ اسے بلاک کر دیتا ہے۔ اس طرح سسپنڈنٹ ایکٹو سائٹ سے نہیں جوڑ سکتا۔ انہی بائیونکس مسابقتی مزاحم کی مثالیں ہیں۔ انہی بائیونک کے مالیکیولز بیکٹیریا کے انزائمز کے سسپنڈنٹ کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ وہ بیکٹیریا کے انزائمز سے جو جاتے ہیں اور انہیں روکتے ہیں۔

2- غیر مسابقتی حرارت:

(Non-Competitive Inhibition)

انزائمز کے کچھ مزاحم مالیکیول سسپنڈنٹ سے مماثلت نہیں رکھتے۔ وہ انزائم کی ایکٹو سائٹ سے نہیں جڑتے۔ اس کی بجائے وہ انزائم کے کسی دوسرے مقام پر جاتے ہیں۔ یہ عمل انزائم کی مجموعی شکل کے ساتھ ساتھ اس کی ایکٹو سائٹ کی شکل بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ تبدیل شدہ ایکٹو سائٹ اب سسپنڈنٹ



انزائم کی حرارت کی اقسام

میں فٹ نہیں ہوتی ہے اور انزائم کے کام میں مزاحمت آ جاتی ہے۔ اس کی مثالوں میں بھاری دھاتیں جیسے مرکری (mercury) اور کینسر تھراپی (therapy) میں استعمال ہونے والی کچھ ادویات شامل ہیں۔

انسانی طرز کنسیپچوئل (Conceptual) سوالات

سوال 1: انزائمز زندگی کے لیے کیوں ضروری ہیں؟

جواب: انزائمز پروٹین ہیں جو کیمیا لٹ کا کام کرتے ہیں اور کیمیکل ری ایکشنز کی شرح کو بڑھاتے ہیں۔

مندرجہ ذیل طریقوں سے انزائمز زندگی کے لیے ضروری ہیں۔

ڈائی جیشن: انزائمز بڑے مالیکیولز کو چھوٹے مالیکیولز میں توڑ دیتے ہیں۔ جنہیں جسم استعمال کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایمیلز ایک انزائم ہے جو شارج کو شوگر میں توڑ دیتا ہے، جو بعد میں خون میں شامل ہو جاتی ہے۔

سیل مینا یولزم: انزائمز سیل مینا یولزم کے تمام پیلوؤں کو منظم کرتے ہیں جن میں سیلولر مائیکرو مالیکیولز کی تعمیر اور کیمیکل انرجی کا تحفظ اور تبدیلی شامل ہے۔

مسئلہ اور روز کا کام: انزائمز مسئلہ اور روز کے کام کے لیے ضروری ہیں۔

ریسپائریشن: انزائمز ریسپائریشن کے لیے ضروری ہیں۔

سوال 2: کیا انزائمز کے بغیر ری ایکشن ہو سکتے ہیں؟

جواب: ہاں، انزائمز کے بغیر ری ایکشن ہو سکتے ہیں لیکن وہ زندگی کی سپورٹ کے لیے سست ہوں گے۔

وضاحت: انزائمز بائیولوجیکل کیمیا لٹ ہیں جو جانداروں میں کیمیکل ری ایکشنز کو تیز کرتے ہیں۔ انزائمز کے بغیر، زیادہ تر بائیولوجیکل ری ایکشنز اتنے سست ہوں گے کہ وہ نمبر پچر اور پریشر کی ان شرائط کے مطابق نہیں ہوں گے جو زندگی کے مطابق ہیں۔

سوال 3: مختلف حالات میں انزائمز کیسے کام کرتے ہیں؟

جواب: انزائمز مخصوص درجہ حرارت اور pH رینج کے اندر بہترین کام کرتے ہیں۔ درجہ حرارت بڑھانے سے عام طور پر ری ایکشن تیز ہو جاتا ہے جبکہ درجہ حرارت کم کرنے سے یہ سست ہو جاتا ہے۔ اگر حالات آئٹیمل نہ ہوں تو انزائمز اسسپنڈنٹ سے فسلک ہونے کی صلاحیت کھو سکتا ہے۔

معروضی سوالات

مختصر نمونہ کی بنیادی تکنیکس (Knowledge, Understanding, Application, Analytical & Conceptual) کی روشنی میں مرتب کیے گئے کثیر الانتخابی سوالات

7.1	میٹابولزم (Metabolism)
7.2	انزائمز (Enzymes)
7.3	انزائمز کے کام کرنے کا طریقہ (Mechanism of Enzyme Action)

☆ درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔

1- میٹابولزم کی اقسام ہیں:

- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

2- خوراک کے مالکیول (گلوکوز) کو کاربن ڈائی آکسائیڈ اور پانی میں توڑا جاتا ہے۔

- (A) فوٹوسنتھی سیز میں (B) ایٹا یولزم میں (C) کیمیا یولزم میں (D) سیلولر ریسپائریشن میں

3- لپڈز کو فیٹی ایسڈ اور گلیسرول میں توڑنے کا عمل ہے۔

- (A) سیلولر ریسپائریشن (B) لپو لائس (C) فوٹوسنتھی سیز (D) ایٹا یولزم

- 4- کیا بلوٹم کی مثالیں ہیں۔
(A) لیپولاس (B) سیلر ریپاریشن (C) A اور B دونوں (D) فونوسٹیسیز
- 5- فونوسٹیسیز میں بائی پراڈکٹ ہے:
(A) ہائیڈروجن (B) ٹائٹروجن (C) آکسیجن (D) گلوکوز
- 6- جاعداروں میں کیمیکل ری ایکشنز کو تیز کرتے ہیں۔
(A) کاربوہائیڈریٹس (B) لپڈز (C) اینزائمز (D) نیوکلک ایسڈز
- 7- اینزائمز کیمیائی طور پر ہیں۔
(A) لپڈز (B) پروٹینز (C) نیوکلک ایسڈز (D) ہائیڈروکاربنز
- 8- اینزائمز میں کتنے امائنو ایسڈز ہوتے ہیں؟
(A) 50 سے 100 (B) 100 سے 500 (C) 100 سے 1000 (D) 1000 سے 1500
- 9- کونسا اینزائم صرف شارچ کو ہی سادہ شوگر میں توڑنے والے ری ایکشنز کو تیز کرتا ہے؟
(A) ٹرمین (B) ایمائی لیز (C) چپس (D) لائیو
- 10- ساختی لحاظ سے اینزائمز کتنے ہوتے ہیں:
(A) تین (B) دو (C) ایک (D) چار
- 11- دو مالیکولز جن پر اینزائمز اثر انداز ہوتے ہیں۔
(A) سبسٹریٹ (B) پراڈکٹس (C) اینہیٹر (D) ایکٹیویٹر
- 12- اینزائمز جو سیل سے باہر خارج کیے جاتے ہیں جہاں وہ ری ایکشنز کو کھلانے کرتے ہیں کہلاتے ہیں۔
(A) انٹرا سیلر اینزائمز (B) ایکسٹرا سیلر اینزائمز (C) کوئی کونز (D) کو-اینزائمز
- 13- اینزائمز کا کھلنا ایک رجحان کہلاتا ہے:
(A) مینا بولک سائٹ (B) کوآینزائم (C) کوئی کونز (D) ایکٹیو سائٹ
- 14- کو-اینزائمز کی مثالیں ہیں:
(A) وٹامنز (B) نیوکلک ایسڈز (C) نیوکلک ایسڈز (D) A اور B دونوں
- 15- برتن دھونے میں استعمال ہونے والا اینزائم ہے۔
(A) ایمائی لیز (B) ٹرمین (C) لائیو (D) ٹائکس
- 16- کون سے وٹامنز کو-اینزائم کے طور پر کام کرتے ہیں؟
(A) وٹامن بی (B) وٹامن ڈی (C) وٹامن سی (D) وٹامن ای
- 17- بائیو کیمیکل ڈیٹریجٹ کی مثال ہے:
(A) چپس (B) پروٹیٹ (C) گلائی کوجن (D) ٹریپس
- 18- ایمائز اینزائمز کونسا ہے۔
(A) شارچ (B) پروٹین (C) لپڈز (D) امینو ایسڈز
- 19- اینزائمز ایکشن کا لاک اینڈ کی ماڈل پیش کیا۔
(A) ایمل فشر نے (B) ڈیوئیڈ کوشلینڈ (C) ون ہیل (D) کیلون

● جوابات

- 20- اینزائمز ماڈل کب پیش کیا گیا؟
(A) 1858ء میں (B) 1956ء میں (C) 1963ء میں (D) 1958ء میں
- 21- ایمل فشر تھا:
(A) امریکن کیمسٹ (B) جرمن کیمسٹ (C) اسٹریلین کیمسٹ (D) امریکن بائیولوجسٹ
- 22- اینزائمز ایکشن کا اینزائمز ماڈل کس نے تجویز کیا:
(A) ایمل فشر (B) ڈیوئیڈ کوشلینڈ (C) ابن النیس (D) جابر بن حیان
- 23- ایسے آرتھک کونکٹو کونکٹو جوائنٹز کے ساتھ مضبوطی سے جڑے ہوتے ہیں کہلاتے ہیں؟
(A) کوآینزائم (B) اپو اینزائم (C) کوئی کونز (D) پراسٹیک گروپ
- 24- اینزائمز کا وہ حصہ جو کھلانا میں شامل ہوتا ہے۔
(A) ایکٹیو سائٹ (B) کوئی کونز (C) کوآینزائم (D) پراسٹیک گروپ
- 25- کس پرنسپل میں مینا بولم کی رفتار کسی بھی جانور سے زیادہ ہوتی ہے؟
(A) کوآینزائم (B) چپس (C) ہنگ برڈز (D) طوطے میں

7.4 اینزائمز کے کام پر اثر انداز ہونے والے عوامل (Factors that Affect the Activity of Enzymes)

7.5 اینزائمز کی مزاحمت (Enzyme Inhibition)

- 26- درجہ حرارت جس پر انسانی اینزائمز تیز ترین رفتار سے کام کرتے ہیں:
(A) 30°C (B) 37°C (C) 35°C (D) 32°C
- 27- چپس اینزائمز کام کرتا ہے:
(A) معدہ میں (B) لاریج انٹسٹائن میں (C) سال انٹسٹائن میں (D) دل میں
- 28- ٹرمین اینزائمز کس pH پر کام کرتا ہے؟
(A) 7.6 (B) 7.7 (C) 7.8 (D) 7.9
- 29- ایسی صورت جس میں سبسٹریٹ کے مزید مالیکولز کو آزاداں ایکٹیو سائٹس نہیں کہلاتی ہے:
(A) کیمیا بولزم (B) ڈی نیچریشن (C) آئیوٹائزیشن (D) کیموٹیشن
- 30- مسابقتی مزاحمت کی مثال ہے:
(A) وٹامنز (B) امینو ایسڈز (C) پروٹینز (D) اینٹی بائیوٹک

(B) -10	(B) -9	(C) -8	(B) -7	(C) -6	(C) -5	(C) -4	(B) -3	(D) -2	(A) -1
(D) -20	(A) -19	(A) -18	(B) -17	(D) -16	(A) -15	(D) -14	(D) -13	(B) -12	(A) -11
(D) -30	(D) -29	(C) -28	(A) -27	(B) -26	(C) -25	(A) -24	(D) -23	(B) -22	(B) -21

کثیر الانتخابی کنسپچوئل (Conceptual) سوالات

☆ درست جواب کے کردار لکھیں۔

- 1- اگر تمام اینزائمز جسم میں غیر فعال ہو جائیں تو کیا ہوگا؟
(A) جسم میں کوئی بھی کیمیائی رد عمل نہیں ہوگا
(B) جسم کا درجہ حرارت بڑھ جائے گا
(C) جسم کو ازجی حاصل کرنے میں دشواری ہوگی
(D) مذکورہ تمام
- 2- اینزائمز کی فعالیت کو متاثر کرنے والے عوامل ہیں:
(A) درجہ حرارت (B) pH (C) اینزائم کی مقدار (D) مذکورہ تمام
- 3- ایک اینزائم صرف ایک مخصوص رد عمل یہ کیوں ری ایکشن کرتا ہے؟
(A) اینزائم کی ساخت کی خصوصیت کی وجہ سے
(B) اینزائم کی مقدار کی وجہ سے
(C) رد عمل میں شامل سبسٹریٹ کی مقدار کی وجہ سے
(D) رد عمل کے درجہ حرارت کی وجہ سے
- 4- اینزائمز کنٹرول مائیکرو پراثر انداز ہوتے ہیں؟
(A) سبسٹریٹ (B) پراڈکٹس (C) اینہیٹر (D) ایکٹیوئٹر
- 5- اینزائم کی سرگرمی کیسے بدلتی ہے؟
(A) درجہ حرارت بڑھانے سے
(B) سبسٹریٹ بڑھانے سے
(C) اینہیٹر بڑھانے سے
(D) A اور B دونوں سے

نہایت

1- (D)	2- (D)	3- (A)	4- (A)	5- (D)
--------	--------	--------	--------	--------

مختصر تہذیبی نئی امتحانی تکنیکس (Knowledge, Understanding, Application, Analytical & Conceptual) کی روشنی میں مرتب کیے گئے مختصر جوابی سوالات

7.1	میتابولزم (Metabolism)
7.2	اینزائمز (Enzymes)
7.3	اینزائمز کے کام کرنے کا طریقہ (Mechanism of Enzyme Action)

☆ مختصر جواب دیں۔

- 1- میتابولزم کیا ہے اور اس کی اقسام کونسی ہیں؟
جواب: اقسام: جانداروں میں زندگی برقرار رکھنے کے لیے ہونے والے کیمیائی ری ایکشنز کو مجموعی طور پر میتابولزم کہتے ہیں۔
میتابولزم کی دو اقسام ہیں۔ 1- کیا بولزم 2- اینابولزم
- 2- اینزائمز کی تعریف لکھیں۔
جواب: اینزائمز بائیولوجیکل کاتالیسٹ ہیں جو جانداروں میں کیمیائی ری ایکشنز کو تیز کرتے ہیں۔ اینزائمز کیمیائی طور پر پروٹینز ہوتے ہیں۔
- 3- اینزائمز کی تعریف لکھیں اور دو مثالیں دیں۔
جواب: اینابولزم میں سادہ مالیکیوں کو پیچیدہ مالیکیوں میں تبدیل کرتے ہیں۔

ان ری ایکشنز میں ازجی خرچ ہوتی ہے۔

مثلاً: (i) فونٹوسٹیسیز (ii) پروٹین کی تیاری

4- لیولائکس سے کیا مراد ہے؟

جواب: لیولائکس جس میں لپڈز (چربی) کو فیٹی ایسڈ اور گلیسرول میں توڑا جاتا ہے، جنہیں بعد میں توانائی حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔

5- کوئی سے دو اینزائمز کے نام لکھیں۔

جواب: اینزائمز میں رائبوفلیون اور تھامین شامل ہیں۔

6- رائبوزائٹم سے کیا مراد ہے اور یہ کہاں پائے جاتے ہیں؟

جواب: کچھ آراین اے مالیکیوں میں بھی اینزائمز کے طور پر کام کرتے ہیں۔ اس طرح کے آراین اے کو رائبوزائٹم کہتے ہیں۔ رائبوزائٹم اینزائمز بنیادی طور پر رائبوسوم میں پائے جاتے ہیں۔ وہ مخصوص وائرس اور بیکٹیریا میں بھی پائے جاتے ہیں۔

7- اینزائمز کی گلوبل ساخت کی وضاحت کریں۔

جواب: اینزائمز ایک تین جہتی (3-dimensional) گلوبل ساخت رکھتے ہیں۔ اس ساخت کی وجہ سے اینزائمز میں ایکٹو سائٹس ہوتی ہیں جو مخصوص سبسٹریٹس کے ساتھ جڑ سکتی ہیں۔

8- کام کرنے کی بنیاد پر اینزائمز کو کتنے اور کون سے گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے؟

جواب: کام کرنے کے مقام کی بنیاد پر اینزائمز کو دو گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

(i) انٹرسلولر (ii) ایکسٹراسلولر

9- انٹرسلولر اور ایکسٹراسلولر کے درمیان فرق کریں۔

جواب: انٹرسلولر اینزائمز: انٹرسلولر اینزائمز سیل کے اندر ہی کام کرتے ہیں۔

مثلاً: سیلولر ریپیریشن کے اینزائمز۔

ایکسٹراسلولر اینزائمز: ایکسٹراسلولر اینزائمز سیل سے باہر خارج کیے جاتے ہیں جہاں وہ ری ایکشنز کو کھینچ لائے جاتے ہیں۔

مثلاً: دو اینزائمز جو معدے کی دیواروں کے سیلز سے معدے کی کیوبی میں خارج کیے جاتے ہیں جہاں وہ خوراک کی ذراتی چھین کرتے ہیں۔

10- کوئیٹریک کی تعریف لکھیں۔

جواب: بہت سے اینزائمز کو مکمل طور پر فعال ہونے کے لیے اضافی نان پروٹین / غیر پروٹین (non-protein) مالیکیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے غیر پروٹین مالیکیوں کو کوئیٹریک کہلاتے ہیں۔

11- پراسٹیمک گروپ اور کو-اینزائمز کے درمیان فرق کریں۔

جواب: پراسٹیمک گروپ: ایسے آرگنک کو-فیکٹرز جو اینزائمز کے ساتھ مضبوطی سے جڑے ہوتے ہیں۔ پراسٹیمک گروپ کہلاتے ہیں۔

کو-اینزائمز: ایسے آرگنک کو-فیکٹرز جو اینزائمز کے ساتھ کمزور جڑ جاتے ہیں۔ کو-اینزائمز کہلاتے ہیں۔ مثلاً چند وٹامنز (بائیوٹن) اور ایم گروپ

مثلاً: نیوکلیوٹائیڈز (این اے ڈی NAD اور این اے ڈی پی NADP) اور بہت سے وٹامنز۔

12- فوڈ ایڈیٹو میں اینزائمز کا استعمال لکھیں۔

جواب: شارچ کو سادہ شکر میں توڑنے والے اینزائمز سفید روٹی، بن اور وٹار کرنے میں استعمال ہوتے ہیں۔ میٹیر کی پیداوار کے لیے بھی اینزائمز کا استعمال کیا جاتا ہے۔

13- کپڑوں پر لگے پروٹینز کے دھبے اتارنے کے لیے کون سا اینزائمز استعمال کیا جاتا ہے؟

جواب: پروٹی اینزائمز اینزائمز کپڑوں پر لگے پروٹینز کے دھبے اتارنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔

14- فرمیشن انڈسٹری میں اینزائمز کیسے استعمال ہوتے ہیں؟

جواب: فرمیشن انڈسٹری میں اینزائمز سٹارچ اور پروٹین کو توڑ کر سادہ شوگر، امائنو ایسڈ اور پیپٹائڈز بناتے ہیں۔ مائیکرو آرگنزمز مثلاً بیسٹ ان مادل کو فرمیشن میں استعمال کرتے ہیں اور انسانی استعمال کی مختلف مصنوعات تیار کرتے ہیں۔

15- اینزائمز کے کام کرنے کے طریقے کی وضاحت کے لیے کون سے دو ماڈل تجویز کیے گئے؟

جواب: اینزائمز کے کام کرنے کے طریقے کی وضاحت کے لیے دو ماڈل تجویز کیے گئے: (i) لاک اینڈ کی ماڈل (ii) انڈیوسڈ فٹ ماڈل

16- ایکٹوسائٹ اور سسٹرٹ میں فرق لکھیے۔

جواب: ایکٹوسائٹ: اینزائمز کے مالکیول کا چھوٹا حصہ ہے جو لائسنز میں شامل ہوتا ہے۔ اس حصہ کو ایکٹوسائٹ کہتے ہیں۔

سسٹرٹ: وہ مالکیول جن پر اینزائمز عمل کرتے ہیں سسٹرٹ کہلاتے ہیں۔

17- لاک اینڈ کی ماڈل کی وضاحت کریں۔

جواب: جرمن کیمسٹ ایمل فشر نے 1894 میں لاک اینڈ کی ماڈل پیش کیا۔ لاک اینڈ کی ماڈل کے مطابق اینزائمز اور سسٹرٹ دونوں کی اشکال مخصوص ہوتی ہیں اور دونوں ایک دوسرے میں مکمل فٹ ہوتے ہیں۔

18- اینزائمز سسٹرٹ (ES) کمپلیکس کیسے بنتا ہے؟

جواب: جب ایک اینزائمز سسٹرٹ کے ساتھ جڑتا ہے تو ایک عارضی اینزائمز سسٹرٹ کمپلیکس بنتا ہے۔ اس کے بعد اینزائمز ری ایکشن کی کینالائزیشن کرتا ہے اور سسٹرٹ پر ڈاکٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔



19- اینزائمز کے کونے خواص ہیں جو اسے سسٹرٹ کے لیے مخصوص بناتے ہیں؟

جواب: اینزائمز کا مخصوص ہونا اس کی ایکٹوسائٹس کی شکل پر بھی منحصر ہے۔ ایکٹوسائٹس کی مخصوص جیومیٹرکل اشکال ہوتی ہیں جو مخصوص سسٹرٹ کے ساتھ ہی جڑتی ہیں یا فٹ ہوتی ہیں۔

20- سسٹرٹ اور پر ڈاکٹ میں فرق لکھیں۔

جواب: سسٹرٹ: وہ مالکیول جن پر اینزائمز عمل کرتے ہیں سسٹرٹ کہلاتے ہیں۔

پر ڈاکٹس: ایسی اشیاء جو اینزائمز کے ری ایکشن کے نتیجے میں بنتی ہیں پر ڈاکٹس کہلاتے ہیں۔

21- انڈیوسڈ فٹ ماڈل، لاک اینڈ کی ماڈل سے زیادہ قابل قبول کیوں ہے؟

جواب: انڈیوسڈ فٹ ماڈل لاک اینڈ کی ماڈل کی نسبت زیادہ قابل قبول ہے کیونکہ ڈیٹیل کو خلیڈ کے مطابق اینزائمز پلک دار اجسام ہیں ان کی ایکٹوسائٹ جب سسٹرٹ سے ملتی ہے تو اپنی جگہ تبدیل کر لیتی ہے۔ اس ماڈل کی رو سے ایکٹوسائٹ کو بے پلک ساخت نہیں ہے بلکہ اپنے کام کو کرنے کے لیے یہ مناسب اور درست حالت میں ڈھل جاتی ہے۔

22- انڈیوسڈ فٹ ماڈل کب اور کس نے پیش کیا؟

جواب: 1958ء میں ایک امریکی بائیولوجسٹ ڈیٹیل کو خلیڈ نے انڈیوسڈ فٹ ماڈل پیش کیا۔

7.4 اینزائمز کے کام پر اثر انداز ہونے والے عوامل (Factors that Affect The Activity of Enzymes)

7.5 اینزائمز کی مزاحمت (Enzyme Inhibition)

23- نمبر پچر کا اینزائمز ایکشن کی رفتار پر کیا اثر ہے؟

جواب: ہیرائزائمز مخصوص نمبر پچر پر تیز رفتار کے ساتھ کام کرتا ہے اسے آکٹیم نمبر پچر کہتے ہیں۔ جب نمبر پچر کسی حد تک بڑھتا ہے تو حرارت ایکٹیویشن انرجی میں اضافہ کرتی ہے اور کالائی نیک انرجی فراہم کرتی ہے جس کی وجہ سے رییکشن کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔

24- کونے عوامل اینزائمز کی سرگرمی کو متاثر کرتے ہیں؟

جواب: اینزائمز کی سرگرمی کو متاثر کرنے والے عوامل درج ذیل ہیں:

(i) نمبر پچر (ii) pH (iii) سسٹرٹ کی مقدار

25- انسانی جسم میں اینزائمز کا آکٹیم نمبر پچر کیا ہے؟

جواب: انسانی جسم میں اینزائمز کا آکٹیم نمبر پچر 37°C ہے۔

26- اینزائمز کے ڈی نمبر ہونے سے کیا مراد ہے؟

جواب: نمبر پچر کے بڑھنے سے اینزائمز کا ری ایکشن ریت بڑھ جاتا ہے مگر ایک مخصوص ریج کے بعد اگر نمبر پچر کو مزید بڑھایا جائے تو اینزیم کی واہریشن زیادہ ہو جاتی ہے جو اینزائمز کے گلوبلر سٹرکچر کو ختم کر دیتا ہے اس کو اینزائمز کا ڈی نمبر ہونا کہتے ہیں۔

27- آکٹیم pH کیا ہے؟ ایک مثال دیں۔

جواب: تمام اینزائمز ایک خاص pH پر زیادہ تیزی سے کام کرتے ہیں جس کو آکٹیم pH کہتے ہیں۔

مثال کے طور پر پیپسن اینزائمز (معدہ میں کام کرنے والا) کم pH (یعنی 20 سے 1.5) تیز ابلی میڈیم میں کام کرتا ہے۔

28- سسٹرٹ کنسنٹریشن کیسے اینزائمز کی سرگرمی کو متاثر کرتی ہے؟

جواب: سسٹرٹ کی مقدار میں اضافہ ری ایکشن کی رفتار کو بڑھاتا ہے۔ سسٹرٹ کی مقدار ایک حد سے زیادہ ہونے پر اینزائمز کی تمام ایکٹوسائٹس بڑھ جاتی ہیں۔ ایسی صورت میں سسٹرٹ کے مزید مالکیولز کو آزاد ایکٹوسائٹس نہیں ملتیں۔ اس حالت کو ایکٹوسائٹس کی پچریشن کہتے ہیں اور اس دوران ری ایکشن کی رفتار مزید نہیں بڑھتی۔

29- انہیٹر کا کیا کام ہے؟

جواب: انہیٹر زائیزائٹس کی ایلی فینسی کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتے ہیں۔

30- پیپسن اور ٹریپسن کونے میڈیم میں کام کرتے ہیں؟

جواب: پیپسن اینزائمز ایک میڈیم (pH 1.5 to 2.0) میں کام کرتا ہے جبکہ ٹریپسن اینزائمز ایکٹوٹن میڈیم (pH 7 to 8) میں کام کرتا ہے۔

31- اینزائمز کی رکاوٹ یا مزاحمت سے کیا مراد ہے؟

جواب: کچھ مادے جنہیں اینزائمز کے انہیٹر زائیزائٹس کہتے ہیں۔ اینزائمز سے جڑ جاتے ہیں اور اس کی سرگرمی کو کم کر دیتے ہیں۔ اس عمل کو اینزائمز کی رکاوٹ یا مزاحمت کہتے ہیں۔

مختصر جوابی کنسپیکٹوئل (Conceptual) سوالات

☆ مختصر جواب دیں۔

1- اینزائمز ہارمونز سے کس طرح مختلف ہیں؟

جواب: اینزائمز بائیولوجیکل کیمیا لیس ہیں جو کیمیکل ری ایکشنز کی رفتار کو تیز کرتے ہیں، جبکہ ہارمونز کیمیکل میسجرز ہیں جو مختلف جسمانی اعمال کو منظم کرتے ہیں۔

2- اگر سسٹرٹ ایکٹوسائٹ کی بجائے اینزائمز پر کسی دوسرے مقام سے جڑ جائے تو کیا ہوتا ہے؟

جواب: اگر سسٹرٹ اینزائمز پر کسی دوسرے مقام سے جڑ جائے تو یہ اینزائمز کی شکل اور ایکٹوسائٹ کی شکل کو بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ اس طرح یہ تبدیل شدہ ایکٹوسائٹ سسٹرٹ کے مطابق نہیں ہوتی اور اینزائمز کام کرنا ترک جاتا ہے۔

3- اینزائمز کی ساخت میں تبدیلی کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟

جواب: اینزائمز کی ساخت میں تبدیلی سے ان کی فعالیت متاثر ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک اینزائمز کی ایکٹوسائٹ تبدیل ہو جائے تو وہ اپنے سسٹرٹ سے نہیں جڑ پائے گا اور پروڈکٹ نہیں بنے گا۔ یہ بیماریوں کی وجہ بھی بن سکتا ہے۔

4- اگر جسم میں اینزائم کی مقدار کم ہو جائے تو ڈائجسٹو سسٹم پر کیا اثر پڑے گا؟
جواب: اگر جسم میں اینزائم کی مقدار کم ہو جائے تو ڈائجسٹو سسٹم سے ہو جانے والا مکمل طور پر رک بھی سکتا ہے۔ اس سے بد ہضمی، گیس اور دیگر مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔

5- اینزائم کو میڈیٹن میں کیسے استعمال کیا جاتا ہے؟
جواب: اینزائم کو دوا سازی میں بھی استعمال کیا جاسکتا ہے جیسے کرائیو بائیوٹیکس۔ کچھ اینٹی بائیوٹیکس یا کچھ اینزائمز کو روک کر کام کرتے ہیں کچھ دردمک کرنے والی دوائیں بھی اینزائمز کو روک کر سوزش کو کم کرتی ہیں۔

بخار اہم نکات

- جانداروں میں ہونے والے بائیو کیمیکل ری ایکشنز کو مینا بولزم کہتے ہیں۔
- اینا بولزم میں چھوٹے مالیکیوز لزل کر بڑے مالیکیوز بناتے ہیں۔ کچھ بولزم میں بڑے مالیکیوز کو چھوٹے مالیکیوز میں توڑا جاتا ہے۔
- اینزائم ایسی پروٹین ہیں جو بائیو کیمیکل ری ایکشنز کو تھک کرتی ہیں (یعنی تیز کرتی ہیں)۔
- اینزائمز ری ایکشن کے لیے اور سبستر کے لیے مخصوص ہوتے ہیں۔
- اینزائمز ری ایکشن کے اندر کام کرتے ہیں جیسے سیلر۔ سپریشن کے اینزائمز۔
- ایکسٹرا سیلر اینزائمز ری ایکشن کو تیز کرنے کے لیے سیلز سے باہر خارج ہوتے ہیں جیسے معدے کی cavity میں کام کرنے والے اینزائمز جو خوراک کو ڈائیجسٹ کرتے ہیں۔
- کو- فیکٹرز ایسے غیر پروٹین مالیکیوز ہیں جن کی اینزائمز کو مکمل طور پر فعال ہونے کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔
- غیر تاسیاتی کو- فیکٹرز میں دھاتوں کے آئن شامل ہیں جیسے آئرن اور میگنیشیم آئنز۔
- تاسیاتی کو- فیکٹرز کی دو اقسام ہیں۔
- پروٹھیک گروپس ایسے تاسیاتی کو- فیکٹرز ہیں جو اینزائمز کے ساتھ مضبوطی سے جڑ جاتے ہیں، جیسے کچھ وٹامنز (مثلاً بائیوٹن) اور ایم گروپ۔
- کو- اینزائمز ایسے تاسیاتی کو- فیکٹرز ہیں جو اینزائمز کے ساتھ ہلکے سے جڑتے ہیں، جیسے کئی وٹامنز اور نیوکلیوٹائیڈز (NAD اور NADP)۔
- اینزائمز آکسجین ٹرانسپورٹ پر pH پر اپنی زیادہ سے زیادہ رفتار پر کام کرتے ہیں۔
- اینزائمز ہائڈرولک کاؤہ حصہ جو کھلا لائس کر داتا ہے، ایکٹو سائٹ کہلاتا ہے۔
- لاک اینڈ کی ماڈل کے مطابق، اینزائم کی ایکٹو سائٹ کی ساخت مستقل ہوتی ہے۔
- انڈیوسڈ فٹ ماڈل کے مطابق، جب سبستر اینزائم کے ساتھ تعامل کرتا ہے تو اینزائم کی ایکٹو سائٹ کی ساخت بدل جاتی ہے تاکہ وہ اپنا کام انجام دے سکے۔
- اینزائمز کے حرا م مادے ہیں جو اس کا کام میں مداخلت کرتے ہیں اور اسے روک دیتے ہیں۔
- مسابقتی حرا م سبستر سے مشابہت رکھتے ہیں۔ یہ اینزائم کی ایکٹو سائٹ کے لیے سبستر کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔
- مثالیں: اینٹی بائیوٹیکس ہیں۔

حل مشقی سوالات

- A- درج ذیل سوالات کے لیے درست جوابات منتخب کریں۔
- 1- بنیادی طور پر، تمام اینزائمز ہیں:
- (الف) نیوکلیک ایسڈ (ب) پروٹین (ج) کاربوہائیڈریٹ (د) لیڈز

2- کون سا بیان اینزائمز کی بہترین تعریف کرتا ہے؟

- (الف) ایک کیمیکل جو خوراک کو توڑ دیتا ہے۔
(ب) ایک ہارمون جو مینا بولزم کو منظم کرتا ہے۔
(ج) ایک پروٹین جو ری ایکشن کو تیز کرتی ہے۔
(د) ایک مالیکیول جو توانائی ذخیرہ کرتا ہے۔

3- کیا ہو سکتا ہے اگر ایک اینزائم کو ایسے ٹیمرچر کا سامنا کرنا پڑے جو اس کے آکسجین ٹیمرچر سے زیادہ ہو؟

- (الف) اینزائم کے کام کی رفتار میں اضافہ ہوگا
(ب) اینزائم کی شکل تبدیل ہو جائے گی جو مکمل طور پر اس کی سرگرمی کو کم کر دے گی
(ج) اینزائم ری ایکشن کو تیز کرے گا اور مستحکم رہے گا
(د) اینزائم خود ایک سبستر بن جائے گا

4- اینزائم اپنے عمل میں مخصوص ہیں کیونکہ:

- (الف) ان کی ایکٹو سائٹس مخصوص سبستر کے ساتھ مناسبت رکھتی ہیں۔
(ب) وہ ہمیشہ پروٹین ہیں۔
(ج) وہ ری ایکشن میں استعمال ہو جاتے ہیں۔
(د) وہ صرف زیادہ ٹیمرچر پر کام کرتے ہیں۔

5- پراسٹھیک گروپس کے بارے کیا درست ہے؟

- (الف) تمام اینزائمز کے لیے ضروری ہیں
(ب) فطرت میں پروٹین ہیں
(ج) اینزائمز کے ساتھ ڈیپٹھیک طور پر جڑتے ہیں
(د) اینزائم سے مضبوطی سے جڑتے ہیں

6- ٹیمرچر میں اضافہ اینزائم کی سرگرمی کو کس طرح متاثر کرتا ہے؟

- (الف) اینزائم کے کام کی رفتار کو ایک حد تک بڑھاتا ہے
(ب) کام کی رفتار کو ہمیشہ کم کرتا ہے
(ج) اینزائمز کو غیر فعال بناتا ہے
(د) اینزائم پر کوئی اثر نہیں ڈالتا

7- مسابقتی حرا م اینزائم کے کام پر کس طرح اثر ڈالتا ہے؟

- (الف) سبستر کے ساتھ جڑ جاتا ہے
(ب) اینزائم کی شکل تبدیل کرتا ہے
(ج) ایکٹو سائٹ کے ساتھ جڑ کر اسے بلاک کرتا ہے
(د) کو- فیکٹرز کو بلاک کرتا ہے

8- ایک اینزائم 7.4 pH پر بہترین کام کرتا ہے۔ اسے 4.0 pH والے تیزابی محلول میں رکھا جاتا ہے۔ یہ قدیم اینزائم کو کس طرح متاثر کرے گا؟

- (الف) ایکٹو سائٹ میں تبدیلی آجائے گی جس سے سبستر کے ساتھ جڑنا کم ہو جائے گا۔
(ب) ہائڈروجن آئنز میں اضافے کی وجہ سے اینزائم ری ایکشن کو زیادہ تیز کر دے گا۔

(ج) اینزائم اضافی ایکٹو سائٹس حاصل کرے گا۔

(د) تیزابی ماحول میں سبستر غیر فعال ہو جائے گا۔

9- انڈیوسڈ فٹ ماڈل کے مطابق کیا درست ہے؟

- (الف) اینزائم کی ایکٹو سائٹ میں تبدیلی آتی ہے تاکہ سبستر سے جڑ سکے۔
(ب) ایکٹو سائٹ سے جڑنے کے لیے سبستر اپنی شکل تبدیل کرتا ہے۔

(ج) ایکٹو سائٹ یا سبستر میں شکل میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔

(د) سبستر اینزائم کے ساتھ ایکٹو سائٹ کے علاوہ کسی اور مقام سے جڑتا ہے۔

- 10- ذیلی صسٹوسٹم کے مندرجہ ذیل اینزائمز کی آٹھم pH کے بارے میں کیا درست ہے؟
 (الف) پتپسن کم pH پر کام کرتا ہے جبکہ ٹریپسن زیادہ pH پر کام کرتا ہے۔
 (ب) دونوں زیادہ pH پر کام کرتے ہیں۔
 (ج) دونوں کم pH پر کام کرتے ہیں۔
 (د) پتپسن زیادہ pH پر کام کرتا ہے جبکہ ٹریپسن کم pH پر کام کرتا ہے۔

جوابات

1- (ب)	2- (ج)	3- (ب)	4- (الف)	5- (د)	6- (الف)	7- (ج)	8- (الف)	9- (الف)	10- (الف)
--------	--------	--------	----------	--------	----------	--------	----------	----------	-----------

B- مختصر جوابات لکھیں۔

- 1- مینابولزم کی تعریف لکھیں۔ کیا بولزم اور اینابولزم کے درمیان فرق کریں۔
 جواب: مینابولزم: جانداروں میں زندگی برقرار رکھنے کے لیے ہونے والے کیمیائی ری ایکشنز کو مجموعی طور پر مینابولزم کہتے ہیں۔
 کیا بولزم اور اینابولزم میں فرق:
 کیا بولزم: کیا بولزم میں پیچیدہ مالیکیولز کو سادہ میں توڑا جاتا ہے۔ ان ری ایکشنز میں انرجی خارج ہوتی ہے۔ مثلاً سیلولر ریسیاریشن۔
 اینابولزم: اینابولزم میں سادہ مالیکیولز سے پیچیدہ مالیکیولز بنائے جاتے ہیں۔ ان ری ایکشنز میں انرجی خرچ ہوتی ہے۔ مثلاً فوٹو سنتھیسز۔
 کس قسم کا مینابولزم توانائی کا مطالبہ کرتا ہے؟ ایک مثال دیں۔
 جواب: اینابولزم مینابولزم کی وہ قسم ہے جس میں انرجی خرچ ہوتی ہے۔
 مثال: فوٹو سنتھیسز میں سورج کی روشنی کا استعمال کرتے ہوئے کاربن ڈائی آکسائیڈ اور پانی کو ملا کر گلوکز تیار کیا جاتا ہے۔ اس ری ایکشن میں آکسیجن ایک بائی پروڈکٹ کے طور پر پیدا ہوتی ہے۔
 3- اینزائم کی تعریف لکھیں۔ مینابولزم میں اس کا کیا کردار ہے؟
 جواب: اینزائمز: اینزائمز بائیو کیمیکل کیلاسٹ ہیں جو جانداروں میں کیمیائی ری ایکشنز کو تیز کرتے ہیں۔
 مینابولزم میں اینزائمز کا کردار: اینزائمز مینابولزم کو تیز کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر لیپو لائسس، اس میں لیپڈز (چربی) کو فاسفی ایسڈ اور گلیسرول میں توڑا جاتا ہے، جنہیں بعد میں انرجی حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔
 4- اینزائم کی ایکٹو سائٹ کیا ہے؟ اینزائم کے مخصوص ہونے میں اس کی اہمیت بیان کریں۔
 جواب: ایکٹو سائٹ: ایکٹو سائٹ اینزائمز کے مالیکیول کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو کیا لائٹسز میں شامل ہوتا ہے۔
 اہمیت: اینزائم کی ایکٹو سائٹ اینزائم کے مخصوص ہونے میں اہم ہے کیونکہ یہ اینزائم کا وہ حصہ ہے جو ایک مخصوص سبسٹریٹ سے جڑتا ہے اور کیمیائی ری ایکشن کو تیز کرتا ہے۔
 5- مخصوص اینزائم۔ سبسٹریٹ جوڑے کی ایک مثال دیں۔
 جواب: مخصوص اینزائم سبسٹریٹ جوڑے کی مثال:
 • لائیپاز چربی کو آٹھم کرنے میں مدد کرتا ہے۔
 • ٹریپسن پروٹین کو امینو ایسڈ میں تبدیل کرتا ہے۔
 6- اینزائم کی سرگرمی پر سبسٹریٹ کی مقدار کا کیا اثر ہوتا ہے؟
 جواب: سبسٹریٹ کی مقدار میں اضافہ ری ایکشن کی رفتار کو بڑھاتا ہے۔ سبسٹریٹ کی مقدار ایک حد سے زیادہ ہونے پر اینزائمز کی تمام ایکٹو سائٹس بھرتی ہو جاتی ہیں۔ ایسی صورت میں سبسٹریٹ کے مزید مالیکیولز کو آزاد ایکٹو سائٹس نہیں ملتیں۔ اس حالت کو ایکٹو سائٹس کی پوریشن کہتے ہیں اور اس دوران ری ایکشن کی رفتار مزید نہیں بڑھتی۔



- 7- اینزائمز کی دو مثالیں دیں جو مخصوص pH پر بہتر طریقے سے کام کرتے ہیں۔
 جواب: مندرجہ ذیل اینزائمز مخصوص pH پر بہتر کام کرتے ہیں۔
 • معدہ میں کام کرنے والا پتپسن اینزائم ایسڈک میڈیم (pH 1.5 to 2.0) میں کام کرتا ہے۔
 • سال انتھائٹس میں کام کرنے والا ٹریپسن اینزائم الکلکائیڈ میڈیم (pH 7 to 8) میں کام کرتا ہے۔
 8- آٹھم ٹریپسز اور pH سے کیا مراد ہے؟
 جواب: آٹھم ٹریپسز: ایک مخصوص درجہ حرارت ہے جس پر ہر اینزائم زیادہ سے زیادہ کام کرتا ہے۔ زیادہ تر انسانی اینزائمز کے لیے آٹھم ٹریپسز 37°C ہے۔
 آٹھم pH: ایک مخصوص pH جس پر ہر اینزائم زیادہ سے زیادہ کام کرتا ہے۔
 مثلاً: پتپسن کے لیے آٹھم pH 1.5 سے 2 ہے۔
 9- اینزائمز کے کس قسم کے مزاجم ایکٹو سائٹ سے جوڑے بغیر مزاحمت پیدا کرتے ہیں؟
 جواب: غیر مسابقتی مزاجم اینزائم کی ایکٹو سائٹ سے نہیں جڑتے۔ اس کے بجائے وہ اینزائم کے کسی دوسرے مقام پر جو جاتے ہیں۔ یہ عمل اینزائم کی مجموعی شکل کے ساتھ ساتھ اس کی ایکٹو سائٹ کی شکل بھی تبدیل کر دیتا ہے۔
 10- مسابقتی اور غیر مسابقتی مزاحمت کے درمیان فرق کریں۔
 جواب: مسابقتی: اینزائمز کے کچھ مزاجم مالیکیول سبسٹریٹ سے مماثلت رکھتے ہیں۔ ایسے مزاجم اینزائم کی ایکٹو سائٹ سے جڑنے کے لیے سبسٹریٹ کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ جب مزاجم مالیکیول ایکٹو سائٹ سے جڑ جاتا ہے تو وہ اسے بلاک کر دیتا ہے۔ اس طرح سبسٹریٹ ایکٹو سائٹ سے نہیں جڑ سکتا۔
 مثلاً: اینٹی بائیوٹکس۔
 غیر مسابقتی مزاحمت: اینزائمز کے کچھ مزاجم مالیکیول سبسٹریٹ سے مماثلت نہیں رکھتے۔ وہ اینزائم کی ایکٹو سائٹ سے نہیں جڑتے۔ اس کی بجائے وہ اینزائم کے کسی دوسرے مقام پر جڑ جاتے ہیں۔ یہ عمل اینزائم کی مجموعی شکل کے ساتھ ساتھ اس کی ایکٹو سائٹ کی شکل بھی تبدیل کر دیتا ہے۔
 مثلاً: مرکری اور کینسر تھراپی میں استعمال ہونے والی کچھ ادویات۔
 C- تفصیلی جوابات لکھیں۔
 1- اینزائمز کی خصوصیات بیان کریں۔
 جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال 2
 2- بیان کریں کہ ٹریپسز کی انتہا کس طرح اینزائم کی سرگرمی کو روکتی ہے اور اینزائم کی ڈی نیچریشن کا باعث بنتی ہے؟
 جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال 5
 3- اینزائم کی سرگرمی کو pH کس طرح متاثر کرتی ہے؟
 جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال 5
 4- اینزائمز کی سرگرمی کو متاثر کرنے والے عوامل بیان کریں۔
 جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال 5
 5- اینزائم ایکشن کے لاک اینڈ کی اور انڈر لوسٹ فٹ ماڈل کا موازنہ کریں۔
 جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال 4

باب 8

بائیوانرژٹکس

Bioenergetics

یہ باب پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہوں گے کہ:

- آکسیڈیشن، ریڈکشن ری ایکشنز کی اہمیت بیان کریں۔
- اے ٹی پی کو ایک مالیکیول کے طور پر بیان کریں جو تمام سٹز کے لیے توانائی کی اہم کرنی ہے۔
- فونٹکھی سڑک کا عمل بیان کریں۔
- کلوروپلاسٹ میں پائے جانے والے کلوروفل کے کردار کو بیان کریں۔
- فونٹکھی سڑک کی مساوات (الفاظ یا علامتوں میں) لکھیں۔
- ریسیریشن کا عمل بیان کریں۔
- این اے رو بک ریسیریشن کی وضاحت کریں اور اس کی اہمیت بیان کریں۔
- ایرو بک ریسیریشن کی مساوات (الفاظ یا علامتوں میں) بیان کریں۔
- حاصل کردہ توانائی کی مقدار کے حوالے سے ایرو بک اور این اے رو بک ریسیریشن کا موازنہ کریں۔
- جسم میں ریسیریشن سے حاصل کردہ توانائی استعمال کرنے کے طریقوں کی فہرست بنائیں۔
- ریسیریشن اور فونٹکھی سڑک کا موازنہ کریں۔

انشائی طرز سوالات

مختصر قسم کی نئی امتحانی تکنیکس (Knowledge, Understanding, Application, Analytical & Conceptual) کی روشنی میں مرتب کیے گئے انشائی طرز سوالات

سوال 1: بائیوانرژٹکس سے کیا مراد ہے؟

جواب: بائیوانرژٹکس جانداروں میں توانائی کی ایسی تبدیلیوں کا مطالعہ ہے۔ جاندار بنیادی طور پر توانائی اپنے ماحول سے حاصل کرتے ہیں۔ پودے فونٹکھی سڑک کے دوران سورج کی روشنی کو جذب کرتے ہیں۔ جانور اور دیگر جاندار خوراک کھاتے ہیں۔ اس توانائی کو قابل استعمال کیسیائی توانائی میں تبدیل کیا جاتا ہے اور پھر اے ٹی پی (Adenosine triphosphate) جیسے مالیکیولز میں ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ سٹز کو جب بھی نشوونما، نقل و حرکت، مرمت اور سپروڈکشن جیسے افعال کے لیے توانائی کی ضرورت ہو تو وہ اے ٹی پی کو استعمال کرتے ہیں۔

سوال 2: آکسیڈیشن اور ریڈکشن ری ایکشنز کی اہمیت لکھیں۔


جواب: جانداروں کے مینابولزم کے لیے آکسیڈیشن، ریڈکشن یعنی ریڈوکس (redox) ری ایکشنز بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ ان ری ایکشنز میں مالیکیولز کے درمیان الیکٹرانز (electrons) کا تبادلہ ہوتا ہے۔ آکسیڈیشن میں مالیکیول سے الیکٹران نکلتے ہیں اور ریڈکشن میں مالیکیول الیکٹران حاصل کرتا ہے۔ الیکٹرانز کا یہ بہاؤ سیلولر ریسیریشن اور فونٹکھی سڑک جیسے ری ایکشنز میں بہت ضروری ہوتا ہے جب اے ٹی پی کی شکل میں توانائی پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔

8.1 اے ٹی پی: سیل کی توانائی کی کرنسی ATP: The Cell's Energy Currency


سوال 3: اے ٹی پی کو بطور مالیکیول بیان کریں جو تمام سٹز کی توانائی کی اہم کرنی ہے۔

جواب: اے ٹی پی: سیل کی توانائی کی کرنسی (ATP: The Cell's Energy Currency):

سٹز اپنے ری ایکشنز کے لیے توانائی کی ایک خاص کرنسی استعمال کرتے ہیں۔ یہ کرنسی ایک نیوکلئوٹائیڈ ہے جسے ایڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ (اے ٹی پی) کہتے ہیں۔ جب سٹز توانائی ذخیرہ کرتے ہیں تو وہ اے ٹی پی بناتے ہیں۔ جب سٹز توانائی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اے ٹی پی کو توڑ دیتے ہیں۔ اے ٹی پی مالیکیول کے تین ذیلی حصے ہوتے ہیں یعنی ایڈینین (adenine) جو نائٹروجن رکھنے والی ایک بیس (base) ہے، رائبوز (ribose) جو پانچ کاربن والی ایک شوگر ہے اور: تین فاسفیٹ گروپس۔




اے ٹی پی کے مالیکیول کی ساخت




اے ٹی پی کے مالیکیول میں دو فاسفیٹ کے درمیان کووولیٹن (covalent) بانڈز میں توانائی ہوتی ہے یعنی یہ ہائی ٹرنجی (high energy) ہوتے ہیں۔ جب ان میں سے ایک بانڈ ٹوٹتا ہے تو ایک ان آرگینک فاسفیٹ (Pi) علیحدہ ہو جاتا ہے اور توانائی نکلتی ہے۔

فاسفیٹ کا ایک بانڈ ٹوٹنے سے ATP کے ایک مول (mole) سے تقریباً 7.3 کلوکیلوریز (kilocalories) یعنی 7300 کیلوکیلوریز توانائی نکلتی ہے۔



توانائی کے عمومی ری ایکشنز میں صرف بیرونی P-P ہائی انرجی بانڈ ہی توڑا جاتا ہے۔ ایسا ہونے پر ATP سے ADP یعنی ایڈینوسین ڈائی فاسفیٹ بن جاتا ہے اور ایک Pi خارج ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ADP کو AMP یعنی ایڈینوسین مونو فاسفیٹ اور Pi میں مزید توڑ دیا جاتا ہے۔



سٹز خوراک کی آکسیڈیشن سے انرجی حاصل کرتے ہیں۔ وہ اس انرجی سے ADP کو Pi کے ساتھ جوڑ کر ATP بناتے ہیں اور توانائی ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ انرجی خارج کرنے والے اعمال کے دوران ATP بنایا جاتا ہے اور اے ٹی پی کی خرچ کرنے والے اعمال کے دوران توڑا جاتا ہے۔ اس طرح اے ٹی پی مینابولزم کے ری ایکشنز کے مابین توانائی کا تبادلہ کرتا ہے۔

فوتوسنتھی سیز (Photosynthesis)

8.2

سوال 4: فوتوسنتھی سیز سے کیا مراد ہے؟ اس کا میکائزم لکھیں۔

جواب: فوتوسنتھی سیز (Photosynthesis): آؤٹراک جاندرا (پودے، الہی، کچھ بیکٹیریا) فوتوسنتھی سیز کے عمل میں آریٹک خام مال کو استعمال کر کے اپنی آریٹک خوراک تیار کر لیتے ہیں۔ یہ آریٹک خوراک کاربوہائیڈریٹس کی شکل میں ہوتی ہے۔ کاربوہائیڈریٹس کو توانائی حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ انھیں پروٹیز اور لپڈ وغیرہ میں بھی تبدیل کر لیا جاتا ہے۔

سورج کی روشنی اور کلوروفل کی موجودگی میں کاربن ڈائی آکسائیڈ اور پانی سے گلوکوز کی تیاری کے عمل کو فوتوسنتھی سیز کہتے ہیں۔ اس عمل میں آکسیجن ایک پراڈکٹ (by-product) کے طور پر بنتی ہے۔ یہ سب سے اہم میٹابولک عمل ہے اور تمام جانداروں کی زندگی اس پر انحصار کرتی ہے۔

فوتوسنتھی سیز کی میکائزم جنرل مساوات



پانی آکسیجن گلوکوز شش توانائی کاربن ڈائی آکسائیڈ

فوتوسنتھی سیز کا طریقہ (میکائزم) (Mechanism of Photosynthesis):


فوتوسنتھی سیز کے دو بڑے مراحل ہیں یعنی لائٹ (light) ری ایکشنز اور ڈارک (dark) ری ایکشنز۔ لائٹ ری ایکشنز کلوروپلاسٹ کی تھاکائوڈ (thylakoid) ممبرین پر ہوتے ہیں۔ ڈارک ری ایکشنز کلوروپلاسٹ کے سٹروما (stroma) میں ہوتے ہیں۔

1- لائٹ ری ایکشنز (Light Reactions): لائٹ ری ایکشنز میں سورج کی روشنی استعمال کر کے زیادہ توانائی والے یعنی ہائی انرجی مالیکولز (ATP اور NADPH) بنائے جاتے ہیں۔ لائٹ ری ایکشنز کے اہم اعمال مندرجہ ذیل ہیں۔

جب کلوروفل روشنی جذب کرتا ہے تو اس کے دو الیکٹران ہائی انرجی الیکٹران بن جاتے ہیں۔ زیادہ توانائی والے یہ الیکٹرانز کلوروفل مالیکول سے نکل جاتے ہیں۔

• زیادہ توانائی والے الیکٹرانز ایک الیکٹران ٹرانسپورٹ چین (electron transport chain) کو دے دیے جاتے ہیں۔ اس چین میں جب الیکٹرانز زیادہ توانائی کے لیول سے کم توانائی کے لیول کی طرف آتے ہیں تو ان میں سے توانائی نکلتی ہے۔ الیکٹرانز میں سے نکلنے والی اس توانائی کو ATP بنانے میں استعمال کر لیا جاتا ہے۔

• روشنی پانی کے ایک مالیکول کو بھی توڑتی ہے۔ آکسیجن خارج ہوتی ہے جبکہ ہائیڈروجن ایٹمز اپنے الیکٹرانز کلوروفل کو دے دیتے ہیں اور خود آکسیجن بن جاتے ہیں۔




• کلوروفل کے الیکٹرانز (ATP بنانے کے بعد) اور پانی کے ہائیڈروجن آکسز کو استعمال کر کے ایک کو-ایزائم NADP کی ریڈکشن کی جاتی ہے اور NADPH بنالیا جاتا ہے۔

2- ڈارک ری ایکشنز (کیلون سائیکل) (Dark Reactions (Calvin Cycle): اس مرحلے میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی ریڈکشن کر کے گلوکوز بنالیا جاتا ہے۔ ڈارک ری ایکشنز کی تفصیلات کو میلون کیلون (Malvin Calvin) نے دریافت کی تھیں۔ ڈارک ری ایکشنز کا خلاصہ مندرجہ ذیل ہے۔

• کاربن ڈائی آکسائیڈ کے مالیکولز کو پانچ (5) کاربن والے کمپاؤنڈ کے ساتھ ملایا جاتا ہے اور چھ (6) کاربن والے کمپاؤنڈ بنتے ہیں۔ ہر چھ (6) کاربن والا کمپاؤنڈ نوٹ کر تین (3) کاربن والے دو کمپاؤنڈ بنادیتا ہے۔

• تین (3) کاربن والے کمپاؤنڈ کی ریڈکشن کر کے تین (3) کاربن والے کاربوہائیڈریٹس بنائے جاتے ہیں۔ اس عمل کے لیے ATP کی توانائی اور NADPH کی ہائیڈروجن استعمال ہوتی ہے۔ تین (3) کاربن والے کاربوہائیڈریٹس سے گلوکوز بنالیا جاتا ہے۔

• تین (3) کاربن والے کاربوہائیڈریٹس کو استعمال کر کے آغاز میں استعمال ہونے والے پانچ (5) کاربن والے کمپاؤنڈز بھی دوبارہ بنالے جاتے ہیں۔ اس عمل میں بھی ATP استعمال ہوتے ہیں۔



فوتوسنتھی سیز کے ڈارک ری ایکشنز

سوال 5: فوتوسنتھی سیز میں کلوروفل کے کردار پر نوٹ لکھیں۔

جواب: کلوروفل اور روشنی کا کردار (Role of Chlorophyll and Light):

کلوروپلاسٹ کی تھاکائوڈ (thylakoid) ممبرین پر فوتوسنتھی سیز کے لیے ضروری پگمنٹس (pigments) موجود ہوتے ہیں۔ کلوروفل a اہم پگمنٹ ہے۔ دوسرے پگمنٹس معاون (accessory) پگمنٹس کہلاتے ہیں۔ کلوروفل b اور کیروٹینائڈز (carotenoids) اہم معاون پگمنٹس ہیں۔

پگمنٹس کا کردار: پگمنٹس سورج کی روشنی کو جذب کرتے ہیں اور فوتوسنتھی سیز کے لیے اسے کیمیائی توانائی (کیمیکل انرجی) میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ پتے کی سطح پر پڑنے والی کل روشنی میں سے صرف ایک (1) فیصد ہی جذب ہوتی ہے۔ باقی روشنی ریفلیکٹ (reflect) یا ٹرانسمٹ (transmit) ہو جاتی ہے۔ نیلی اور سرخ روشنی فوتوسنتھی سیز میں زیادہ استعمال ہوتی ہیں۔ مختلف پگمنٹ روشنی کی مختلف دیولینتھ (wavelengths) کو جذب کرتے ہیں۔ کلوروفل a نیلی اور سرخ دیولینتھ کو جذب کرتا ہے۔ کلوروفل b سے جذب ہونے والے دیولینتھ کو معاون پگمنٹ جذب کر لیتے ہیں۔

ATP کا بننا: جب ایک پگھلت روٹنی جذب کرتا ہے تو اس میں ری ایکشنز ہوتے ہیں اور اس کے الیکٹرانز نکل جاتے ہیں۔ یہ زیادہ توانائی والے یعنی بائی انرجی الیکٹرانز الیکٹران ٹرانسپورٹ چین سے گزرتے ہیں۔ اس دوران الیکٹرانز میں سے توانائی نکلتی ہے جسے ATP بنانے اور NADP کی NADPH میں ریڈکشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

سیلولر ریسیریشن (Cellular Respiration)

8.3

سوال 6: سیلولر ریسیریشن کیا ہے؟ اس کی اقسام کی وضاحت کریں۔

جواب: سیلولر ریسیریشن (Cellular Respiration): جاندار خوراک میں موجود C-H بائنڈز توڑ کر توانائی حاصل کرتے ہیں۔ اس مقدار کے لیے وہ اپنے ہائڈروجن میں خوراک کی آکسائیڈیشن کرتے ہیں۔ خوراک کی آکسائیڈیشن کو سیلولر ریسیریشن (cellular respiration) کہتے ہیں۔ ہائڈروجن میں توانائی حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ استعمال کی جانے والی خوراک گلوکوز ہے۔


ایروک اور این ایروک ریسیریشن (Aerobic and Anaerobic Respiration):

i. ایروک ریسیریشن (Aerobic Respiration): آکسیجن کی موجودگی میں ہونے والی سیلولر ریسیریشن کو ایروک ریسیریشن کہتے ہیں۔ یہ خوراک کی مکمل آکسائیڈیشن ہے جس میں زیادہ سے زیادہ توانائی حاصل ہوتی ہے۔ ایروک ریسیریشن کے پہلے مرحلے میں (6) کاربن والے گلوکوز کے ایک مالیکیول کو تین (3) کاربن والے پانی روک ایسڈ (pyruvic acid) کے دو مالیکیولز میں توڑا جاتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں پانی روک ایسڈ کے مالیکیولز کی مکمل آکسائیڈیشن کر دی جاتی ہے یعنی ان میں موجود تمام C-H بائنڈز توڑ دیے جاتے ہیں۔ اس طرح اس میں موجود تمام توانائی حاصل کر لی جاتی ہے۔

ii. این ایروک ریسیریشن (An Aerobic Respiration (Fermentation)) (فرمنٹیشن): آکسیجن کی غیر موجودگی میں ہونے والے سیلولر ریسیریشن کو این ایروک ریسیریشن کہتے ہیں۔ این ایروک ریسیریشن میں گلوکوز کی نامکمل آکسائیڈیشن ہوتی ہے۔ اس طرح اس میں سے کم توانائی حاصل ہوتی ہے۔ این ایروک ریسیریشن کا پہلا مرحلہ ایروک ریسیریشن جیسا ہی ہے۔ اس میں گلوکوز کا ایک مالیکیول پانی روک ایسڈ کے دو مالیکیولز میں توڑا جاتا ہے۔ لیکن این ایروک ریسیریشن میں دوسرا مرحلہ مختلف ہوتا ہے۔ یہاں پانی روک ایسڈ مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک ری ایکشن میں حصہ لیتا ہے۔


A- الکوحلک فرمنٹیشن (Alcoholic Fermentation): بیکٹیریا اور یسٹ (yeast) این ایروک ریسیریشن میں خوراک میں موجود بہت - وغیرہ میں ہونے والی این ایروک ریسیریشن میں پانی روک ایسڈ کو الکوحل (C₂H₅OH) اور C-H ٹوٹنے سے رہ جاتے ہیں۔

کاربن ڈائی آکسائیڈ میں مزید توڑ دیا جاتا ہے۔ اس طرح کی این ایروک ریسیریشن کو الکوحلک فرمنٹیشن کہتے ہیں۔



پانی روک ایسڈ الکوحل

B- لیکٹک ایسڈ فرمنٹیشن (Lactic Acid Fermentation): انسان اور دوسرے جانوروں کے سکلیٹل مسلز میں ہونے والی این ایروک ریسیریشن میں پانی روک ایسڈ کو لیکٹک ایسڈ (C₂H₆O₃) میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح کی این ایروک ریسیریشن کو لیکٹک ایسڈ فرمنٹیشن کہتے ہیں۔



پانی روک ایسڈ لیکٹک ایسڈ

سوال 7: فرمنٹیشن (این ایروک) ریسیریشن کی اہمیت بیان کریں۔

جواب: فرمنٹیشن (این ایروک) ریسیریشن کی اہمیت (Importance of Anaerobic Respiration): زندگی کے آغاز کے وقت زمینی ماحول میں آزاد آکسیجن (O₂) موجود نہیں تھی۔ شروع کے جاندار توانائی حاصل کرنے کے لیے این ایروک ریسیریشن کرتے تھے۔ حتیٰ کہ آج بھی چند جاندار مثلاً چند بیکٹیریا اور چند فنجائی این ایروک ریسیریشن سے ہی توانائی حاصل کرتے ہیں۔ ایسے جانداروں کو این ایروک (annerobes) کہتے ہیں۔ جب انسان کے سکلیٹل مسلز زیادہ کام کرتے ہیں (مثلاً ورزش کے دوران) تو آکسیجن کی فراہمی ضرورت کے مطابق پوری نہیں ہوتی۔ ایسی صورت حال میں سکلیٹل مسلز این ایروک ریسیریشن کرتے ہیں اور توانائی حاصل کرتے ہیں۔


سانسند انوں نے بیکٹیریا اور فنجائی میں ہونے والی فرمنٹیشن سے انسانی کے لیے مفید مصنوعات بنائی ہیں۔

مثالیں: مثال کے طور پر بیکٹیریا میں ہونے والی فرمنٹیشن سے پنیر (cheese) اور دہی بنایا جاتا ہے۔ پیسٹ میں ہونے والی فرمنٹیشن کو شراب سازی (brewing) اور بیکری کی صنعتوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک فنگس میں ہونے والی فرمنٹیشن سے سویا (soy) پودے کی چٹنی یعنی سویا ساس (soy sauce) بنائی جاتی ہے۔

سوال 8: ایروک ریسیریشن کے میکانزم کا خاکہ بنائیں۔

جواب: ایروک ریسیریشن کا طریقہ (میکانزم) (Mechanism of Aerobic Respiration): آکسیجن کی غیر موجودگی میں ہونے والی سیلولر ریسیریشن کو ایروک ریسیریشن کہتے ہیں۔ ایروک ریسیریشن کے تین بڑے مراحل ہیں:


1- گلائیکولائسز (Glycolysis): پہلے مرحلے میں گلوکوز (6 کاربن) کو توڑا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں پانی روک ایسڈ (3 کاربن) کے دو مالیکیولز بنتے ہیں اور دو ATP اور دو NADH حاصل ہوتے ہیں۔ اس عمل کو گلائیکولائسز کہتے ہیں۔ یہ عمل سائٹوپلازم میں ہوتا ہے۔ گلائیکولائسز کے لیے آکسیجن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ عمل این ایروک ریسیریشن میں بھی ہوتا ہے۔




گلائیکولائسز کا خاکہ

2- کربر سائیکل (Krebs Cycle): جب آکسیجن دستیاب ہوتی ہے تو پانی روک ایسڈ کے مالیکیولز کا سائٹوپلازم سے مائٹوکونڈریا کے میٹریکس (matrix) میں چلے جاتے ہیں۔ یہاں ری ایکشنز کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جسے برطانوی بائیو کیمسٹ سیر ہنس کربر (Sir Hans Krebs) نے دریافت کیا تھا۔ کربر سائیکل سے پہلے پانی روک ایسڈ کو اسیٹائل کو-ایسڈ (Acetyl CoA) میں تبدیل کیا جاتا ہے اور اس دوران کاربن ڈائی آکسائیڈ اور NADH بھی بنتے ہیں۔

کربر سائیکل میں اسیٹائل کو-ایسڈ A کی کاربن ڈائی آکسائیڈ میں مکمل آکسائیڈیشن ہو جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں ATP اور توانائی والے کمپاؤنڈز یعنی NADH اور FADH₂ بنتے ہیں۔ FADH₂ دراصل فلیون ایڈینین ڈائی نیوکلیوٹائیڈ (Flavin Adenine Dinucleotide) کی ریڈیوسڈ (reduced) شکل ہوتی ہے۔



کرنے والے جاندار	چند بیکٹیریا، تمام اہلی، تمام پودے	تمام جاندار
دفعہ پذیر ہونے کا مقام	کلورو پلاسٹس میں	سائٹوپلازم اور مائٹوکونڈریا میں
دفعہ پذیر ہونے کا وقت	صرف بڑھتیوں میں	تمام وقت



گلوکوز کی ایروک آکسیدیشن سے پیدا ہونے والے اے ٹی پی کی تعداد کا ایک جائزہ


انشائی طرز کنسپچوئل (Conceptual) سوالات

سوال 1: ایروک اور این ایروک ریسریشن میں انرجی کے بجٹ پر بحث کریں۔

جواب: ایروک ریسریشن کا انرجی بجٹ: ہر NADH مالیکول ایکٹران ٹرانسپورٹ چین میں تین ATP مالیکول پیدا کرتا ہے جبکہ گلوکولائسز میں پیدا ہونے والا ہر NADH دو ATP مالیکول کا منافع کرتا ہے کیونکہ اسے مائٹوکونڈریا کی ممبرین میں منتقل کرنا ہوتا ہے اور یہ ایک ATP کا منافع کرتا ہے۔ ہر FADH₂ مالیکول دو ATP بناتا ہے۔

ٹول	انرجی مالیکول	سیلولر ریسریشن کے مراحل
ATP 2	ATP 2	گلوکولائسز آکسید
ATP 2	NADH 2	وی کاربو آکسید
ATP 6	2 NADH	کربر سائیکل
ATP 18	NADH 6	
ATP 4	FADH 2	
ATP 2	ATP 2	
ATP 36		ٹول

این ایروک ریسریشن میں انرجی بجٹ: آکسین میں این ایروک آکسیدیشن کے دوران صرف 2 ATP کے مالیکول حاصل ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے کہ این ایروک ریسریشن میں کوکربر سائیکل اور ایکٹران ٹرانسپورٹ چین نہیں ہوتی۔



ایکٹران ٹرانسپورٹ چین

3- ایکٹران ٹرانسپورٹ چین (Electron Transport Chain): یہ مرحلہ مائٹوکونڈریا کی ممبرین پر وقوع پذیر ہوتا ہے۔ اس مرحلہ میں NADH اور FADH₂ سے ایکٹرانز اور ہائیڈروجن آکسز نکلتے ہیں۔ اس طرح وہ خود دوبارہ NAD اور FAD بن جاتے ہیں۔ ان میں سے نکلنے والے ایکٹرانز ایک ایکٹران ٹرانسپورٹ چین پر گزرتے ہیں اور اپنی توانائی نکالتے ہیں۔ اس توانائی سے ATP بنائے جاتے ہیں۔ ایکٹران ٹرانسپورٹ چین کے آخر میں ایکٹرانز اور ہائیڈروجن آکسز آکسین کے ساتھ ملے ہیں اور پانی بنادیتے ہیں۔

ریسریشن سے حاصل کردہ توانائی کا جسم میں استعمال (Use of Respiratory Energy in Body):

سیلولر ریسریشن کے دوران پیدا ہونے والی توانائی (اے ٹی پی) کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے۔

- 1- مسلز کے سکڑنے اور حرکت
- 2- مادوں کی ایکٹو ٹرانسپورٹ (active transport)
- 3- بائیو مالیکولز کی تیاری
- 4- مائی ٹوکس اور ڈی این اے کی نقل کی تیاری یعنی ریپلی کیشن (replication)
- 5- نرو ایملز (nerve impulses) کی منتقلی
- 6- جسم کا ٹمپرچر برقرار رکھنا
- 7- جسم میں زہریلے مادوں کو توڑنا اور جسم سے نکالنا۔

سوال 9: ایروک اور این ایروک ریسریشن کے درمیان فرق کریں۔

جواب: ایروک اور این ایروک ریسریشن میں فرق:

ایروک ریسریشن	این ایروک ریسریشن	آکسین کی موجودگی
ضروری ہے	ضروری نہیں	
36	02	اے ٹی پی کا مجموعی فائدہ
کاربن ڈائی آکسائیڈ اور پانی	لیکٹک ایسڈ یا اسٹائلک الکوہل اور کاربن ڈائی آکسائیڈ	اختصاصی پراڈکٹس
گلوکولائسز	سائٹوپلازم میں	دفعہ پذیر ہونے کا مقام
سائٹوپلازم میں، جبکہ کربر سائیکل اور ایکٹران ٹرانسپورٹ چین مائٹوکونڈریا میں		
زیادہ تر جانداروں کے لیے توانائی کا ذریعہ	این ایروک جانداروں کے لیے توانائی کا ذریعہ	اہمیت
	ایروک جانداروں کے لیے آکسین کی کمی کی صورت میں توانائی کا ذریعہ	
	کئی پراڈکٹس مثلاً: ایتھانول، پیروکسیڈ، وغیرہ کا ذریعہ	

سوال 10: ریسریشن اور فوٹوسنتھی سیز کا موازنہ کریں۔

جواب: فوٹوسنتھی سیز اور ریسریشن میں فرق:

خصوصیت	فوٹوسنتھی سیز	ریسریشن
میتابولزم کی قسم	اینابولزم	کیٹابولزم
توانائی پیدا ہونا یا خرچ ہونا	ہائڈروجن کی شکل میں توانائی سٹور ہوتی ہے	خوراک کی ہائڈروجن کو ATP میں تبدیل کیا جاتا ہے

سوال 2: اگر کربس سائیکل رک جائے تو کیا ہوگا؟

جواب: اگر کربس سائیکل رک جائے تو یہ کئی مسائل کا باعث بنتا ہے۔

- سائیکل کی موت: ایک غیر متوازن کربس سائیکل مائٹوکونڈریا میں شدید تبدیلیوں کا سبب بن سکتا ہے اور سائیکل کی موت کا باعث بن سکتا ہے۔
- زہریلے مادے کا بننا: کربس سائیکل میں شامل اینزائمز کی زہریلی مادوں کے بننے کا سبب بھی بن سکتی ہے۔
- انرجی میں کمی: کربس سائیکل میں شامل اینزائمز کی جسم میں انرجی پیدا کرنے کی صلاحیت میں کمی کا باعث بنتی ہے۔
- انرجی کا خاتمہ: اگر کربس سائیکل کے لیے NAD پیدا نہیں ہوتا، تو فوسفو، پروٹین اور کاربوہائیڈریٹس کے نوٹھے سے حاصل ہونے والی تمام انرجی ختم ہو جائے گی۔

سوال 3: جانداروں میں سیلولر ریسریشن کے تین استعمالات کی وضاحت کریں۔

جواب: جانداروں کے جسم میں ریسریشن انرجی کا استعمال:

- مائیکرو لڑکا بننا: مختلف مائیکرو لڑکے بننے میں جیسے کہ چھوٹے مائیکرو لڑکے سے بڑے مائیکرو لڑکے بننے میں انرجی کی ضرورت ہوتی ہے۔
- سیل ڈویژن: سیل ڈویژن کے دوران ڈی این اے اور پروٹین جیسے بڑے مائیکرو لڑکے تشکیل اور کروموسومز کی حرکت کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے۔
- حرکت: جانوروں میں مسلز کے سکڑنے کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پودوں میں، فلوئم میں خوراک کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے۔

معروضی سوالات

تعلیم کی نئی امتحانی تکنیکس (Knowledge, Understanding, Application, Analytical & Conceptual) کی روشنی میں مرتب کیے گئے تشریحاتی سوالات

8.1 اے ٹی پی: سیل کی توانائی کی کرنسی

- ☆ درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔
- 1- مائیکرو لائیکٹرون حاصل کرتا ہے: (A) گلائیکولائس میں (B) فوٹوسنتھی میں (C) ریڈکشن میں (D) آکسائیڈیشن میں
 - 2- مائیکرو لائیکٹرون کے خارج ہونے کے عمل کو کہتے ہیں: (A) آکسائیڈیشن (B) ریڈکشن (C) ریڈوکس ریکشنز (D) سیلولر ریسریشن
 - 3- تمام سائیکل انرجی کی کرنسی ہے؟ (A) ANP (B) ADP (C) ATP (D) NADP
 - 4- فروٹینین نے کب جوہر کیا کہ اے ٹی پی سیل میں توانائی کی منتقلی کا اہم ذریعہ ہے: (A) 1940ء میں (B) 1941ء میں (C) 1942ء میں (D) 1943ء میں
 - 5- جب سائیکل انرجی شورو کرتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں: (A) ADP (B) ATP (C) فاسفیٹ گروپس (D) مائٹووجنٹس
 - 6- ہر ATP مائیکرو لڑکے کے کتنے سب یونٹس (subunits) ہیں؟ (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

7- فاسفیٹ کے ایک بائوٹھٹے سے ATP کے ایک مول سے کتنی انرجی نکلتی ہے؟

- (A) 7.1 kcal (B) 7.2 kcal (C) 7.8 kcal (D) 7.3 kcal

8- ایک P-P بائوٹھٹے سے ATP تبدیل ہو جاتا ہے:

- (A) AMP میں (B) ADP میں (C) ATP میں (D) NAD میں

9- ATP ظاہر کرتا ہے:

- (A) ایڈینوسین مونوفاسفیٹ (B) ایڈینوسین ڈائی فاسفیٹ (C) ایڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ (D) ایڈینوسین پولی فاسفیٹ

10- 7.3 kcal/mol انرجی برابر ہوتی ہے:

- (A) 73 کیلو یز کے (B) 730 کیلو یز کے (C) 7,300 کیلو یز کے (D) 7,3000 کیلو یز کے

11- ATP مائیکرو لڑکے میں کتنے فاسفیٹ گروپس ہوتے ہیں:

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

12- رابنوز شوگر میں، کاربن ایٹم کی تعداد ہے:

- (A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 8

13- اے ٹی پی کے مائیکرو لڑکے میں دو فاسفیٹس کے درمیان بائوٹھٹے:

- (A) آئیونک (B) کوویلینٹ (C) پیپٹائڈ (D) ہائیڈروجن

8.2 فوٹوسنتھی (Photosynthesis)

8.3 سیلولر ریسریشن (Cellular Respiration)

- 14- مندرجہ ذیل میں سے کون سا جاندار فوٹوسنتھی میں عمل میں ان آرگنک خام مال کو استعمال کر کے اپنی آرگنک خوراک تیار کر لیتے ہیں؟ (A) پودے (B) الجی (C) بیکٹیریا (D) یہ تمام
- 15- فوٹوسنتھی میں کاربن ڈائی آکسائیڈ (A) کاربن (B) ہائیڈروجن (C) آکسیجن (D) کاربن ڈائی آکسائیڈ
- 16- انرجی حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے: (A) پروٹینز (B) کاربوہائیڈریٹس (C) لپڈز (D) نیوکلیک ایسڈ
- 17- گلوکوز کا فارمولا ہے: (A) C_3H_6 (B) $C_6H_{12}O_6$ (C) CHO (D) CH_3
- 18- لائٹ ریکشنز ہوتے ہیں: (A) تھیلاکوئڈ میں (B) مائٹوکونڈریا میں (C) سٹروما میں (D) سائٹوسول میں
- 19- NADP ہے: (A) کوئیکنٹر (B) کوآیزائیم (C) پراسٹھیک گروپ (D) وٹامن
- 20- لائٹ ریکشنز میں سورج کی روشنی استعمال کر کے بنائے جاتے ہیں: (A) ATP اور ADP (B) NADPH اور ADP (C) ATP اور NADPH (D) NADPH اور NADP

- 36- کس کی فرمیشن سے پتھر اور وہی بنایا جاتا ہے؟
 (A) پیسٹ کی (B) بیکیئر یا کی (C) فنجائی کی (D) الچی کی
- 37- فکس میں ہونے والی فرمیشن سے بنائی جاتی ہے:
 (A) دہی (B) پنیر (C) بریڈ (D) سویاس
- 38- ایروک ریسیریشن کا پہلا مرحلہ ہے:
 (A) کریز سائیکل (B) گلائیکولائسر (C) الیکٹران ٹرانسپورٹ میں (D) ریسیریشن میں
- 39- گلائیکولائسر ہوتی ہے:
 (A) نیوکلئیس میں (B) سائٹوپلازم میں (C) مائٹوکنڈریا میں (D) گالٹی باؤنڈ میں
- 40- کریز سائیکل کو دریافت کیا:
 (A) حمل فشر نے (B) رابرٹ ویکر نے (C) مارگولس نے (D) ہیز کریز نے
- 41- کریز سائیکل میں داخل ہونے والا پہلا مالیکیول ہے:
 (A) گلوکوز (B) کاربن ڈائی آکسائیڈ (C) ATP (D) اسپتال کو-اینزائم
- 42- کریز سائیکل کے باقی پروڈکٹس ہیں:
 (A) CO₂ (B) ATP (C) FADH₂ اور NADH (D) یہ تمام
- 43- الیکٹران ٹرانسپورٹ چین وقوع پذیر ہوتی ہے:
 (A) نیوکلئیس میں (B) کلوروپلاسٹ میں (C) لائوسوم میں (D) مائٹوکنڈریا میں
- 44- ہر NADH کتنے ATP بناتا ہے؟
 (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5
- 45- ریسیریشن وقوع پذیر ہوتی ہے؟
 (A) صرف دن میں (B) صرف رات میں (C) روشنی کی موجودگی میں (D) ہر وقت
- 46- ایروک ریسیریشن میں کل کتنے ATP بنے ہیں؟
 (A) 2 (B) 36 (C) 8 (D) 12

جوابات

(C) -1	(A) -2	(C) -3	(B) -4	(B) -5	(B) -6	(D) -7	(B) -8	(C) -9	(C) -10
(C) -11	(B) -12	(B) -13	(D) -14	(C) -15	(B) -16	(B) -17	(A) -18	(B) -19	(C) -20
(C) -21	(C) -22	(D) -23	(A) -24	(D) -25	(D) -26	(C) -27	(D) -28	(B) -29	(A) -30
(B) -31	(C) -32	(B) -33	(C) -34	(B) -35	(B) -36	(D) -37	(B) -38	(B) -39	(D) -40
(D) -41	(D) -42	(D) -43	(B) -44	(D) -45	(B) -46				

- 21- ڈارک ریکشن میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی ریڈکشن کر کے بنایا جاتا ہے:
 (A) آکسیجن (B) پانی (C) گلوکوز (D) سکرور
- 22- ڈارک ریکشن کی تفصیلات دریافت کیں:
 (A) رابرٹ ویکر نے (B) فرنزیمین نے (C) میلون کیلون نے (D) آرٹ بیکل نے
- 23- ڈارک ریکشن میں تین کاربن والے کپاؤٹریڈ کی ریڈکشن سے حاصل ہوتے ہیں:
 (A) لیز (B) نیوکلک ایسڈز (C) فیٹی ایسڈز (D) کاربوہائیڈریٹس
- 24- فوٹوسنتھیس میں اہم کمپٹ ہے:
 (A) کلوروفل - a (B) کلوروفل - b (C) کلوروفل - c (D) کیروٹینائیڈز
- 25- پے کی سطح پر پڑنے والے روشنی کتنے فیصد پے میں جذب ہوتی ہے؟
 (A) 25 فیصد (B) 50 فیصد (C) 98 فیصد (D) 1 فیصد
- 26- کلوروفل - a کس ویو لینتھ کو جذب کرتا ہے؟
 (A) نیلی (B) سرخ (C) سبز (D) اور b دونوں
- 27- کون سے باؤڈز کے ٹوٹنے سے توانائی حاصل ہوتی ہے؟
 (A) C - O (B) H - O (C) C - H (D) N - H
- 28- توانائی حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ استعمال کی جانے والی خوراک ہے؟
 (A) پروٹین (B) لیز (C) فیٹ (D) گلوکوز
- 29- گلوکوز میں کاربن ایٹمز کی تعداد ہے؟
 (A) 4 (B) 6 (C) 2 (D) 8
- 30- پانی روک ایسڈ میں کاربن ایٹمز کی تعداد ہے:
 (A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6
- 31- آکسیجن کی غیر موجودگی میں ہونے والی ریسیرین کو کہتے ہیں:
 (A) ایروک ریسیریشن (B) این ایروک ریسیریشن (C) سیلور ریسیریشن (D) یہ تمام
- 32- بیکیئر یا اوپیسیٹ میں پانی روک ایسڈ کو توڑا جاتا ہے:
 (A) الکول میں (B) کاربن ڈائی آکسائیڈ میں (C) الکول اور آکسیجن میں (D) الکول اور آکسیجن میں
- 33- پانی روک ایسڈ سمجھنا الکول میں تبدیل ہوتا ہے:
 (A) لیکٹک ایسڈ فرمیشن میں (B) الکولک فرمیشن میں (C) اور b دونوں میں (D) کسی میں بھی نہیں
- 34- لیکٹک ایسڈ کا فارمولا ہے:
 (A) C₂H₅OH (B) C₆H₁₂O₆ (C) C₃H₆O₃ (D) C₃H₄O₃
- 35- انسان اور دوسرے جانوروں میں پانی روک ایسڈ تبدیل ہوتا ہے:
 (A) فورک ایسڈ میں (B) لیکٹک ایسڈ میں (C) الکول میں (D) آکسیجن میں

کثیر الانتخابی کنسپچوئل (Conceptual) سوالات

- ☆ درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔
- 1- فوٹوسنتھی سبز میں سورج کی روشنی کو جذب کرتے ہیں؟
(A) پھول (B) جڑیں (C) کلوروئل (D) تان
 - 2- اگر سبز میں آکسیجن کی فراہمی کم ہو جائے تو وہ کس عمل کی طرف رجوع کریں گے؟
(A) فوٹوسنتھی سبز (B) سیلولر سپریشن (C) این ایروکسپریشن (D) ایروکسپریشن
 - 3- ATP کو سبز کی توانائی کی کرنسی کیوں کہا جاتا ہے؟
(A) کیونکہ یہ براہ راست توانائی فراہم کرتا ہے (B) کیونکہ اسے آسانی سے توڑا جاسکتا ہے
(C) کیونکہ یہ سبز کے تمام عملوں کے لیے توانائی کا ذریعہ ہے (D) اوپر دیے گئے تمام
 - 4- سیلولر سپریشن کا عمل کس چیز سے شروع ہوتا ہے؟
(A) گلوکوز (B) اے ٹی پی (C) آکسیجن (D) کاربن ڈائی آکسائیڈ
 - 5- الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین کا پانی پر ڈکٹ ہے:
(A) آکسیجن (B) FADH (C) کاربن ڈائی آکسائیڈ (D) پانی

جوابات

- 1- (C) 2- (C) 3- (D) 4- (A) 5- (D)

تعمیم کی نئی اسیٹی ٹیکنیکس (Knowledge, Understanding, Application, Analytical & Conceptual) کی روشنی میں مرتب کیے گئے مختصر جوابی سوالات

8.1 اے ٹی پی: سیل کی توانائی کی کرنسی ATP: The Cell's Energy Currency

- ☆ مختصر جواب دیں۔
- 1- آکسیڈیشن اور ریڈکشن ریکشنز میں فرق لکھیں۔
جواب: آکسیڈیشن: آکسیڈیشن میں مالیکیول سے الیکٹرونز نکلنے ہیں۔
ریڈکشن: ریڈکشن میں مالیکیول الیکٹرونز حاصل کرتا ہے۔
 - 2- کس نے تجویز کیا کہ اے ٹی پی سیل میں توانائی کی منتقلی کا اہم مالیکیول ہے؟
جواب: 1941ء میں فرنز لیمین نے تجویز دی کہ اے ٹی پی سیل میں توانائی کی منتقلی کا اہم مالیکیول ہے۔
 - 3- ATP کس کا مخفف ہے؟
جواب: ATP ایڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ کا مخفف ہے۔
 - 4- ATP کے مالیکیول کی ساخت بیان کریں۔
جواب: ہر اے ٹی پی مالیکیول کے تین ذیلی حصے ہوتے ہیں۔
(i) ایڈینین (نائٹروجن رکھنے والی بیس) (ii) رائبوز (پانچ کاربن شوگر) (iii) تین فاسفیٹ گروپس
 - 5- ATP کے مالیکیول میں دو فاسفیٹس کے درمیان کونسا باغ ہوتا ہے؟
جواب: اے ٹی پی کے مالیکیول میں دو فاسفیٹس کے درمیان کوویلنٹ باغز ہوتے ہیں۔

- 6- فاسفیٹ کا ایک باغز ٹونے سے کتنی انرجی نکلتی ہے؟
جواب: فاسفیٹ کا ایک باغز ٹونے سے ATP کے ایک مول سے قریباً 7.3 کلو کیلو ریز یعنی 7300 کیلو ریز انرجی نکلتی ہے۔
- 7- ایک P-P باغز ٹونے سے کیا ہوتا ہے؟
جواب: ایک P-P باغز ٹونے سے ATP سے ADP یعنی ایڈینوسین ڈائی فاسفیٹ بن جاتا ہے اور ایک Pi خارج ہوتا ہے۔ بعض اوقات ADP کو AMP یعنی ایڈینوسین مونو فاسفیٹ میں مزید توڑا جاتا ہے۔
- 8- ATP سے ADP بننے کی مساوات لکھیں۔
جواب: $ATP + H_2O \rightarrow ADP + Pi + \text{energy (7.3 kcal/mol)}$
- 9- سبز انرجی کیسے حاصل کرتے ہیں؟
جواب: سبز خوراک کی آکسیڈیشن سے توانائی حاصل کرتے ہیں۔ وہ اس توانائی سے ADP کو Pi کے ساتھ جوڑ کر ATP بناتے ہیں اور انرجی ذخیرہ کر لیتے ہیں۔

فوٹوسنتھی سبز (Photosynthesis)	8.2
سیلولر سپریشن (Cellular Respiration)	8.3

- 10- آٹوٹراکک جاندار خوراک کیسے حاصل کرتے ہیں؟
جواب: آٹوٹراکک جاندار (پودے، الگی اور کچھ بیکٹیریا) فوٹوسنتھی سبز کے عمل میں ان آرگنک خام مال کو استعمال کر کے اپنی آرگنک خوراک تیار کر لیتے ہیں۔ یہ آرگنک خوراک کاربوہائیڈریٹس کی شکل میں ہوتی ہے۔
- 11- کون سے بائیو مالکیولز انرجی کا پڑاؤ دیتے ہیں؟
جواب: کاربوہائیڈریٹس توانائی کا پڑاؤ دیتے ہیں۔ توانائی حاصل کرنے کے لیے کاربوہائیڈریٹس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ انھیں پروٹینز اور لیپڈز وغیرہ میں بھی تبدیل کر لیا جاتا ہے۔
- 12- فوٹوسنتھی سبز سے کیا مراد ہے؟
جواب: سورج کی روشنی میں کلوروئل کی موجودگی میں کاربن ڈائی آکسائیڈ اور پانی سے گلوکوز کی تیاری کے عمل کو فوٹوسنتھی سبز کہتے ہیں۔
اس عمل میں آکسیجن، ایک باغز ڈکٹ کے طور پر بنتی ہے۔
- 13- فوٹوسنتھی سبز کی جزل مساوات لکھیں۔
جواب: $6CO_2 + 12H_2O + \text{photons} \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 6H_2O$
- 14- فوٹوسنتھی سبز کے کتنے مراحل ہیں؟
جواب: فوٹوسنتھی سبز کے 2 بڑے مراحل ہیں:
(i) لائٹ ری ایکشنز (ii) ڈارک ری ایکشنز
- 15- لائٹ ری ایکشنز سیل کے کس حصہ میں ہوتے ہیں؟
جواب: لائٹ ری ایکشنز کلوروپلاسٹ کی تھیلوئڈ ممبرین پر ہوتے ہیں۔
- 16- ڈارک ری ایکشنز سیل کے کس حصہ میں ہوتے ہیں؟
جواب: ڈارک ری ایکشنز کلوروپلاسٹ کے سٹروما میں ہوتے ہیں۔

17- لائٹ ریکشنز کیا ہیں؟

جواب: لائٹ ریکشنز میں شمسی توانائی استعمال کر کے زیادہ توانائی والے یعنی ہائی انرجی مالیکیولز (ATP اور NADPH) بنائے جاتے ہیں۔

18- لائٹ ریکشنز میں ATP کیسے بنتی ہے؟

جواب: جب کلوروفل روشنی جذب کرتا ہے تو اس کے دو الیکٹرانز ہائی انرجی الیکٹرونز بن جاتے ہیں۔ پھر یہ الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین میں داخل ہوتے ہیں۔ اس چین میں الیکٹرانز زیادہ توانائی والے لیول سے کم توانائی والے لیول کی طرف آتے ہیں۔ تو ان سے توانائی نکلتی ہے جو کہ ATP بنانے میں استعمال ہوتی ہے۔

19- NADP کیسے ریڈیوس ہوتا ہے؟

جواب: کلوروفل کے الیکٹرونز اور پانی کے ہائڈروجن آئنز کو استعمال کر کے ایک کو-ایزائم NADP کی ریڈکشن کی جاتی ہے اور NADPH بنایا جاتا ہے۔

20- ڈارک ریکشنز سے کیا مراد ہے؟

جواب: ڈارک ریکشنز میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی ریڈکشن کر کے گلوکوز بنایا جاتا ہے۔ ڈارک ریکشنز کی تفصیلات میلوں کیلون نے دریافت کی تھیں۔

21- ڈارک ریکشنز کا خلاصہ لکھیں۔

جواب: کاربن ڈائی آکسائیڈ کے مالیکیول کو (5) کاربن والے کپاؤنڈ کے ساتھ ملایا جاتا ہے اور پھر (6) کاربن کپاؤنڈ بنتے ہیں۔ پھر یہ ٹوٹ کر تین (3) کاربن والے (2) کپاؤنڈز بنادیتا ہے۔

تین کاربن کپاؤنڈ کی ریڈکشن کر کے کاربوہائیڈریٹس بنائے جاتے ہیں۔

22- ڈارک ریکشنز کے کس سرطے میں ATP استعمال ہوتی ہے؟

جواب: آغاز میں تین کاربن والے کپاؤنڈ کو استعمال کر کے پانچ کاربن کپاؤنڈ بنایا جاتا ہے۔ اس عمل میں ATP استعمال ہوتی ہے۔

23- پگمنٹ کی تعریف لکھیں۔

جواب: پگمنٹ ایسے مادے ہیں جو نظر آنے والی روشنی جذب کرتے ہیں۔ مختلف پگمنٹس مختلف دیولینتھ (رنگوں) کی روشنی جذب کرتے ہیں۔

24- پگمنٹس کہاں موجود ہوتے ہیں؟

جواب: کلوروپلاسٹ کی تھاکا کو انڈمبرین پر فوٹوسنتھی سیز کے لیے ضروری پگمنٹس موجود ہوتے ہیں۔

25- پگمنٹس کیا کام کرتے ہیں؟

جواب: پگمنٹس سورج کی روشنی کو جذب کرتے ہیں اور فوٹوسنتھی سیز کے لیے اسے کیمیکیل انرجی میں تبدیل کرتے ہیں۔

26- فوٹوسنتھی سیز میں اہم پگمنٹس اور دوسرے معاون پگمنٹس کون سے ہیں؟

جواب: اہم پگمنٹس: کلوروفل -a دوسرے معاون پگمنٹس: کلوروفل -b اور کیروٹینائڈز

27- کلوروفل -a کس دیولینتھ کی روشنی کو جذب کرتا ہے؟

جواب: کلوروفل -a نیلی اور سرخ دیولینتھ کو جذب کرتا ہے۔

28- فوٹوسنتھی سیز کے باقی پروڈکٹس کون سے ہیں؟

جواب: گلوکوز، آکسیجن اور پانی فوٹوسنتھی سز کے باقی پروڈکٹس ہیں۔

29- سیلولر ریسیریشن سے کیا مراد ہے؟

جواب: جاندار خوراک میں موجود C-H بانڈز کو توانائی حاصل کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے وہ اپنے سیلولر خوراک کی آکسائیڈیشن کرتے ہیں۔

خوراک کی اس آکسائیڈیشن کو سیلولر ریسیریشن کہتے ہیں۔

30- سیلولر انرجی کے لیے سب سے زیادہ استعمال کی جانے والی خوراک کون سی ہے؟

جواب: سیلولر انرجی کے لیے سب سے زیادہ استعمال کی جانے والی خوراک گلوکوز ہے۔

31- ایروبک اور این ایروبک ریسیریشن میں فرق لکھیں۔

جواب: ایروبک ریسیریشن: آکسیجن کی موجودگی میں ہونے والی سیلولر ریسیریشن کو ایروبک ریسیریشن کہتے ہیں۔ اس عمل میں خوراک کی سب سے زیادہ آکسائیڈیشن ہوتی ہے اور زیادہ انرجی حاصل ہوتی ہے۔

این ایروبک ریسیریشن: آکسیجن کی غیر موجودگی میں ہونے والے سیلولر ریسیریشن کو این ایروبک ریسیریشن کہتے ہیں۔ این ایروبک ریسیریشن میں گلوکوز کی نامکمل آکسائیڈیشن ہوتی ہے۔

32- الکوحلک فرمینٹیشن کی تعریف لکھیں۔



جواب: بیکٹیریا اور پیسٹ وغیرہ میں ہونے والی این ایروبک ریسیریشن میں پانی روک ایسڈ کو الکوحل (C₂H₅OH) کاربن ڈائی آکسائیڈ میں مزید توڑا جاتا ہے۔ اس طرح کی این ایروبک ریسیریشن کو الکوحلک فرمینٹیشن کہتے ہیں۔

33- لیکک ایسڈ فرمینٹیشن، الکوحلک فرمینٹیشن سے کس طرح مختلف ہے؟

جواب: الکوحل فرمینٹیشن میں پانی روک ایسڈ کو الکوحل میں توڑا جاتا ہے جبکہ لیکک ایسڈ فرمینٹیشن میں پانی روک ایسڈ کو لیکک ایسڈ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔

34- الکوحلک اور لیکک ایسڈ فرمینٹیشن کی کیمیکیل مساوات لکھیں۔

جواب: الکوحلک فرمینٹیشن:



35- سیلولر ریسیریشن کی کوئی قسم کو فرمینٹیشن بھی کہتے ہیں؟

جواب: این ایروبک ریسیریشن کو فرمینٹیشن بھی کہتے ہیں۔

36- بیکٹیریا اور پیسٹ میں الکوحلک ایسڈ فرمینٹیشن کے باقی پروڈکٹس کون سے ہیں؟

جواب: بیکٹیریا اور پیسٹ میں الکوحلک ایسڈ فرمینٹیشن کے باقی پروڈکٹس الکوحل اور کاربن ڈائی آکسائیڈ ہیں۔

37- این ایروبک سے کیا مراد ہے؟

جواب: چند جاندار جن میں کچھ بیکٹیریا اور کچھ فنجائی شامل ہیں این ایروبک ریسیریشن سے انرجی حاصل کرتے ہیں۔ انہیں این ایروبک کہتے ہیں۔

38- فرمینٹیشن کی اہمیت بیان کریں۔

جواب: سائنسدانوں نے بیکٹیریا اور فنجائی کی فرمینٹیشن کی صلاحیت کو انسانی فائدے کے لیے استعمال کیا ہے۔

(i) بیکٹیریا میں ہونے والی فرمینٹیشن سے پنیر اور دہی بنایا جاتا ہے۔

(ii) پیسٹ میں ہونے والی فرمینٹیشن کو شراب سازی اور بیکری کی صنعتوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔

(iii) فنگس میں ہونے والی فرمینٹیشن سے سویا سوس بنائی جاتی ہے۔

39- ایروبک ریسیریشن کے مراحل کون سے ہیں؟

جواب: ایروبک ریسیریشن کے تین بڑے مراحل ہیں: (i) گلائیکولائس (ii) کربر سائیکل (iii) الیکٹران ٹرانسپورٹ چین

- 40- گھاگولائسز کے عمل کی وضاحت کریں۔
جواب: گھاگولائسز کے پہلے مرحلے میں گلوکوز کو توڑا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں پانی، روک ایسڈ کے دو مالکیولز بنتے ہیں اور "ATP" اور "NADH" حاصل ہوتے ہیں۔ اس عمل کو گھاگولائسز کہتے ہیں۔
- 41- گھاگولائسز کا عمل این ایروک ربیسریشن میں بھی کیوں ہوتا ہے؟
جواب: گھاگولائسز این ایروک ربیسریشن کا ایک مرحلہ ہے لیکن اس کے لیے آکسیجن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لیے عمل این ایروک ربیسریشن میں بھی ہوتا ہے۔
- 42- کریمز سائیکل کے عمل کو مختصر بیان کریں۔
جواب: کریمز سائیکل میں پانی، روک ایسڈ کے مالکیولز کی مکمل آکسیڈیشن ہوتی ہے۔ اس دوران ATP، NADH اور $FADH_2$ بنتا ہے۔ کریمز سائیکل میں داخل ہونے سے پہلے پانی، روک ایسڈ کو ایک 2- کاربن والے کپاؤنڈر سیکائل کو-ایزائیم A میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔
- 43- مثال سے واضح کریں کہ الیکٹرانز انرجی کے اخراج کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔
جواب: الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین میں الیکٹرانز کا ایک الیکٹران ٹرانسپورٹ چین پر منتقل ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں NADH اور $FADH_2$ الیکٹرانز اور ہائیڈروجن آکسز نکلتے ہیں۔ اس طرح وہ خود دوبارہ NAD اور FAD بن جاتے ہیں۔ ان میں سے نکلنے والے الیکٹرانز ایک الیکٹران ٹرانسپورٹ چین پر سے گزرتے ہیں اور اپنی انرجی خارج کرتے ہیں۔ اس انرجی سے ATP بنائے جاتے ہیں۔
- 44- ربیسریشن میں استعمال ہونے والے ایندھن کا ذریعہ کیا ہے؟
جواب: گلوکوز مالکیول ربیسریشن میں استعمال ہونے والا ایندھن ہے۔
- 45- این ایروک ربیسریشن اور این ایروک ربیسریشن میں کتنے ATP بنے ہیں؟
جواب: این ایروک ربیسریشن میں 36 ATP بنے ہیں۔ جبکہ این ایروک ربیسریشن میں 2 ATP بنے ہیں۔
- 46- سیلولر ربیسریشن سے حاصل ہونے والی انرجی جسم میں کس طرح استعمال ہوتی ہے؟
جواب: سیلولر ربیسریشن کے دوران بننے والی انرجی کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے:
- مسلز کے سکڑنے اور حرکت کرنے میں
 - مائیٹوس اور ڈی این اے کی ریپلیکیشن میں
 - نرو ٹرانسمیوٹیشن میں
 - مادوں کی ایکٹو ٹرانسپورٹ میں

مختصر جوابی کنسپچوئل (Conceptual) سوالات

- ☆ مختصر جواب دیں۔
- 1- ربیسریشن اور سیلولر ربیسریشن میں کیا فرق ہے؟
جواب: ربیسریشن: ربیسریشن ایک سانس لینے کا عمل ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جس میں آکسیجن کو اندر اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کو جسم سے باہر نکالا جاتا ہے۔ سیلولر ربیسریشن: سیلولر ربیسریشن ایک ایسا عمل ہے جس میں C-H باڈز توڑ کر انرجی حاصل کی جاتی ہے۔ اس میں آکسیڈیشن اور ریڈکشن ری ایکشنز کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائیڈ اور پانی بنتا ہے۔
- 2- ATP کب وجود میں آئی؟
جواب: ATP تمام جانداروں میں توانائی کی اہم کرنسی ہے لہذا یہ بھی اس وقت وجود میں آئی جب اس زمین پر زندگی ارتقاء پذیر ہوئی۔
- 3- اگر ATP کی سیل میں کمی ہو جائے تو کیا ہوگا؟
جواب: اگر سیل میں ATP کی کمی ہو جائے تو
- سیل کی نشوونما رک جائے گی۔
 - سیل کی تمام سرگرمیاں سست ہو جائیں گی۔
 - سیل کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔

- 4- اگر الیکٹران ٹرانسپورٹ چین میں خلل پڑ جائے تو کیا ہوگا؟
جواب: اگر الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین میں خلل پڑ جائے تو اسے ٹی پی (ATP) کی پیداوار کم ہو جائے گی۔
- 5- سیلولر ربیسریشن میں کون سے عوامل توانائی کی منتقلی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں؟
جواب: سیلولر ربیسریشن میں این اے ڈی ایچ (NADH) اور ایف اے ڈی ایچ (FADH₂) اہم کردار ادا کرتے ہیں۔

مختصر اہم نکات :-

- آکسیڈیشن، ریڈکشن (ریڈوکس) ری ایکشن میں مالکیولز کے درمیان الیکٹرانز کا تبادلہ ہوتا ہے۔
- آکسیڈیشن میں مالکیول سے الیکٹران نکلتے ہیں۔
- ریڈکشن میں مالکیول الیکٹران حاصل کرتا ہے۔
- توانائی پیدا کرنے کے لیے الیکٹرانز کا بہاؤ (آکسیڈیشن۔ ریڈکشن) ضروری ہے۔
- اے ٹی پی سائیکل میں توانائی کی کرنسی ہے۔
- فوٹوسنتھی سیز میں روشنی اور کلوروفل کی موجودگی میں کاربن ڈائی آکسائیڈ اور پانی ملتے ہیں اور کاربوہائیڈریٹس اور آکسیجن بنتے ہیں۔
- فوٹوسنتھی سیز کے لائٹ ری ایکشنز میں کلوروفل روشنی جذب کرتا ہے اور اے ٹی پی بناتا ہے۔
- ڈارک ری ایکشنز میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی ریڈکشن کر کے گلوکوز بنایا جاتا ہے۔
- این ایروک ربیسریشن آکسیجن کی غیر موجودگی میں ہونے والی گلوکوز کی مکمل آکسیڈیشن ہے۔ جبکہ این ایروک ربیسریشن آکسیجن کی موجودگی میں ہونے والی گلوکوز کی مکمل آکسیڈیشن ہے۔
- گھاگولائسز کے دوران گلوکوز کے ایک مالکیول کو پانی، روک ایسڈ کے دو مالکیولز میں توڑا جاتا ہے۔
- کریمز سائیکل کے دوران پانی، روک ایسڈ مالکیول کو مکمل طور پر توڑ دیا جاتا ہے۔ اس سے ہائیڈروجن آکسز، زیادہ توانائی والے الیکٹرانز اور کاربن ڈائی آکسائیڈ بنتے ہیں۔
- الیکٹران ٹرانسپورٹ چین میں الیکٹرانز ایک چین (الیکٹران کیریئرز carriers) پر مشتمل) پر سے گزرتے ہیں اور توانائی نکالتے ہیں۔ یہ توانائی ADP کو ATP میں تبدیل کرنے میں استعمال ہوتی ہے۔

حل مشقی سوالات

- A- درج ذیل سوالات کے لیے درست جوابات منتخب کریں۔
- 1- جب ہم ATP سے توانائی لیتے ہیں تو اس کے کون سے باڈز ٹوٹتے ہیں؟
(الف) P-P باڈز (ب) C-H باڈز (ج) C-N باڈز (د) C-O باڈز
- 2- فوٹوسنتھی سیز کے لائٹ ری ایکشنز کہاں ہوتے ہیں؟
(الف) پلازما ممبرین (ب) سائٹوپلازم (ج) کلوروپلاسٹ کا سٹروما (د) کلوروپلاسٹ کے تھیلکوئیڈ
- 3- پودوں میں کلوروفل کی کون سی قسم سب سے زیادہ عام ہے؟
(الف) کلوروفل A (ب) کلوروفل B (ج) کلوروفل C (د) کلوروفل D
- 4- کلوروفل روشنی کی کون سی ویولینٹھ کو سب سے زیادہ جذب کرتے ہیں؟
(الف) سبز اور نیلی (ب) سبز اور سرخ (ج) سرخ اور نیلی (د) صرف سبز

5- جب پیسٹ گلوکوز کی فرمیشن کرتا ہے تو مصنوعات ہیں:

(الف) الکحل اور کاربن ڈائی آکسائیڈ

(ب) الکحل اور پانی

(ج) لیکک ایسڈ

6- فوٹوسنتھی سیز کے ڈارک ری ایکشنز کہاں ہوتے ہیں؟

(الف) کلوروپلاسٹ کا سٹروما (ب) کلوروپلاسٹ کے تھائیلاکوئڈز (ج) کلوروپلاسٹ کی بیرونی جھلی (د) سائٹوپلازم

7- فوٹوسنتھی سیز کے لائٹ ری ایکشن میں کون سا مالیکیول الیکٹرانز دیتا ہے؟

(الف) NADPH (ب) پانی (ج) آکسیجن (د) کاربن ڈائی آکسائیڈ

8- ایروبوک ریسپریشن میں کون سا عمل سب سے زیادہ اے ٹی پی پیدا کرتا ہے؟

(الف) گلیکولائسز (ب) کربر سائیکل (ج) الیکٹران ٹرانسپورٹ چین (د) فرمیشن

9- این ایروبوک ریسپریشن کے دوران ایک گلوکوز مالیکیول سے کتنے اے ٹی پی مالیکیول بطور خالص منافع حاصل ہوتے ہیں؟

(الف) 2 (ب) 4 (ج) 12 (د) 36

10- جانوروں کے سلاز میں این ایروبوک ریسپریشن کا ایک عام بانی پراڈکٹ کون سا ہے؟

(الف) آکسیجن (ب) پانی (ج) لیکک ایسڈ (د) کاربن ڈائی آکسائیڈ

مختصر جوابات

1- (الف)	2- (د)	3- (الف)	4- (ج)	5- (الف)	6- (الف)	7- (ب)	8- (ج)	9- (الف)	10- (ج)
----------	--------	----------	--------	----------	----------	--------	--------	----------	---------

B- مختصر جوابات لکھیں۔

1- آکسیڈیشن ری ایکشنز کی کیا اہمیت ہے؟

جواب: توانائی کی پیداوار: سانس لینے اور فوٹوسنتھی سیز جیسے بائیولوجیکل عمل میں توانائی کی پیداوار، رد و کس ری ایکشنز پر منحصر ہے۔

سلاز کا عمل: سلاز کے اندر بہت سے عمل جیسے پروٹین کی ترکیب اور سلاز کی نشوونما رد و کس ری ایکشنز پر مبنی ہے۔

بائیولوجیکل نظام: بائیولوجیکل نظاموں میں سکننگ، مدافعتی نظام اور دواؤں کے اثرات یعنی رد و کس ری ایکشنز پر منحصر ہیں۔

2- اے ٹی پی اور اے ڈی پی کا کیا مطلب ہے؟ سلاز میں اے ڈی پی کے لیے اے ٹی پی کی ضرورت کیوں ہے؟

جواب: ATP کا مطلب ایڈینوسین ٹرائی فوسفٹ جبکہ ADP کا مطلب ایڈینوسین ڈائی فوسفٹ ہے۔

سلاز میں اے ڈی پی کی ضرورت: ATP اور ADP ایسے مالیکیولز ہیں جو سلاز میں اے ڈی پی کے لیے انرجی فراہم کرتے ہیں۔ جب سلاز کو توانائی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ATP کو تیار دیتے ہیں۔ ATP کوٹ کر ADP بن جاتا ہے اور انرجی خارج کرتا ہے۔ ADP کم انرجی والا مالیکیول ہے۔ جب سلاز میں ایکسٹرا انرجی ہوتی ہے تو وہ ADP کو Pi کے ساتھ ملا کر ATP بنا کر انرجی ذخیرہ کر لیتے ہیں۔

فوٹوسنتھی سیز کے لیے لفظی مساوات لکھیں۔

جواب: فوٹوسنتھی سیز کی جنرل مساوات:



پانی آکسیجن گلوکوز شش توانائی پانی کاربن ڈائی آکسائیڈ

4- فوٹوسنتھی سیز کے لیے کلوروفل کیوں اہم ہے؟

جواب: کلوروفل فوٹوسنتھی سیز کے لیے ضروری ہے کیونکہ یہ روشنی کو جذب کرتا ہے۔ روشنی کی توانائی کو جذب کر کے کلوروفل اسے کیمیکیل انرجی میں تبدیل کرتا ہے جو پودوں کے لیے غذا بنانے کے لیے ضروری ہے۔

5- فوٹوسنتھی سیز کے دوران آکسیجن کیسے پیدا ہوتی ہے؟

جواب: فوٹوسنتھی سیز کے دوران، کلوروفل کے ذریعے جذب ہونے والی سورج کی روشنی پانی کے مالیکیولز کو توڑ دیتی ہے جب ہائیڈروجن ایٹم کلوروفل کو الیکٹران دیتے ہیں اور ہائیڈروجن آئن بن جاتے ہیں تو آکسیجن پیدا ہوتی ہے۔


6- کون سے جاندار فوٹوسنتھی سیز کرتے ہیں؟ فوٹوسنتھی سیز کے لیے روشنی جذب کرنے کے لیے کون سا سائل آرگنل ذمہ دار ہے؟

جواب: پودے، الگی اور کچھ بیکٹیریا فوٹوسنتھی سیز کرتے ہیں۔ فوٹوسنتھی سیز کے لیے روشنی جذب کرنے کے لیے کلوروفل اے ذمہ دار ہے۔

7- سیلولر ریسپریشن کا بنیادی مقصد کیا ہے؟

جواب: سیلولر ریسپریشن کا بنیادی مقصد سلاز کو انرجی فراہم کرنا ہے۔ یہ انرجی (ATP) کی شکل میں ہوتی ہے۔

8- ایروبوک ریسپریشن کے لیے مساوات (الفاظ یا علامتوں میں) لکھیں۔



جواب: انرجی پانی کاربن ڈائی آکسائیڈ آکسیجن گلوکوز

9- ایروبوک ریسپریشن میں آکسیجن کے کردار پر ایک مختصر نوٹ لکھیں۔

جواب: ایروبوک ریسپریشن کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ الیکٹران ٹرانسپورٹ چین میں آخری الیکٹران اور ہائیڈروجن آئنز آکسیجن کے ساتھ ملتے ہیں اور پانی بناتے ہیں۔ یہ الیکٹرانز کے بہاؤ کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔

10- این ایروبوک اور ایروبوک ریسپریشن کی تعریف لکھیں۔

جواب: این ایروبوک ریسپریشن:

آکسیجن کی غیر موجودگی میں ہونے والی سیلولر ریسپریشن کو این ایروبوک ریسپریشن کہتے ہیں۔ این ایروبوک ریسپریشن میں گلوکوز کی مکمل آکسیڈیشن ہوتی ہے۔

ایروبوک ریسپریشن: آکسیجن کی موجودگی میں ہونے والی سیلولر ریسپریشن کو ایروبوک ریسپریشن کہتے ہیں۔ اس میں خوراک کی سب سے زیادہ آکسیڈیشن ہوتی ہے اور زیادہ انرجی حاصل ہوتی ہے۔

11- جانوروں اور پیسٹ میں این ایروبوک ریسپریشن کے اختتامی پراڈکٹ کیا ہیں؟

جواب: جانوروں میں این ایروبوک ریسپریشن کے اختتامی پراڈکٹ:

جانوروں میں این ایروبوک ریسپریشن کا اختتامی پراڈکٹ لیکک ایسڈ ہے۔

پیسٹ میں این ایروبوک ریسپریشن کے اختتامی پراڈکٹ:

پیسٹ میں این ایروبوک ریسپریشن کا اختتامی پراڈکٹ الکحل اور کاربن ڈائی آکسائیڈ ہیں۔

12- شدید ورزش کے دوران آکسیجن کی کمی کی وجہ سے سلاز میں کیا کرتے ہیں؟

جواب: شدید ورزش کے دوران آکسیجن کی کمی کی وجہ سے سلاز انرجی حاصل کرنے کے لیے این ایروبوک ریسپریشن کرتے ہیں۔

13- جسم میں ان افعال کی فہرست بنائیں جن میں ریسیپشن سے حاصل کردہ توانائی استعمال ہوتی ہے۔

جواب: سیلور ریسیپشن کے دوران بننے والی انرجی کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے۔

- مسلز کے سکڑنے اور حرکت میں
- مائیٹوس اور ڈی این اے کی ریپلی کیشن میں
- بائیو مالیکولز کی تیاری میں
- نرو امپلسز کی منتقلی میں

مادوں کا ایکٹو ٹرانسپورٹ میں

C- تفصیلی جوابات لکھیں۔

1- اسے ٹی پی کو ایک مالیکول کے طور پر بیان کریں جو تمام سبز کی توانائی کی اہم کرنی ہے۔

جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال نمبر 3

2- فوٹوسنتھی سیز کے اعمال کا خاکہ بنائیں۔

جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال نمبر 4

3- پودوں میں کاربن ڈائی آکسائیڈ اور پانی جسم میں لے جانے پر ایک نوٹ لکھیں۔

جواب: پودے فوٹوسنتھی سیز کے ذریعے اپنی خوراک بناتے ہیں۔ لفظ "فوٹو" کا مطلب "روشنی" اور "سنتھی سیز" کا مطلب "بنانا" ہے۔

پودوں کو اپنی خوراک بنانے کے لیے تین اہم اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ پانی، کاربن ڈائی آکسائیڈ اور سورج کی روشنی ہیں۔ پودے سورج سے روشنی، جڑوں سے پانی اور پتوں میں موجود سٹومیٹا کے ذریعے کاربن ڈائی آکسائیڈ حاصل کرتے ہیں۔

پانی کا استعمال: پودے جڑوں کے ذریعے مٹی سے پانی اور معدنیات لیتے ہیں جن کی انھیں فوٹوسنتھی سیز کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ پانی اور معدنیات جڑ کے اندرونی سبز میں داخل ہوتے ہیں اور آخر کار زائلم کی ویسلو تک پہنچ جاتے ہیں، جو پانی اور معدنیات کو پتوں تک پہنچاتے ہیں۔

کاربن ڈائی آکسائیڈ کا استعمال: کاربن ڈائی آکسائیڈ ٹلی ہوا چھوٹے سوراخوں (سٹومیٹا) کے ذریعے پتوں میں داخل ہوتی ہے اور میزوفل سبز کے گراڈیو سیزز میں پہنچ جاتی ہے۔ جب پودے کے پتوں میں کاربن ڈائی آکسائیڈ اور پانی موجود ہو تو وہ سورج کی روشنی سے توانائی حاصل کرتے ہیں اور خوراک بناتے ہیں۔

4- این ایرو بک ریسیپشن کی اقسام اور اہمیت کی وضاحت کریں۔

جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال نمبر 6 + 7

5- ایرو بک ریسیپشن کے میکائزم کا خاکہ بنائیں۔

جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال نمبر 8

6- ریسیپشن اور فوٹوسنتھی سیز کا موازنہ کریں۔

جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال نمبر 10

D- تحقیقی سوالات:

1- ATP کی ساخت کس طرح انرجی سٹور اور خارج کرنے کے قابل بناتی ہے؟

جواب: ATP اینی بیوسین ٹرائی فاسفیٹ مالیکول اپنی منفرد ساخت کی وجہ سے انرجی کو سٹور کرنے اور خارج کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ فاسفیٹ گروپ کیمیائی بانڈ کی وجہ سے انرجی کا ذخیرہ کرتا ہے۔ جب سیل کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے ATP مالیکول کا بانڈ ٹوٹتا ہے اور انرجی مہیا کرتا ہے۔

باب 9

پودوں کی فزیالوجی

Plant Physiology

یہ باب پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہوں گے کہ:

پودوں میں نیوٹریشن کی تعریف لکھیں۔

پودوں کے مندرجہ ذیل نیوٹریٹس کی میکر و نیوٹریٹس اور مائیکرو نیوٹریٹس میں درجہ بندی کریں۔

بیان کریں کہ نائٹروجن پریوٹین کی تیاری کے لیے اور کلوروفل سائنٹیفک کی تشکیل کے لیے اہم ہے۔

ٹرانسپورٹ اور اس کی ضرورت کا تصور بیان کریں۔

جڑ اور روٹ ہیرز کی اندرونی ساخت کی وضاحت کریں۔

وضاحت کریں کہ جڑیں ایکٹو اور پسیو (passive) انجذاب کے ذریعہ پانی اور منرل (معدنی) نمکیات کو کس طرح لیتی ہیں۔

ٹرانسپائریشن کی وضاحت کریں اور سیل کی سطح اور سٹومیٹا کے کھلنے اور بند ہونے سے اس عمل کا تعلق بیان کریں۔

نمبر پچر، ہوا اور مٹی کو ان عوامل کے طور پر بیان کریں جو ٹرانسپائریشن کی رفتار پر اثر کرتے ہیں۔

پودوں میں پانی اور نمک کی ٹرانسپورٹ کے میکائزم کی وضاحت کریں۔

پریشر فلو میکائزم کے نظریہ کے ذریعہ خوراک کی منتقلی کے میکائزم کی وضاحت کریں۔

پودوں میں گیسوں کے تبادلے کے عمل کی وضاحت کریں۔

بے کار مادوں کے اخراج کے لیے پودوں میں میکائزم / موافقت کی وضاحت کریں۔

پودوں میں اوسمونک ایڈجسٹمنٹ کی وضاحت کریں۔

انشائی طرز سوالات

تفصیلی نمائندگی (Knowledge, Understanding, Application, Analytical & Conceptual) کی روشنی میں مرتب کیے گئے انشائی طرز سوالات

9.1 پودوں میں نیوٹریشن (Nutrition in plants)

سوال 1: نیوٹریشن اور نیوٹریٹس کی تعریف کریں۔ اس کی اقسام بیان کریں۔

جواب: نیوٹریشن:

نیوٹریشن (تغذیہ) سے مراد وہ عمل ہے جس میں خوراک تیار کی جاتی ہے یا حاصل کی جاتی ہے اور اسے نشوونما اور توانائی کے لیے جسمانی مادوں میں تبدیل کیا جاتا ہے۔
نیوٹریٹس: نیوٹریٹس (غذائی مادے) وہ مادے ہیں جو جانداروں کو توانائی، نشوونما، خوراک تیار کرتے ہیں۔ مثالیں ہیں کچھ بیسیک یا، تمام امی، اور مرمت اور بقا کے لیے درکار ہوتے ہیں۔

پودوں میں مندرجہ ذیل نیوٹریٹس: پودے فوٹوسنتھی سیز کے عمل سے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں۔ وہ سورج کی روشنی استعمال کر کے کاربن ڈائی آکسائیڈ اور پانی سے شوگرز بناتے ہیں۔ لیکن دوسرے بائیو مالیکول بنانے کے لیے انھیں زمین سے مادے لینے ہوتے ہیں۔ ایسے مادوں کو معدنی یعنی منرل نیوٹریٹس (mineral nutrients) کہتے ہیں۔ یہ زمین سے جذب کیے جانے والے وہ مخصوص کیمیائی آئنمنٹس ہیں جو پودوں کی نشوونما کے لیے ضروری ہیں۔

نیوٹریٹس کی اقسام:

میکرو نیوٹریٹس: وہ منرل جو پودوں کو بڑی مقدار میں چاہیے ہوتے ہیں، میکرو نیوٹریٹس کہلاتے ہیں۔

مثالیں: کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، فاسفورس، پوٹاشیم، نائٹروجن، سلفر، میگنیشیم اور میکینیشیم۔

مائیکرو نیوٹریٹس: وہ منرل جن کی پودوں کو کم مقدار میں ضرورت ہوتی ہے، مائیکرو نیوٹریٹس (micronutrients) کہلاتے ہیں۔

مثالیں: آئرن، نکل، بورون، کلورین، کاپر، مولیبدینم (molybdenum)، منگنیز (manganese) اور زنک۔

سوال 2: پودوں میں اہم میکرو نیوٹریٹس کی وضاحت کریں۔

جواب: پودوں کی زندگی میں میکرو نیوٹریٹس کا کردار:

میکرو نیوٹریٹس	پودے کی زندگی میں کردار
کاربن (Carbon)	بائیو مالیکیولز کا اہم جزو
ہائیڈروجن (Hydrogen)	بائیو مالیکیولز کا اہم جزو
آکسیجن (Oxygen)	بائیو مالیکیولز کا اہم جزو، سیلولر ریسپیریشن کے لیے ضروری
فاسفورس (Phosphorous)	اسے ٹی پی، نیوکلیک ایسڈز اور کو۔ اینزائمز کا جزو، بیج اگنے، فوٹوسنتھی سیز وغیرہ کے لیے لازمی
پوٹاشیم (Potassium)	سٹومیٹا کے کھلنے اور بند ہونے کو کنٹرول کرتا ہے
نائٹروجن (Nitrogen)	پروٹینز، کلوروفیل، اینزائمز اور نیوکلیک ایسڈز کا جزو
سلفر (Sulphur)	پروٹینز، وٹامنز اور اینزائمز کا حصہ
کیلشیم (Calcium)	اینزائمز کو فعال بناتا ہے سیل وال کی ساخت کا حصہ ہے، سبزل میں پانی کی حرکات پر اثر رکھتا ہے۔
میگنیشیم (Magnesium)	کلوروفیل کا جزو، ٹی اینزائمز کو فعال بناتا ہے۔

سوال 3: پودوں میں اہم مائیکرو نیوٹریٹس کے کردار کی وضاحت کریں۔

جواب: پودوں کی زندگی میں اہم مائیکرو نیوٹریٹس کا کردار:

مائیکرو نیوٹریٹس	پودے کی زندگی میں کردار
آئرن (Iron)	فوٹوسنتھی سیز کے لیے ضروری، بہت سے اینزائمز کو فعال بناتا ہے
مولیبدینم (Molybdenum)	اس اینزائم کا حصہ ہے جو نائٹریٹس کو امونیا میں تبدیل کرتا ہے
بورون (Boron)	شوگر کی ترسیل، سیل ڈویژن اور کچھ اینزائمز کے لیے اہم
کاپر (Copper)	بہت سے اینزائمز کا حصہ
منگنیز (Manganese)	فوٹوسنتھی سیز اور ریسپیریشن کے اینزائمز کے افعال میں شامل
زنک (Zinc)	بہت سارے اینزائمز کے لیے ضروری
کلورین (Chlorine)	پانی کی اوسموس میں شامل
نکل (Nickel)	نائٹروجن کے مینابولزم کے لیے ضروری

سوال 4: پودوں میں نائٹروجن اور میگنیشیم کا کردار بیان کریں۔

جواب: نائٹروجن اور میگنیشیم کا کردار:

نائٹروجن کا کردار: نائٹروجن تمام پروٹینز، اینزائمز اور نیوکلیک ایسڈز کا لازمی حصہ ہوتی

ہے۔ یہ کلوروفیل کا بھی حصہ ہے۔

نائٹروجن پودے کو تیز نشوونما میں مدد دیتی ہے۔ یہ بیج اور پھل بننے کے عمل کو تیز

کرتی ہے اور پختے کے معیار کو بھی بہتر کرتی ہے۔ پودے اپنی جڑوں کے ذریعے زمین سے

نائٹریٹس کی شکل میں نائٹروجن جذب کرتے ہیں۔

نائٹروجن کی کمی: نائٹروجن کی کمی سے پودے کی نشوونما سست ہو جاتی ہے۔ اس کی کمی سے کلوروفیل بھی ضرورت کے مطابق کافی نہیں بنتا اور اس لیے پتے

زرد ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسے کلوروسس (chlorosis) کہتے ہیں۔

میگنیشیم کا کردار: میگنیشیم کلوروفیل کا ایک جزو ہے۔ یہ ایسے ٹی اینزائمز کو بھی

فعال کرتا ہے جو نشوونما کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ یہ پھل بننے اور بیج اگنے


میں بھی مدد کرتا ہے۔ پودے کی جڑیں میگنیشیم کو آئنز (Mg^{2+}) کی شکل میں

جذب کرتی ہیں۔

میگنیشیم کی کمی:

میگنیشیم کی ضروری مقدار دستیاب نہ ہو تو پودا اپنے پتوں میں موجود کلوروفیل کو توڑنے لگتا ہے۔ اس سے پتے زرد پڑ جاتے ہیں یعنی کلوروسس کا

شکار ہو جاتے ہیں۔ زیادہ عرصے تک میگنیشیم کی کمی رہنے سے پتے گر بھی سکتے ہیں۔



(a)

(b)

(a) نائٹروجن کی کمی کی وجہ سے کلوروسس (b) میگنیشیم کی کمی کی وجہ سے کلوروسس

9.2 پودوں میں ٹرانسپورٹ Transport in plants

سوال 5: پودوں میں ٹرانسپورٹ سے کیا مراد ہے؟ وضاحت کریں۔

جواب: پودوں میں ٹرانسپورٹ:

ٹرانسپورٹ سے مراد کسی جاندار کے جسم میں پانی، نیوٹریٹس، ہارمونز اور بے کار مادوں کی نقل و حرکت ہے۔ یہ نقل و حرکت سبزل کے افعال،

نشوونما اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے رد عمل کے لیے ضروری ہوتی ہے۔

یاد رکھیے (Recall)

- پسیج ٹرانسپورٹ (Passive Transport): سیل ممبرین میں سے آئنز یا مالیکیولز کی زیادہ ارتکاز والے علاقے سے کم ارتکاز والے علاقے میں نقل و حرکت، پسیج ٹرانسپورٹ کہلاتی ہے۔ اس حرکت میں توانائی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پسیج ٹرانسپورٹ کی مثالیں ہیں ڈیفیوژن (diffusion) اور اوسموس۔
- ایکٹیو ٹرانسپورٹ (Active Transport): توانائی کا استعمال کرتے ہوئے سیل ممبرین میں سے آئنز یا مالیکیولز کی کم ارتکاز والے علاقے سے زیادہ ارتکاز والے علاقے میں نقل و حرکت کو ایکٹیو ٹرانسپورٹ کہتے ہیں۔
- اوسموس (Osmosis): یہ پانی کے مالیکیولز کی ایک سیل پریمیبل (semi-permeable) میں سے سولیوٹ (solute) کے کم ارتکاز والے علاقے سے سولیوٹ کے زیادہ ارتکاز والے علاقے میں نقل و حرکت ہے۔ اس حرکت میں توانائی کی ضرورت نہیں ہوتی۔

وضاحت: پودے زمین سے پانی اور منرل نیوٹریئنٹس یعنی نمکیات حاصل کرتے ہیں۔ ان مادوں کو جسم کے اوپر والے حصوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ اسی طرح، پتوں میں تیار ہونے والی خوراک کو جسم کے دوسرے حصوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ تمام زمینی پودوں (موسز mosses اور لیورورٹرز liverworts کے علاوہ) میں پانی، نمکیات اور خوراک کی جسم میں ٹرانسپورٹ کے لیے ذمہ دار زائیکلم اور فلوئم ٹشو ہیں۔ زائیکلم ٹشو پانی اور نمکیات کی ٹرانسپورٹ جبکہ فلوئم ٹشو خوراک کی ٹرانسپورٹ کرتا ہے۔

سوال 6: جڑ کی اندرونی ساخت کی وضاحت کریں اور بیان کریں کہ پانی اور آئنز کیسے جڑوں میں جذب ہوتے ہیں؟

جواب: جڑ کی اندرونی ساخت میں پانی اور آئنز کا جذب ہونا: جڑیں وہ آگنیز ہیں جو مٹی سے پانی اور نمکیات جذب کرتے ہیں۔ جڑ کی اندرونی ساخت مندرجہ ذیل خصوصیات رکھتی ہے جو جڑوں کو یہ فعل سرانجام دینے میں مدد کرتی ہیں۔


- | | |
|---|---|
| جڑ کے اندر، پانی اور نمکیات مرکز تک پہنچنے کے لیے دروازے اختیار کرتے ہیں: | جڑ کے اندر، پانی اور نمکیات مرکز تک پہنچنے کے لیے دروازے اختیار کرتے ہیں: |
| (i) سیلز میں سے گزر کر | (i) سیلز میں سے گزر کر |
| (ii) سیل والوں میں سے اور سیلز کے درمیان خالی جگہوں پر سے گزر کر | (ii) سیل والوں میں سے اور سیلز کے درمیان خالی جگہوں پر سے گزر کر |
- روٹ ہیز مٹی میں پانی کے ساتھ براہ راست جڑے ہوتے ہیں۔ روٹ ہیز کا سطحی رقبہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مٹی میں موجود پانی میں نمکیات کا ارتکاز روٹ ہیز کی نسبت کم ہوتا ہے۔ روٹ ہیز ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے ذریعے مزید نمکیات بھی اپنے اندر لے جاتے ہیں۔ روٹ ہیز میں نمکیات کے زیادہ ارتکاز کی وجہ سے پانی اوسموس (پسیج ٹرانسپورٹ) کر کے مٹی سے روٹ ہیز میں چلا جاتا ہے۔ یہاں سے یہ پانی حل شدہ نمکیات کو ساتھ لے کر اپنی ڈرس کے دوسرے سیلز میں داخل ہو جاتا ہے۔

کارٹیکس (Cortex): یہ اپنی ڈرس کے بالکل نیچے سیلز کا ایک چوڑا علاقہ ہے۔ اپنی ڈرس سے پانی کارٹیکس میں داخل ہوتا ہے۔

اینڈوڈرس (Endodermis): کارٹیکس کے سب سے اندرونی طرف اینڈوڈرس (endodermis) کی تہ ہے جو کارٹیکس سے پانی وصول کرتی ہے۔

ہیری سائیکل (Pericycle): یہ سیلز کی ایک باریک تہ ہے جو اینڈوڈرس کی اندرونی جانب موجود ہے۔

وےسکولر ٹشو (Vascular tissue): جڑ کے سب سے اندرونی حصے میں وےسکولر ٹشو یعنی زائیکلم اور فلوئم ہوتے ہیں۔ جڑ کے زائیکلم اور فلوئم مرکز میں ایک راڈ یا پائپ (pipe) کی صورت میں ہوتے ہیں۔ یہ پائپ تنے میں موجود ایسی ہی پائپ کے ساتھ متصل ہوتی ہے۔ ہیری سائیکل سے پانی جڑ کے زائیکلم میں چلا جاتا ہے جہاں سے اسے تنے کے زائیکلم میں منتقل کیا جاتا ہے۔



جڑ سے پانی اور آئنز کا جذب ہونا


3.3 ٹرانسپائریشن (Transpiration)

سوال 7: ٹرانسپائریشن کی تعریف کریں۔ ٹرانسپائریشن کی اقسام بیان کریں۔

جواب: ٹرانسپائریشن: پودے کی سطح سے پانی کا بخارات بن کر نکل جانا، ٹرانسپائریشن کہلاتا ہے۔

ٹرانسپائریشن کی اقسام: پودوں میں ٹرانسپائریشن کا عمل تین رستوں سے ہو سکتا ہے: یعنی پتوں کے سٹومیٹا کے ذریعے، پتے کی اپنی ڈرس پر موجود کیوٹیکل (cuticle) کے ذریعے اور چند پودوں کے تنوں میں موجود خاص سوراخوں یعنی سلز (lenticels) کے ذریعے۔

زیادہ تر ٹرانسپائریشن سٹومیٹا کے ذریعے ہوتی ہے اور اسے سٹومیٹل (stomatal) ٹرانسپائریشن کہتے ہیں۔ پتوں میں زائیکلم سے پانی میزوفل سیلز کی سیل والوں میں آ جاتا ہے۔ میزوفل سیلز کی گھسی دیواروں سے پانی بخارات بن کر پتے میں موجود خالی جگہوں یعنی ایئر سپیسز (air spaces) میں آ جاتا ہے۔ یہ بخارات سٹومیٹا کی طرف جاتے ہیں اور پھر باہر کی ہوا میں شامل ہو جاتے ہیں۔




ٹرانسپائریشن کے مراحل

سوال 8: سٹومیٹا کھلنے اور بند ہونے میں شامل واقعات بیان کریں۔

جواب: سٹومیٹا کھلنے اور بند ہونے کا میکا نزم: سٹومیٹا اپنے گارڈ سیلز (guard cells) کے زگر پریشز میں تبدیلی آنے پر کھلتے اور بند ہوتے ہیں۔ اپنی ڈس کے تمام سیلز میں سے صرف سائج (sausage) کی شکل کے گارڈ سیلز کے پاس کلورو پلاسٹ ہوتا ہے۔ ان کی سیل والز کی اندرونی اطراف (جو سوراخ کا سامنا کرتی ہیں) موٹی ہوتی ہیں۔ جبکہ ان کی سیل والز کی بیرونی اطراف پتلی ہوتی ہیں۔ جب گارڈ سیلز ٹرجڈ (turgid) ہوتے ہیں، تو ان کی شکل پھلیوں (beans) جیسی ہو جاتی ہے۔ ایسی شکل میں دونوں گارڈ سیلز کی سیل والز کی اندرونی اطراف ایک دوسرے سے دور ہٹ جاتی ہیں۔ اس طرح ان کے درمیان کا سٹوما کھل جاتا ہے۔

دن کے وقت ہونے والے واقعات: دن کے وقت گارڈ سیلز ایکٹو ٹرانسپورٹ کر کے ارد گرد کے سیلز سے پوٹاشیم آئنز اپنے اندر لے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے گارڈ سیلز کے اندر سولیوٹ (solute) کا ارتکاز اپنی ڈس کے دوسرے سیلز کی نسبت بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے اپنی ڈس کے سیلز سے پانی اوسموس کر کے گارڈ سیلز میں آتا ہے۔ گارڈ سیلز ٹرجڈ (turgid) ہو جاتے ہیں اور ان کی اندرونی دیواریں ایک دوسرے سے دور ہٹ جاتی ہیں۔ اس طرح ان کے درمیان موجود سٹوما کھل جاتا ہے۔ دن کے وقت گارڈ سیلز میں سولیوٹ کا ارتکاز زیادہ ہی رہتا ہے کیونکہ وہ فوٹوسنتھی سیز کر کے گلوکوز تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ سولیوٹ کے زیادہ ارتکاز کی وجہ سے پانی ان کے اندر ہی رہتا ہے اور یہ ٹرجڈ رہتے ہیں۔

شام کے وقت ہونے والے واقعات: شام کے وقت گارڈ سیلز میں گلوکوز کا ارتکاز کم ہو جاتا ہے۔ پوٹاشیم آئنز بھی واپس اپنی ڈس سیلز میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں پانی بھی گارڈ سیلز سے نکل کر اپنی ڈس کے دوسرے سیلز میں چلا جاتا ہے۔ اس سے گارڈ سیلز کا ٹرگرشم ہو جاتا ہے اور ان کی اندرونی دیواریں ایک دوسرے کے ساتھ لگ جاتی ہیں اور ان کے درمیان سٹوما بند ہو جاتا ہے۔



سوال 9: نمبر پچھ، ہوا اور نفاذ میں نمی کو ان عوامل کے طور پر بیان کریں جو ٹرانسپائریشن کی رفتار پر اثر کرتے ہیں؟


جواب: ٹرانسپائریشن کی رفتار پر اثر انداز ہونے والے عوامل: مختلف عوامل ٹرانسپائریشن کی رفتار پر اثر انداز ہوتے ہیں، مثلاً:

- نمبر پچھ: نمبر پچھ بڑھنے پر ٹرانسپائریشن کی رفتار تیز ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ نمبر پچھ پر پانی تیزی سے بخارات میں تبدیل ہوتا ہے۔
- پتے کا سطحی رقبہ اور سٹومیٹا کی تقسیم: باریک پتوں کی نسبت زیادہ سطحی رقبہ رکھنے والے (چوڑے) پتوں میں ٹرانسپائریشن زیادہ ہوتی ہے۔ زیادہ تر پودوں میں، پتے کی زیریں سطح پر سٹومیٹا کی تعداد بالائی سطح کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے زیریں سطح سے ٹرانسپائریشن کی رفتار زیادہ ہوتی ہے۔
- ہوا میں نمی: ہوا میں جتنی زیادہ نمی (نفاذ میں بخارات کی فیصد مقدار) ہوگی، ٹرانسپائریشن کی رفتار اتنی ہی کم ہوگی۔
- متحرک ہوا: متحرک ہوا ٹرانسپائریشن کو تیز کرتی ہے۔ یہ ہوا پتوں کے ارد گرد مرطوب ہوا کو دور لے جاتی ہے جس سے زیادہ پانی بخارات بنتا ہے۔

9.4 پودوں میں پانی کی ٹرانسپورٹ (Transport of water in plants)

سوال 10: پودوں میں پانی کی ٹرانسپورٹ کا میکا نزم بیان کریں۔

جواب: پودوں میں پانی کی ٹرانسپورٹ: جڑیں جذب شدہ پانی کو پودے کے پتوں تک نہیں دھکیل سکتیں۔ اس کی بجائے، پتے جڑوں میں موجود پانی کو پتوں کی ایک قوت لگاتے ہیں۔



پتوں میں کھنچاؤ کی یہ قوت ان کی سطح سے پانی کی ٹرانسپائریشن کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے اسے ٹرانسپائریشن کا کھنچاؤ یعنی ٹرانسپائریشنل پل (transpirational pull) کہتے ہیں۔ جب پتے کے میزوفل سیلز سے پانی نکلتا ہے تو پتے کی زائیم ہالیوں سے مزید پانی ان میں داخل ہو جاتا ہے۔ زائیم ہالیوں کے اندر پتے سے جڑوں تک پانی کا مسلسل کالم ہوتا ہے۔ پانی کا یہ مسلسل کالم بننے کی تین وجوہات ہیں:

- (i) پانی کے مالیکیولز کے درمیان کشش کا ہونا
- (ii) زائیم ہالیوں کا ڈائامیٹر تنگ ہونا
- (iii) وہ کشش جس سے پانی کے مالیکیولز زائیم کی دیواروں سے چپکے ہوتے ہیں۔

پتے کی زائیم تالی میں جب پانی کا ایک مالیکیول اوپر چڑھتا ہے تو یہ پتے، تنے اور جڑ کی زائیم میں پانی کے تمام کالم پر ایک کساؤ یعنی ٹینشن (tension) پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے نتیجے میں پانی کا تمام کالم اوپر کی طرف کھینچا ہے۔

9.5 پودوں میں خوراک کی منتقلی (Translocation of food in plants)

سوال 11: پریشر فلو میکا نزم کے ذریعے پودوں میں خوراک کی منتقلی کا میکا نزم بیان کریں۔

جواب: پودے کے جسم میں خوراک فلوئم کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائی جاتی ہے۔ زیادہ تر پودوں میں ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے گلوکوز کو سکروز (sucrose) میں تبدیل کر لیا جاتا ہے۔

پریشر فلو میکا نزم: پودوں میں خوراک کی منتقلی کے طریقہ کار کو پریشر فلو (Pressure Flow) (پتوں کی طرف)۔ فلوئم خوراک کے لیے ایک دو طرفہ رستہ ہے۔ خوراک کے سفر کرنے کی سمت کا فیصلہ سورس اور سنک میں رسد اس میکا نزم کے مطابق، محل شدہ خوراک ماخذ یعنی سورس (source) سے (supply) اور مطلب (demand) کے مطابق کیا جاتا ہے۔

سینک یعنی سنک (sink) کی طرف بہتی ہے۔ خوراک کے سورسز میں فوٹوسنتھی سیز کرنے والے نشو و نما (پتے کے میزوفل سیلز) اور خوراک ذخیرہ کرنے والے نشو و نما (مثلاً جڑیں) شامل ہیں۔ خوراک کے سنکس (sinks) میں خوراک استعمال کرنے والے نشو و نما (جڑوں اور پتوں کے نشو و نما پاتے کنارے) اور خوراک ذخیرہ کرنے والے نشو و نما شامل ہیں۔



چمال پر موجود لینٹی سلز (lenticels)

پتوں اور چھوٹی عمر کے تنوں کی اپنی ڈرس میں موجود سٹومینا کے رستے ہوا اندر باہر آتی جاتی ہے۔ جسم کے اندر سیلز اور ہوا کے درمیان گیہوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ لکڑی والے تنوں (woody stems) کی تمام سطح پر چمال (bark) ہوتی ہے۔ چمال میں سے گیہوں کا تبادلہ نہیں ہو سکتا۔ تاہم چمال میں مخصوص سوراخ لینٹی سلز (lenticels) ہوتے ہیں، جو ماحول کے ساتھ گیہوں کا تبادلہ ہونے دیتے ہیں۔

9.7 پودوں میں ایکسکریشن کا میکانزم (Mechanism for Excretion in Plants)


9.8 پودوں میں اوسمٹک مطابقتیں (Osmotic Adjustments in Plants)

سوال 13: پودوں میں اضافی کاربن ڈائی آکسائیڈ اور آکسیجن کی ایکسکریشن کا میکانزم بیان کریں۔
جواب: اضافی کاربن ڈائی آکسائیڈ اور آکسیجن کی ایکسکریشن:

دن کے وقت سیلولر ریسپیریشن میں بننے والی کاربن ڈائی آکسائیڈ فوٹوسنتھی سیز میں استعمال ہو جاتی ہے۔ البتہ رات کے وقت، جب فوٹوسنتھی سیز نہیں ہو رہی ہوتی، کاربن ڈائی آکسائیڈ ایک بے کار مادہ ہو جاتی ہے۔ پودے اس کاربن ڈائی آکسائیڈ کو اپنی سطح اور سٹومینا کے ذریعے باہر نکالتے ہیں۔ اسی طرح دن کے وقت فوٹوسنتھی سیز میں پیدا ہونے والی آکسیجن کو سیلولر ریسپیریشن میں استعمال کیا جاتا ہے۔ آکسیجن کی اضافی مقدار کو سٹومینا کے ذریعہ فضا میں خارج کر دیا جاتا ہے۔

سوال 14: پودے اپنے جسم سے اضافی پانی اور نمکیات کیسے خارج کرتے ہیں؟

جواب: اضافی پانی کی ایکسکریشن: پودے اپنے سیلز کے ویکیلز (vacuoles) میں پانی کی بڑی مقداروں کو ذخیرہ کرتے ہیں۔ اس سے سیلز میں ٹرگر (turgor) بنتا ہے جو پودے کے نرم حصوں کو سہارا دیتا ہے۔ اگر پودوں کے پاس اضافی یا فالتو پانی ہو تو وہ اسے دو طریقوں سے باہر نکالتے ہیں۔
1- ٹرانسپائریشن 2- گلیشن




ٹرانسپائریشن کی اقسام

1- ٹرانسپائریشن (Transpiration): پودے دن کے وقت اضافی پانی کو ٹرانسپائریشن کے ذریعے خارج کرتے ہیں۔ ٹرانسپائریشن کی تین اقسام ہیں یعنی سٹومیل ٹرانسپائریشن (Stomatal transpiration)، کیونیکلر ٹرانسپائریشن (cuticular transpiration) اور لینٹی کیولر ٹرانسپائریشن (lenticular transpiration)۔

2- گلیشن (Guttation): رات کے وقت، جب سٹومینا بند ہوتے ہیں، ٹرانسپائریشن نہیں ہوتی۔ اس لیے بہت سے پودے اضافی پانی اپنے زائلم میں جمع کر لیتے ہیں۔ یہ پانی دن کے وقت نکالا جاتا ہے۔ کچھ پودے جیسے کرگھاس،

رات کے وقت فالتو پانی کو نکالنے کے لیے مخصوص طریقہ استعمال کرتے ہیں جسے گلیشن کہتے ہیں۔ گلیشن میں اضافی پانی پتوں کی نوک یا کناروں پر موجود چھوٹے سوراخوں کے ذریعے باہر نکالتے ہیں۔ یہ عمل پودے میں پانی کی مقدار کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے۔



پودوں میں خوراک کی ٹرانسپورٹ

سورس کے مقام پر، خوراک (سکرز) ایکٹو ٹرانسپورٹ کے ذریعے فلوئم کی سیوٹیوب (sieve tube) میں داخل کی جاتی ہے۔ اس ایکٹو ٹرانسپورٹ کے لیے فلوئم کے کمپینین (companion) سیلز توانائی مہیا کرتے ہیں۔ سیوٹیوب میں قریبی زائلم ٹشو کی نسبت سویلوٹ کا ارتکاز زیادہ ہوجانے کی وجہ سے پانی اوسموس کے ذریعے سیوٹیوب میں داخل ہوجاتا ہے۔ اس طرح ان نیوز میں فلوئمڈ پریشر بڑھ جاتا ہے اور خوراک کا محلول (سولیوشن) سنک کی طرف بہتا ہے۔

سنک کے مقام پر خوراک کو ایکٹو ٹرانسپورٹ کے ذریعے سیوٹیوبز سے نکالا جاتا ہے۔ پانی بھی اوسموس کر کے سیوٹیوبز سے زائلم میں آ جاتا ہے۔ اس طرح، سیوٹیوب میں فلوئمڈ پریشر کم ہوجاتا ہے۔ سورس میں فلوئمڈ پریشر زیادہ ہونے اور سنک میں کم ہونے کی وجہ سے سورس سے خوراک کی بڑی مقدار کا ایک بہاؤ سنک کی طرف آتا ہے۔

9.6 پودوں میں گیہوں کا تبادلہ (Gaseous Exchange in Plants)


سوال 12: پودوں میں گیہوں کے تبادلے کا مکمل بیان کریں۔

جواب: پودوں میں گیہوں کا تبادلہ:

- دن کے وقت پودے کے تمام سیلز سیلولر ریسپیریشن کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے بڑھوسوں میں فوٹوسنتھی سیز بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ فوٹوسنتھی سیز میں وہ کاربن ڈائی آکسائیڈ استعمال کرتے ہیں اور آکسیجن خارج کرتے ہیں۔ پودے وہ کاربن ڈائی آکسائیڈ استعمال کرتے ہیں جو ان کی ریسپیریشن میں پیدا ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ ماحول سے بھی کاربن ڈائی آکسائیڈ لیتے ہیں۔
- ریسپیریشن کے لیے پودے وہ آکسیجن استعمال کرتے ہیں جو ان کی فوٹوسنتھی سیز میں پیدا ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ ماحول میں کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج کرتے ہیں۔


اس طرح دن کے وقت پودے ماحول کو آکسیجن دے رہے ہوتے ہیں اور وہاں سے کاربن ڈائی آکسائیڈ لے رہے ہوتے ہیں۔ رات کے وقت تمام سیلز میں ریسپیریشن ہو رہی ہوتی ہے جبکہ فوٹوسنتھی سیز نہیں ہو رہی ہوتی۔ اس لیے پودے ماحول سے آکسیجن لیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج کرتے ہیں۔

گیہوں کے تبادلہ کا مکمل:



(a) ایک پتے میں گیہوں کا تبادلہ (b) پودے میں گیہوں کا تبادلہ

پودوں میں جسم اور ماحول کے درمیان گیہوں کا تبادلہ سطح کے ذریعے ہوتا ہے۔ جڑ، تنے اور پتے کی اپنی ڈرس (epidermis) ماحول اور اندرونی سیلز کے درمیان گیہوں کے تبادلے کی اجازت دیتی ہے۔ کچھ حصوں میں اپنی ڈرس کے اوپر ایک موٹی تہہ کیونیکل (cuticle) بھی ہوتی ہے۔ کیونیکل کے ذریعے بھی گیہوں کا تبادلہ ہو جاتا ہے۔



کیلین اور شبنم (dew) بننا دو مختلف عمل ہیں۔ شبنم پودے کی سطح پر موجود وہ آبی قطرے ہوتے ہیں جو ہوا میں موجود بخارات کے کثیف ہو جانے سے بنتے ہیں۔

شکل: مختلف چوں میں کیلین کا عمل

سوال 15: بے کار مادوں کے اخراج کے لیے پودوں میں میکنازم بیان کریں۔

جواب: مینابولزم کے دوسرے بے کار مادوں کی ایکسکریشن Excretion of other Metabolic Wastes

پودے مختلف طریقوں سے مینابولزم کے دوسرے بے کار مادے باہر نکالتے ہیں۔ چند پودے بے کار مادوں کو غیر نقصان دہ قلموں (crystals) کی صورت میں ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ کچھ پودے اپنے بے کار مادوں کو چتوں میں رکھتے ہیں۔ جب ان کے پتے گرتے ہیں تو جسم کو بے کار مادوں سے بھی چھٹکارا مل جاتا ہے۔ چند پودے قوت لگا کر مخصوص سوراخوں کے ذریعے اپنے بے کار مادے نکالتے ہیں۔ مثال کے طور پر ربڑ (rubber) کا پودا لیکس (latex) نکالتا ہے، کیکر (Acacia) کا درخت گمز (gums) نکالتا ہے، کوئی فر (conifer) درخت ریزن (resins) خارج کرتا ہے، اور بھنڈی (ladyfinger) کا پودا میوکیج (mucilage) خارج کرتا ہے۔



پودوں میں ایکسکریشن

سوال 16: میزوفائٹس، ہیڈروفائٹس اور زیروفائٹس میں اوسموتک مطالعتیں بیان کریں۔

جواب: میزوفائٹس (Mesophytes): یہ خشکی کے پودے ہیں جو ایسی زمین میں رہتے ہیں جہاں پانی کی مناسب مقدار دستیاب ہوتی ہے۔ ان پودوں کا روت سٹم وسیع ہوتا ہے جو اچھے طریقے سے پانی جذب کرتا ہے۔ ان کے جسم کی زیادہ تر سطح پر موسمی کیلیکل (waxy cuticle) ہوتی ہے، جو پانی کے ضیاع کو روکتی ہے۔ مزید برآں، ٹرانسپائریشن کو کم کرنے کے لیے یہ پودے اپنے سٹومیٹا بند رکھتے ہیں۔ میزوفائٹس کی مثالیں کئی، ہی شانہ (clover) اور گلاب وغیرہ ہیں۔

ہیڈروفائٹس (Hydrophytes): یہ پودے تازہ پانی (fresh water) یعنی تالاب، جمیل وغیرہ یا گیلی مٹی میں رہتے ہیں۔ ان میں پودے کی تمام سطح سے پانی جذب ہوتا ہے۔ وہ اپنے جسم سے اضافی پانی نکالنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کئی ہیڈروفائٹس کے پتے چوڑے ہوتے ہیں جو پانی کی سطح پر تیرتے ہیں۔ ان چتوں کی بالائی سطح پر زیادہ سٹومیٹا ہوتے ہیں۔ پانی ان سٹومیٹا سے باہر نکلتا ہے۔ ایسے پودوں کی ایک عام مثال کنول (water lily) ہے۔



1- نماز (میزوفائٹ) کے چوں کے بند سٹومیٹا
2- کنول (ہیڈروفائٹ) کے چوڑے پتے



3- کیلینس (زیروفائٹ) کا گودے دار تار
4- سمندری پودے (ہیڈروفائٹ) کے پتے پنکھٹیاں کے زخا

زیروفائٹس (xerophytes): یہ پودے بہت خشک ماحول (صحراؤں) میں رہتے ہیں۔ قریباً خشک مٹی سے پانی جذب کرنے کے لیے ان کی جڑیں بہت گہری ہوتی ہیں۔ ان کی سطح پر سٹومیٹا بہت کم ہوتے ہیں۔ پانی کا ضیاع روکنے کے لیے ان کی سطح پر موسمی کیلیکل ہوتی ہے۔ چند زبردی فائٹس مثلاً کیکائی (cacti) (واحد کیلینس) اپنی مخصوص جڑوں یا چتوں میں پانی ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ ایسی جڑیں یا چتے نرم اور زس بھرے (juicy) ہوتے ہیں۔ ایسے آرگنز کو گودے دار یعنی سکولینٹ (succulent) آرگنز کہتے ہیں۔

پودوں میں اوسموتک مطالعتیں

ہیڈروفائٹس (Halophytes): یہ پودے نمکین پانیوں (مثلاً سمندر یا نمکین دلدلوں) والے مسکن میں رہتے ہیں۔ پانی ان کے باہر ٹانک (hypotonic) جسم سے نکل کر باہر باہر ٹانک (hypertonic) ماحول میں جانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ پودے پانی سے نمکیات جذب کرتے ہیں اور اپنے جسم کو باہر ٹانک بنا لیتے ہیں۔ اس طرح پانی باہر نہیں نکلتا۔ زائد نمکیات کو سیلز میں ذخیرہ کیا جاسکتا ہے یا چتوں پر موجود سالت گینڈز (Salt glands) سے باہر نکالا جاتا ہے۔ سمندری گھاس (sea grass) کے کئی پودے اس گروپ میں شامل ہیں۔

انشائی طرز کنسپچوئل (Conceptual) سوالات

سوال 1: اگر پودوں میں ٹرانسپائریشن نہیں ہوتی تو کیا ہوگا؟

جواب: اگر پودوں میں ٹرانسپائریشن نہ ہوتی تو پودا متعدد وجوہات کی بنا پر مر سکتا ہے۔

- پانی کا جمع ہونا: ٹرانسپائریشن کے بغیر، پودے میں پانی جمع ہو جائے گا، جو نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔
- چوں تک پانی کی فراہمی ناممکن: ٹرانسپائریشن کے بغیر پانی چوں تک نہیں پہنچے گا۔ اس طرح فوٹو سنتھی سیز بھی نہیں ہوگی۔
- زیادہ گرم ہونا: اگر پودے سے پانی کا اخراج نہیں ہوگا تو پودوں کے نشوز زیادہ ہیٹ کی وجہ سے مرجائیں گے۔
- غذائی اجزاء کی نقل و حمل کی تا کا می: ٹرانسپائریشن کے بغیر، غذائی اجزاء کی نقل و حمل بھی ناممکن ہوگی۔

سوال 2: پودوں کے لیے نقل مکانی (ٹرانسلوکیشن) کیوں ضروری ہے؟

جواب: ٹرانسلوکیشن: ٹرانسلوکیشن پودے میں غذائی اجزاء کی نقل و حمل کا عمل ہے۔ جہاں سے وہ تیار ہونے سے لے کر جہاں وہ ذخیرہ ہوتے ہیں یا استعمال ہوتے ہیں۔

- خوراک کی پیداوار: پودے فوٹو سنتھی سیز کے ذریعے اپنے چوں میں کاربوہائیڈریٹس (شوگرز) پیدا کرتے ہیں۔ تاہم پودے کے دوسرے حصوں جہاں فوٹو سنتھی سیز نہیں ہوتی ان کو بھی ان غذائی اجزاء (کاربوہائیڈریٹس) کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹرانسلوکیشن ان غذائی اجزاء کو چوں سے پودے کے باقی حصوں میں منتقل کرتی ہے۔

- فصل کی پیداوار: فصل کی زیادہ سے زیادہ پیداوار کے لیے ٹرانسلوکیشن ضروری ہے کیونکہ یہ پھلوں اور بیجوں کے لیے غذائی اجزاء فراہم کرتی ہے۔
- غذائیت کی ترکیب: ٹرانسلوکیشن انسانوں کے لیے پودوں کی خوراک کے غذائی اجزاء کو بڑھاتی ہے۔
- سوال 3: اگر پودے میں سٹومیٹا موجود نہ ہو کیا ہوگا؟
- جواب: اگر پودے میں سٹومیٹا نہ بنائیں گے تو وہ زندہ نہیں رہ سکیں گے کیونکہ:
- فوٹو سنتھیسی: پودوں کو خوراک بنانے اور فوٹو سنتھیسی سیز کرنے کے لیے کاربن ڈائی آکسائیڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ سٹومیٹا کے بغیر، پودے کاربن ڈائی آکسائیڈ اندر لے جانے سے قاصر ہوں گے۔
- اضافی پانی کا ضیاع: پودے ٹرانسپائریشن کے ذریعے اپنے جسم سے اضافی پانی نہیں نکال سکیں گے۔
- آکسیجن کا اخراج: پودے آکسیجن خارج کرنے کے قابل نہیں ہوں گے جو زمین پر موجود دیگر جانداروں کے لیے ضروری ہے۔

معروضی سوالات

تجزیہ کی نئی امتحانی تکنیک (Knowledge, Understanding, Application, Analytical & Conceptual) کی روشنی میں مرتب کیے گئے کثیر الانتخابی سوالات

9.1 پودوں میں نیوٹریشن (Nutrition in plants)

9.2 پودوں میں ٹرانسپورٹ (Transport in plants)

☆ درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔

- مندرجہ ذیل میں سے کون سے آلوٹراک جاعدار ہیں؟
(A) بیکیٹیریا (B) الگی (C) پودے (D) دیے گئے تمام
- پودے سورج کی روشنی استعمال کر کے کاربن ڈائی آکسائیڈ اور پانی سے بناتے ہیں:
(A) کاربوہائیڈریٹس (B) نائٹروجن (C) فاسفورس (D) شوگر
- پودے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں:
(A) فوٹو سنتھیسی سیز سے (B) ریپائریشن سے (C) سیلولر ریپائریشن سے (D) گلائیولائسز سے
- مندرجہ ذیل میں سے کون سا میکرو نیوٹریٹ ہے؟
(A) کاربن (B) آئرن (C) کلورین (D) بورون
- کون سا بائیو مالیکیول سیلولر ریپائریشن کے لیے ضروری ہے؟
(A) نائٹروجن (B) آکسیجن (C) کاربن (D) ہائیڈروجن
- تمام بائیو مالیکیولز کا میجر کیمپنٹ ہے:
(A) سلفر (B) میکینیم (C) آکسیجن (D) کاربن
- کون سا میکرو نیوٹریٹ سٹومیٹا کے کھلنے اور بند ہونے کو کنٹرول کرتا ہے؟
(A) فاسفورس (B) پوٹاشیم (C) میکینیم (D) سلفر
- پودے میں میکینیم کا کام ہے:
(A) یہ انزائمز کو فعال بناتا ہے (B) یہ سیل وال کی ساخت کا حصہ ہے (C) سیلز میں پانی کی حرکات کو کنٹرول کرتا ہے (D) یہ تمام

- پروٹین، کلوروفیل، اینزائمز اور نیوٹریٹک ایسڈز کا جزو ہے:
(A) بورون (B) کلورین (C) زنک (D) نائٹروجن
- کون سا میکرو نیوٹریٹ پانی کی اوسموس میں شامل ہے؟
(A) کاپر (B) مولیبدیم (C) زنک (D) کلورین
- کس نیوٹریٹ میں کمی کی وجہ سے پودے کی نشوونما متاثر ہوتی ہے؟
(A) آئرن (B) سلفر (C) میکینیم (D) نائٹروجن
- کلوروفیل کی کمی کی وجہ سے پتے کارنگ ہو جاتا ہے:
(A) براؤن (B) پیلا (C) سبز (D) نیلا
- میکینیم کا کام ہے:
(A) پودے کی نشوونما کے لیے ضروری ہے (B) بیج اگنے میں مدد دیتا ہے (C) اینزائمز کو فعال بناتا ہے (D) دیے گئے تمام
- زیادہ عمر سے تک کمی کی وجہ سے پتے گرنے لگتے ہیں:
(A) میکینیم (B) میکینیم (C) کلوروفیل (D) نائٹروجن
- پودے جو چھوٹے جانوروں (مثلاً حشرات) کو پکڑتے ہیں اور انہیں ڈائی جیسٹ کرتے ہیں کہلاتے ہیں:
(A) کارنی دورس (B) بیڈوٹراک (C) ڈی کپوزرز (D) آئوٹراک
- مالکیوٹری زیادہ ارتکاز والے علاقے سے کم ارتکاز والے علاقے میں نقل و حرکت کہلاتی ہے:
(A) ایکٹو ٹرانسپورٹ (B) پسیو ٹرانسپورٹ (C) اوسموس (D) ڈیفیوژن
- کون سے عمل میں انرجی کی ضرورت نہیں ہوتی؟
(A) پسیو ٹرانسپورٹ میں (B) ایکٹو ٹرانسپورٹ میں (C) اوسموس میں (D) A اور C دونوں میں
- جڑ کی سب سے بڑی تہہ ہے:
(A) کارنیکس (B) اپی ڈرکس (C) اینڈوڈرکس (D) ہیری سائیکل
- روٹ ہیرڈکس کے ذریعے نمکیات کو اپنے اندر لے جاتے ہیں؟
(A) اوسموس (B) پسیو ٹرانسپورٹ (C) ایکٹو ٹرانسپورٹ (D) ڈیفیوژن
- اپی ڈرکس کے نیچے سیلز کا ایک چوڑا علاقہ ہے:
(A) اینڈوڈرکس (B) روٹ ہیر (C) اپی ڈرکس (D) کارنیکس
- وٹیکولر ٹیوڈ ہیں:
(A) زائیکم (B) فلوئم (C) ڈرکس (D) A اور B دونوں
- پودے میں ہیری سائیکل سے پانی جاتا ہے:
(A) فلوئم میں (B) زائیکم میں (C) جڑ میں (D) تنے میں

36۔ سوس کے مقام پر، خوراک ایکٹوٹرانسپورٹ کے ذریعے سیٹوب میں داخل کی جاتی ہے:

- (A) زائلم کی (B) فلوئم کی (C) A اور B دونوں کی (D) سوس کی

37۔ سٹک کے مقام پر خوراک کو کس کے ذریعے سیٹوب سے نکالا جاتا ہے؟

- (A) اوسموس کے (B) ایکٹوٹرانسپورٹ کے (C) ڈیفیوژن کے (D) ہیپوٹرانسپورٹ کے

9.7 پودوں میں ایکسکریشن کا میکانزم (Mechanism for Excretion in Plants)

9.8 پودوں میں اوسموسک مطابقتیں (Osmotic Adjustments in Plants)

38۔ پودے پانی کی بڑی مقدار کو ذخیرہ کرتے ہیں:

- (A) کلوروپلاسٹ میں (B) رائبوسوم میں (C) ویکیل میں (D) سائٹوپلازم میں

39۔ دن کے وقت، پودے اضافی پانی کو خارج کرتے ہیں:

- (A) کنڈیشن میں (B) فوٹوسنتھس میں (C) ریسپائریشن میں (D) ٹرانسپائریشن میں

40۔ ٹرانسپائریشن کی اقسام ہیں:

- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

41۔ رات کے وقت، جب سٹومینا بند ہوتے ہیں تو پودے اضافی پانی ذخیرہ کرتے ہیں:

- (A) زائلم میں (B) فلوئم میں (C) سیٹوب میں (D) سٹک میں

42۔ کون سا عمل پودوں میں پانی کی مقدار کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے؟

- (A) فوٹوسنتھس (B) ریسپائریشن (C) کنڈیشن (D) ٹرانسپائریشن

43۔ بھنڈی کا پودا خارج کرتا ہے:

- (A) ریزنز (B) کمز (C) لینکس (D) امیوٹیل

44۔ ریزنز خارج کرتا ہے:

- (A) ریز کا پودا (B) بھنڈی کا پودا (C) کیکر کا درخت (D) کوئی فر کا درخت

45۔ کیکر کون سا مینابوٹک ویسٹ خارج کرتا ہے؟

- (A) کمز (B) میوٹیل (C) لینکس (D) ریزنز

46۔ مساکن کی بنیاد پر پودوں کی اقسام ہیں:

- (A) تین (B) چار (C) پانچ (D) چھ

47۔ خشکی پر پائے جانے والے پودے ہیں:

- (A) ہائیڈروفائٹس (B) میزوفائٹس (C) زیروفائٹس (D) ہیلوفائٹس

48۔ مکئی اور گلاب مثالیں ہیں:

- (A) ہائیڈروفائٹس (B) میزوفائٹس (C) زیروفائٹس (D) ہیلوفائٹس

49۔ ہائیڈروفائٹس کی مثال ہے:

- (A) گلاب (B) لینکس (C) مکئی (D) کنول

9.3 ٹرانسپائریشن (Transpiration)

9.4 پودوں میں پانی کی ٹرانسپورٹ (Transport of water in plants)

23۔ پودے کی سطح سے پانی کا بخارات بن کر نکل جانا کہلاتا ہے:

- (A) ریسپائریشن (B) ٹرانسپائریشن (C) کنڈیشن (D) سٹوئیٹل ٹرانسپائریشن

24۔ زیادہ تر ٹرانسپائریشن ہوتی ہے:

- (A) لیٹنی سیز کے ذریعے (B) گارڈ سیز کے ذریعے (C) کیونیکل کے ذریعے (D) سٹوئیٹل کے ذریعے

25۔ ٹرانسپائریشن کا عمل ہو سکتا ہے:

- (A) سٹوئیٹل کے ذریعے (B) کیونیکل کے ذریعے (C) لیٹنی کے ذریعے (D) ان تمام کے ذریعے

26۔ پودوں میں پانی کی شدید کمی کہلاتی ہے:

- (A) ریسپائریشن (B) ٹرانسپائریشن (C) نیوزیشن (D) ڈیسیکیشن

27۔ سٹوئیٹل کھل جاتے ہیں جب گارڈ سیز:

- (A) فلیکسڈ ہو جاتے ہیں (B) کلورائڈ آئنز لیتے ہیں (C) ٹرچڈ ہو جاتے ہیں (D) پانی کھودتے ہیں

28۔ ٹرانسپائریشن کی رفتار کا انحصار نہیں ہوتا:

- (A) پتے کی سطح کے رقبہ پر (B) نمبر پتے پر (C) ہوا کی حرکت پر (D) جیری سائیکل پر

29۔ کچھ پودے رات کے وقت اپنے سٹوئیٹل کھولتے ہیں، جب پانی کی کمی کا دباؤ ہوتا ہے:

- (A) زیادہ (B) کم (C) برابر (D) نہیں ہوتا

30۔ نمبر پتے کے پودے سے ٹرانسپائریشن کی رفتار:

- (A) بڑھ جاتی ہے (B) کم ہو جاتی ہے (C) برابر رہتی ہے (D) کوئی اثر نہیں ہوتا

9.5 پودوں میں خوراک کی منتقلی (Translocation of food in plants)

9.6 پودوں میں گیسوں کا تبادلہ (Gaseous Exchange in Plants)

31۔ ریسپائریشن کے دوران پودے کون سی گیس خارج کرتے ہیں؟

- (A) آکسیجن (B) ہائیڈروجن (C) کاربن ڈائی آکسائیڈ (D) کاربن مونو آکسائیڈ

32۔ کلوری والے پتوں کی تمام سطح پر ہوتی ہے:

- (A) اپی ڈرمس (B) اینڈوڈرمس (C) کیونیکل (D) چھال (bark)

33۔ پودوں کے پتوں میں موجود سوراخ کہلاتے ہیں:

- (A) سٹوئیٹل (B) گارڈ سیز (C) لیٹنی سیز (D) میزوفیل سیز

34۔ فلوئڈ پریشر زیادہ ہونے کی وجہ سے سوس سے خوراک آتی ہے:

- (A) سیٹوب میں (B) سٹک میں (C) کمیٹیشن سیز میں (D) زائلم میں

35۔ زیادہ تر پودوں میں ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے گلوکوز کو تھیل کر لیا جاتا ہے:

- (A) پروٹین میں (B) لپڈز میں (C) سکروز میں (D) فکٹوز میں

50- زیردائنس رہتے ہیں:

(A) تازہ پانی میں (B) خشک ماحول میں (C) صحراؤں میں (D) نمکین پانیوں میں

51- زیردائنس میں پانی کے اخراج کو روکنے کے لیے موجود ہوتے ہیں:

(A) سٹومینا (B) کیونیکل (C) اپی ڈرمس (D) A اور B دونوں

52- کیکائی مثال ہے:

(A) ہیلوفائنس کی (B) ہائیڈروفائنس کی (C) زیردائنس کی (D) میزوفائنس کی

53- نمکین پانی (مثلاً سمندر یا نمکین دلدل) والے مسکن میں رہتے ہیں:

(A) میزوفائنس (B) ہیلوفائنس (C) زیردائنس (D) ہائیڈروفائنس

جوابات

(D) -1	(D) -2	(A) -3	(A) -4	(B) -5	(D) -6	(B) -7	(D) -8	(D) -9	(D) -10
(D) -11	(B) -12	(D) -13	(B) -14	(A) -15	(B) -16	(D) -17	(B) -18	(C) -19	(D) -20
(D) -21	(B) -22	(B) -23	(D) -24	(D) -25	(D) -26	(C) -27	(D) -28	(B) -29	(A) -30
(C) -31	(D) -32	(C) -33	(B) -34	(C) -35	(B) -36	(B) -37	(C) -38	(D) -39	(B) -40
(A) -41	(C) -42	(D) -43	(D) -44	(D) -45	(B) -46	(B) -47	(B) -48	(D) -49	(C) -50
(D) -51	(C) -52	(B) -53							

کثیر الانتخابی کنسیپچوئل (Conceptual) سوالات

☆ درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔

1- کن عوامل کی بنیاد پر ٹرانسپائریشن میں زیادہ ہوگا؟

(A) سٹومینا کے کھلنے سے (B) خشک ماحول سے (C) نمی والی مٹی سے (D) ان تمام سے

2- ایٹوسفیرک پریشر کی وجہ سے ٹرانسپائریشن کا ریٹ:

(A) بڑھے گا (B) کم ہوگا (C) برابر رہے گا (D) کوئی فرق نہیں پڑے گا

3- "پتے پودے کی خوراک کا خانے ہیں" لیکن کیکلس فوٹوسنتھیس کیسے کرتا ہے؟

(A) جڑوں سے (B) تنے سے (C) پائیز سے (D) ان سب سے

4- اگر پودے کو کافی مقدار میں پانی نہ ملے تو کیا ہوگا؟

(A) پودے کو کوئی نقصان نہیں ہوگا (B) پودے کی نشوونما روک جائے گی (C) پودے کے پتے مرجھا جائیں گے (D) پودے کی جڑیں زیادہ تیزی سے بڑھیں گی

5- پودے کیسے سانس لیتے ہیں؟

(A) پتے کے ذریعے (B) جڑوں کے ذریعے (C) تنے کے ذریعے (D) اوپر دیے گئے تمام

جوابات

(D) -1	(A) -2	(B) -3	(C) -4	(D) -5
--------	--------	--------	--------	--------

مختصر نمونہ کی نئی امتحانی تکنیک (Knowledge, Understanding, Application, Analytical & Conceptual) کی روشنی میں مرتب کیے گئے مختصر جوابی سوالات

9.1 پودوں میں نیوٹریشن (Nutrition in plants)

9.2 پودوں میں ٹرانسپورٹ (Transport in plants)

☆ مختصر جواب دیں۔

1- نیوٹریشن سے کیا مراد ہے؟

جواب: نیوٹریشن سے مراد وہ عمل ہے جس میں خوراک تیار کی جاتی ہے یا حاصل کی جاتی ہے اور اسے نشوونما اور توانائی کے لیے جسمانی مادوں میں تبدیل کیا جاتا ہے۔

2- نیوٹریٹس کیا ہوتے ہیں؟

جواب: نیوٹریٹس وہ مادے ہیں جو جانداروں کو توانائی، نشوونما، مرمت اور بقا کے لیے درکار ہوتے ہیں۔

3- آئوٹراٹک اور ہیٹروٹراٹک جانداروں میں فرق کریں۔

جواب: آئوٹراٹک اور ہیٹروٹراٹک میں فرق مندرجہ ذیل ہیں:

• آئوٹراٹک جاندار: آئوٹراٹک جاندار اپنے ماحول سے پانی، کاربن ڈائی آکسائیڈ اور معدنیات حاصل کرتے ہیں اور اپنی خوراک تیار کرتے ہیں۔ مثلاً: کچھ نیکو یا تمام الحی اور تمام پودے۔

• ہیٹروٹراٹک جاندار: ہیٹروٹراٹک جاندار اپنی خوراک دوسرے جانداروں سے حاصل کرتے ہیں۔ مثلاً: پرندوں، زون، تمام فنجائی اور تمام جانور۔

4- پودوں میں منرل نیوٹریشن کی تعریف لکھیں۔

جواب: منرل نیوٹریشن سے مراد وہ عمل ہے جس کے ذریعے پودے اپنی نشوونما کے لیے مٹی سے ضروری معدنی عناصر حاصل کرتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔

5- مائیکرو نیوٹریٹس کی کچھ مثالیں لکھیں۔

جواب: مائیکرو نیوٹریٹس میں آئرن، نیکل، بورون، کلورین، کاپر، مولیبدیم اور زنک شامل ہیں۔

6- مائیکرو اور میکرو نیوٹریٹس کے درمیان فرق کریں۔

جواب: مائیکرو نیوٹریٹس: وہ منرل جن کی پودوں کو کم مقدار میں ضرورت ہوتی ہے، مائیکرو نیوٹریٹس کہلاتے ہیں۔ مثلاً: آئرن، نیکل، بورون، کاپر اور زنک۔ میکرو نیوٹریٹس: وہ منرل جو پودوں کو بڑی مقدار میں چاہیے ہوتے ہیں۔ میکرو نیوٹریٹس کہلاتے ہیں مثلاً: کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن۔

7- سیلر ریپائریشن کے لیے کون سا میکرو نیوٹریٹ ضروری ہے؟

جواب: آکسیجن سیلر ریپائریشن کے لیے ضروری ہے۔

8- پودوں میں فاسفورس کا کیا کردار ہے؟

جواب: فاسفورس اے ٹی پی، نیوکلیک ایسڈ اور کو-اینزائمز کا اہم جزو ہے۔ یہ بیج کی جرمینیشن اور فوٹوسنتھیس کے لیے ضروری ہے۔

9- سٹومیٹا کے کھلنے اور بند ہونے کو کون سا منرل کنٹرول کرتا ہے؟

جواب: پوٹاشیم سٹومیٹا کے کھلنے اور بند ہونے کو کنٹرول کرتا ہے۔

10- مولیبدیم کا کیا کام ہے؟

جواب: مولیبدیم اس اینزائم کا حصہ ہے جو نائٹریٹس کو امونیا میں تبدیل کرتا ہے۔

31- شام کے وقت سٹومیٹا ہونے والے واقعات لکھیں۔

جواب: شام کے وقت گارڈ سیلز میں گلوکوز کا ارتکاز کم ہو جاتا ہے۔ پوٹاشیم آئنز بھی واپس اپنی ڈرل سیلز میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں پانی بھی گارڈ سیلز سے نکل کر اپنی ڈرل کے دوسرے سیلز میں چلا جاتا ہے۔ اس سے گارڈ سیلز کا ٹرگز ختم ہو جاتا ہے اور ان کے درمیان سٹومیٹا بند ہو جاتا ہے۔

32- ٹرانسپائریشن کی رفتار پر اثر ہونے والے عوامل کون سے ہیں؟

جواب: مختلف عوامل ٹرانسپائریشن کی رفتار پر اثر انداز ہوتے ہیں مثلاً:

- نمبر پچر
- ہوا میں نمی
- ہوا
- سٹومیٹا کی تقسیم
- پتے کا سطحی رقبہ

33- نمبر پچر بڑھنے سے ٹرانسپائریشن کی رفتار پر کیا اثر پڑتا ہے؟

جواب: نمبر پچر بڑھنے سے ٹرانسپائریشن کی رفتار تیز ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ نمبر پچر پر پانی تیزی سے بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے۔

34- ہوا میں نمی ٹرانسپائریشن پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟

جواب: ہوا میں جتنی زیادہ نمی (فضا میں بخارات کی فیصد مقدار) ہوگی، ٹرانسپائریشن کی رفتار اتنی ہی کم ہوگی۔

35- ٹرانسپائریشن میں سے کیا مراد ہے؟

جواب: پتوں میں کھنچاؤ کی قوت جو ان کی سطح سے پانی کی ٹرانسپائریشن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اسے ٹرانسپائریشنل پل کہتے ہیں۔

36- پودے میں پانی کا مسلسل کالم بننے کی وجوہات کون سی ہیں؟

جواب: پانی کا مسلسل کالم بننے کی تین وجوہات ہیں جو درج ذیل ہیں:

- پانی کے مالکیولز کے درمیان کشش کا ہونا
- زائیم مالکیولز کا ذایا میزنگ ہونا
- دھ کشش جس سے پانی کے مالکیولز زائیم کی دیواروں سے چپکے ہوتے ہیں۔

9.5 پودوں میں خوراک کی منتقلی (Translocation of food in plants)

9.6 پودوں میں گیسوں کا تبادلہ (Gaseous Exchange in Plants)

37- پریشر فلوئڈ میکانزم سے کیا مراد ہے؟

جواب: پودوں میں خوراک کی منتقلی کے طریقہ کار کو پریشر فلوئڈ میکانزم کہتے ہیں۔ اس میکانزم کے تحت ماخذ یعنی سورس سے سینک یعنی سنک کی طرف بہتی ہے۔

38- خوراک کے سورسز (Sources) میں کیا شامل ہے؟

جواب: خوراک کے سورسز میں نوٹسٹی سیز کرنے والے نشوز (پتے کے میزوفیل سیلز) اور خوراک ذخیرہ کرنے والے نشوز (مثلاً جزیں) شامل ہیں۔

39- پودوں کے کون سے آرگنولیسوں کا تبادلہ کرتے ہیں؟

جواب: پودے کے جڑ، تنے اور پتے کی اپنی ڈرل ماحول اور اندرونی سیلز کے درمیان گیسوں کے تبادلے کی اجازت دیتے ہیں۔ کیونکہ ان کے ذریعے بھی گیسوں کا تبادلہ ممکن ہے۔

40- ککڑی کے تنوں والے درختوں میں گیسوں کا تبادلہ کیسے ہوتا ہے؟

جواب: ککڑی والے تنوں (woody stems) کی تمام سطح پر چھال ہوتی ہے۔ چھال میں سے گیسوں کا تبادلہ نہیں ہو سکتا، تاہم چھال میں مخصوص

سوراخ یعنی سیلز ہوتے ہیں، جو ماحول کے ساتھ گیسوں کا تبادلہ ہونے دیتے ہیں۔

9.7 پودوں میں ایکسکریشن کا میکانزم (Mechanism for Excretion in Plants)

9.8 پودوں میں اوسموتک مطالقیں (Osmotic Adjustments in Plants)

41- پودے اضافی آکسیجن کو کیسے خارج کرتے ہیں؟

جواب: دن کے وقت فوٹوسنتھی سیز میں پیدا ہونے والی آکسیجن کو سیلولر ریسپائریشن میں استعمال کیا جاتا ہے۔ آکسیجن کی اضافی مقدار کو سٹومیٹا کے ذریعے خارج کر دیا جاتا ہے۔

42- پودے اضافی پانی کو کون طریقوں سے خارج کرتے ہیں؟

جواب: اگر پودے میں اضافی پانی ہو تو وہ اسے دو طریقوں سے باہر نکالتے ہیں:

- ٹرانسپائریشن
- (ii) گلیش

43- ٹرانسپائریشن کیا ہے؟ اس کی اقسام کون سی ہیں؟

جواب: ٹرانسپائریشن: پودے کی سطح سے پانی کا بخارات بن کر نکل جانا، ٹرانسپائریشن کہلاتا ہے۔

اقسام: ٹرانسپائریشن کی تین اقسام ہیں۔

- سٹومیٹل ٹرانسپائریشن
- (ii) کیوٹیکولر ٹرانسپائریشن
- (iii) لیٹی ٹرانسپائریشن

44- گلیش کس طرح شبنم سے مختلف ہے؟

جواب: گلیش: گلیش میں اضافی پانی پتوں کی نوک یا کناروں پر موجود چھوٹے سوراخوں کے ذریعے باہر نکالا جاتا ہے۔

شبنم: شبنم پودے کی سطح پر موجود آبی قطرے ہوتے ہیں جو ہوا میں موجود بخارات کے کثیف ہوجانے سے بنتے ہیں۔

45- پودے کس طرح دوسرے بیکار مادے خارج کرتے ہیں؟

- جواب: • کچھ پودے اپنے بے کار مادوں کو پتوں میں رکھتے ہیں۔ جب ان کے پتے گر جاتے ہیں تو بیکار مادے بھی خارج ہو جاتے ہیں۔
- چند پودے قوت لگا کر مخصوص سوراخوں کے ذریعے اپنے بیکار مادے نکالتے ہیں۔ مثال کے طور پر بڑا پودا الیکس نکالتا ہے اور کیکر کا درخت کمزور نکالتا ہے۔

46- مساکن کی بنیاد پر پودوں کی کتنی اور کون سی اقسام ہیں؟

جواب: مساکن کی بنیاد پر پودوں کی چار اقسام ہیں:

- میزوفائٹس
- (ii) ہائیڈروفائٹس
- (iii) زیروفائٹس
- (iv) ہیپوفائٹس

47- ہائیڈروفائٹس اور ہیپوفائٹس کے درمیان فرق کریں۔

جواب: ہائیڈروفائٹس:

- یہ پودے تازہ پانی یعنی تالاب، جھیل وغیرہ میں رہتے ہیں۔
- ان پودوں کی تمام سطح سے پانی جذب ہوتا ہے یہ پانی کو نکالنے کے لیے اپنے چوڑے پتوں اور سٹومیٹا کا استعمال کرتے ہیں۔
- ایسے پودوں کی ایک عام مثال کنول ہے۔

ہیپوفائٹس:

- یہ پودے نمکین پانیوں (مثلاً سمندر یا نمکین دلدل) والے مسکن میں رہتے ہیں۔
- یہ سائل گلیٹنڈز کی مدد سے پانی کو جسم سے باہر نکالتے ہیں۔
- سمندری گھاس کے کئی پودے اس گروپ میں شامل ہیں۔

مختصر جوابی کنسپچوئل (Conceptual) سوالات

☆ مختصر جواب دیں۔

- 1- پودوں کا اہم ایکسٹریشن کا آرگن کون سا ہے؟
جواب: سٹومیٹا پودوں کا اہم ایکسٹریشن کا آرگن ہے۔
- 2- ٹرانسپائریشن ایک نقصان دہ عمل ہو سکتا ہے۔ کیسے؟
جواب: ٹرانسپائریشن ایک نقصان دہ عمل ہو سکتا ہے کیونکہ خشک سالی کے حالات میں پودے سے پانی کے اخراج کے نتیجے میں پودا مر جاسکتا ہے اور اکثر مر سکتا ہے۔
- 3- اگر پودے کو کافی مقدار میں فاسفورس نہ ملے تو کیا ہوگا؟
جواب: اگر پودے کو کافی مقدار میں فاسفورس نہ ملے تو پودے کی جڑیں کمزور ہو جائیں گی، پودے پر پھول کم لگیں گے اور پودے کی نشوونما رک جائے گی۔
- 4- کون سی خصوصیات زیر فافش کو صحراؤں میں رہنے کے قابل بناتی ہیں؟
جواب: خشک مٹی سے پانی جذب کرنے کے لیے زیر فافش کی جڑیں بہت گہری ہوتی ہیں۔
ان کی سطح پر سٹومیٹا بہت کم ہوتے ہیں۔
پانی کا ضیاع روکنے کے لیے ان کی سطح پر کیونیکل ہوتی ہے۔
- 5- ٹائٹروجن کی کمی سے پتے پر کیا اثر پڑے گا؟
جواب: ٹائٹروجن کی کمی سے پودے کے پتے زرد ہو جائیں گے اور جھڑنا شروع ہو جائیں گے۔

مختصر جوابی کنسپچوئل سوالات

- نیوٹریشن (تغذیہ) سے مراد وہ عمل ہے جس میں خوراک تیار کی جاتی ہے یا حاصل کی جاتی ہے اور اسے نشوونما اور توانائی کے لیے جسمانی مادوں میں تبدیل کیا جاتا ہے۔
- پودوں کو پر دین کی تیاری کے لیے ٹائٹروجن اور کلوروفل کی تیاری کے لیے میکینیشم کی ضرورت ہوتی ہے۔
- جڑوں میں چھوٹے رُوت ہیمز زہوتے ہیں جو دراصل جڑوں کے اپی ڈرمل سیلز کی توسیع ہیں۔
- جڑیں اوسموس کے عمل سے رُوت ہیمز کے ذریعے مٹی سے پانی جذب کرتی ہیں، اور اس پانی کو پودے کے دیگر اوسموس میں منتقل کر دیتی ہیں۔
- بخارات کے ذریعے پودوں کی سطح سے پانی کا ضیاع ٹرانسپائریشن کہلاتا ہے۔
- پانی زائیکم تالیوں کے ذریعے پودے کے اوپر جاتا ہے اور پتوں اور دیگر حصوں تک پہنچتا ہے۔ یہ عمل ٹرانسپائریشن کے کھینچاؤ (ٹرانسپائریشنل پل) کی وجہ سے ہوتا ہے۔
- پانی کے مالیکولز کے درمیان کشش ہوتی ہے اور وہ زائیکم زائیکم کی دیواروں سے بھی چپکے ہوتے ہیں۔ یہ خصوصیات جڑوں سے پتوں تک پانی کا ایک مسلسل کالم بنانے کی ذمہ دار ہیں۔
- پتوں سے پانی کی ٹرانسپائریشن کی وجہ سے زائیکم میں ایک کھینچاؤ پیدا ہوتا ہے جو پانی کو جڑوں سے اوپر کی طرف کھینچتا ہے۔
- خوراک کی ٹرانسپورٹ رسد کے علاقوں (ماخذ) سے مینابولزم یا اسٹوریج کے علاقوں (سنگ) کی طرف ہوتی ہے۔
- پتوں میں شوگر کے مالیکولز لائیکوٹرائینوٹرائینوٹ کے فلوئم کی سیویو بڑ میں اوڈ کیے جاتے ہیں۔
- فلوئم میں شوگر کے زیادہ ارتکاز کی وجہ سے زائیکم سے پانی اوسموس کے ذریعے فلوئم میں آتا ہے۔ یہ ماخذ (پتوں) میں فلوئم پریشز برہا ہوتا ہے۔

- ماخذ اور سنگ میں فلوئم پریشز کا فرق شوگر سے بھرپور رس کو ماخذ (مثلاً پتوں) سے سنگ (مثلاً جڑیں، پھل، یا نشوونما پانے حصے) کی طرف دھکیل دیتا ہے۔
- سنگ پر فلوئم سے شوگر کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ اس سے فلوئم پریشز کم ہو جاتا ہے اور پانی زائیکم میں واپس آ جاتا ہے۔
- سنگ پر فلوئم سے باہر شوگر ز اور پانی باہر نکلتے ہیں۔ اس سے سیویو بڑ میں فلوئم پریشز کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے، خوراک بڑے پیمانے پر ماخذ سے سنگ کی طرف بہہ جاتی ہے۔
- پتوں میں سٹومیٹا پودے کی ضرورت کے مطابق پانی نکلنے اور گیسوں کے تبادلے کو کنٹرول کرتے ہیں۔
- مسکن (پانی کی دستیابی) کی بنیاد پر پودوں کی چار اقسام ہیں یعنی، میزوفافش، زیر فافش، اور ہیلوفافش۔

حل مشقی سوالات

- A- درج ذیل سوالات کے لیے درست جوابات منتخب کریں۔
- 1- پودے کے مندرجہ ذیل نیوٹریٹس میں سے کون سا بڑی مقدار میں ضروری ہے؟
(الف) آئرن (ب) زنک (ج) پوٹاشیم (د) بورون
- 2- کلوروفل بنانے کے لیے پودوں کو کون سا ایلمنٹ درکار ہوتا ہے؟
(الف) فاسفورس (ب) کلسیم (ج) میکینیشم (د) سلفر
- 3- رُوت ہیمز کا بنیادی کام یہ ہے:
(الف) نیوٹریٹس کی ٹرانسپورٹ کرنا (ب) خوراک کا ذخیرہ کرنا
(ج) پانی جذب کرنے کے لیے سطح کے رقبے میں اضافہ (د) پروٹینز کی تیاری
- 4- رُوت ہیمز ذمی سے نمکیات کیسے جذب کرتے ہیں؟
(الف) ڈیفیوژن (ب) اوسموس (ج) ایکٹوٹرائینوٹ (د) فلیٹیشن
- 5- پانی مٹی سے جڑ کے سیلز میں کیسے منتقل ہوتا ہے؟
(الف) اوسموس (ب) ایکٹوٹرائینوٹ (ج) ڈیفیوژن (د) بڑے پیمانے پر بہاؤ
- 6- ٹرانسپائریشن کو کس کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے؟
(الف) میزوفل (ب) گارڈ سیلز (ج) زائیکم (د) فلوئم
- 7- کس حالت میں ٹرانسپائریشن کی رفتار زیادہ ہوگی؟
(الف) زیادہ نمی (ب) روشنی کی کم شدت (ج) حرکت کرتی ہوا (د) پانی سے بھری مٹی
- 8- سٹومیٹا کے کھلنے میں کون سا آئن کردار ادا کرتا ہے؟
(الف) سوڈیم (ب) پوٹاشیم (ج) کلسیم (د) میکینیشم
- 9- زیادہ تر پودوں میں خوراک کو کون سی شکل میں ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے؟
(الف) گلوکوز (ب) سکروز (ج) شارچ (د) مالٹوز
- 10- خوراک کی ٹرانسپورٹ کے پریشز فلوئم کا نرم کے مطابق کیا درست ہے؟
(الف) پانی ماخذ میں داخل ہوتا ہے، جس سے پریشز پیدا ہوتا ہے (ب) سنگ سے پانی نکالا جاتا ہے
(ج) فلوئم میں خوراک کی نقل و حرکت کشش ثقل کی وجہ سے ہوتی ہے (د) سویوٹ کم سے زیادہ ارتکاز کی طرف منتقل ہوتے

11- کن پودوں میں سکولیت آرگنٹ موجود ہوتے ہیں؟

(الف) زیردقائقش (ب) ہائیزروقائقش (ج) میزودقائقش (د) ہیپودقائقش

جوابات

1- (ج)	2- (ج)	3- (ج)	4- (ج)	5- (الف)	6- (ب)
7- (ج)	8- (ب)	9- (ب)	10- (الف)	11- (الف)	

B- مختصر جوابات لکھیں۔

1- پودوں میں منزل نیوٹریشن کی تعریف لکھیں۔

جواب: منزل نیوٹریشن سے مراد وہ عمل ہے جس کے ذریعے پودے اپنی نشوونما کے لیے مٹی سے ضروری معدنی عنصر حاصل کرتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔

2- میکرونیوٹریٹس اور مائیکرونیوٹریٹس کی تعریف لکھیں اور مثالیں دیں۔

جواب: میکرونیوٹریٹس: وہ منزل جو پودوں کو بڑی مقدار میں چاہیے ہوتے ہیں۔ میکرونیوٹریٹس کہلاتے ہیں مثلاً کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن۔

مائیکرونیوٹریٹس: وہ منزل جن کی پودوں کو کم مقدار میں ضرورت ہوتی ہے، مائیکرونیوٹریٹس کہلاتے ہیں۔ مثلاً: آئرن، نکل، بورون، کاپر اور زنک۔

3- پودوں میں نائٹروجن اور فوسفور کا کردار بیان کریں۔

جواب: پودوں میں نائٹروجن کا کردار: نائٹروجن پودے کی نشوونما کو تیز کرنے، سبز اور پھل کے بننے کے عمل کو تیز کرنے اور پتے کے معیار کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے۔

پودوں میں فوسفور کا کردار: فوسفور مٹی میں کم مقدار میں ہوتا ہے جو نشوونما کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔

یہ پھل بننے اور بیج اُگنے میں بھی مدد کرتا ہے۔

4- ٹرانسپائریشن اور اس کی اقسام کی تعریف کریں۔

جواب: ٹرانسپائریشن: پودے کی سطح سے پانی کا بخارات بن کر نکل جانا ٹرانسپائریشن کہلاتا ہے۔

اقسام: ٹرانسپائریشن کی تین اقسام ہیں:

(i) سٹومیٹیل ٹرانسپائریشن (ii) کیوٹیکولر ٹرانسپائریشن (iii) لیٹی کیولر ٹرانسپائریشن

5- پودوں میں ٹرانسپائریشن کی کس طرح اہم ہے؟

جواب: ٹرانسپائریشن پانی میں کھنچاؤ کی ایک قوت ہے۔ جو پتوں کی سطح سے پانی کی ٹرانسپائریشن کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔

یہ انجکشن و سلوس میں پانی کی حرکت میں مدد دیتا ہے۔

6- پودوں میں ٹرانسپائریشن پانی کا ضیاع ہے۔ کیا یہ ایک نقصان دہ عمل ہے؟ اگر نہیں تو اس کی اہمیت کیا ہے؟

جواب: ٹرانسپائریشن کی اہمیت: ٹرانسپائریشن پانی اور معدنیات کو پودوں کے مختلف حصوں تک پہنچاتی ہے۔ یہ سیلز کی اڈوسس اور رزجڈٹی کو برقرار رکھتا ہے۔ یہ پانی کے اوپر کی جانب حرکت میں مدد کرتا ہے۔

7- ان کے درمیان فرق کریں:

(i) زائیکم اور فلوئم (ii) ٹرانسپائریشن اور گھٹن (iii) ہائیزروقائقش اور ہیپودقائقش

(iv) ہائیزروقائقش اور زیردقائقش (v) لیٹی کیولر ٹرانسپائریشن اور سٹومیٹیل ٹرانسپائریشن

جواب: (i) زائیکم اور فلوئم میں فرق:

زائیکم: یہ دسکولر ٹشو ہے جو زمین سے جڑوں کے ذریعے جذب شدہ پانی اور معدنیات کی نقل و حمل کے لیے ذمہ دار ہے۔

فلوئم: یہ ہائیزرو پودوں میں دسکولر ٹشو ہے جو خوراک کو پودوں کے دوسرے حصوں تک منتقل کرتا ہے۔

(ii) ٹرانسپائریشن اور گھٹن میں فرق:

ٹرانسپائریشن: پودے کی سطح سے پانی کا بخارات بن کر نکل جانا ٹرانسپائریشن کہلاتا ہے۔

گھٹن: پتوں کی نوک یا کناروں پر موجود چھوٹے سوراخوں کے ذریعے اضافی پانی کا اخراج گھٹن کہلاتا ہے۔

(iii) ہائیزروقائقش اور ہیپودقائقش میں فرق:

ہائیزروقائقش:

• یہ پودے تازہ پانی یعنی تالاب، جھیل وغیرہ میں رہتے ہیں۔

• ان پودوں کی تمام سطح سے پانی جذب ہوتا ہے یہ پانی کو نکالنے کے لیے اپنے چوڑے پتوں اور سٹومینا کا استعمال کرتے ہیں۔

• ایسے پودوں کی ایک عام مثال کنول ہے۔

ہیپودقائقش:

• یہ پودے نمین پانی (مثلاً سمندر یا نمین دلدل) والے سکن میں رہتے ہیں۔

• یہ سالٹ گلیٹنڈز کی مدد سے پانی کو جسم سے باہر نکالتے ہیں۔

• سمندری گھاس کے کئی پودے اس گروپ میں شامل ہیں۔

(iv) ہائیزروقائقش اور زیردقائقش میں فرق:

ہائیزروقائقش: ہائیزروقائقش تازہ پانی یعنی تالاب، جھیل وغیرہ میں پائے جاتے ہیں۔ مثلاً کنول۔

زیردقائقش: یہ پودے بہت خشک ماحول (صحراؤں) میں رہتے ہیں۔ مثلاً کیکس

(v) لیٹی کیولر ٹرانسپائریشن اور سٹومیٹیل ٹرانسپائریشن میں فرق:

لیٹی کیولر ٹرانسپائریشن:

وہ عمل جس کے ذریعے لیٹی سیلز (تھوں پر چھوٹے سوراخوں) سے پانی بخارات بن کر بن کر نکلتا ہے لیٹی کیولر ٹرانسپائریشن کہلاتی ہے۔

سٹومیٹیل ٹرانسپائریشن:

وہ عمل جس کے ذریعے سٹومینا سے پانی بخارات کی شکل میں نکلتا ہے سٹومیٹیل ٹرانسپائریشن کہلاتی ہے۔

8- ریڈ اور بلیک کے پودے اپنے بے کار مادوں کو کیسے خارج کرتے ہیں؟

جواب: ریڈ: ریڈ کا پودا لیکس خارج کرتا ہے۔

بلیک: بلیک کا درخت گمر خارج کرتا ہے۔

C- تفصیلی جوابات لکھیں۔

1- ستونینا کے کھٹنے اور بند ہونے میں شامل واقعات بیان کریں۔

جواب: دیکھیے سوال نمبر 8

2- جڑ کی اندرونی ساخت کی وضاحت کریں اور جڑ میں نمک اور پانی داخل ہونے کا عمل بیان کریں۔

جواب: دیکھیے سوال نمبر 6

3- نمبر پچھ حرکت کرتی ہوا اور فضا میں نمی کو ان عوامل کے طور پر بیان کریں جو ٹرانسپائریشن کی رفتار پر اثر کرتے ہیں۔

جواب: دیکھیے سوال نمبر 9

4- پودوں میں پانی کی ٹرانسپورٹ کا میکا نام بیان کریں۔

جواب: دیکھیے سوال نمبر 10

5- پریٹریٹو میکا نام کے ذریعہ خوراک کی ٹرانسپورٹ کے میکا نام کی وضاحت کریں۔

جواب: دیکھیے سوال نمبر 11

6- پودے اپنے جسم سے اضافی پانی اور نمکیات کیسے خارج کرتے ہیں؟

جواب: دیکھیے سوال نمبر 14

7- پودوں میں گیسوں کے تبادلے کا عمل بیان کریں۔

جواب: دیکھیے سوال نمبر 12

8- بے کار مادوں کے اخراج کے لیے پودوں میں میکا نام / موافقت بیان کریں۔

جواب: دیکھیے سوال نمبر 15

9- ہائڈرو فائٹس، زیروفائٹس اور ہیلو فائٹس میں اوسموتک موافقتیں بیان کریں۔

جواب: دیکھیے سوال نمبر 16

D- تحقیقی سوالات:

1- پودے نمی والے دن کی نسبت ہوا والے دن زیادہ ٹرانسپائریشن کرتے ہیں؟

جواب: نمی والے دنوں میں ستونینا کے بند ہونے اور پودے کے بیرونی حصوں کے گرد بننے کی وجہ سے ٹرانسپائریشن کم ہوتی ہے جبکہ عام دنوں میں

ستونینا کے کھٹنے اور بیرونی حصوں پر تہ بننے کی وجہ سے ٹرانسپائریشن زیادہ ہوتی ہے۔

باب 10

پودوں میں ریپروڈکشن

Reproduction in Plants

یہ باب پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہوں گے کہ:

• اے سیکشول ریپروڈکشن کی مختلف اقسام بیان کریں یعنی بائنری فیشن، بڈنگ، سپور بننا اور وئیٹیو ہر و پیگیٹیشن۔

• وئیٹیو ہر و پیگیٹیشن اور مصنوعی ہر و پیگیٹیشن کے درمیان فرق کریں۔

• پودوں میں وئیٹیو ہر و پیگیٹیشن کی وضاحت کریں۔ (ستے، سکر ز اور پتوں کے ذریعے)

• مصنوعی وئیٹیو ہر و پیگیٹیشن کے دو طریقے (سٹیم کٹنگ اور گرافٹنگ) بیان کریں۔

• پودوں میں سیکشول ریپروڈکشن کی وضاحت کریں۔

انشائی طرز سوالات

مختصر تعریف کی بنیادی تفہیم (Knowledge, Understanding, Application, Analytical & Conceptual) کی روشنی میں مرتب کیے گئے انشائی طرز سوالات

سوال 1: ریپروڈکشن سے کیا مراد ہے؟ ریپروڈکشن کی اقسام مختصراً بیان کریں۔

جواب: ریپروڈکشن:

ریپروڈکشن (reproduction) وہ عمل ہے جس میں جاندار اپنے جیسے نئے جاندار پیدا کرتے ہیں۔

اقسام: ریپروڈکشن کی دو بنیادی اقسام ہیں۔

i- اے سیکشول ریپروڈکشن:

ایسی ریپروڈکشن جس میں گیمیٹس (gametes) کا ملاپ نہیں ہوتا، غیر جنسی یعنی اے سیکشول (asexual) ریپروڈکشن کہلاتی ہے۔ اے

سیکشول ریپروڈکشن سے پیدا ہونے والے بچے دراشی طور پر آپس میں اور والدین کے مشابہ ہوتے ہیں۔

ii- سیکشول ریپروڈکشن:

ایسی ریپروڈکشن جس میں نر اور مادہ گیمیٹس کا ملاپ ہوتا ہے، جنسی یعنی سیکشول ریپروڈکشن (sexual reproduction) کہلاتی ہے۔

سیکشول ریپروڈکشن میں نئے جاندار آپس میں بھی تغیرات (variation) رکھتے ہیں اور والدین سے بھی۔

10.1 اے سیکشول ریپروڈکشن کی اقسام (Types of Asexual Reproduction)

سوال 2: بیکٹیریا میں بائنری فیشن کی وضاحت کریں اور بیان کریں کہ یہ عمل کس طرح دو ڈاٹر بیکٹیریا بنانے کا باعث بنتا ہے؟


جواب: اے سیکشول ریپروڈکشن کی اقسام (Types of Asexual Reproduction)

پودوں سمیت مختلف جانداروں میں اے سیکشول ریپروڈکشن کے طریقے مندرجہ ذیل ہیں۔

1- بائنری فیشن (Binary Fission): بائنری فیشن کا لفظی مطلب ہے دو میں تقسیم۔

بیکٹیریا میں بائنری فیشن: یہ بیکٹیریا میں ریپروڈکشن کا عام طریقہ ہے۔ بائنری فیشن کے دوران بیکٹیریا کے ڈی این اے کی نقل تیار ہوتی ہے اور


دونوں نئے بننے والے ڈی این اے (daughter DNA) مالکیول مخالف اطراف میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد سیل ممبرین اندر کی طرف دب جاتی ہے۔ درمیان میں نئی سیل وال بنائی جاتی ہے اور اس طرح دو ایک جیسے ڈائریکٹریا پیدا ہوتے ہیں۔



بیکٹریا میں بائنری فشن

سوال 3: پروٹسٹس میں بائنری فشن کے عمل کی وضاحت کریں۔

جواب: بہت سے پروٹسٹس (protists) (یونی سیلولر یوکیئر یوٹس مثلاً امیبا، یوگلینا وغیرہ) بھی بائنری فشن کے ذریعہ رپروڈکشن کرتے ہیں۔ پروٹسٹس میں اس رپروڈکشن کے دوران آبائی جاندار کا نیوکلیئس دو (2) میں تقسیم ہوتا ہے۔ اس کے بعد سائٹوپلازم کی تقسیم ہوتی ہے۔ اس طرح دو ڈائریکٹریا بن جاتے ہیں۔




امیبا میں بائنری فشن

سوال 4: پیسٹ میں بڈنگ کی وضاحت کریں۔

جواب: بڈنگ

یہ طریقہ پیسٹ (yeast) (یونی سیلولر فنگس) میں عام ہے۔ بڈنگ کے دوران آبائی جاندار کا ایک حصہ جسم سے باہر کی طرف نشوونما پاتا ہے۔ اس حصے کو بڈ (bud) کہتے ہیں۔ جب بڈ بڑی ہو جاتی ہے تو یہ آبائی جسم سے الگ بھی ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ بھی رہ سکتی ہے۔



پیسٹ میں بڈنگ

سوال 5: سپورز کے ذریعے اے سیکھوئل رپروڈکشن کی وضاحت کریں۔

جواب: سپورز:

سپورز مونی دیوار والے اے سیکھوئل رپروڈکٹو (reproductive) سیلز ہیں۔ لہذا ان میں سپورز کے ذریعے اے سیکھوئل رپروڈکشن: اکثر فنجائی مثلاً روئی پر لگنے والی فنگس یعنی رائز وڈس (rhizopus) سپور بنا کر اے سیکھوئل رپروڈکشن کرتے ہیں۔ یہ سپورز مخصوص تحمیلی نما ساختوں کے اندر بنتے ہیں، جنہیں سپورینجیا۔ واحد سپورینجیم (sporangia: sing. sporangium) کہتے ہیں۔ جب سپورز پک کر تیار ہو جاتے ہیں تو سپورینجیا کی دیواریں ٹوٹی ہیں اور سپورز باہر نکل آتے ہیں۔



سپورز کے ذریعے اے سیکھوئل رپروڈکشن (رائز وڈس میں)

سپورز اپنی مونی دیواروں کی وجہ سے غیر مناسب حالات برداشت کر سکتے ہیں۔ جب حالات مناسب ہوں تو سپورز اگتے ہیں اور نئے فنگس میں نمودار ہوتے ہیں۔ بیکٹریا میں سپورز کے ذریعے اے سیکھوئل رپروڈکشن: کچھ بیکٹریا یا اینڈوسپورز (endospores) غیر مناسب طور پر سنیرلائزڈ (sterillized) یا بے بند بنا کر رپروڈکشن کرتے ہیں۔ یہ سیل کے اندر پیدا ہونے والے سپورز ہوتے ہیں۔ جو تا سازگار ماحولیاتی حالات میں بنائے جاتے ہیں۔ بیکٹریا کا سیل مر بھی جائے مگر اینڈوسپورز زندہ رہتا ہے۔ جب حالات بہتر ہوتے ہیں تو اینڈوسپورز ایک نئے بیکٹریا میں نمودار ہوتا ہے۔

سوال 6: وچکی ٹیٹوپروپیگیشن سے کیا مراد ہے؟ پودوں کے ان حصوں میں فرق بتائیں جو وچکی ٹیٹوپروپیگیشن میں حصہ لیتے ہیں۔

جواب: وچکی ٹیٹوپروپیگیشن (Vegetative Propagation): یہ پودوں میں اے سیکھوئل رپروڈکشن کا طریقہ ہے۔ اس طریقے میں آبائی پودے کے نباتاتی یعنی وچکی ٹیٹو (vegetative) حصے (جز، تبا یا پتے) سے نیا پودا بنتا ہے۔ سیکھوئل رپروڈکشن کے مقابلے میں وچکی ٹیٹوپروپیگیشن میں نئی نسل پیدا کرنے میں بہت کم وقت لگتا ہے۔ مزید برآں، اس طریقہ سے پیدا ہونے والی اولاد جینیاتی طور پر آبائی پودے کے مشابہہ ہوتی ہے۔ وچکی ٹیٹوپروپیگیشن قدرتی یا مصنوعی ہو سکتا ہے۔

قدرتی وچکی ٹیٹوپروپیگیشن:

قدرتی وچکی ٹیٹوپروپیگیشن ایسا عمل ہے جس میں پودے خود اپنے تنے، جڑ یا پتے جیسی ساخت کا استعمال کرتے ہوئے نئی نسل پیدا کرتے ہیں یعنی رپروڈکشن کرتے ہیں۔ مصنوعی وچکی ٹیٹوپروپیگیشن:


مصنوعی وچکی ٹیٹوپروپیگیشن سے مراد وہ عمل ہے جس میں انسان پودوں کے نباتاتی حصوں کو ان کی رپروڈکشن کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس کے لیے انسانی قلم کاری یعنی کٹنگ (cutting)، پیوند کاری یعنی گرافٹنگ (grafting)، یا داب لگائی یعنی لیئرنگ (layering) کے طریقے استعمال کرتا ہے۔

قدرتی وچکی ٹیٹوپروپیگیشن میں پودے سے پودے پیدا کرنے کے لیے مندرجہ ذیل نباتاتی یعنی وچکی ٹیٹو حصوں کا استعمال کرتے ہیں۔

(a) تنہ (Stem): پودوں میں وچکی ٹیٹوپروپیگیشن میں مندرجہ ذیل اقسام کے تنے حصہ لیتے ہیں۔


1- سٹولون (Stolon) (Runner):

یہ ایک افقی تنہ ہے جو زمین سے اوپر بڑھتا ہے۔ سٹولون میں نوڈز (nodes) ہوتے ہیں جہاں نئے پتے اور جڑیں نمودار ہوتی ہیں۔ پتے اوپر طرف بڑھتے ہیں اور جڑیں نیچے کی طرف بڑھتی ہیں۔ اس طرح نوڈز میں سے ایک نیا پودا نکل آتا ہے۔ سٹراویری (strawberry) سٹولون استم کر کے رپروڈکشن کرتا ہے۔




سٹریری میں سٹولون (رُز) کے ذریعے دہی ٹیو ہروپیکیشن

- 2- ٹیوہر (Tuber): یہ رس بھرتا ہے جو زیر زمین بڑھتا ہے۔ اس کے اوپر "آنکھیں" (eyes) ہیں جو مصل اس کی بڈز (buds) ہیں۔ آنکھیں نئے پودوں میں نمو پا سکتی ہیں۔ آلو (potatoes) ٹیوہر سے ریپر وڈکشن کرتے ہیں۔
- 3- رائی زوم (Rhizome): یہ ایک افقی تاجہ جو زمین کے نیچے بڑھتا ہے۔ اس میں نوڈز ہیں جہاں نئے پتے اور جڑیں نکلتی ہیں۔ اس طرح ہرنوڈ سے ایک نیا پودا نمو پا تا ہے۔ فرنز (ferns)، اورنگے (ginger)، اور گنے (sugar cane) کے پودے رائی زوم سے ریپر وڈکشن کرتے ہیں۔



اورنگے میں رائی زوم کے ذریعے دہی ٹیو ہروپیکیشن


- 4- بلب (Bulb): یہ ایک چھوٹا سا تاجہ جو زیر زمین بڑھتا ہے۔ اس میں بڈ (bud) اور رس بھرے پتے ہوتے ہیں۔ بلب قدرتی طور پر نئے پودے پیدا کرنے کے لیے نشوونما پا تے ہیں۔ گل لالہ (tulip)، پیاز (onion)، اور لیلی (lily) کے پودے بلب کے ذریعہ ریپر وڈکشن کرتے ہیں۔
- 5- کورم (Corm): یہ بلب سے مشابہت رکھتا ہے لیکن اس میں رس بھرے پتے نہیں ہوتے۔ قریباً تمام کورم تے پر مشتمل ہوتا ہے جس کے باہر کچھ غیر فعال بھورے پتے ہوتے ہیں۔ اردو (dasheen) اور لہسن (garlic) کے پودے کورم کے ذریعہ ریپر وڈکشن کرتے ہیں۔




پیاز میں بلب کے ذریعے دہی ٹیو ہروپیکیشن

لہسن میں کورم کے ذریعے دہی ٹیو ہروپیکیشن

- (b) سکرز (Suckers): سکرز ایسی نئی شاخیں (shoots) ہیں جو آبائی پودے کی بنیاد سے یا اس کی زیر زمین جڑوں سے نکلتی ہیں۔ یہ شاخیں آبائی پودے کے ساتھ جڑے رہ کر بھی نئے پودوں کی صورت میں نشوونما پا جاتی ہیں۔ جب سکرز کا اپنا روٹ سسٹم (root system) بن جاتا ہے تو وہ خود مختار ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے ریپر وڈکشن کرنے والے پودوں کی مثالیں کیلا (banana) اور سیربی (rasberry) ہیں۔
- (c) ترمیم شدہ پتے (Modified Leaves): کچھ پودوں (مثلاً برائیو فائٹم Bryophyllum) کے پتوں میں دہی ٹیو ہروپیکیشن کے لیے تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایسے پتوں کے حاشیے پر بڈز (buds) ہوتی ہیں۔ جب یہ پتے زمین پر گر جاتے ہیں تو بڈز نئے پودوں میں نمو پا جاتی ہیں۔



کیلے کے پودے میں سکر




برائیو فائٹم کا تبدیل شدہ پتا

10.2 مصنوعی ہروپیکیشن (Artificial Propagation)


سوال 7: ہروپیکیشن کن طریقوں سے کی جاتی ہے؟ وضاحت کریں۔

جواب: مصنوعی ہروپیکیشن (Artificial Propagation): مصنوعی ہروپیکیشن میں دو طریقے شامل ہیں جن میں انسان پودوں کے نباتاتی یعنی دہی ٹیو حصوں کو استعمال کر کے نئے پودے پیدا کرتے ہیں۔ مصنوعی ہروپیکیشن کے طریقوں میں کٹنگ، گرافٹنگ اور ٹیو ہروپیکیشن شامل ہیں۔ مصنوعی ہروپیکیشن کا طریقہ مطلوبہ خصوصیات کے حامل پودوں کی کاشت یا فصل کی پیداوار میں اضافہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مصنوعی ہروپیکیشن کے کچھ طریقوں کی تفصیل درج ذیل ہے۔

- 1- کٹنگ (کلم کاری) (Cutting): چند پودوں میں تے یا جڑ کا ایک ٹکڑا نیا پودا بنا سکتا ہے۔ تے اور جڑ کا ایسا ٹکڑا جسے پودے سے کاٹ کر نیا پودا اگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ قلم یعنی کٹنگ (cutting) کہلاتا ہے۔ مصنوعی ہروپیکیشن کا یہ طریقہ گھریلو پودے، آرائشی درخت، جھاڑیاں (shrubs) اور پھلوں کی چند فصلیں اگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ گلاب اور انگوٹھی کی بیلیوں (grape vines) کو تنے کی قلموں سے اگایا جاتا ہے۔ شکر قندی (sweet potato) کو جڑ کی قلموں سے اگایا جاتا ہے۔



دہی ٹیو ہروپیکیشن کے لیے قلموں کا استعمال



پودوں میں آلفریشن آف جزئیں

پھول دار پودوں میں سیکشول ریپروڈکشن (Sexual Reproduction in Flowering Plants): پھول دار پودوں یعنی سنبھ پرمز (angiosperms) میں پھول سیکشول ریپروڈکشن کے لیے مخصوص آرگنز ہیں۔

سوال 9: پھول کے حصوں کی وضاحت کریں۔


جواب: پھول کے حصے (Parts of Flower): پھول کی ذمہ داری پھول کی پھولی ہوئی نوک کو رسیپٹیکل (receptacle) کہتے ہیں۔ اس نوک کے اوپر پھول کے تمام حصے (floral parts) لگے ہوتے ہیں۔ یہ رسیپٹیکل ایک بنیاد کے طور پر کام کرتی ہے اور پھول کی ساخت کو سہارا دیتی ہے۔

پھول کے حصے مندرجہ ذیل چار (4) ہم مرکز گھروں (concentric whorls) یا دائروں کی شکل میں ہوتے ہیں۔

1- کلمکس (Calyx): یہ سب سے بیرونی گھرا ہے۔ یہ ہزرنگ کے پتے نما سپلو (sepals) پر مشتمل ہے۔ سپلو کا کام پھول کھلنے سے پہلے اس کے اندرونی حصوں کی حفاظت کرنا ہے۔


2- کرولا (Corolla): یہ دوسرا گھرا ہے اور پتلو (petals) پر مشتمل ہے۔ زیادہ تر پھولوں میں پتلو رنگ دار ہوتے ہیں۔

3- اینڈروسیم (Androecium): یہ تیسرا گھرا ہے۔ نر تولیدی ساختوں یعنی سنبھ (stamens) پر مشتمل ہے۔ ہر سنبھ کے دو حصے ہیں یعنی ایک اشتر (anther) اور ایک فلامنٹ (filament)۔ اشتر کے اندر پولن سیکس (pollen sacs) موجود ہیں۔ یہ پھول کے مانیکر و سپرو (microsporangia) ہوتے ہیں جن میں مانیکر و سپورز (microspores) بنتے ہیں۔ فلامنٹ ایک غذائی نماساخت ہے جو اشتر کو سہارا دیتی ہے۔



پھول کے حصے

2- گرافٹنگ (پوند کاری) (Grafting): گرافٹنگ میں ایک ہی قسم کے دو یا زیادہ پودوں کے حصوں کو جوڑ کر ایک پودا بنایا جاتا ہے۔ اس طریقے میں ایک پودے کی بڈ (bud) یا چھوٹا تادوسرے پودے کی جڑ یا تنے کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ گرافٹنگ سے دو پودوں کی مفید خصوصیات اکٹھی کی جاسکتی ہیں۔ یہ طریقہ تقریباً تمام تجارتی پھلوں کے درخت (مثلاً بادام، آلو بخارا، چیری (cherry) وغیرہ) اور کئی نمائی پودے اور جھاڑی نما پودے اگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔



گرافٹنگ

پودوں کی دبی نیو پروپیگیشن کے فائدے اور نقصان:

(Advantages and Disadvantages of Vegetative Propagation of Plants)

فائدے (Advantages): دبی نیو پروپیگیشن سے کم وقت میں بہت سے نئے پودے پیدا کیے جاسکتے ہیں۔ ایسے نئے پودے اپنے آبائی پودے سے مشابہ ہوتے ہیں۔ اس طرح ان تمام میں مفید خصوصیات موجود ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مفید خصوصیات جیسے اچھے پھل یا مضبوط نشوونما، اگلی نسل کو منتقل ہوتی ہیں۔

نقصان (Disadvantages): دبی نیو پروپیگیشن سے بننے والے پودوں میں وراثتی تغیرات (genetic variations) نہیں ہوتے۔ دوسرے لفظوں میں تمام نئے پودے بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ ماحول میں تبدیلیوں کے لیے ایک ہی طرح سے حساس ہوتے ہیں اور ان پر ایک جیسی بیماریوں یا نقصان دہ چیزوں (pests) کا حملہ ہو سکتا ہے۔

10.3 پودوں میں سیکشول ریپروڈکشن (Sexual Reproduction in Plants)

سوال 8: سپروکارپٹ اور گیمیٹو فائٹ کی تعریف لکھیں۔ پودوں کے لائف سائیکل میں ان کا کردار بیان کریں۔

جواب: پودوں میں سیکشول ریپروڈکشن (Sexual Reproduction in Plants):


سیکشول ریپروڈکشن کے دوران، پودوں کے بڑے گروپس دو مختلف نسلیں (جنریشن generation) بناتے ہیں۔ یہ نسلیں ایک دوسرے کے بعد آتی ہیں۔ انھیں سپروکارپٹ (sporophyte) اور گیمیٹو فائٹ (gametophyte) نسلیں کہتے ہیں۔ سپروکارپٹ نسل بالغ ہونے پر سپور (spore) بناتی ہے۔ یہ سپور جب نمو پاتے ہیں تو نئی گیمیٹو فائٹ نسل بناتے ہیں۔ گیمیٹو فائٹ نسل بالغ ہونے پر گیمیٹ (gemete) بناتی ہے۔ یہ گیمیٹ مل کر نئی سپروکارپٹ نسل بناتے ہیں۔ اس مظہر (phenomenon) کو آلفریشن آف جزئیں (alternation of generations) کہتے ہیں۔

پودوں کی لائف سائیکل میں سپروکارپٹ اور گیمیٹو فائٹ کا کردار: سپروکارپٹ نسل ڈیپلوئڈ (diploid: 2n) ہوتی ہے۔ یہ نسل می اوٹس کر کے ہپلوئڈ (haploid: 1n) سپورز بناتی ہے۔ سپورز نمو پا کر ہپلوئڈ گیمیٹو فائٹ بناتے ہیں۔ گیمیٹو فائٹ نسل می اوٹس کر کے ہپلوئڈ (haploid: 1n) گیمیٹ بناتی ہے۔ ہپلوئڈ گیمیٹس آپس میں مل کر ڈیپلوئڈ زائیکٹ بناتے ہیں۔ یہ زائیکٹ نئی سپروکارپٹ نسل میں نمو پاتا ہے۔

سوال 10: پھول دار پودوں کی لائف سائیکل کی وضاحت کریں جس میں گیمیٹو فائٹ اور سپوروفائٹ نسلوں کے مابین آلٹرنیشن آف جنریشن کو بیان کیا گیا ہو۔

جواب: نر گیمیٹو فائٹ (پولن گرین) کا بننا (Development of Male Gametophyte) (Pollen Grain)

ایشتر میں موجود پولن سیکس (pollen sacs) پھول کے مائیکرو سپورونجیا (microsporangia) ہیں۔ ہر پولن سیک میں کئی ڈپلائڈ مائیکرو سپور مدر سلز (microspore mother cells) ہوتے ہیں۔ ہر مائیکرو سپور مدر سیل می اوکس کرتا ہے اور چار ہپلائڈ مائیکرو سپورز (microspores) بناتا ہے۔ ہر مائیکرو سپور میں مائی نوکس ہوتا ہے۔ بننے والے دو سلز پر مشتمل ساخت ایک پولن گرین ہے۔ یہ نر گیمیٹو فائٹ ہے۔ پولن گرین میں موجود ایک سیل ٹیوب سیل (tube cell) ہے جو پولن ٹیوب بنائے گا۔ دوسرا سیل جزیو سیل (generative cell) ہے جو دو پرم بنائے گا۔



نر گیمیٹو فائٹ (پولن گرین) کا بننا

پولی نیشن (Pollination): نر گیمیٹو فائٹ (پولن گرین) میں پرمز (sperms) ہیں جبکہ مادہ گیمیٹو فائٹ (ایمریوسیک) میں انڈہ یعنی ایک (egg) ہے۔ پولن گرینز کو ایشتر سے سکما پر منتقل کیا جاتا ہے تاکہ پرمز انڈے کی فریلائزیشن کریں۔ اس عمل کو پولینیشن (pollination) کہتے ہیں یعنی پولن گرین کا ایشتر سے سکما پر منتقل ہونا۔

فریلائزیشن (Fertilization): جب ایک پولن گرین سکما پر پہنچتا ہے تو اس کا ٹیوب سیل وہاں ایک پولن ٹیوب (pollen tube) بناتا ہے۔ یہ ٹیوب سکما اور سائل میں سے اووری کی طرف بڑھتی ہے۔ پولن ٹیوب اوویول تک جاتی ہے اور مائیکرو پائل (micropyle) کے ذریعے اس میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہاں پولن گرین کا جزیو سیل دو پرمز بناتا ہے، جو ایمریوسیک میں داخل ہو کر ایک سیل تک پہنچ جاتے ہیں۔

ایک پرم ایک کے ساتھ مل جاتا ہے اور ایک ڈپلائڈ زائیگوٹ بناتا ہے۔ زائیگوٹ نمو پا کر ایمریوسیک یو بناتا ہے۔ دوسرا پرم فیوژن نیوکلئس کے ساتھ مل جاتا ہے اور ایک ٹریپلائڈ (3n) نیوکلئس بناتا ہے۔ یہ نیوکلئس ایک نشوونما میں نمو پا تا ہے جسے اینڈو پرم (endosperm) کہتے ہیں۔ اینڈو پرم ایمریوسیک کو خوراک مہیا کرتا ہے۔ ایک پرم کا ایک کے ساتھ ملنا اور دوسرے پرم کا فیوژن نیوکلئس کے ساتھ ملنا، ڈبل فریلائزیشن (double fertilization) کہلاتا ہے۔ یہ عمل ایشتر پرمز کی منفرد خصوصیت ہے۔


مکائی نیشم (Gynoecium): یہ سب سے اندرونی گیرا ہے جو مادہ تولیدی ساختوں یعنی کارپلز (carpels) پر مشتمل ہے۔ ایک کارپل کے تین حصے ہیں۔

- کارپل کی بڑے بنیادی حصے کو اووری (ovary) کہتے ہیں۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں اوویولز (ovules) بنتے ہیں۔ یہ اوویول رپر وڈکشن کے دوران میگاسپورز (megaspores) بناتے ہیں۔
- اووری کے ساتھ لگاؤ نڈی نما حصہ سائل (style) کہلاتا ہے۔
- سائل کے کنارے پر سکما (stigma) ہے۔

لائف سائیکل کے مراحل (Stages of Life Cycle): ایک ایشتر پرم پودا سپوروفائٹ نسل کی نمائندگی کرتا ہے۔ جب اس کا پھول بالغ ہو جاتا ہے تو یہ سپور بناتا ہے۔ یہ سپور گتے ہیں یعنی نمو پاتے ہیں اور مادہ اور نر گیمیٹو فائٹس بناتے ہیں۔ گیمیٹو فائٹس بہت چھوٹی ساختیں ہیں جو صرف چند سلز پر مشتمل ہوتی ہیں۔ ان گیمیٹو فائٹس کا کام گیمیٹ بنانا ہے۔ نر اور مادہ گیمیٹو فائٹس میں بننے والے گیمیٹ مل کر زائیگوٹ بناتے ہیں۔ زائیگوٹ نمو پا کر نیا سپوروفائٹ بناتا ہے۔ ایشتر پرم کے لائف سائیکل میں مندرجہ ذیل اہم مراحل ہیں۔


1- مادہ گیمیٹو فائٹ (ایمریوسیک) کا بننا (Development of Female Gametophyte) (Embryo Sac)

اووری میں موجود اوویول پھول کا میگاسپورنجم (megaspore) ہے۔ اس میں ڈپلائڈ (diploid) میگاسپور مدر سیل (megaspore mother cell) موجود ہے۔ اس میگاسپور مدر سیل میں می اوکس ہوتی ہے جس کے نتیجے میں چار ہپلائڈ (haploid) میگاسپورز بنتے ہیں۔ ان چار میں سے صرف ایک میگاسپور ہی زندہ رہتا ہے۔ اس میگاسپور کے اندر مائی نوکس کے ذریعے آٹھ ہپلائڈ نیوکلئی بنتے ہیں۔ دو نیوکلئی مرکز میں آتے ہیں اور ضم ہو کر ایک فیوژن نیوکلئس (fusion nucleus) بناتے ہیں۔ بقیہ چھ میں سے ایک نیوکلئس سے مادہ گیمیٹ یعنی ایک سیل (egg cell) بناتا ہے۔



مادہ گیمیٹو فائٹ (ایمریوسیک) کا بننا

ان تبدیلیوں سے بننے والی ساخت کو ایمریوسیک کہتے ہیں۔ اس میں سات سلز موجود ہوتے ہیں یعنی ایک ایک سیل، ایک فیوژن نیوکلئس اور پانچ غیر فعال سلز۔



پھول دار پودے کا لائف سائیکل

بج اور پھل کا بننا (Seed and Fruit Formation): فریٹلائزیشن کے بعد زائیکوٹ ایمبریو میں نمو پاتا جاتا ہے اور ٹرپلائیزڈ ٹیولیکس اینڈ سپرم میں نمو پاتا ہے۔ ان تبدیلیوں کے بعد، اوویول پک کر بیج (seed) بن جاتا ہے۔ اسی چند پودوں میں اوویول میں انڈے کی فریٹلائزیشن کے بغیر ہی دوران اووری پھل (Fruit) میں تبدیل ہو جاتی ہے۔

سپوروفائٹس کا بننا (Development of Sporophytes): جب بیج اس عمل کو پارٹینوکارپی (parthenocarpy) کہتے ہیں۔ اس پک جاتے ہیں تو ان کا نکھراؤ ہوتا ہے۔ اگر بیجوں کو مناسب حالات میسر آ جائیں تو ان کے ایمبریو نئے پودوں (نئی نسل کے سپوروفائٹس) میں نمو پاتا جاتا ہے۔

انسانی طرز کنسیپچوئل (Conceptual) سوالات

سوال 1: بغیر بیج کے پودوں کے کیا نقصانات ہیں؟

جواب: بغیر بیج کے پھل اتنے صحت بخش نہیں ہوتے۔ ان میں دوسروں کی نسبت دانا منزا اور منرلز کم ہوتے ہیں۔ ان میں فائبر بھی کم ہوتا ہے۔ جس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے جسم سے زیادہ تیزی سے ہضم ہوتے ہیں۔ مزید برآں، بیجوں کی کمی کا مطلب یہ ہے کہ ان پھلوں میں اینٹی آکسیڈنٹس اور پودوں میں موجود غذائی اجزاء کم ہوتے ہیں۔

سوال 2: پودوں میں سیکسوال ریپروڈکشن کیوں ضروری ہے؟

جواب: پودوں میں سیکسوال ریپروڈکشن ضروری ہے۔

• جینیٹک ڈائورسٹی کا فروغ: فریٹلائزیشن کے دوران زراور مادہ میٹکس کے فیوژن کے نتیجے میں والین کے جینیٹک میسرمل کے ملنے سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اس سے پاپولیشنز میں جینیٹک ڈائورسٹی پیدا ہوتی ہے جو پودوں کو نئے ماحول کو اپنانے میں مدد دے سکتا ہے۔

اولاد میں نئی خصوصیات کی منتقلی: سیکسوال ریپروڈکشن نئی پس شیز کے بننے یا اولاد میں نئی خصوصیات کی منتقلی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔

سوال 3: پارٹینوکارپی کے فوائد کیا ہیں؟

جواب: انڈے کی فریٹلائزیشن کے بغیر ہی اووریز کا پھل میں تبدیل ہو جانا پارٹینوکارپی کہلاتا ہے۔

پارٹینوکارپی کے فوائد:

- نتائج زیادہ آسانی سے حاصل کیے جاتے ہیں۔
- بغیر بیج کے پھل فراہم کرتی ہے اور معیار کو بہتر بناتی ہے۔
- پیداوار کی مکمل لاگت کو کم کرتی ہے۔
- یہ فصل کے لیے درکار کل وقت کو کم کرتی ہے۔
- یہ حشرات اور کیڑوں کو دور رکھتی ہے کیونکہ پولینیشن کے لیے ان کی ضرورت نہیں ہوتی۔

معروضی سوالات

تجزیہ و تحلیل (Knowledge, Understanding, Application, Analytical & Conceptual) کی روشنی میں مرتب کیے گئے کثیر الانتخابی سوالات

10.1 (Types of Asexual Reproduction) نامائے سیکسوال ریپروڈکشن کی اقسام

درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔

- مندرجہ ذیل میں سے ریپروڈکشن کی کون سی قسم میں میٹکس کا ملاپ ہوتا ہے؟
(A) اے سیکسوال ریپروڈکشن (B) سیکسوال ریپروڈکشن (C) وچکی نیو پروپیگیشن (D) آرٹیفیشل پروپیگیشن
- بیکٹیریا میں ریپروڈکشن کا عام طریقہ ہے:
(A) بڈنگ (B) گرافنگ (C) بائری فشن (D) سپورینٹا
- پلینیریا سیکسوال ریپروڈکشن کرتے ہیں:
(A) بڈنگ کے ذریعے (B) بائری فشن کے ذریعے (C) اینڈوسپورز کے ذریعے (D) a اور b دونوں
- کون سے جاندار بائری فشن کے ذریعے ریپروڈکشن کرتے ہیں؟
(A) امیبا (B) یوکیٹا (C) پینیریا (D) یہ تمام
- جاندار کا کون سا حصہ جسم سے باہر نشوونما پاتا ہے؟
(A) بڈ (B) سپور (C) سپورینٹیم (D) اینڈوسپور
- بڈنگ کے ذریعے ریپروڈکشن کرتا ہے:
(A) امیبا (B) یوکیٹا (C) پینیریا (D) بائیرا
- مندرجہ ذیل میں سے کون سے جاندار اینڈوسپورز کے ذریعے ریپروڈکشن کرتے ہیں؟
(A) فنجائی (B) بائیرا (C) بیکٹیریا (D) امیبا
- پودے کے وچکی نیو حصے ہیں:
(A) جڑیں (B) تانہ (C) پتے (D) یہ تمام
- معنوی وچکی نیو پروپیگیشن میں استعمال ہونے والے طریقے ہیں:
(A) کٹنگ (B) گرافنگ (C) لیئرنگ (D) یہ تمام

- 10- قلم کاری کی تکنیک استعمال ہوتی ہے:
(A) مصنوعی دہی نیو پروپیگیشن میں
(C) بڈنگ میں
11- ایک افقی تاجوز میں سے اوپر بڑھتا ہے، کہلاتا ہے:
(A) سنولون (B) رز
12- سنولون کی مثال ہے:
(A) آلو (B) اورک
13- کون سا ایک افقی تاجوز میں کے نیچے بڑھتا ہے؟
(A) بلب (B) رائی زوم
14- نیو سے ریپرڈکشن کرتے ہیں:
(A) آلو (B) گنا (C) فرز (D) پیاز
15- تنے کی کون سی قسم بلب سے مشابہت رکھتی ہے لیکن اس میں رس بھرے پتے نہیں ہوتے؟
(A) رز (B) رائی زوم (C) نیو (D) کورم
16- کیلا اور سریری مثالیں ہیں:
(A) کورمزی (B) نیو (C) سکرز (D) رائی زومز

10.2 مصنوعی بروپیگیشن (Artificial Propagation)

- 17- تنے کی قلموں سے اگائے جانے والے پودے ہیں:
(A) گلاب (B) انگری کی بلیس (C) A اور B دونوں (D) شکر قندی
18- ایک ہی قسم کے دو یا زیادہ پودوں کے حصوں کو جوڑ کر نیا پودا بنایا جاتا ہے:
(A) کٹنگ میں (B) لیئرنگ میں (C) گرافٹنگ میں (D) ان تمام میں
19- گرافٹنگ کے ذریعے اگائے جانے والے پودوں کی مثالیں ہیں:
(A) بادام (B) آلو بخارا (C) شکر قندی (D) A اور B دونوں
20- دو پودوں کی مفید خصوصیات انہی کی جاسکتی ہیں:
(A) کٹنگ سے (B) رائی زوم سے (C) نیو سے (D) گرافٹنگ سے

10.3 پودوں میں سیکسوال ریپرڈکشن (Sexual Reproduction in Plants)

- 21- سپوروکائٹ جڑیشن ہوتی ہے:
(A) مہلاؤ (B) ڈپلائڈ (C) A اور B دونوں (D) کوئی نہیں
22- اسٹیو پر مز میں سیکسوال ریپرڈکشن کے لیے مخصوص آرگن ہیں:
(A) جڑیں (B) پھول (C) تنے (D) پھل

- 23- پھول کی ڈسک کی پھولی ہوئی نوک کہلاتی ہے:
(A) کیلکس (B) کرولا
24- پھول کا سب سے بیرونی گھیرا ہے:
(A) کرولا (B) کیلکس
25- کرولا مشتمل ہے:
(A) سپیلز پر (B) پیٹلز پر
26- سٹیمینز کے حصے ہیں:
(A) دو (B) تین (C) چار (D) پانچ
27- ایسٹر کو سہارا دینے والی ساخت ہے:
(A) سپیل (B) سٹیمین (C) فلامنٹ (D) پولن سیک
28- گائیٹیم بنا ہوتا ہے:
(A) پیٹلز (B) سٹیمین (C) سپیلز (D) کارپلز
29- پھول کا سب سے اندرونی گھیرا ہے:
(A) کرولا (B) اینڈروٹیم (C) کیلکس (D) گائیٹیم
30- کارپل کے بنیادی حصے کو کہتے ہیں:
(A) سپور (B) سپورٹیم (C) اوویول (D) اووری
31- مائیکرو سپورز پھول کے کس حصے میں بنتے ہیں؟
(A) گائیٹیم میں (B) اینڈروٹیم میں (C) کیلکس میں (D) کرولا میں
32- اوویولز بنتے ہیں:
(A) سٹائل (B) سٹکما (C) اووری (D) کارپل
33- ڈپلائڈ میگا سپورڈریل می اوکس کے بعد کتنے مہلاؤ میگا سپورز بنتے ہیں؟
(A) 3 (B) 4 (C) 6 (D) 8
34- می اوکس کے بعد کتنے میگا سپورز زہر جتے ہیں؟
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) کوئی نہیں
35- میگا سپور میں کیسے آٹھ پھلاؤ ڈیوکیائی بنتے ہیں؟
(A) می اوکس (B) مائیٹوسس (C) بڈنگ (D) بائری فشن
36- ایمریوسیک میں موجود ہوتے ہیں؟
(A) ایک سیل (B) فیوژن نیوکلئیس (C) غیر فعال سیلز (D) یہ تمام
37- پولن گرین میں کون سا سائل موجود ہوتا ہے؟
(A) نیو سیل (B) جزیو سیل (C) غیر فعال سیل (D) A اور B دونوں

- 10- کلم کاری کی تکنیک استعمال ہوتی ہے:
(A) مصنوعی دہی نیو پروپیگیشن میں
(B) قدرتی دہی نیو پروپیگیشن میں
(C) بڈنگ میں
(D) سپور بننے میں
- 11- ایک افقی تنا جو زمین سے اوپر بڑھتا ہے، کہلاتا ہے:
(A) سٹولون (B) ریز
(C) نیویر (D) A اور B دونوں
- 12- سٹولون کی مثال ہے:
(A) آلو (B) اورک
(C) سٹرایری (D) پیاز
- 13- کون سا ایک افقی تنا ہے جو زمین کے نیچے بڑھتا ہے؟
(A) بلب (B) رائی زوم
(C) نیویر (D) سٹولون
- 14- نیویر سے رہبر وڈکشن کرتے ہیں:
(A) آلو (B) گنا
(C) فرنز (D) پیاز
- 15- تنے کی کون سی قسم بلب سے مشابہت رکھتی ہے لیکن اس میں رس بھرے پتے نہیں ہوتے؟
(A) ریز (B) رائی زوم
(C) نیویر (D) کورم
- 16- کیلا اور سمیری مثالیں ہیں:
(A) کورمزکی (B) نیویرز
(C) سکرز (D) رائی زومز

10.2 مصنوعی پروپیگیشن (Artificial Propagation)

- 17- تنے کی قسموں سے اگائے جانے والے پودے ہیں:
(A) گلاب (B) انگور کی بلیں
(C) A اور B دونوں (D) شکر قندی
- 18- ایک ہی قسم کے دو یا زیادہ پودوں کے حصوں کو جوڑ کر نیا پودا بنایا جاتا ہے:
(A) کٹنگ میں (B) لیئرنگ میں
(C) گرافٹنگ میں (D) ان تمام میں
- 19- گرافٹنگ کے ذریعے اگائے جانے والے پودوں کی مثالیں ہیں:
(A) بادام (B) آلو بخارا
(C) شکر قندی (D) A اور B دونوں
- 20- دو پودوں کی مفید خصوصیات اکٹھی کی جاسکتی ہیں:
(A) کٹنگ سے (B) رائزوم سے
(C) نیویر سے (D) گرافٹنگ سے

10.3 پودوں میں یکشکل رہبر وڈکشن (Sexual Reproduction in Plants)

- 21- سپوروفائٹ جزیئیں ہوتی ہے:
(A) ہملائڈ (B) ڈیپلائڈ
(C) A اور B دونوں (D) کوئی نہیں
- 22- اینٹی سپرمز میں یکشکل رہبر وڈکشن کے لیے مخصوص آرگنز ہیں:
(A) جزیں (B) پھول
(C) تنے (D) پھل

- 23- پھول کی ڈھری کی پھولی ہوئی نوک کہلاتی ہے:
(A) کیلکس (B) کرولا
(C) ریسپیکٹل (D) اینٹر
- 24- پھول کا سب سے بیرونی گھیرا ہے:
(A) کرولا (B) کیلکس
(C) اینڈروشم (D) سٹمنز
- 25- کرولا مشتمل ہے:
(A) سپیلز پر (B) پٹیلز پر
(C) اینٹر پر (D) فلامنٹ پر
- 26- سٹمنز کے حصے ہیں:
(A) دو (B) تین
(C) چار (D) پانچ
- 27- اینٹر کو سہارا دینے والی ساخت ہے:
(A) سیپل (B) سٹمن
(C) فلامنٹ (D) پولن سیک
- 28- گائی ٹیمم بنا ہوتا ہے:
(A) جینڈر (B) سٹمنز
(C) سپیلز (D) کارپلز
- 29- پھول کا سب سے اندرونی گھیرا ہے:
(A) کرولا (B) اینڈروشم
(C) کیلکس (D) گائی ٹیمم
- 30- کارپل کے بنیادی حصے کو کہتے ہیں:
(A) سپور (B) سپورٹیم
(C) اوویول (D) اووری
- 31- مائیکرو سپورز پھول کے کس حصے میں بنتے ہیں؟
(A) گائی ٹیمم میں (B) اینڈروشم میں
(C) کیلکس میں (D) کرولا میں
- 32- اوویولز بنتے ہیں:
(A) سٹائل (B) سٹیکلا
(C) اووری (D) کارپل
- 33- ڈیپلائڈ میگا سپورمٹریل می اوکس کے بعد کتنے ہملائڈ میگا سپورز بنتے ہیں؟
(A) 3 (B) 4
(C) 6 (D) 8
- 34- می اوکس کے بعد کتنے میگا سپورز نمونہ رہتے ہیں؟
(A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) کوئی نہیں
- 35- میگا سپور میں کیسے آٹھ پھلائیڈ نکلیں گے؟
(A) می اوکس (B) مائی ٹوسس
(C) بڈنگ (D) بائری فشن
- 36- لکمر پوسیک میں موجود ہوتے ہیں؟
(A) ایگ سل (B) فیوژن نیوکلئس
(C) غیر فعال سیز (D) یہ تمام
- 37- پولن گرین میں کون سا سیل موجود ہوتا ہے؟
(A) نیوب سیل (B) جزیئوسیل
(C) غیر فعال سیل (D) A اور B دونوں

38- ایک پھول کے انحر سے پلن کا دوسرے پھول کے سکما پر منتقل ہونا کہلاتا ہے:

- (A) سیلف پولینیشن (B) کراس پولینیشن (C) فرٹیلائزیشن (D) ڈبل فرٹیلائزیشن

39- مندرجہ ذیل میں سے کون سا پلن نیوب بناتا ہے؟

- (A) سپرمز (B) ایگز (C) نیوب سیل (D) جنرینیو سیل

40- دو سپرمز بناتا ہے:

- (A) نیوب سیل (B) مائیکرو سپور (C) میگاسپور (D) جنرینیو سیل

41- زائیگوٹ نمونیا کر بناتا ہے:

- (A) نیوکلئس (B) اوویول (C) مائیکرو پائل (D) ایمبریو

42- فرٹیلائزیشن میں ایک سپرم ایک کے ساتھ مل کر بناتا ہے:

- (A) ہپلائیز زائیگوٹ (B) ڈیپلائیز زائیگوٹ (C) ٹریپلائیز زائیگوٹ (D) اینڈوسپرم

43- ڈبل فرٹیلائزیشن خصوصیت ہے:

- (A) بیکنیریائی (B) موسسزکی (C) فرزکی (D) انجیوپرمزکی

44- فرٹیلائزیشن کے بعد زائیگوٹ نمونیا کر بناتا ہے:

- (A) اینڈوسپرم میں (B) ٹریپلائیز نیوکلئس میں (C) زائیگوٹ میں (D) سپرم میں

45- فرٹیلائزیشن کے بعد ڈیپلائیز نیوکلئس نمونیا کر بناتا ہے:

- (A) زائیگوٹ میں (B) ایمبریو میں (C) اوویول میں (D) اینڈوسپرم میں

46- اوویول پک کر بن جاتا ہے:

- (A) پچل (B) زائیگوٹ (C) اوویول (D) بیج

47- پارتھنوجنری کے نتیجے میں بننے والا پچل ہے:

- (A) آم (B) انار (C) کیلا (D) مالٹا

جملات

(A) -10	(D) -9	(D) -8	(C) -7	(D) -6	(A) -5	(D) -4	(B) -3	(C) -2	(B) -1
(D) -20	(D) -19	(C) -18	(C) -17	(C) -16	(D) -15	(A) -14	(B) -13	(C) -12	(D) -11
(D) -30	(D) -29	(D) -28	(C) -27	(A) -26	(B) -25	(B) -24	(C) -23	(B) -22	(B) -21
(D) -40	(C) -39	(B) -38	(D) -37	(D) -36	(B) -35	(A) -34	(B) -33	(C) -32	(B) -31
			(C) -47	(D) -46	(D) -45	(C) -44	(D) -43	(B) -42	(D) -41

کثیر الانتخابی کنسپچوئل (Conceptual) سوالات

☆ درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔

1- وئیٹیٹیو پروٹیکشن سے بننے والے پودے لیتے ہیں:

- (A) گرتھ میں طویل وقت (B) گرتھ میں کم وقت (C) A اور B دونوں (D) ان میں سے کوئی نہیں

2- مندرجہ ذیل میں سے کون سے پودے وئیٹیٹیو پروٹیکشن کرتے ہیں؟

- (A) براؤنیوفا ٹائم (B) گلاب (C) جیمسین (D) A, B, C تینوں

3- پودوں میں پھولوں کی تشکیل پر کون سے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں؟

- (A) روشنی (B) درجہ حرارت (C) دن کی لمبائی (D) A, B, C تینوں

4- پودوں میں کراس پولی نیشن کیسے ہوتی ہے؟

- (A) صرف ہوا کے ذریعے (B) صرف کیڑوں کے ذریعے (C) صرف پانی کے ذریعے (D) ہوا، پانی اور کیڑوں کے ذریعے

5- اگر کسی پودے میں ڈبل فرٹیلائزیشن کا عمل نہ ہو تو کیا ہوگا؟

- (A) زائیگوٹ نہیں بنے گا (B) اندرونی آرگنز نہیں بنیں گے (C) A اور B دونوں (D) کوئی اثر نہیں پڑے گا

جملات

(C) -5	(D) -4	(D) -3	(D) -2	(B) -1
--------	--------	--------	--------	--------

مختصر جوابی سوالات (Knowledge, Understanding, Application, Analytical & Conceptual) کی روشنی میں مرتب کیے گئے مختصر جوابی سوالات

10.1 اے سیکھوئل ریپروڈکشن کی اقسام (Types of Asexual Reproduction)

☆ مختصر جواب دیں۔

1- ریپروڈکشن کے عمل کی تعریف لکھیں۔

جواب: ریپروڈکشن وہ عمل ہے جس میں جاندار اپنے جیسے نئے جاندار پیدا کرتے ہیں۔

2- ریپروڈکشن کی کتنی اقسام ہیں۔ نام لکھیں۔

جواب: ریپروڈکشن کی دو اقسام ہیں: (i) اے سیکھوئل ریپروڈکشن (ii) سیکھوئل ریپروڈکشن

3- اے سیکھوئل ریپروڈکشن سے کیا مراد ہے؟

جواب: ایسی ریپروڈکشن جس میں گیمٹس کا ملاپ نہیں ہوتا، غیر جنسی یعنی اے سیکھوئل ریپروڈکشن کہلاتی ہے۔

اس ریپروڈکشن سے پیدا ہونے والے بچے وراثتی طور پر آپس میں اور والدین کے مشابہ ہوتے ہیں۔

4- اے سیکھوئل ریپروڈکشن کے طریقے کون سے ہیں؟ نام لکھیں۔

جواب: پودوں سمیت مختلف جانداروں میں اے سیکھوئل ریپروڈکشن کے طریقے مندرجہ ذیل ہیں۔

(i) بائری فشن (ii) بڈنگ (iii) سپورینٹا (iv) وئیٹیٹیو پروٹیکشن

5- پرنوسس میں بائری فشن کیسے ہوتی ہے؟

جواب: بہت سے پرنوسس (یونی سیلولر یوکیئر یوس مثلاً امیبا، یوگلینا وغیرہ) بائری فشن کے ذریعے ریپروڈکشن کرتے ہیں۔ پرنوسس میں اس

ریپروڈکشن کے دوران، آبائی جاندار کا نیوکلئس دو میں تقسیم ہوتا ہے۔ اس کے بعد سائٹوپلازم کی تقسیم ہوتی ہے اور دو ڈائریکٹ بن جاتے ہیں۔

6- بائری فشن کا لفظی مطلب کیا ہے؟

جواب: بائری فشن کا لفظی مطلب "دو میں تقسیم ہونا" ہے۔

7- کون سے جاندار بائسری فشن کے ذریعے ریپر وڈکشن کرتے ہیں؟

جواب: بیکٹیریا، امیبا، یوگلینا اور پلینریا بائسری فشن کے ذریعے ریپر وڈکشن کرتے ہیں۔

8- بڈنگ کے ذریعے ریپر وڈکشن کرنے والے جانداروں کے نام لکھیں۔

جواب: فنگس اور ہائیڈرایا بڈنگ کے ذریعے ریپر وڈکشن کرتے ہیں۔

9- پیسٹ میں بڈنگ کیسے ہوتی ہے؟

جواب: بڈنگ کے دوران آبائی جاندار کا ایک حصہ جسم سے باہر کی طرف نشوونما پاتا ہے۔ اس حصے کو بڈ کہتے ہیں جب بڈ بڑی ہو جاتی ہے تو یہ آبائی جسم سے الگ بھی ہو سکتی ہے اور ساتھ بھی لگی رہ سکتی ہے۔

10- سپورز کیا ہیں؟

جواب: سپورز مونی دیوار والے اے سیکھول ریپر وڈکونسلز ہیں۔

11- سپورز کیسے سپورنجنم سے خارج ہوتے ہیں؟

جواب: سپورز مخصوص قہلی نما ساختوں کے اندر بنتے ہیں، جنہیں سپورنجنیا کہتے ہیں۔ جب سپورز پک کر تیار ہو جاتے ہیں تو سپورنجنیا کی دیواریں ٹوٹتی ہیں اور سپورز باہر آ جاتے ہیں۔

12- وئیٹیٹیو پروٹیکیشن سے کیا مراد ہے؟

جواب: وئیٹیٹیو پروٹیکیشن پودوں میں اے سیکھول ریپر وڈکشن کا طریقہ ہے۔ اس طریقے میں آبائی پودے کے وئیٹیٹیو حصے (جز، تنایا پتے) سے نیا پودا بناتا ہے۔

13- وئیٹیٹیو پروٹیکیشن میں حصہ لینے والی تنے کی اقسام کونسی ہیں؟

جواب: پودوں میں وئیٹیٹیو پروٹیکیشن میں مندرجہ ذیل اقسام کے تنے حصہ لیتے ہیں:

(i) سٹولون (رز) (ii) ٹیوبر (iii) رائی زوم (iv) بلب (v) کورم

14- سٹولون (رز) سے کیا مراد ہے؟ مثال لکھیں۔

جواب: سٹولون ایک افقی تنا ہے جو زمین سے اوپر بڑھتا ہے۔ سٹولون میں نوڈز ہوتے ہیں۔ جہاں نئے پتے اور جڑیں نمودار ہوتی ہیں۔

مثلاً: سٹراپیری سٹولون استعمال کر کے ریپر وڈکشن کرتا ہے۔

15- ٹیوبر کی تعریف لکھیں۔

جواب: یہ زس ہجراتا ہے جو ریز زمین بڑھتا ہے۔ اس کے اوپر بڈز موجود ہوتے ہیں جو نئے پودوں میں نمودار ہوتے ہیں۔

مثلاً: آلو نیو بر سے ریپر وڈکشن کرتے ہیں۔

16- رائی زوم سے کون سے پودے ریپر وڈکشن کرتے ہیں؟

جواب: فرنز، ادک اور گنے کے پودے رائی زوم سے ریپر وڈکشن کرتے ہیں۔

17- پودے بلب کے ذریعے کیسے ریپر وڈکشن کرتے ہیں؟

جواب: بلب ایک چھوٹا سا تنا ہے جو ریز زمین بڑھتا ہے۔ اس میں بڈز اور زس بھرے پتے ہوتے ہیں۔ بلب قدرتی طور پر نئے پودے پیدا کرنے کے لیے نشوونما پاتا ہے۔ گل لالہ، پیاز اور لیلی (lily) کے پودے بلب کے ذریعے ریپر وڈکشن کرتے ہیں۔

18- سکرز وئیٹیٹیو پروڈکشن میں کیسے مدد دیتے ہیں؟

جواب: سکرز ایسی شوٹس ہیں جو آبائی پودے کی بنیاد سے یا اس کی زیر زمین جڑوں سے نکلتی ہیں۔ یہ شوٹس آبائی پودے کے ساتھ جڑے رہ کر نئے پودوں کی صورت میں نشوونما پاتی ہیں۔

19- ترمیم شدہ پتوں سے کیا مراد ہے؟

جواب: کچھ پودوں (مثلاً براسیکائیٹس) کے پتوں میں وئیٹیٹیو پروڈکیشن کے لیے تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایسے پتوں کے حاشیے پر بڈز ہوتی ہیں۔ جب یہ پتے زمین پر گر جاتے ہیں تو بڈز نئے پودوں میں نشوونما پاتی ہیں۔

مصنوعی پروٹیکیشن (Artificial Propagation)

10.2

20- مصنوعی پروٹیکیشن میں کون سے طریقے شامل ہیں؟

جواب: مصنوعی پروٹیکیشن میں وہ طریقے شامل ہیں جن میں انسان پودوں کے وئیٹیٹیو حصوں کو استعمال کر کے نئے پودے پیدا کرتے ہیں۔ مصنوعی پروٹیکیشن کے طریقوں میں کٹنگ، گرافٹنگ اور نشوونما پتے شامل ہیں۔

21- کٹنگ کا طریقہ کن پودوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟

جواب: یہ طریقہ آرائشی درخت، جھازیاں اور پھلوں کی چند فصلیں اگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ گلاب اور انگور کی بیلوں کو تنے کی قلموں سے اگایا جاتا ہے۔

22- گرافٹنگ سے کیا مراد ہے؟

جواب: گرافٹنگ میں ایک ہی قسم کے دو یا زیادہ پودوں کے حصوں کو جوڑ کر ایک پودا بنایا جاتا ہے۔ اس طریقے میں ایک پودے کی بڈیا چھوٹا تنا دوسرے پودے کی جڑیا تنے کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔

23- کون سے پودے گرافٹنگ سے ریپر وڈکشن کرتے ہیں؟

جواب: گرافٹنگ کا طریقہ قریباً تمام تجارتی پھلوں کے درخت (مثلاً بادام، آلو بخارا، چیری وغیرہ) اور کئی نمائشی پودے اور جھازیاں اگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

24- وئیٹیٹیو پروٹیکیشن بننے والے پودوں کے کیا نقصانات ہیں؟

جواب: وئیٹیٹیو پروٹیکیشن سے بننے والے پودوں کے نقصانات:

• وئیٹیٹیو پروٹیکیشن سے بننے والے پودوں میں دراشی تغیرات نہیں ہوتے۔

• تمام نئے پودے بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں اس لیے ان پر ایک جیسی بیماریوں یا نقصان دہ کیڑوں کا حملہ ہو سکتا ہے۔

پودوں میں سیکھول ریپر وڈکشن (Sexual Reproduction in Plants)

10.3

25- سیکھول ریپر وڈکشن کے دوران کونسی جزیشنز بناتے ہیں؟

جواب: سیکھول ریپر وڈکشن کے دوران، پودوں کے بڑے گروپس دو مختلف جزیشنز بناتے ہیں۔ یہ جزیشنز ایک دوسرے کے بعد آتی ہیں۔ انہیں سپوروفائٹ اور گیٹو فائٹ جزیشنز کہتے ہیں۔

26- آلٹرنیشن آف جزیٹس کیا مراد ہے؟

جواب: سپوروفائٹ جزیٹس بالغ ہونے پر سپور بناتی ہے۔ یہ سپور جب نمو پاتے ہیں تو نئی گیمیٹو فائٹ جزیٹس بناتے ہیں۔ گیمیٹو فائٹ جزیٹس بالغ ہونے پر گیمیٹ بناتی ہے۔ یہ گیمیٹ مل کر نئی سپوروفائٹ جزیٹس بناتے ہیں اس مظہر کو آلٹرنیشن آف جزیٹس کہتے ہیں۔

27- سپوروفائٹ جزیٹس کی بنیاد کیا ہے؟

جواب: سپوروفائٹ جزیٹس ڈیپلانڈ ہوتی ہے۔ یہ جزیٹس کی اوکس کر کے ہپلائیڈ سپورز بناتی ہے۔ سپورز نمو پا کر ہپلائیڈ گیمیٹو فائٹ بناتے ہیں۔

28- ریسپیکٹ کی تعریف لکھیں۔

جواب: پھول کی ڈنڈی کی پھولی ہوئی نوک کو ریسپیکٹ کہتے ہیں۔ اس نوک کے اوپر پھول کے تمام حصے لگے ہوتے ہیں۔

29- ریسپیکٹ کا کام کیا ہے؟

جواب: ریسپیکٹ ایک بنیاد کے طور پر کام کرتی ہے اور پھول کی ساخت کو سہارا دیتی ہے۔

30- پھول کے حصوں کے نام لکھیں۔

جواب: پھول کے چار حصے ہیں:

(i) کیلکس (ii) کرولا (iii) اینڈروشیئم (iv) گائیٹیم

31- کیلکس کس سے مل کر بنا ہوتا ہے اور اس کا کام کیا ہے؟

جواب: کیلکس بیرونی گھیرا ہے۔ یہ بزرگ کے پتے نما سپل پر مشتمل ہے۔ سپلو کا کام پھول کھلنے سے پہلے اس کے حصوں کی حفاظت کرنا۔

32- سٹمن کے حصے کونے ہیں؟

جواب: سٹمن کے دو حصے ہیں۔ (i) ائنٹر (ii) فلامنٹ

33- کارپل کے کتنے اور کونے حصے ہیں؟

جواب: ایک کارپل کے تین حصے ہیں۔ (i) اووری (ii) سٹائل (iii) سٹکما

34- اووری کا فعل کیا ہے؟

جواب: کارپل کے بڑے بنیادی حصے کو اووری کہتے ہیں۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں اوویولز بنتے ہیں۔ یہ اوویولز ریپروڈکشن کے دوران میگاسپورز بناتے ہیں۔

35- پیل سے کیا مراد ہے؟

جواب: کچھ پھولوں میں ایک سے زائد کارپلوں کے دوسرے میں ضم ہو کر ایک ساخت بناتے ہیں۔ جسے پیل کہتے ہیں۔

36- انٹیپرسم کی لائف سائیکل میں کونے مراحل ہوتے ہیں؟

جواب: انٹیپرسم کی لائف سائیکل میں مندرجہ ذیل اہم مراحل ہیں:

(i) مادہ گیمیٹو فائٹ کا بننا (ii) نر گیمیٹو فائٹ کا بننا (iii) پولینیشن
(iv) فریٹلائزیشن (v) بیج اور پھل کا بننا (vi) سپوروفائٹس کا بننا

37- میگاسپورٹیم میں کیا موجود ہوتا ہے؟

جواب: میگاسپورٹیم میں ڈیپلانڈ میگاسپور مدر سیل موجود ہوتا ہے۔

38- لیوٹون نیوکلئس کیسے بنتا ہے؟

جواب: میگاسپور کے اندر مائیٹوسس کے ذریعے آٹھ ہپلائیڈ نیوکلئس بننے ہیں۔ دو نیوکلئس مرکزی مرکز میں آتے ہیں اور ضم ہو کر ایک لیوٹون نیوکلئس بناتے ہیں۔

39- لکمریوسیک میں کیا موجود ہوتا ہے؟

جواب: لکمریوسیک میں سات سٹیز موجود ہوتے ہیں یعنی ایک ایک سیل، ایک لیوٹون نیوکلئس اور پانچ غیر فعال سٹیز۔

40- میگاسپورٹیم اور مائیکروسپورٹیم کیا ہیں؟

جواب: میگاسپورٹیم: اووری میں موجود اوویول پھول کا میگاسپورٹیم ہے۔ اس میں ڈیپلانڈ میگاسپور مدر سیل موجود ہوتا ہے۔

مائیکروسپورٹیم: ائنٹر میں موجود پولینیکس پھول کے مائیکروسپورٹیم ہیں۔

41- ڈیل فریٹلائزیشن سے کیا مراد ہے؟

جواب: ایک سپرم کا ایک سیل کے ساتھ ملنا اور دوسرے سپرم کا لیوٹون نیوکلئس کے ساتھ ملنا ڈیل فریٹلائزیشن کہلاتا ہے۔ یہ عمل انٹیپرسم کے مرکزی منفرد خصوصیت ہے۔

42- پارتھوکارپی سے کیا مراد ہے؟

جواب: چند پودوں میں اوویول میں انڈے کی فریٹلائزیشن کے بغیر ہی اوویولز پھل بن جاتی ہیں۔ اس طرح پھل میں بیج نہیں ہوتے۔ اس عمل کو پارتھوکارپی کہتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں بغیر بیجوں والے پھل مثلاً کیلے اور بغیر بیج کے انگور بنتے ہیں۔

مختصر جوابی کنسپیکٹوئل (Conceptual) سوالات

☆ مختصر جواب دیں۔

1- گائیٹیم کے اس حصے کا نام بتائیں جو پولین گرین کی مطابقت کی نوعیت کا تعین کرتا ہے؟

جواب: پیل گائیٹیم کا وہ حصہ ہے جو پولین گرین کی مطابقت کی نوعیت کا تعین کرتا ہے۔

2- پیل کے ان حصوں کے نام لکھیں جہاں پھل اور بیج بنتے ہیں۔

جواب: سٹکما، سٹائل اور اووری پیل کے حصے ہیں جہاں پھل اور بیج بنتے ہیں۔

3- پھول دار پودوں کو کیا نام دیا جاتا ہے؟

جواب: انٹیپرسم پھول دار پودوں کا دوسرا نام ہے۔

4- ٹشو ٹیکچر کی کیا اہمیت ہے؟

جواب: ٹشو ٹیکچر سے پودوں کی ایک ہی قسم سے بہت سے پودے حاصل کیے جاسکتے ہیں اور پودوں کو بیماریوں سے پاک بنایا جاسکتا ہے۔

اقسام کے پودے تیار کرنے اور پودوں کی افزائش کے لیے بھی ضروری ہے۔

5- کیا آلٹرنیشن آف جزیٹس کا عمل صرف پودوں میں ہی ہوتا ہے؟

جواب: جی نہیں! آلٹرنیشن آف جزیٹس کا عمل کچھ اعلیٰ اور نچلی میں بھی ہوتا ہے۔

اہم نکات

- بائزوفیشن وہ تقسیم ہے جس میں آبائی سیل دو ڈائپلوئیڈ میں تقسیم ہوتا ہے جن میں سے ہر سیل وراثتی طور پر آبائی سیل سے مشابہ ہوتا ہے۔
- بڑنگ میں نیا جاندار آبائی جاندار کے جسم پر ایک چھوٹی سی نشوونما یعنی بڈ سے بنتا ہے۔
- دیگی نیوٹیسروٹیکیشن پودوں کی ریپروڈکشن کا ایک طریقہ ہے جس میں نئے پودے بناتے ہیں یعنی دیگی نیوٹیسروٹیکیشن مثلاً تھو، جڑوں یا پتوں سے پیدا ہوتے ہیں۔

- شٹ کے کناروں یا پودے کے دیگر مناسب حصوں سے لیے گئے نشو کے چھوٹے ٹکڑوں سے ایک جیسے نئے جاندار پیدا کرنے کی تکنیک کو کوننگ کہتے ہیں۔
- پودوں کے لائف سائیکل میں دو مختلف نسلیں ہوتی ہیں۔ ڈیپلانڈ جزیئن سپور بناتی ہے اور اسے سپورو فائٹ جزیئن کہا جاتا ہے جبکہ میلاڈ جزیئن گیسیٹ بناتی ہے اور اسے گیسیٹو فائٹ جزیئن کہا جاتا ہے۔
- مانگر و سپور میں مائی ٹوس ہوتی ہے اور وہ میلاڈ سائیکل بننے ہیں۔ ان میں سے ایک میوٹیل ہے جو پولن میوٹیل بناتا ہے اور دوسرا جزیئن میوٹیل تقسیم ہو کر دو سپرم بناتا ہے۔
- ایک نموپاٹا مانگر و سپور جس میں ایک میوٹیل نیوکلئس اور دو سپرم ہوتے ہیں، پودوں کی نر گیسیٹو فائٹ نسل ہے۔
- اوویول میں ایک میگا سپور مدر سل ہوتا ہے جس میں مائی ٹوس ہوتی ہے اور چار ہپلاڈ میگا سپورز بننے ہیں۔ ایک اوویول میں صرف ایک بڑا سپورعی فعال رہتا ہے۔ یہ ہپلاڈ میلاڈ گیسیٹو فائٹ میں نموپاٹا ہے جسے ایمبر یوسیک کہتے ہیں۔
- ایمبر یوسیک میں سات سیلز ہوتے ہیں۔ ایک سرے پر ایک ایگ سیل اور دوسرے سیلز ہوتے ہیں۔ دوسرے سرے پر تین سیلز ہیں۔ مرکز میں ایک فیوژن نیوکلئس ہوتا ہے جس میں دو نیوکلئس ہوتے ہیں۔

حل مشقی سوالات

- A- درج ذیل سوالات کے لیے درست جوابات منتخب کریں۔
- 1- مندرجہ ذیل میں سے کون سا جاندار عام طور پر بائٹری فشن کے ذریعہ رپروڈکشن کرتے ہیں؟
(الف) پیسٹ (ب) بیکٹیریا (ج) رائزوپس (د) پودے
- 2- پیسٹ میں رپروڈکشن کا بنیادی طریقہ کیا ہے؟
(الف) بائٹری فشن (ب) سپور بنانا (ج) بڈنگ (د) فریگیٹیشن
- 3- لہجائی میں سپور بنانے کے بارے میں کیا درست ہے؟
(الف) وہ سیکولر رپروڈکشن کے دوران سپور بناتے ہیں (ب) وہ دو قسم کے سپور بناتے ہیں (ج) سپور صرف خشک ماحول میں نئے لہجائی میں نمونہ بن سکتے ہیں (د) سپور سخت حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے پیدا کیے جاتے ہیں
- 4- سخت نامناسب حالات کے دوران کچھ بیکٹیریا میں کیا ہوتا ہے؟
(الف) ایک بڈ بناتے ہیں جو سیل سے الگ ہو جاتی ہے (ب) موٹی دیواروں والے اینڈوسپورز بناتے ہیں (ج) سیل کو دو ایک جیسے ڈیویژن میں تقسیم کرتے ہیں (د) بیکٹیریا کے دو سیلز آپس میں ضم ہو جاتے ہیں
- 5- درج ذیل میں سے کون سا پودارز کے ذریعہ وچنی ٹیوہرو پیکیشن کرتا ہے؟
(الف) آلو (ب) سٹرابیری (ج) پیاز (د) ادرک
- 6- کون سا پودا ٹیویوز کے ذریعے نسل بڑھاتا ہے؟
(الف) پیاز (ب) آلو (ج) ادرک (د) لہسن
- 7- زمین کے اوپر باقی تھا، جو اپنے نوڈز پر پتے اور جڑیں پیدا کرتا ہے:
(الف) سنولون (ب) بلب (ج) رائزوم (د) کورم

- 8- ان میں سے کون سا حصہ پودے کی وچنی ٹیوہرو پیکیشن میں مدد نہیں کرتا؟
(الف) رائزوم (ب) کورم (ج) رز (د) پھول
- 9- پھول کا کون سا حصہ پولن پیدا کرنے کا ذمہ دار ہے؟
(الف) سٹما (ب) اسٹنڈر (ج) اوری (د) پتل
- 10- مندرجہ ذیل میں سے کون سا کارپل کا حصہ نہیں ہے؟
(الف) فلامنٹ (ب) سٹائل (ج) سٹما (د) اوری
- 11- پھول دار پودوں میں کون سی ساخت سے مادہ گیسیٹو فائٹ بنتا ہے؟
(الف) پولن گرین (ب) اوریول (ج) اسٹنڈر (د) سٹیل
- 12- پھول دار پودوں میں نر گیسیٹو فائٹ کو کیا کہتے ہیں؟
(الف) پولن گرین (ب) ایمبر یوسیک (ج) اوری (د) کارپل
- 13- پھول دار پودوں کے لائف سائیکل میں کون سی ساخت ٹریپلاڈ (3N) ہے؟
(الف) ایگ سیل (ب) فیوژن نیوکلئس (ج) اینڈوسپرم نیوکلئس (د) سپرم
- 14- ایمبر یوسیک کس ساخت کے اندر بنتا ہے؟
(الف) فلامنٹ (ب) اسٹنڈر (ج) سٹائل (د) اوریول
- 15- ڈیپل فریٹلائزیشن کا مطلب ہے:
(الف) ایگ سیل کی دو نسلوں کے ذریعے فریٹلائزیشن (ب) ایک ہی ایمبر یوسیک میں دو ایگ سیلز کی دو سپرمز کے ذریعے فریٹلائزیشن (ج) ایگ سیل اور فیوژن نیوکلئس کی دو سپرمز کے ذریعے فریٹلائزیشن (د) ایگ سیل اور میوٹیل سیل کی دو سپرمز کے ذریعے فریٹلائزیشن

جوابات

1- (ب)	2- (ج)	3- (د)	4- (ب)	5- (ب)	6- (ب)	7- (الف)	8- (د)	9- (ج)	10- (الف)
11- (ب)	12- (الف)	13- (ج)	14- (د)	15- (ج)					

B- مختصر جوابات لکھیں۔

- 1- پیسٹ میں بڈنگ پر ایک مختصر نوٹ لکھیں۔
- جواب: پیسٹ میں بڈنگ: بڈنگ کا طریقہ پیسٹ میں عام ہے۔ بڈنگ کے دوران آبائی جاندار کا ایک حصہ جسم سے باہر کی طرف نشو پاتا ہے۔ اس حصے کو بڈ کہتے ہیں۔ جب بڈ بڑی ہو جاتی ہے تو یہ آبائی جسم سے الگ بھی ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ بھی لگی رہ سکتی ہے۔
- 2- لہجائی میں سپور بنانے پر ایک مختصر نوٹ لکھیں۔
- جواب: اکثر لہجائی (مثلاً روٹی پر لگنے والی فنگس یعنی رائزوپس) سپور بنا کر اسے سیکولر رپروڈکشن کرتے ہیں۔ یہ سپورز مخصوص خلیاتی ماحولوں کے اندر بننے ہیں۔ جن میں سپور بننا کہتے ہیں۔ جب سپورز پک کر تیار ہو جاتے ہیں تو سپور بننا کی دیواریں ٹوٹتی ہیں اور سپورز باہر نکل آتے ہیں۔

3۔ لہائی اور بیکٹیریا میں سپور بنانے کے فوائد کیا ہیں؟

جواب: لہائی میں فائدہ: لہائی سپور بنا کر سپروڈکشن کرتے ہیں۔ سپور اپنی موٹی دیواروں کی وجہ سے غیر مناسب حالات برداشت کر سکتے ہیں۔ جب حالات مناسب ہوں تو سپور اگلے میں اور نئے فکس میں نمودار ہوتے ہیں۔
بیکٹیریا میں فائدہ: کچھ بیکٹیریا اینڈوسپورز بنا کر سپروڈکشن کرتے ہیں۔ یہ سیل کے اندر پیدا ہونے والے سپورز ہوتے ہیں جو نامازگار ماحولیاتی حالات میں بنائے جاتے ہیں۔ بیکٹیریا کا سیل مر بھی جائے مگر اینڈوسپورز زندہ رہتا ہے۔ جب حالات بہتر ہوتے ہیں تو اینڈوسپور ایک بیکٹیریم میں نمودار ہوتا ہے۔

4۔ بیان کریں کہ رز کے ذریعے دیہی ٹیو بر ویگیشن کیسے ہوتی ہے؟

جواب: رز ایک افقی تاج ہے جو زمین سے اوپر بڑھتا ہے سٹولون (رز) میں نوڈز ہوتے ہیں جہاں نئے پتے اور جڑیں نمودار ہوتی ہیں۔ پتے اوپر کی طرف بڑھتے ہیں اور جڑیں نیچے بڑھتی ہیں۔ اس طرح نوڈز میں سے ایک نیا پودا نکل آتا ہے۔

5۔ بیان کریں کہ لکوسا کی طرح ٹیو برز کے ذریعے سپروڈکشن کرتے ہیں؟

جواب: آلوئیو برز کے ذریعے سپروڈکشن کرتے ہیں۔ یہ رز بھرتا ہے جو ریز زمین بڑھتا ہے۔ اس کے اوپر آنکھیں موجود ہوتی ہیں جو دراصل اس کے بڈز ہوتے ہیں۔ بڈز نئے پودوں میں نمودار ہوتے ہیں۔

6۔ دیہی ٹیو بر ویگیشن کے فوائد اور نقصانات بیان کریں۔

جواب: فائدہ: دیہی ٹیو بر ویگیشن سے کم وقت میں بہت سے نئے پودے پیدا کیے جاسکتے ہیں۔ ایسے نئے پودے اپنے آبائی پودے سے مشابہ ہوتے ہیں۔ اس طرح ان تمام میں مفید خصوصیات موجود ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مفید خصوصیات جیسے اچھے پھل یا مضبوط ٹنڈو، اگلی نسل کو منتقل ہوتی ہیں۔

نقصان: دیہی ٹیو بر ویگیشن سے بننے والے پودوں میں وراثتی تغیرات (genetic variations) نہیں ہوتے۔ دوسرے لفظوں میں تمام نئے پودے بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ ماحول میں تبدیلیوں کے لیے ایک ہی طرح سے حساس ہوتے ہیں اور ان پر ایک جیسی بیماریاں یا نقصان دہ کیڑوں (pests) کا حملہ ہو سکتا ہے۔

7۔ ایک پھول میں موجود چار گھروں کے نام بتائیں اور ہر گھرے کے اجزاء بھی بتائیں۔

جواب: پودے کے گھرے:

i۔ کیلکس ii۔ کرولا iii۔ اینڈروشیم iv۔ گائیٹیشیم

(i) کیلکس یہ سب سے بیرونی گھیرا ہوتا ہے یہ بڑے پتوں کی طرح سے مل کر بنا ہوتا ہے۔

(ii) کرولا دو سب سے بیرونی گھیرا ہوتا ہے جو پتوں سے مل کر بنا ہوتا ہے زیادہ تر پھول میں رنگ دار پتوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔

(iii) اینڈروشیم تیسرا گھیرا ہوتا ہے اور یہ نر تولیدی حصوں پر مشتمل ہوتا ہے جیسے سیمن کہتے ہیں ہر سیمن اینتھر اور فلامنٹ پر مشتمل ہوتا ہے اینتھر مائیکرو سپور بناتا ہے۔

(iv) سب سے اندرونی گھیرا گائیٹیشیم ہے جو مادہ تولیدی حصوں کا ریل سے مل کر بنا ہوتا ہے کارپل تین حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اووری، سٹائل، سٹگما۔

8۔ ایک پھول کے انمبر یوسیک کے اندر ایک سیل اور قطبی نیوکلیائی بننے کے عمل کو مختصر طور پر بیان کریں۔

جواب: پھول کے انمبر یوسیک کے اندر ایک سیل کا بننا: میگا سپور مد ریل می اوکس ہوتی ہے جس کے نتیجے میں چار ہپلائیڈ میگا سپورز بننے ہیں۔ ان

چار میں سے صرف ایک میگا سپور ہی زندہ رہتا ہے۔ اس میگا سپور کے اندر مائیٹوس کے ذریعے آٹھ ہپلائیڈ نیوکلیائی بننے ہیں۔ دو نیوکلیائی مرکز میں آتے ہیں اور ضم ہو کر ایک فیوژن نیوکلیس بناتے ہیں۔ بقیہ چھ میں سے ایک نیوکلیس سے مادہ گیسیٹ یعنی ایک سیل بنتا ہے۔

پودے کی انمبر یوسیک کے اندر پور نیوکلیائی کا بننا: پور نیوکلیائی اسی میونک پروڈکٹ سے مائیٹوس کے ذریعے بننے ہیں جو پودوں میں ایک سیل بناتا ہے۔ یہ مادہ گیمیٹو فائٹ کے سینٹرل سیل یا سٹیجیو پرم (پھول دار پودے) کی انمبر یوسیک میں واقع ہوتا ہے۔

9۔ ان کے درمیان فرق کریں:

i۔ ایکسیکول اور سیکسکول ریپر وڈکشن

جواب: ایکسیکول ریپر وڈکشن: ایسی ریپر وڈکشن جس میں گیمیٹس کا ملاپ نہیں ہوتا غیر جنسی یعنی اے سیکسکول ریپر وڈکشن کہلاتی ہے۔

سیکسکول ریپر وڈکشن: ایسی ریپر وڈکشن جس میں زائد مادہ گیمیٹس کا ملاپ ہوتا ہے، جنسی یعنی سیکسکول ریپر وڈکشن کہلاتی ہے۔

ii۔ بیکٹیریا اور ایمپیا میں بائنری فیشن:

جواب: بیکٹیریا میں ریپر وڈکشن: بائنری فیشن بیکٹیریا میں ریپر وڈکشن کا عام طریقہ ہے۔ بائنری فیشن کے دوران بیکٹیریا کے ڈی این اے کی نقل تیار ہوتی ہے اور دونوں نئے بننے والے ڈی این اے مائیکرومل مخالف اطراف میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد سیل ممبرین اندر کی طرف دب جاتی ہے۔ درمیان میں نئی سیل وال بنائی جاتی ہے اور اس طرح دو ایک جیسے ڈائریکٹریا پیدا ہوتے ہیں۔

ایمپیا میں ریپر وڈکشن: ایمپیا بائنری فیشن کے ذریعے پروڈکشن کرتے ہیں۔ ایمپیا میں اس ریپر وڈکشن کے دوران، آبائی جاندار کا نیوکلیس دو میں تقسیم ہوتا ہے۔ اس کے بعد سائٹوپلازم کی تقسیم ہوتی ہے۔ اس طرح دو ڈائریکٹریا بن جاتے ہیں۔

iii۔ سٹولون اور رائی زوم

جواب: سٹولون: یہ ایک افقی تاج ہے جو زمین سے اوپر بڑھتا ہے، مثلاً سٹراپیری۔

رائی زوم: یہ ایک افقی تاج ہے جو زمین کے نیچے بڑھتا ہے۔ مثلاً ہائرنز، ادراک اور گنے۔

iv۔ بلب اور کورم

جواب: بلب: بلب ایک چھوٹا سا تاج ہے جو زیر زمین بڑھتا ہے۔ مثلاً پیاز۔

کورم: کورم بلب سے مشابہت رکھتا ہے لیکن اس میں رز بھرے پتے نہیں ہوتے۔

v۔ گنگنگ اور گرافنگ

جواب: گنگنگ: نئے اور جڑ کا ایک ٹکڑا جسے پودے سے کاٹ کر نیا پودا لگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے قلم یعنی گنگنگ کہلاتا ہے۔ مثلاً گلاب اور انگور کی بیوں کو گنگنگ سے اگایا جاتا ہے۔

گرافنگ: گرافنگ میں ایک ہی قسم کے دو یا دو سے زیادہ پودوں کے حصوں کو جوڑ کر ایک پودا بنادیا جاتا ہے۔ مثلاً بادام، آلو بخارا وغیرہ۔

vi۔ دیہی ٹیو بر ویگیشن اور معنوی بر ویگیشن

جواب: دیہی ٹیو بر ویگیشن: یہ پودوں میں اے سیکسکول ریپر وڈکشن کا ایک طریقہ ہے۔ اس طریقے میں آبائی پودے کے دیہی ٹیو بر سے نیا پودا بنتا ہے۔

معنوی بر ویگیشن: معنوی بر ویگیشن میں وہ طریقے شامل ہیں جن میں انسان پودوں کے نباتاتی یعنی دیہی ٹیو حصوں کو استعمال کر کے نئے پودے پیدا کرتے ہیں۔

vii- زراور مادہ گیسٹو فائٹ

جواب: نر گیسٹو فائٹ: نر گیسٹو فائٹ (پولن گرین) میں سپرمز موجود ہوتے ہیں۔

مادہ گیسٹو فائٹ: مادہ گیسٹو فائٹ (ایمر یوسیک) میں ایک موجود ہوتے ہیں۔

viii- کیلیکس اور کرولا

جواب: کیلیکس: کیلیکس سب سے بیرونی گھیرا ہے۔ یہ بزرنگ کے پتے نما سپلز پر مشتمل ہے۔

کرولا: کرولا دوسرا گھیرا ہے اور یہ پتلا پر مشتمل ہے۔


ix- سٹیم اور کارپل

جواب: سٹیم: یہ زرقہ لیدی ساخت ہے۔ یہ اینٹھر اور فلماٹ پر مشتمل ہوتی ہے۔

کارپل: یہ مادہ تولیدی ساخت ہے۔ اس میں ادوری، سائل اور سٹیکما موجود ہوتے ہیں۔

10- پھول کی مندرجہ ذیل ڈیاگرام میں حصوں کے نام لکھیں۔

جواب:



C- تفصیلی جوابات لکھیں۔

1- بیٹریا میں بائرنی فشن کے عمل کی وضاحت کریں اور بیان کریں کہ یہ عمل کس طرح دو ڈائریکٹریا بننے کا باعث بنتا ہے۔

جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال نمبر 2

2- وکیٹو پروٹیکشن سے کیا مراد ہے؟ پودوں کے ان حصوں میں فرق بتائیں جو وکیٹو پروٹیکشن میں حصہ لیتے ہیں۔

جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال نمبر 6

3- ان طریقوں کی وضاحت کریں جن کے ذریعہ انسان آبائی پودوں کے نباتاتی حصوں کو استعمال کر کے نئے پورے اگا سکتے ہیں؟

جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال نمبر 6

4- سپورو فائٹ اور گیمیو فائٹ کی تعریف لکھیں۔ پودوں کے لائف سائیکل میں ان کا کردار بیان کریں۔

جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال نمبر 8

5- پھول دار پودوں کے لائف سائیکل کی وضاحت کریں جس میں گیمیو فائٹ اور سپورو فائٹ سلسلوں کے مابین الترائیشن آف جنریشن کو بیان کیا گیا ہو۔

جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال نمبر 10

6- بیان کریں کہ پھول کے ادویوں کے اجڑ کر طرح مادہ گیمیو فائٹ (ایمر یوسیک) نمونہ پاتا ہے؟

جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال نمبر 10

D- حقیقی سوالات:

1- سپورز کوخت ماحولیاتی عوامل میں بچاؤ کے لیے مطابقت کیوں سمجھا جاتا ہے؟

جواب: درج ذیل وجوہات کی وجہ سے سپورز کوخت موسمی حالات میں بقا کے لیے ضروری تصور کیا جاتا ہے۔

• سپورز ڈارمنسی میں شدید موسمی حالات کے لیے مزاحمت پیدا کرتا ہے۔

• سپورز شدید موسمی حالات، تناؤ اور بہت زیادہ نمبر پچر میں اپنا وجود برقرار رکھ سکتے ہیں۔

• سپورز حفاظت اور درتیک پودوں کی بقا میں کردار ادا کرتے ہیں۔

2- سیکٹول اور اے میکٹول رپروڈکشن پودوں کی پالپیشن کی جینیاتی تنوع کے لیے مختلف کردار ادا کرتی ہے؟

جواب:

• اے میکٹول رپروڈکشن میں صرف ایک پیرنٹ حصہ لیتا ہے اس لیے ان میں جینیٹک ویریشن بہت کم ہوتی ہے جبکہ دوسری قسم یعنی رپروڈکشن میں دونوں والدین حصہ لیتے ہیں اس لیے ان میں جینیٹک ویریشن بہت زیادہ ہوتی ہے۔

• اے میکٹول رپروڈکشن میں کسی سیویشن کے دوران ہی اس کی پالپیشن میں ویریشن پیدا ہوتا ہے۔

3- پولن ٹوب پھول دار پودوں میں فرٹلائزیشن کے عمل میں کیسے سہولت فراہم کرتی ہے؟

جواب: پھولدار پودوں میں پولن ٹوب سپرم سلز کو سٹیکما سے ادویوں کی طرف موڈر فرٹلائزیشن کے پروس کو ممکن بناتی ہے۔

رہسٹیکل

سائل

فلماٹ

ادوری

سپیل

رہسٹیکل

باب 11

بائیوسٹیتیکس

Biostatistics

یہ باب پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہوں گے کہ:

- بائیوسٹیتیکس (حیاتیاتی شماریات) اور اس کے استعمال کی تعریف لکھیں۔
- مین (اوسط)، میڈین (وسطی) اور موڈ (شمار یا چلن) کی تعریف لکھیں اور حساب کتاب سے معلوم کریں۔
- بائیولوجیکل ڈیٹا (اعداد و شمار) کے دیے گئے سیٹ کے لیے بار چارٹ بنائیں۔

انشائی طرز سوالات

نئی تعلیم کی نئی امتحانی شکلیں (Knowledge, Understanding, Application, Analytical & Conceptual) کی روشنی میں مرتب کیے گئے انشائی طرز سوالات

11.1	بائیوسٹیتیکس کا تعارف (Introduction of Biostatistics)
11.2	مین، میڈین، اور موڈ (Mean, Median, and Mode)
11.3	بار چارٹ (Bar Chart)

سوال 1: بائیوسٹیتیکس کیا ہے؟ مختلف شعبوں میں بائیوسٹیتیکس کے استعمالات لکھیں۔

جواب: بائیوسٹیتیکس کا تعارف (Introduction of Biostatistics):

بائیوسٹیتیکس سے مراد بائیوسٹیتیکس (statistics) کی وہ شاخ ہے جو بائیولوجیکل سائنس پر شماریاتی طریقوں یعنی بائیوسٹیتیکس کے طریقوں کا اطلاق کرتی ہے۔ یہ علم بائیولوجیکل تجربات کو ڈیزائن کرنے، کلینیکل ٹرائلز کروانے، اور وبائی امراض کا مطالعہ کرنے کے لیے ضروری ہے۔

بائیوسٹیتیکس کے استعمال (Uses of Biostatistics):

بائیوسٹیتیکس (Biostatistics) کے اہم استعمال میں مندرجہ ذیل شامل ہیں:

1- تجربات اور تحقیقی مطالعہ ڈیزائن کرنا (Designing Experiments and Research Studies)

بائیوسٹیتیکس (Biostatistics) تجربات کی منصوبہ بندی اور تشکیل میں مدد کرتی ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جاسکے کہ تحقیقی یعنی ریسرچ کے سوالات کے جوابات حقیقت کے لیے اکٹھا کیا جانے والا ڈیٹا متعلقہ (relevant) اور کافی ہے۔ مثال کے طور پر، ایک نئی دوا کو ٹیسٹ کرنے کی خاطر یہ جانے والے کلینیکل ٹرائلز میں بائیوسٹیتیکس کے ماہرین نمونے (sample) کے سائز کا تعین کرتے ہیں جو اس دوا کا ایک اثر معلوم کرنے کے لیے ضروری ہو۔

2- بائیولوجیکل ڈیٹا کا تجزیہ کرنا (Analysing of Biological Data): بائیوسٹیتیکس (Biostatistics) میں ڈیٹا کا تجزیہ کرنے کے لیے بائیوسٹیتیکس کے طریقوں کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ اس طرح کے تجزیے سے سائنسدانوں کو رجحانات، باہمی تعلقات (correlation) اور ترتیب (pattern) معلوم ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر مختلف احوالیاتی حالات میں پودوں کی نشوونما کی رفتار کا تجزیہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ روشنی اور پانی جیسے عوامل پودے کی نشوونما کو کس طرح متاثر کرتے ہیں۔

نتیجہ کی تشریح کرنا (Interpreting Results): ڈیٹا کا تجزیہ کرنے کے بعد بائیوسٹیتیکس (biostatistics) یا معنی طریقے سے نتائج کی تشریح کرنے میں مدد کرتی ہے۔ مثال کے طور پر، کسی بیماری کے پھیلاؤ کے متعلق آبادی میں کیے گئے سروے (survey) کے نتائج کی تشریح کرنے سے ایسے اقدامات کے لیے رہنمائی مل سکتی ہے جو عوامی صحت کے لیے اٹھائے جانے ضروری ہوں۔

4- نتائج کی پیشین گوئی کرنا (Predicting Outcomes): بائیوسٹیتیکس (Biostatistics) کو ایسے ماڈل بنانے کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے جو موجودہ ڈیٹا کی بنیاد پر مستقبل کے نتائج کی پیشین گوئی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، آبادی میں کسی متعدی (infectious) بیماری کے پھیلاؤ کی پیش گوئی کرنے سے ویکسین لگانے (vaccination) والی مہموں کی منصوبہ بندی اور وسائل مختص کرنے میں مدد ملتی ہے۔

5- صحت عامہ اور پالیسی سازی (Public Health and Policy Making): صحت عامہ کے شعبہ میں بائیوسٹیتیکس (biostatistics) کی مدد سے ثبوت پر مبنی معلومات ملتی ہیں۔ اس معلومات سے پالیسی ساز فیصلوں اور صحت کے اصولوں کے لیے رہنمائی ملتی ہے۔ مثال کے طور پر، کووڈ-19 (Covid-19) کی شرح کے ڈیٹا کے شماریاتی تجزیے سے کووڈ-19 کی ویکسین لگانے کی مہم پھل درآ رہی ہو سکتا ہے۔

سوال 2: بائیوسٹیتیکس کے اہم بائیولوجی، جینیٹکس، زراعت اور کلینیکل ٹرائلز میں استعمالات کی وضاحت کریں۔

جواب: بائیوسٹیتیکس کے استعمال مثالیں (Examples of the Uses of Biostatistics)

1- وبائی امراض کا علم (Epidemiology): وبائی امراض کے ماہرین آبادیوں میں صحت اور بیماریوں کی تقسیم اور تعین کا مطالعہ کرنے کے لیے بائیوسٹیتیکس (biostatistics) کا استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کووڈ-19 انفیکشن کی شرح، صحت یابی کی شرح اور ویکسین کی تاثیر سے متعلق ڈیٹا کا تجزیہ کرنے میں بائیوسٹیتیکس (biostatistics) کے طریقے شامل ہیں۔

2- جینیٹکس (Genetics): حیاتیاتی اعداد و شمار جینیٹکس کی ریسرچ میں خصوصیات کی وراثت اور بیماریوں کے ساتھ جینیاتی تغیرات کے تعلق کا تجزیہ کرنے کے لیے (biostatistics) کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، ذیابیطس اور کینسر جیسی بیماریوں سے خسلک جینیاتی مارکرز (genetic markers) کی شناخت کرنے کے لیے کی جانے والی جینیٹکس کی ریسرچ میں بائیوسٹیتیکس (biostatistics) کا استعمال ہوتا ہے۔

3- زراعت (Agriculture): زرعی تحقیق میں، بائیوسٹیتیکس (biostatistics) بہت سے معاملات کا تجزیہ کرنے میں مدد کرتی ہے مثلاً فصلوں کی پیداوار، کھادوں کی تاثیر، اور پودوں میں نقصان دہ کیڑوں کے خلاف مزاحمت۔ مثال کے طور پر، کاشتکاری کے مختلف طریقوں کے تحت گندم کی مختلف اقسام کی پیداوار کا موازنہ کرنے میں شماریاتی تجزیہ شامل ہے۔

4- کلینیکل ٹرائلز (Clinical Trials): نئے علاج اور ادویات کی جانچ کرنے والے کلینیکل ٹرائلز کے ڈیزائن اور تجزیے میں بائیوسٹیتیکس (biostatistics) اہم ہے۔ مثال کے طور پر، اس بات کا تعین کرنے کے لیے کہ آیا کوئی نئی دوا ایلیپیڈو (ایک دھڑکن بڑھانے والا دوا) کے طور پر دیا جاتا ہے: placebo) سے زیادہ موثر ہے یا نہیں، سخت شماریاتی ٹیسٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ یہ بات یقینی ہو کہ نتائج اعداد و شمار کے لحاظ سے اہم ہیں۔

سوال 3: مین، میڈین اور موڈ میں کیا فرق ہے؟ ایسے مثالیں شامل کریں جہاں ہر پیمائش استعمال کرنے کے لیے سب سے زیادہ مناسب ہے؟

جواب: مین، میڈین، اور موڈ (Mean, Median, and Mode):

اوسط یعنی مین (mean)، وسطی یعنی میڈین (median) اور شماریاتی چلن یعنی موڈ (mode) وہ پیمائشیں ہیں جو ڈیٹا سیٹ (set) خلاصہ کرنے اور اسے سمجھنے میں مدد کرتی ہیں۔ مین مجموعی اوسط فراہم کرتا ہے، میڈین درمیانی ویلیو (value) فراہم کرتا ہے، اور موڈ سب سے زائد کثرت میں موجود ہونے والی ویلیو کو اجاگر کرتا ہے۔

مین (اوسط) Mean: ایک ڈیٹا سیٹ میں موجود تمام ویلیوز کا مجموعہ جو ویلیوز کی تعداد سے تقسیم کیا گیا ہو، اس ڈیٹا سیٹ کا مین (اوسط) ہوتا ہے۔ اوریج (average) بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ڈیٹا سیٹ کی مرکزی ویلیو ظاہر کرتا ہے۔

موزم معلوم کرنے کا طریقہ (Steps to Calculate Mode)

- 1- ڈیٹا میں ہر ویلیو کی تکرار (frequency) کا شمار کریں۔
- 2- سب سے زیادہ تکرار والی ویلیو موز ہے۔

مثال (Example):

- ڈیٹا میں تکرار کریں: 150, 160, 165, 155, 160
- تکرار: 150(1), 160(2), 165(1), 155(1)
 - سب سے زیادہ تکرار والی ویلیو 160 ہے۔
 - اس لیے اس ڈیٹا میں موز 160 ہے۔

مثال (Example):

- ڈیٹا میں تکرار کریں: 150, 160, 160, 155, 155
- تکرار: 150(1), 160(2), 155(2)
 - سب سے زیادہ تکرار والی ویلیو 160 اور 155۔
 - اس لیے اس ڈیٹا میں دو موز ہیں یعنی 160 اور 155۔

مثال (Example):

- ڈیٹا میں تکرار کریں: 150, 160, 165, 155, 170
- تکرار: 150(1), 160(1), 165(1), 155(1), 170(1)
 - تمام ویلیوز کی تکرار ایک ہی ہے۔
 - اس لیے اس ڈیٹا میں کوئی موز نہیں ہے۔

سوال 4: ایکس کا استعمال کرتے ہوئے بار چارٹ بنانے کے مراحل بیان کریں۔ وضاحت کریں کہ ڈیٹا کے بہتر بصری تصور اور تشریح کے لیے چارٹ کو اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کیا جاسکتا ہے۔

جواب: بار چارٹ (Bar Chart):

بار چارٹ ڈیٹا کا گراف کی شکل میں یعنی گرافیکل (graphical) اظہار ہے جس میں مختلف اونچائی یا لمبائی کی بارز (bars) کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ مختلف اقسام (categories) کی مقداروں کا موازنہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بار چارٹ مختلف اقسام کا موازنہ کرنے اور ڈیٹا کی تقسیم کو بصری طور پر ظاہر کرنے کے لیے مؤثر ہوتے ہیں۔

بار چارٹ بنانے کا طریقہ (Steps to Create a Bar Chart)

- 1- بار چارٹ میں دکھایا جانے والا ڈیٹا اکٹھا کریں۔
- 2- ڈیٹا کو اقسام (categories) اور ان کی متعلقہ ویلیوز میں ترتیب دیں۔
- 3- افقی محور یعنی x-محور (x-axis) اور عمودی محور یعنی y-محور (y-axis) کھینچیں۔
- 4- x-محور کو اقسام (categories) جبکہ y-محور کو ویلیوز کے ساتھ لیبل کریں۔
- 5- ڈیٹا میں ویلیوز کی حد کی بنیاد پر y-axis کے سکیل (scale) کا تعین کریں۔ محور کو مساوی وقفوں میں تقسیم کریں۔
- 6- ہر قسم (category) کے لیے، اس کی ویلیو کے مطابق اونچائی کے ساتھ ایک بار (bar) کھینچیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ بارز (bars) کی چوڑائی برابر ہے اور یہ ایک دوسرے سے یکساں فاصلے پر ہیں۔

فارمولا (Formula) میں (Mean) = $\frac{\text{تمام ڈیٹا پوائنٹس کا مجموعہ (Sum of All Data Points)}}{\text{تمام ڈیٹا پوائنٹس کی تعداد (Number of Data Points)}}$

مثال Example: مندرجہ ذیل ڈیٹا میں تکرار کریں جس کے اعداد و شمار پانچ طلبہ کے قد (سینٹی میٹر میں) کی نمائندگی کرتے ہیں:

$$150, 160, 165, 155, 170$$

$$\text{میان (Mean)} = \frac{150 + 160 + 165 + 155 + 170}{5} = \frac{800}{5} = 160$$

لہذا، اوسط قد 160 سینٹی میٹر ہے۔

میڈین (وسطی) (Median): جب ڈیٹا میں موجود ویلیوز کو بڑھتی ہوئی (ascending) یا کم ہوتی (descending) ترتیب میں منظم کیا جاتا ہے تو اس ڈیٹا کی درمیانی قیمت کو میڈین کہتے ہیں۔ اگر ویلیوز کی تعداد طاق (odd) ہے تو ان کا میڈین درمیانی ویلیو ہے۔ اگر ویلیوز کی تعداد جفت (even) ہے تو ان کا میڈین درمیانی ویلیوز کا اوسط (average) ہے۔

میڈین معلوم کرنے کا طریقہ (Steps to Calculate Median)

- 1- ڈیٹا میں موجود ویلیوز کو بڑھتی ہوئی ترتیب سے لکھیں۔
- 2- اگر ویلیوز کی تعداد (n) طاق میں ہے تو ڈیٹا کے میڈین کا مقام ہوگا: $\frac{n+1}{2}$
- 3- اگر ویلیوز کی تعداد (n) جفت میں ہے تو ڈیٹا کے میڈین کا ان دو مقامات کی ویلیوز کا اوسط (average) ہوگا:

$$\left(\frac{n}{2}\right) \text{ اور } \left(\frac{n}{2} + 1\right)$$

مثال (Example): ڈیٹا میں تکرار کریں: 150, 160, 165, 155, 170

- 1- ویلیوز کو بڑھتی ہوئی ترتیب سے لکھیں: 150, 155, 160, 165, 170
- 2- ویلیوز کی تعداد (n) = 5 (طاق)
- 3- میڈین کا مقام ہے: $\left(\frac{5+1}{2}\right) = 3$

اس لیے میڈین ویلیو ہے: 160

مثال (Example):

- ویلیوز کی جفت تعداد کے لیے اس ڈیٹا میں تکرار کریں: 150, 160, 165, 155
- 1- ویلیوز کو بڑھتی ہوئی ترتیب سے لکھیں: 150, 155, 160, 165
 - 2- ویلیوز کی تعداد (n) = 4 (جفت)
 - 3- میڈین کا ان دو مقامات کی ویلیوز کا اوسط (average) ہے:

$$\left(\frac{4}{2}\right) = 2 \text{ اور } \left(\frac{4}{2} + 1\right) = 3$$

$$\text{Median} = \frac{155 + 160}{2} = \frac{315}{2} = 157.5$$

اس لیے میڈین ویلیو ہے: 157.5

نوٹ: Mode

موز ایسی ویلیو ہے جو ڈیٹا میں سب سے زیادہ مرتبہ موجود ہوتی ہے۔ ایک ڈیٹا میں ایک موز، ایک سے زیادہ موز، یا بالکل بھی موز نہیں ہو سکتا ہے۔

7- ہر بار کو اس کے قسم (category) کے نام اور ویلو کے ساتھ لیبل کریں۔

مثال (Example): مندرجہ ذیل ڈیٹا سیٹ پر غور کریں۔ یہ ڈیٹا لیڈسروے (field survey) کے دوران پودوں کی مختلف ہسی شیز میں پودوں کی تعداد کو ظاہر کرتا ہے:

ہسی شیز (Species)	پودوں کی تعداد
ہسی شیز A	15
ہسی شیز B	20
ہسی شیز C	10
ہسی شیز D	25
ہسی شیز E	5

1- ڈیٹا اکٹھا کریں: مندرجہ بالا ٹیبل میں ڈیٹا پہلے ہی اکٹھا کیا گیا ہے۔

2- ڈیٹا کو منظم کریں: ڈیٹا کو ہسی شیز اور ان کی متعلقہ پودوں کی تعداد کے ساتھ ٹیبل میں ترتیب دیں۔

3- محور کھینچیں: x-axis اور y-axis کھینچیں۔


4- x-axis کو ہسی شیز کے ساتھ لیبل کریں یعنی A, B, C, D, E اور y-axis کو ویلو یعنی پودوں کی تعداد کے ساتھ لیبل کریں۔

5- محوروں کو سکیل (scale) کریں: سب سے زیادہ ویلو 25 ہے۔ 5 کے وقفوں کے ساتھ ایک سکیل استعمال کریں یعنی 0, 5, 10, 15, 20, 25۔

6- بارز (bars) بنائیں: ہر ہسی شیز کے لیے پودوں کی متعلقہ تعداد تک ایک بار کھینچیں۔

7- بارز کو لیبل کریں: ہر بار کو ہسی شیز کے نام اور اس کی ویلو کے ساتھ لیبل کریں۔

بار چارٹ: پودوں کی تعداد



انسانی طرز کنسیپچوئل (Conceptual) سوالات

سوال 1: صحت کے شعبہ میں مین، میڈیئن اور موڈ کا کیا کردار ہے؟

جواب: صحت کے شعبے میں مین، میڈیئن اور موڈ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مین بلند پریش اور کو لیٹرنل لیول کی اوسط ویلو کا حساب لگانے میں مدد کرتا ہے۔ جو تشخیص کے لیے اہم ہے۔ میڈیئن اکثر ہٹا کے تجزیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

واضح اعداد و شمار کا تجزیہ کرنے کے لیے موڈ ضروری ہے جیسے کہ آبادی میں سب سے زیادہ خون کی گروہ قسم پائی جاتی ہے یا کھانسی میں صحت عامہ کی پالیسیوں اور علاج کے منصوبوں کی رہنمائی کرتا۔

سوال 2: ہائیڈرولکس میں مین (mean) کی کیا اہمیت ہے؟

جواب: مین کی اہمیت:

(i) مین اہم ہے کیونکہ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ڈیٹا سیٹ میں سینٹرل ویلو کہاں موجود ہے۔

(ii) مین اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ ڈیٹا سیٹ میں ہر مشاہدے سے معلومات رکھتی ہے۔

سوال 3: ڈیٹا سیٹ کا موڈ معلوم کریں۔ 2, 6, 5, 3, 0, 3, 4, 3, 2, 4, 5, 2, 4

جواب: ڈیٹا کو ترتیب دینے سے:

0, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6

موڈ:

0(1), 2(3), 3(3), 4(3), 5(2), 6(1)

سب سے زیادہ فریکوئنسی والی ویلو: 2, 3, 4

موڈ = 2, 3, 4

سوال 4: پہلے 10 طاق اعداد کا مین (mean) معلوم کریں۔

جواب: پہلے 10 طاق اعداد: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19

$$\begin{aligned} \text{مین} &= \frac{\text{تمام ڈیٹا پوائنٹس کا مجموعہ}}{\text{تمام ڈیٹا پوائنٹس کی تعداد}} \\ &= \frac{1+3+5+7+9+11+13+15+17+19}{10} \\ &= \frac{100}{10} \\ &= 10 \end{aligned}$$

معروضی سوالات

مختصر تہم کی امتحانی تکنیکس (Knowledge, Understanding, Application, Analytical & Conceptual) کی روشنی میں مرتب کیے گئے تھیں۔

11.1 بائیو سٹاتسٹکس کا تعارف (Introduction of Biostatistics)

☆ درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔

1- سٹاتسٹکس کی کوئی شاخ بائیولوجیکل سائنس پر سٹاتسٹکس کے طریقوں کا اطلاق کرتی ہے؟

(A) بائیو اکانسس (B) بائیو کیمسٹری (C) بائیو فزکس (D) بائیو سٹاتسٹکس

2- بائیولوجیکل تجربات کو ڈیزائن کرنے، کلینیکل ٹرائلز کروانے اور روپائی امراض کا مطالعہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے:

(A) بائیو سٹاتسٹکس کو (B) بائیو فزکس کو (C) بائیو سٹاتسٹکس کو (D) بائیو کیمسٹری کو

3- بائیو فلکس منصوبہ بندی اور تشکیل میں مدد دیتی ہے:

(A) ڈیٹا کی (B) ماڈلز کی (C) نتائج کی (D) تجربات کی

4- بائیو فلکس میں فلکس کے طریقوں کا اطلاق کیا جاتا ہے:

(A) تجربات کرنے کے لیے (B) ڈیٹا کا تجزیہ کرنے کے لیے (C) نتائج کی تشریح کرنے کے لیے (D) بائیو تھیس بنانے کے لیے

5- ڈیٹا کا تجزیہ کرنے کے بعد بائیو فلکس مدد کرتی ہے:

(A) مطالعہ ذرا ان کرنے میں (B) تجربات کرنے میں

(C) نتائج کی تشریح کرنے میں (D) ڈیٹیشن بنانے میں

6- بائیولوجیکل ریسرچ میں بائیو فلکس کا بنیادی کردار کیا ہے؟

(A) ڈیٹا اکٹھا کرنا (B) بائیولوجیکل ڈیٹا کا تجزیہ کرنا (C) نتائج کی تشریح کرنا (D) تجربات کرنا

7- کوڈ 19 میں انفیکشن کی شرح، صحت یابی کی شرح اور یکسین کی تاثیر سے متعلق ڈیٹا کا تجزیہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے:

(A) بائیو اکٹھا کرنا (B) بائیو فلکس کو (C) بائیو یکسٹری کو (D) بائیو فلکس کو

8- کون صحت اور بیماریوں کی تقسیم اور قیاس کا مطالعہ کرنے کے لیے بائیو فلکس کا استعمال کرتے ہیں؟

(A) فارمرز (B) ڈاکٹرز (C) انجینئرز (D) وبائی امراض کے ماہرین

9- بائیو فلکس فلکس کی ریسرچ میں استعمال کیا جاتا ہے:

(A) خصوصیات کی وراثت کا تجزیہ کرنے کے لیے (B) بیماریوں کے ساتھ جینیٹک تغیرات کا تجزیہ کرنے کے لیے

(C) پاپولیشن میں بیماریوں کی تشخیص کے لیے (D) A اور B دونوں

10- زری تحقیق میں، بائیو فلکس مدد دیتی ہے:

(A) فصلوں کی پیداوار میں (B) کھادوں کی تاثیر میں

(C) پودوں میں بیماریوں کے خلاف مزاحمت میں (D) ان تمام میں

11- ڈیٹا بیس (شوگر) اور کینسر جیسی بیماریوں کا مطالعہ مثال ہے:

(A) جینیٹکس کی (B) زراعت کی (C) کلینیکل ٹرائلز کی (D) پالیسی سازی کی

11.2 (Mean, Median, and Mode) میں، میڈین، اور موڈ

11.3 (Bar Chart) بار چارٹ

12- ڈیٹا کا خلاصہ کرنے اور اسے سمجھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے:

(A) میں (mean) (B) میڈین (median) (C) موڈ (mode) (D) ان تمام کو

13- مندرجہ ذیل میں سے کونسا میں کا دوسرا نام ہے:

(A) رینج (B) اوسط (C) تناسب (D) میڈین

14- ایک ڈیٹا سیٹ میں موجود تمام ویلیوز کا مجموعہ ویلیوز کی تعداد سے تقسیم کیا گیا ہو کہلاتا ہے:

(A) میں (B) میڈین (C) موڈ (D) رینج

15- ڈیٹا سیٹ کی مرکزی ویلیو ظاہر کرتی ہے:

(A) رینج کو (B) ایورج کو (C) میں کو (D) موڈ کو

16- مندرجہ ذیل ڈیٹا سیٹ کے لیے مین کیا ہوگی؟ 10, 8, 6, 4, 2

(A) 4 (B) 6 (C) 8 (D) 10

17- ڈیٹا سیٹ کی درمیانی قیمت کو کہا جاتا ہے:

(A) میڈین (B) موڈ (C) مین (D) تناسب

18- اگر ویلیوز کی تعداد طاق ہو تو ان کا میڈین ہوگا:

(A) پہلی ویلیو (B) آخری ویلیو (C) درمیانی ویلیو (D) پہلی دو ویلیوز

19- اگر ویلیوز کی تعداد جفت ہو تو ان کا میڈین ہوگا:

(A) آخری ویلیو (B) درمیانی ویلیو (C) درمیانی دو ویلیوز کا اوسط (D) آخری دو ویلیوز کا اوسط

20- ڈیٹا سیٹ میں سب سے زیادہ مرتبہ موجود ویلیو کو کہتے ہیں:

(A) میڈین (B) موڈ (C) رینج (D) ایورج

21- ایک ڈیٹا سیٹ میں موڈ ہو سکتا ہے:

(A) ایک موڈ (B) ایک سے زیادہ موڈ (C) کوئی بھی موڈ نہیں (D) یہ تمام

22- موڈ معلوم کرنے کا پہلا شیپ کیا ہے؟

(A) ڈیٹا کو ترتیب دینا (B) ویلیوز کی تعداد کاؤنٹ کرنا (C) ہر ویلیو کی فریکوئنسی کاؤنٹ کرنا (D) تمام ویلیوز کا مجموعہ

23- بار چارٹ ہے:

(A) ڈیٹا کا عددی اظہار (B) ڈیٹا کا نمبر کی شکل میں اظہار

(C) ڈیٹا کا گراف کی شکل میں اظہار (D) A اور B دونوں

24- بار چارٹ بنانے کا پہلا شیپ ہے:

(A) ڈیٹا اکٹھا کرنا (B) ویلیوز کو ترتیب دینا (C) ایکسز بنانا (D) لیبل کرنا

محلات

(D) -10	(D) -9	(D) -8	(D) -7	(B) -6	(C) -5	(B) -4	(D) -3	(C) -2	(D) -1
(B) -20	(C) -19	(C) -18	(A) -17	(B) -16	(B) -15	(A) -14	(B) -13	(D) -12	(A) -11
						(A) -24	(C) -23	(C) -22	(D) -21

کثیر الانتخابی کنسپچوئل (Conceptual) سوالات

☆ درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔

1- میڈین وہ ویلیو ہے جو ڈیٹا کو تقسیم کرتی ہے:

(A) 2 حصوں میں (B) 3 حصوں میں (C) 4 حصوں میں (D) 5 حصوں میں

2- اگر ایک ڈیٹا سیٹ کا مین 12 ہو اور ویلیوز کی تعداد 8 ہو تو ویلیوز کا مجموعہ کیا ہوگا؟

(A) 96 (B) 80 (C) 64 (D) 48

3- مندرجہ ذیل ویلیوز کی مین کیا ہوگی؟ 23, 45, 87, 40, 50

(A) 49 (B) 34 (C) 56 (D) 62

4- مندرجہ ذیل ڈیٹا سیٹ کا موازنہ کیا ہے؟ 150, 160, 160, 155, 155

160 (A) 155 (B) 155, 160 (C) 150, 160 (D)

5- بار چارٹ استعمال کیا جاتا ہے:

(A) وقت کے ساتھ رجحانات دیکھنے کے لیے
(B) ڈیٹا کی مختلف گریڈز کا موازنہ کرنا
(C) عددی اعداد و شمار کی نمائندگی کرنا
(D) تقسیم کو ظاہر کرنا

جوابات

1- (A) 2- (A) 3- (A) 4- (C) 5- (B)

مختصر قسم کی نئی امتحانی تکنیکس (Knowledge, Understanding, Application, Analytical & Conceptual) کی روشنی میں مرتب کیے گئے مختصر جوابات

11.1 بائیو سٹیکس کا تعارف (Introduction of Biostatistics)

☆ مختصر جواب دیں۔

1- بائیو سٹیکس سے کیا مراد ہے؟
جواب: بائیو سٹیکس سے مراد بائیو سٹیکس کی وہ شاخ ہے جو بائیولوجیکل سائنس پر شماریاتی طریقوں یعنی سٹیکس کے طریقوں کا اطلاق کرتی ہے۔

2- بائیو سٹیکس کیوں ضروری ہے؟
جواب: بائیو سٹیکس کا علم بائیولوجیکل تجربے کا کوڈ براؤزنگ کرنے، کلیئیکل ٹرائلز کروانے اور وہابی امراض کا مطالعہ کرنے کے لیے ضروری ہے۔

3- بائیولوجیکل ڈیٹا کا تجزیہ کرنے میں بائیو سٹیکس کیسے مددگار ہے؟
جواب: بائیو سٹیکس میں ڈیٹا کا تجزیہ کرنے کے لیے سٹیکس کے طریقوں کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ اس طرح کے تجزیے سے سائنسدانوں کو جان

بہی تعلقات اور ترتیب معلوم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ مثال کے طور پر مختلف ماحولیاتی حالات میں پودوں کی نشوونما کی رفتار کا تجزیہ کرنا سے پتہ چلتا ہے کہ روشنی اور پانی جیسے عوامل پودے کی نشوونما کو کس طرح متاثر کرتے ہیں۔

4- نتائج کی تشریح میں بائیو سٹیکس کی اہمیت بیان کریں۔
جواب: ڈیٹا کا تجزیہ کرنے کے بعد بائیو سٹیکس باحقی طریقے سے نتائج کی تشریح کرنے میں مدد کرتی ہے۔

مثلاً: کسی بیماری کے پھیلاؤ کے متعلق آبادی میں کیے گئے سروے کے نتائج کی تشریح کرنے سے ایسے اقدامات کے لیے رہنمائی مل سکتی ہے جو عوامی صحت کے لیے اٹھائے جانے ضروری ہوں۔

5- صحت عامہ اور پالیسی سازی میں بائیو سٹیکس کا کیا کردار ہے؟
جواب: صحت عامہ کے شعبہ میں بائیو سٹیکس کی مدد سے ثبوت پر مبنی معلومات ملتی ہے۔ ان معلومات سے پالیسی ساز فیصلوں اور صحت کے اداروں کے لیے رہنمائی ملتی ہے۔

مثلاً: کووڈ-19 کی شرح کے ڈیٹا کے شماریاتی تجزیے سے کووڈ-19 کی ویکسین لگانے کی مہم پر عمل درآمد ہو سکتا ہے۔

6- وہابی امراض کے ماہرین آبادیوں میں صحت اور بیماریوں کی تقسیم اور تعین کا مطالعہ کرنے کے لیے بائیو سٹیکس کا استعمال کرتے ہیں۔
جواب: وہابی امراض کے ماہرین آبادیوں میں صحت اور بیماریوں کی تقسیم اور تعین کا مطالعہ کرنے کے لیے بائیو سٹیکس کا استعمال کرتے ہیں۔

1- بائیو سٹیکس کے اہم استعمالات لکھیں۔

جواب: بائیو سٹیکس کے اہم استعمالات درج ذیل ہیں۔

- تجربات اور تحقیقی مطالعہ ڈیزائن کرنا
- نتائج کی تشریح کرنا
- صحت عامہ اور پالیسی سازی میں مدد کرنا

2- بائیو سٹیکس کا جینیٹکس میں کیا فائدہ ہے؟

جواب: جینیٹکس کی ریسرچ میں خصوصیات کی وراثت اور بیماریوں کے ساتھ جینیاتی تغیرات کے تعلق کا تجزیہ کرنے کے لیے بائیو سٹیکس کا استعمال

کیا جاتا ہے۔

3- زراعت میں بائیو سٹیکس کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے؟ مثال دیں۔

جواب: زرعی تحقیق میں، بائیو سٹیکس بہت سے معاملات جیسے فصلوں کی پیداوار، کھادوں کی تاثیر اور پودوں میں نقصان دہ کیڑوں اور بیماریوں کے خلاف مزاحمت کا تجزیہ کرنے میں مدد دیتی ہے۔

مثال کے طور پر: کاشتکاری کے مختلف طریقوں کے تحت گندم کی مختلف اقسام کی پیداوار کا موازنہ کرنے میں شماریاتی تجزیہ شامل ہے۔

11.2 مین، میڈین، اور موڈ (Mean, Median, and Mode)

11.3 بار چارٹ (Bar Chart)

10- کون سی پیمائش ڈیٹا سیٹ کا خلاصہ کرنے اور اسے سمجھنے میں مدد دیتی ہیں؟

جواب: مین، میڈین اور موڈ وہ پیمائشیں ہیں جو ڈیٹا سیٹ کا خلاصہ کرنے اور اسے سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔

11- بائیو سٹیکس میں مین (mean) سے کیا مراد ہے؟

جواب: ایک ڈیٹا سیٹ میں موجود تمام ویلیوز کا مجموعہ جو ویلیوز کی تعداد سے تقسیم کیا گیا ہو، اس ڈیٹا سیٹ کا مین کہلاتا ہے۔

12- ایوریج کیا ہے؟

جواب: ایوریج ڈیٹا سیٹ کی مرکزی ویلیوز کو ظاہر کرتا ہے۔

13- ڈیٹا سیٹ میں مین کا فارمولا کیا ہے؟

جواب: $\text{مین} = \frac{\text{تمام ڈیٹا پوائنٹس کا مجموعہ}}{\text{تمام ڈیٹا پوائنٹس کی تعداد}}$

14- ڈیٹا سیٹ کے میڈین سے کیا مراد ہے؟

جواب: ڈیٹا سیٹ کی درمیانی قیمت کو میڈین کہتے ہیں۔

15- اگر ڈیٹا سیٹ کی ویلیوز کا مجموعہ طاق ہو تو اس کا میڈین کیا ہوگا؟

جواب: اگر ڈیٹا سیٹ کی ویلیوز کا مجموعہ طاق ہو تو ان کا میڈین درمیانی ویلیوز ہوگا۔

16- اگر ڈیٹا سیٹ کی ویلیوز کا مجموعہ جفت ہو تو اس کا میڈین کیا ہوگا؟

جواب: اگر ڈیٹا سیٹ کی ویلیوز کا مجموعہ جفت ہو تو ان کا میڈین دو درمیانی ویلیوز کا اوسط ہوگا۔

17- میڈین معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟

جواب: میڈین معلوم کرنے کا طریقہ:

i- ڈیٹا میں موجود ویلیوز کو بڑھتی ہوئی ترتیب سے لکھیں۔

ii- اگر ویلیوز کی تعداد طاق میں ہے تو ڈینا کے میڈین کا مقام ہوگا۔ $\frac{n+1}{2}$

iii- اگر ویلیوز کی تعداد (n) جفت میں ہے تو ڈینا کا میڈین ان دو مقامات کی ویلیوز کی اوسط ہوگا:
 $\frac{n}{2}$ اور $\frac{n+1}{2}$

18- ڈینا سیٹ کے موڈ سے کیا مراد ہے؟

جواب: موڈ (mode) ایسی ویلیو ہے جو ڈینا سیٹ میں سب سے زیادہ مرتبہ موجود ہوتی ہے۔

19- ایک ڈینا سیٹ میں کتنے موڈ (mode) ہو سکتے ہیں؟

جواب: ایک ڈینا سیٹ میں ایک موڈ، ایک سے زیادہ موڈ یا کوئی بھی موڈ نہیں ہو سکتا۔

20- موڈ معلوم کرنے کا طریقہ لکھیں۔

جواب: موڈ معلوم کرنے کا طریقہ:

i- ڈینا سیٹ کی ہر ویلیو کی تکرار (frequency) کا شمار کریں۔

ii- سب سے زیادہ فریکوئنسی والی ویلیو موڈ ہے۔

21- بار چارٹ سے کیا مراد ہے؟

جواب: بار چارٹ ڈینا کا گراف کی شکل یعنی گرافیکل اظہار ہے جس میں مختلف اونچائی یا لمبائی کی بارز (bars) کا استعمال کیا جاتا ہے۔

22- بار چارٹ کہاں استعمال ہوتے ہیں؟

جواب: بار چارٹ مختلف اقسام کا موازنہ کرنے اور ڈینا کی تقسیم کو بصری طور پر ظاہر کرنے کے لیے مؤثر ہوتے ہیں۔

مختصر جوابی کنسپچوئل (Conceptual) سوالات

☆ مختصر جواب دیں۔

1- مین، میڈین سے کیسے مختلف ہے؟

جواب: مین ایک ڈینا سیٹ میں موجود تمام ویلیوز کا مجموعہ ہے جو ویلیوز کی تعداد سے تقسیم کیا گیا ہو۔ جبکہ میڈین ڈینا سیٹ کی درمیانی قیمت کو کہتے ہیں۔

2- بار گراف کا سب سے اہم حصہ کیا ہے؟

جواب: بار گراف کا سب سے اہم حصہ اس میں موجود ڈینا ہے۔

3- کیا صرف اوسط ہی کسی ڈینا سیٹ کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کر سکتا ہے؟

جواب: نہیں صرف اوسط (مین) سے ڈینا سیٹ کے بارے میں مکمل معلومات حاصل نہیں ہوتی۔ ڈینا سیٹ کی پوری معلومات حاصل کرنے کے لیے دیگر پیرامیٹرز جیسے کہ میڈین اور موڈ وغیرہ کا تجزیہ کرنا بھی ضروری ہے۔

4- اگر کسی تحقیق میں جمع کیے گئے ڈینا میں غلطیاں ہوں تو اس کا بائیو سٹیکس کے نتائج پر کیا اثر پڑے گا؟

جواب: اگر ڈینا میں غلطیاں موجود ہوں تو یہ بائیو سٹیکس کے نتائج کو متاثر کر سکتے ہیں۔ غلط ڈینا سے غلط مین، میڈین اور موڈ حاصل ہوں گے جن سے نتائج غیر قابل اعتماد ہوگا۔

5- بائیو سٹیکس کے استعمال سے تحقیق عمل کو کیسے بہتر بنایا جاسکتا ہے؟

جواب: بائیو سٹیکس کے استعمال سے تحقیق عمل کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ کیونکہ یہ ڈینا کا مناسب تجزیہ کرنے میں مدد دیتا ہے۔ نتائج کو سمجھنے میں آسانی فراہم کرتا ہے اور تحقیقی نتائج کو زیادہ قابل احترام بناتا ہے۔

اہم نکات

• بائیو سٹیکس (Biostatistics) سے مراد بائیولوجی میں شماریاتی طریقوں کا اطلاق ہے۔

• بائیو سٹیکس (Biostatistics) تجربات کو زیرِ اِن کرنے، اعداد و شمار کا تجزیہ کرنے، نتائج کی تشریح کرنے، نتائج کی پیش گوئی کرنے اور

عوامی صحت کی پالیسی کے متعلق معلومات فراہم کرنے میں مدد کرتی ہے۔

• مین (اوسط) تمام ویلیوز کا مجموعہ سے جو ویلیوز کی تعداد سے تقسیم کیا جاتا ہے۔

• مین (اوسط) ایک مجموعی اوسط فراہم کرتا ہے یہ چیز عام رجحانات کو سمجھنے کے لیے مفید ہے۔

• جب ڈینا کو ترتیب دیا جاتا ہے تو میڈین اس کی درمیانی ویلیو ہوتی ہے۔ اگر ویلیوز کی تعداد جفت ہے تو ان کا میڈین دو درمیانی ویلیوز کی مین

(اوسط) ہے۔

• درمیانی ویلیو کو سمجھنے کے لیے میڈین مفید ہے، خاص طور پر اگر ڈینا مبہم ہو۔

• موڈ وہ ویلیو ہے جو ڈینا اکثر ظاہر ہوتی ہے۔

• موڈ سب سے عام قدر کو ظاہر کرتا ہے، جو اقسام پر مشتمل ڈینا کے تجزیہ کے لیے مفید ہے۔

• بار چارٹ مختلف اقسام کا موازنہ کرنے میں مدد کرتے ہیں۔

حل مشقی سوالات

A درج ذیل سوالات کے لیے درست جوابات منتخب کریں۔

1- بائیو سٹیکس (Biostatistics) کا بنیادی مقصد کیا ہے؟

(الف) مائیتی ڈینا کا تجزیہ کرنا (ب) بائیولوجیکل سائنس میں شماریاتی طریقوں کا اطلاق

(ج) انجینئرنگ ماڈل ڈیزائن کرنا (د) تاریخی واقعات کا مطالعہ کرنا

2- بائیو سٹیکس (Biostatistics) میں موجود ڈینا کی بنیاد پر مستقبل کے نتائج کی پیش گوئی کرنے کے لیے کون سا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے؟

(الف) تجربات ڈیزائن کرنا (ب) چارٹ بنانا (ج) اوسط نکالنا (د) ڈینا کا تجزیہ کرنا

3- مندرجہ ذیل میں سے کون سا مین ڈینا سیٹ کی مین (اوسط) کو بہترین طور پر بیان کرتا ہے؟

(الف) سب سے زیادہ تکرار سے ہونے والی ویلیو (ب) جب ڈینا ترتیب میں ہو تو درمیانی ویلیو

(ج) تمام ویلیوز کا مجموعہ جسے ویلیوز کی تعداد سے تقسیم کیا گیا ہو (د) سب سے زیادہ اور سب سے کم ویلیو کے درمیان فرق

4- اگر ڈینا سیٹ 5, 8, 12, 15, 20 ہے، تو میڈین کیا ہوگی؟

(الف) 8 (ب) 12 (ج) 15 (د) 20

5- ڈینا سیٹ 7, 8, 9, 10, 11 ہے، تو مین (اوسط) کیا ہوگی؟

(الف) 7 (ب) 8 (ج) 9 (د) 10

6- جب ڈینا سیٹ میں ویلیوز کی تعداد جفت ہو تو میڈین کیسے معلوم کی جاتی ہے؟

(الف) درمیانی ویلیو کا انتخاب کر کے (ب) دو (2) درمیانی ویلیوز کا اوسط لے کر

(ج) سب سے زیادہ کثرت سے موجود ویلیو کا انتخاب کر کے (د) تمام ویلیوز کو شامل کر کے اور ویلیوز کی کل تعداد سے تقسیم کر کے

7- ڈیٹا سیٹ 3, 3, 6, 7, 8, 9, 9 تو موڈ کیا ہوگا؟

(الف) 3 (ب) 6 (ج) 7 (د) 13 اور 9 دونوں

8- اگر ڈیٹا سیٹ میں ایسی کوئی ویلیو نہیں ہے جس کی تکرار ہو تو موڈ کیا ہے؟

(الف) سب سے زیادہ ویلیو (ب) ڈیٹا سیٹ کی اوسط (ج) کوئی موڈ نہیں ہے (د) میڈین ویلیو

9- بار چارٹ میں، ہر بار کی اونچائی یا لمبائی کیا ظاہر کرتی ہے؟

(الف) اقسام کی کل تعداد (ب) متعلقہ قسم کی ویلیو (ج) تمام ویلیوز کی اوسط (د) سب سے زیادہ اور سب سے کم ویلیوز میں فرق

10- بار چارٹ بناتے وقت، کون سا axis عام طور پر اقسام کو ظاہر کرتا ہے؟

(الف) عمودی محور یعنی y-axis (ب) افقی محور یعنی x-axis (ج) دونوں محور یکساں طور پر اقسام کو ظاہر کرتے ہیں (د) کوئی بھی محور اقسام کو ظاہر نہیں کرتا

جوابات

1- (ب)	2- (ج)	3- (ج)	4- (ب)	5- (ج)	6- (ب)	7- (د)	8- (ج)	9- (ب)	10- (ب)
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

B- مختصر جوابات لکھیں۔

1- بائیو سٹیکس (Biostatistics) کی تعریف لکھیں۔

جواب: بائیو سٹیکس (Biostatistics) سے مراد سٹیکس کی وہ شاخ ہے جو بائیولوجیکل سائنس پر شماریاتی طریقوں یعنی سٹیکس کے طریقوں کا اطلاق کرتی ہے۔

2- ڈیٹا سیٹ کی میڈین (median) سے کیا مراد ہے؟

جواب: ڈیٹا سیٹ کی درمیانی قیمت کو میڈین کہتے ہیں۔

3- مین (mean) کیسے معلوم کی جاتی ہے؟

جواب: مین مندرجہ ذیل فارمولہ سے معلوم کی جاتی ہے:

$$\text{مین} = \frac{\text{تمام ڈیٹا پوائنٹس کا مجموعہ}}{\text{تمام ڈیٹا پوائنٹس کی تعداد}}$$

4- بار چارٹ میں بار کی اونچائی یا لمبائی کیا ظاہر کرتی ہے؟

جواب: بار چارٹ میں بار کی اونچائی اس کی تکرار کی مقدار یا تعداد کو ظاہر کرتی ہے۔

5- ڈیٹا سیٹ کے موڈ (mode) سے کیا مراد ہے؟

جواب: موڈ ایسی ویلیو ہے جو ڈیٹا سیٹ میں سب سے زیادہ مرتبہ موجود ہوتی ہے۔ ایک ڈیٹا سیٹ میں ایک موڈ، ایک سے زیادہ موڈ یا کوئی موڈ نہیں ہو سکتا۔

C- تفصیلی جوابات لکھیں۔

1- صحت عامہ کے شعبہ میں بائیو سٹیکس (Biostatistics) کی اہمیت کی وضاحت کریں۔ مثالیں دیں کہ عوامی صحت کے فیصلوں کے لیے معلومات فراہم کرنے کے لیے بائیو سٹیکس (Biostatistics) کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔

جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال 2

2- مین (mean)، میڈین (median) اور موڈ (mode) میں کیا فرق ہیں۔ ایسی مثالیں شامل کریں جہاں ہر پیمانہ استعمال کرنے کے لیے سب سے زیادہ مناسب ہے۔

جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال 3

3- ایکسل کا استعمال کرتے ہوئے بار چارٹ بنانے کے مراحل بیان کریں۔ وضاحت دیں کہ ڈیٹا کے بہتر بصری تصور اور تشریح کے لیے چارٹ کو اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کیا جاسکتا ہے۔

جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال 4

4- ڈیٹا سیٹ کے مین، میڈین اور موڈ معلوم کرنے کی ایک تفصیلی مثال دیں۔ اپنی کیلکولیشن (calculation) کے لیے یہ ڈیٹا سیٹ استعمال کریں۔

12, 15, 22, 8, 19, 25, 15

جواب: ڈیٹا سیٹ: 12, 15, 22, 8, 19, 25, 15

$$\text{مین} = \frac{\text{تمام ڈیٹا پوائنٹس کا مجموعہ}}{\text{تمام ڈیٹا پوائنٹس کی تعداد}}$$

$$\text{مین} = \frac{12+15+22+8+19+25+15}{7}$$

$$\text{مین} = \frac{116}{7}$$

$$\text{مین} = 16.6$$

میڈین:

ڈیٹا سیٹ: 12, 15, 22, 8, 19, 25, 15

ڈیٹا کو ترتیب دینا: 8, 12, 15, 15, 19, 22, 25

ویلیوز کی تعداد (n) = 7 (خلاق)

$$\text{میڈین} = \frac{n+1}{2} \text{ ویں رقم}$$

$$\text{میڈین} = \frac{7+1}{2} \text{ ویں رقم}$$

$$\text{میڈین} = \frac{8}{2} \text{ ویں رقم}$$

$$\text{میڈین} = 4 \text{ ویں رقم}$$

$$\text{میڈین} = 15$$

$$\text{میڈین} = 15$$

موڈ:

ڈیٹا سیٹ: 12, 15, 22, 8, 19, 25, 15

فریکوئنسی (1) 25، (1) 19، (1) 8، (2) 15، (1) 12

15 = نمب سے زیادہ فریکوئنسی والی ویلیو

15 = موڈ


5- آپ کو مندرجہ ذیل ڈیٹا سیٹ دیا گیا ہے، ایک ہفتے میں مارکیٹ میں فروخت ہونے والے مختلف اقسام کے پھلوں کی تعداد دکھانے کے لیے ایک بار چارٹ بنائیں:

• سیب: 30 • کیلے: 45 • سنترے: 20 • انگور: 25 • آم: 15

جواب: یقینی بنائیں کہ axis کو لیبل کیا گیا ہو اور چارٹ کے لیے عنوان دیا گیا ہو۔

عنوان: فروخت کیے گئے پھلوں کی تعداد۔



پھل	فروخت ہونے والے پھلوں کی تعداد
سیب	30
کیلے	45
سنترے	20
انگور	25
آم	15






1

امتحانی بائیولوجی نہم


CHAPTER 2




CHAPTER 3




CHAPTER 3



سٹیم سیل سے مخصوص سیل کا بننا




مائٹوکونڈریا




کلوروپلاسٹ

CHAPTER 4




یوکیروٹک سیل کا سیل سائیکل




می اوسس II کے فیزز

CHAPTER 4




می اوسس آکے فیروز




کراسنگ اوور

CHAPTER 5




معدہ میں موجود نشوز

CHAPTER 6




DNA کا دیل بیلکس ماڈل

CHAPTER 7




ایڈزٹم کے کام کرنے کا لاک، اینڈ کی ماڈل




ایڈزٹم کے کام کرنے کا لاک، اینڈ کی ماڈل


CHAPTER 8



ایسی ہی کے مالیکیول کی ساخت




فونوسینتھیسیز کے لائٹ ری ایکشنز




شوما کا کھلنا اور بند ہونا

CHAPTER 10




گرافنگ




بودوں میں انریشن آف جنریشنز

CHAPTER 10



مادہ گیمیٹوفائٹ کا بننا



پھول دار پودے کا لائف سائیکل

ہمدا ر کتب خانہ

کی ترمیم شدہ سلیبس کے مطابق مستند و معیاری امدادی کتب
ہمدا ر امتحانی کتب برائے میٹرک کلاسز





ہمدا ر امتحانی اردو	ہمدا ر امتحانی انگریز
ہمدا ر امتحانی اسلامیات (لازمی)	ہمدا ر امتحانی اسلامیات (لازمی)
ہمدا ر امتحانی اخلاقیات	ہمدا ر امتحانی ترجمہ القرآن المجید
ہمدا ر امتحانی جنرل سائنس	ہمدا ر امتحانی ریاضی II-I
ہمدا ر امتحانی ہوم سائنس	ہمدا ر امتحانی مطالعہ پاکستان
ہمدا ر امتحانی مبادیات تعلیم (ایجوکیشن)	
ہمدا ر امتحانی کیمیا II-I	ہمدا ر امتحانی فزکس II-I
ہمدا ر امتحانی بخوبی	ہمدا ر امتحانی بائیولوجی II-I
ہمدا ر امتحانی عربی	ہمدا ر امتحانی کوس

ہمدا ر امتحانی کمپیوٹر سائنس اینڈ انٹرپرائز سسٹمز

علاوہ ازیں میٹرک کلاسز کے تمام مضامین کی معروضی کتب
اور ماڈل پیپرز بھی طلب فرمائیں۔

Price Rs. 320/-

Code: I-904



ہمدا ر کتب خانہ 14- اردو بازار لاہور

ٹیکنیکل اینڈ ایجوکیشنل پبلیشرز فون: 37312368-37358947 فیکس: 37210412
Email: hamdard.kutab@gmail.com, visit us: www.hamdardkutabhkhana.com.pk