


KNOWLEDGE, UNDERSTANDING, APPLIED
ANALYTICAL & CONCEPTUAL

فی میں مرتب کیے گئے سوالات پر مشتمل اپنی نوعیت کی بہترین کتاب

2022ء کے مطابق امتحان ط سری

سالانہ پیپر کا مکمل حل

- ٹاپک وائر انشائی طرز سوالات
- انشائی و معروضی طرز سوالات





KNOWLEDGE, UNDERSTANDING
ANALYTICAL & CONCEPTUAL

کیے گئے سوالات پر مشتمل اپنی نوعیت کی بہترین کتاب

امتحانی

ط
سری





پیش لفظ

اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اُس کی توفیق سے ہم **ہلال امتحانی کیسٹری فیہم** کو عملی صورت میں پیش کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس کتاب میں وہ تمام مواد اور ہدایات موجود ہیں جو امتحانی نقطہ نظر سے طلبہ و طالبات کے لیے ضروری ہیں۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ بازار میں ”کیسٹری“ کے خلاصہ جات موجود ہیں مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ان میں سے زیادہ تر کتب محض کاروباری نقطہ نظر سے نہایت جلد بازی سے تحریر کی گئی ہیں۔ وہ کتب جماعت نہم کے طلبہ کی امتحانی ضروریات کو (بالخصوص کنسپیکٹ انشائیہ، معروضی اور مختصر سوالات کو حل کرنے میں) پورا کرنے سے بالکل عاری ہیں۔ دور حاضر میں سخت مقابلے کے خوب سے خوب تر کی تلاش میں طلبہ کو بہترین مواد کے انتخاب اور حصول میں کافی مشکل پیش آتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ رزلٹ آنے کے بعد ہی مواد کے معیاری ہونے یا نہ ہونے کا پتہ چلتا ہے لیکن تب تک وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ **ہلال کتب خانہ** اردو بازار لاہور فروغ علم کے لیے گزشتہ نصف صدی سے زیادہ عرصہ سے سرگرم عمل ہے اور حکومت کے شانہ بشانہ تعلیمی عمل میں مثبت کردار ادا کر رہا ہے۔ چنانچہ ادارہ ہذا اس کوشش میں ہمیشہ سے مصروف رہا ہے کہ معیاری امدادی کتب نئے تعلیمی و امتحانی نظام کے مطابق مرتب کر کے مارکیٹ میں لائے تاکہ طلبہ نئے تعلیمی نظام اور امتحانی طریقہ کار کو سمجھ کر اعلیٰ نمبروں سے کامیابی حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ادارے کی شائع کردہ تمام کتب کو خاطر خواہ پذیرائی حاصل ہے۔ زیر نظر کتاب **ہلال امتحانی کیسٹری فیہم** اسی سلسلہ کی ایک نئی کتاب ہے۔

ہلال امتحانی کیسٹری فیہم کی ضروریات

- کتاب میں ہر قسم کی ذہنی استعداد رکھنے والے طلبہ و طالبات کے لیے آسان اور عام فہم مواد فراہم کیا گیا ہے۔
- کتاب محکمہ تعلیم کے نئے طرز امتحان اور جدید تکنیکس (Knowledge, Understanding, Application, Analytical &)

باب 1

مادہ کی حالتیں اور ان میں تبدیلیاں

(States of Matter and Phase Changes)

حاصلاتِ تعلیم اس باب میں آپ سیکھیں گے:

کیمسٹری میں ہم مادہ، اس کے خواص، اُس میں موجود اجزاء، مادہ کے اجزاء کے درمیان ری ایکشن اور ان سے پیدا ہونے والی توانائی کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یا پھر کیمسٹری میں ہم زمین، ہوا، سمندر اور آسمان اور ان کے درمیان ہونے والے ری ایکشنز کا مطالعہ کرتے ہیں۔ مثالوں سے کیمسٹری میں پڑھائے جانے والے مختلف مضامین کی وضاحت کریں۔ ان کی چند مثالیں درج ذیل ہیں۔

میڈی سل کیمسٹری (Medicinal Chemistry)	iv	بایو کیمسٹری (Biochemistry)	i
جیو کیمسٹری (Geochemistry)	iv	پولیمیر کیمسٹری (Polymer Chemistry)	iii
تجزیاتی کیمسٹری (Analytical Chemistry)	vi	ماحولیاتی کیمسٹری (Environmental Chemistry)	v
آرگینک کیمسٹری (Organic Chemistry)	viii	فزیکل کیمسٹری (Physical Chemistry)	vii
نیوکلیئر کیمسٹری (Nuclear Chemistry)	x	ان آرگینک کیمسٹری (Inorganic Chemistry)	ix
		فلکی کیمسٹری (Astro Chemistry)	xi

مادہ کی تعریف کریں، اس کے خواص، اس کے اجزاء، اس کے درمیان ری ایکشن اور ان سے پیدا ہونے والی توانائی کا مطالعہ کریں۔

6- **بائیو کیمسٹری (Biochemistry)** : اس مضمون میں کیمیائی عمل کے نتیجے میں زندگی کی روانی کو سمجھا جاتا ہے۔ جانداروں میں موجود کیمیکل کمپاؤنڈز اور ان کی وجہ سے وجود میں آنے والے اہم مظاہر جو زندگی کو رواں دواں رکھتے ہیں اس شعبہ کا اہم موضوع ہیں۔ بائیو کیمسٹری ہمیں پروٹینز (Proteins)، کاربوہائیڈریٹس (Carbohydrates)، لیپڈز (Lipids) اور نیوکلک ایسڈز (Nucleic Acids) جیسے مالیکیولز کی ساخت اور ان کے عمل کرنے کے طریقے کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے۔

7- **نیوکلیر کیمسٹری (Nuclear Chemistry)** : نیوکلیر کیمسٹری میں ہم ایٹم کے نیوکلئس (Nucleus) میں ہونے والے ری ایکشنز کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ان ری ایکشنز میں ریڈیو ایکٹیوٹی (Radioactivity) نیوکلئس میں ہونے والے دوسرے مظاہر (Nuclear Processes) اور ایٹم کے نیوکلئس کی تبدیلی جیسے نیوکلیر ری ایکشنز شامل ہیں۔

8- **پولیمیر کیمسٹری (Polymer Chemistry)** : چھوٹے مالیکیولز کو قطار اندر قطار جوڑ کر بڑے سائز کے مالیکیولز بنائے جاتے ہیں جن کو پولیمر کہتے ہیں۔ پولیمر کیمسٹری میں ہم ان بڑے مالیکیولز کے خواص، ان کی ساخت اور ان کو بنانے کے طریقے سیکھتے ہیں۔ جانداروں کی ساخت میں موجود بہت سے مالیکیولز مثلاً پروٹینز، سیلولوز (Cellulose) اور نیوکلک ایسڈز سب پولیمرز ہی ہیں۔

9- **جیو کیمسٹری (Geochemistry)** : کیمسٹری کی اس برانچ میں ہم زمین کے اجزائے ترکیبی، اس کے ماخذ (Sources) اور اس میں موجود معدنیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جیو کیمیکل مپنگ (Geochemical Mapping) سے زمین کے ایسے نقشے بنائے جاتے ہیں جن کے ذریعے نہ صرف معدنیات کی تلاش میں مدد ملتی ہے بلکہ ان کے ذریعے ماحول کی نگرانی، جنگلات کے بارے میں معلومات اور میڈیکل ریسرچ میں بھی سہولت حاصل ہوتی ہے۔

10- **میڈیکل کیمسٹری (Medicinal Chemistry)** : اس برانچ میں کیمیادان انسانی فلاح کے لیے استعمال ہونے والی ادویات کے بارے میں نہ صرف منصوبہ بندی کرتے ہیں بلکہ ان کو عملی طور پر تیار بھی کرتے ہیں۔ اس علم میں ادویات کی دریافت، ان کا استعمال اور انسانی جسم میں

سوال 10: گرافین پر نوٹ لکھیں۔

جواب: گرافین دو جہتی کرشل (Two dimensional crystal) کی ایک مثال ہے جس میں کاربن ایٹمز ایک 2D میں اس طرح ترتیب سے جڑے ہوتے ہیں کہ ہیکزاگونل شکل بن جاتی ہے۔ گرافین ایک سخت، چکدار اور ہلکا میٹریل ہے جس کی الیکٹریکل مزاحمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔

1.3 ایلیمنٹ، کمپاؤنڈ اور میکسر (Element, Compound and Mixture)

1.4 اشیاء کی ایلیوٹروپک فارمز (Allotropic Forms of Substances)

سوال 11: ایکزوسٹینس سے کیا مراد ہے؟ مثالیں دیں۔

جواب: مادہ کی وہ حالتیں جو اس دنیا میں نہیں پائی جاتیں ان کو ایکزوسٹینس (Exotic States) پکارا جاتا ہے۔ ڈارک میٹر (Dark Matter)، بوس آئن سٹائن منجمد حالت (Bose Einstein Condensate)، نیوکلیر میٹر (Nuclear Matter) اور کو اٹم سپن لیوڈ (Quantum Spin Liquid) وغیرہ ان حالتوں کی چند مثالیں ہیں۔

سوال 12: ایلیمنٹ پر نوٹ لکھیں۔

جواب: ایلیمنٹ: ایلیمنٹ مادہ کی سب سے سادہ شکل ہے۔ یہ ایک ایسی خالص شے ہے جو صرف ایک ہی قسم کے ایٹمز پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس کو عام کیمیکل ری ایکشنز کے ذریعے سادہ اشیاء میں نہیں تبدیل کیا جاسکتا۔

ایلیمنٹس کی اقسام: ایلیمنٹس کی مندرجہ ذیل چار اقسام ہیں:

- 1- میٹلز
- 2- نان میٹلز
- 3- میٹالائڈز
- 4- نوبل گیسز

ایلیمنٹس کی دیگر اقسام: ایلیمنٹس کی دیگر اقسام ہیں:

1.5

ایلیمنٹس، کمپاؤنڈز اور مکسچرز کے درمیان فرق
(Differences between Elements, Compounds and Mixtures)

سوال 17: ایلیمنٹس، کمپاؤنڈز اور مکسچرز کے درمیان فرق کریں۔

جواب: ایلیمنٹس، کمپاؤنڈز اور مکسچرز کے درمیان فرق

مکسچر	کمپاؤنڈ	ایلیمنٹ
یہ مادہ کی سب سے زیادہ سادہ شکل ہے۔ یہ ایک یا زیادہ مادوں کی ایک ایسی خالص شے ہے جس میں ایک ہی قسم کے ایٹمز کے کیمیائی ملاپ سے وجود میں آتا ہے۔	یہ بھی ایک خالص شے ہے جو دو یا زیادہ مختلف ایٹمز کے کیمیائی ملاپ سے وجود میں آتا ہے۔	یہ مادہ کی سب سے زیادہ سادہ شکل ہے۔ یہ ایک یا زیادہ مادوں کی ایک ایسی خالص شے ہے جس میں ایک ہی قسم کے ایٹمز کے کیمیائی ملاپ سے وجود میں آتا ہے۔
مکسچر میں موجود مختلف اشیاء کی شناخت اور خواص میں کوئی تبدیلی وقوع پذیر نہیں ہوتی۔	ایک کمپاؤنڈ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس میں موجود مختلف ایٹمز کے ماسز کی نسبت مستقل ہو۔ مثلاً پانی میں ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ماسز کی نسبت 1:8 ہے اور یہ نسبت ہمیشہ یہی رہتی ہے۔	کسی ایلیمنٹ کو عام کیمیکل ری ایکشن سے مزید تقسیم نہیں کیا جاسکتا۔
مکسچر کی دو اقسام ہیں۔ ہومو جنیئس مکسچر اور غیر	ہمارے لیے یہ ممکن ہے کہ کسی کمپاؤنڈ میں موجود	کیسی ایلیمنٹس میں موجود مالیکیولز آزادانہ گھومتے

سوال 20: ان سچے ریڈ سلوشن کیسے بنتا ہے؟

جواب: ان سچے ریڈ سلوشن: ایسا سلوشن جو کسی خاص درجہ حرارت پر سولیوٹ کی مزید مقدار کو حل کر سکے ان سچے ریڈ سلوشن کہلاتا ہے۔
ان سچے ریڈ سلوشن بنانے کا طریقہ: ایک بیکر میں 100 گرام پانی ڈالیں اور اس میں پانچ گرام چینی لے کر چمچ سے ہلائیں۔ چینی پانی میں حل ہو جائے گی۔ اب مزید پانچ گرام چینی ڈال کر ہلائیں۔ یہ چینی بھی پانی میں حل ہو جائے گی اس سلوشن کو ان سچے ریڈ سلوشن کہتے ہیں۔
سوال 21: سچے ریڈ سلوشن سے کیا مراد ہے؟ وضاحت کریں۔

جواب: سچے ریڈ سلوشن: سچے ریڈ سلوشن ایک ایسا سلوشن ہے جو ایک خاص درجہ حرارت پر سالوینیٹی کی مخصوص مقدار میں مزید سولیوٹ حل نہ کر سکے۔
سچے ریڈ سلوشن بنانے کا طریقہ: ایک بیکر میں تقریباً 100 گرام پانی لیں اور اس میں 5 گرام چینی لے کر چمچ سے ہلائیں۔ چینی پانی میں حل ہو جائے گی۔ اب مزید 5 گرام چینی پانی میں ڈال کر ہلائیں۔ یہ چینی بھی پانی میں حل ہو جائے گی۔ اب چینی کے سلوشن میں اور چینی ڈالیں اور ہلائیں۔ جیسے جیسے چینی کی مقدار سلوشن میں بڑھے گی اس کا حل ہونا مشکل ہوتا جائے گا حتیٰ کہ ایک مرحلہ ایسا آئے گا جب سلوشن چینی کو حل نہیں کر سکے گا اور جو چینی اس میں ڈالی جائے گی وہ نیچے نہ میں بیٹھنا شروع ہو جائے گی اس صورت حال میں جو سلوشن بنے گا اس کو سچے ریڈ سلوشن کہتے ہیں۔

سوال 22: روم ٹمبریچر پر سوڈیم کلورائیڈ کی سولیوٹیٹی چینی سے زیادہ کیوں ہے؟

جواب: ایک خاص سالوینیٹی میں مختلف سولیوٹس کی سولیوٹیٹی (Solubility) مختلف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر چینی اور نمک کے سچے ریڈ سلوشنز بنائیں جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سوڈیم کلورائیڈ کے 36 گرام، 100 گرام پانی میں 20°C پر حل ہو کر سچے ریڈ سلوشن بناتے ہیں جبکہ چینی کے 203.9 گرام، 100 گرام پانی میں 20°C پر حل ہو کر اس کا سچے ریڈ سلوشن بناتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں پانی میں چینی کی سولیوٹیٹی 20°C پر سوڈیم کلورائیڈ سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چینی کے مالیکیولز سوڈیم کلورائیڈ کے آئنز سے بڑے ہیں اس لیے پانی کے بہت سے مالیکیولز چینی کے ایک مالیکیول کے گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی سولیوٹیٹی بڑھ جاتی ہے۔

سوال 3: پانی میں چینی اور سوڈیم کلورائیڈ کی سولوشن کا موازنہ کریں۔

جواب: روم ٹمپرچر چینی کی سولوشن سوڈیم کلورائیڈ کی سولوشن سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چینی کے مالیکیولز سوڈیم کلورائیڈ کے آئنز سے بڑے ہیں اس لیے پانی کے بہت سے مالیکیولز چینی کے ایک مالیکیول کے گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی سولوشن بڑھ جاتی ہے۔

معروضی سوالات

محکمہ تعلیم کی نئی امتحانی تکنیکس (Knowledge, Understanding, Application, Analytical & Conceptual) کی روشنی میں مرتب کیے گئے تشریحاتی سوالات

کیمسٹری کیا ہے؟

1.1

مادہ کی مختلف حالتیں

1.2

ایلیمنٹ، کمپاؤنڈ اور کمپوٹ

1.3

درست جواب کا انتخاب کریں۔



سائنس کی وہ شاخ جو مادے کی ترکیب اور خصوصیات کے مطالعہ سے متعلق ہے:



(D) کیمسٹری

(C) جیولوجی

(B) فزکس

(A) بائیولوجی

کیمسٹری کی وہ شاخ جو مادے کا اٹامک یا مالیکیولر لیول پر مطالعہ کرتی ہے، کہلاتی ہے:



23- ایسا سلوین جس میں کسی خاص ٹمپرچر پر سولیوٹ کی زیادہ سے زیادہ مقدار حل ہو کہلاتا ہے:

(A) سپرچو ریڈ سلوشن (B) سپرچو ریڈ سلوشن (C) سولیوینٹ (D) آن سپرچو ریڈ سلوشن

24- ایسا سلوشن جس میں کسی خاص درجہ حرارت پر سولیوینٹ کی دی گئی مقدار میں مزید سولیوٹ حل کرنے کی صلاحیت نہ ہو کہلاتا ہے:

(A) سپرچو ریڈ سلوشن (B) آن سپرچو ریڈ سلوشن (C) سپرچو ریڈ سلوشن (D) ان میں سے کوئی نہیں

25- کسی خاص درجہ حرارت پر 100 گرام سولیوینٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے درکار سولیوٹ کی مقدار کہلاتی ہے:

(A) سپرچو ریڈ سلوشن (B) سولیوینٹ (C) سپینشن (D) آن سپرچو ریڈ سلوشن

26- ٹمپرچر میں اضافے کی وجہ سے کس کمپاؤنڈ کی سولیوینٹ کم ہو جاتی ہے؟

(A) KNO_3 (B) $AgNO_3$ (C) KCl (D) Li_2CO_3

27- ٹمپرچر میں اضافے کی وجہ سے کس کمپاؤنڈ کی سولیوینٹ بڑھ جاتی ہے؟

(A) $AgNO_3$ (B) Li_2CO_3 (C) $CaCrO_4$ (D) کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس

28- شارچ سلوشن مثال ہے:

(A) کولائیڈل سلوشن (B) سپینشن (C) ٹروسلوشن (D) ان میں سے کسی کی نہیں

جوابات

(D) -10	(C) -9	(B) -8	(A) -7	(B) -6	(A) -5	(A) -4	(B) -3	(C) -2	(D) -1
(A) -20	(C) -19	(C) -18	(A) -17	(A) -16	(C) -15	(A) -14	(B) -13	(C) -12	(A) -11

4- ایلیمنٹ سے کیا مراد ہے؟ دو مثالیں دیں۔

جواب: ایلیمنٹ: ایلیمنٹ مادے کی سادہ ترین شکل ہے۔ یہ ایک ہی قسم کے ایٹمز پر مشتمل ہوتی ہے۔ اسے کیمیائی طریقوں سے سادہ ترین شکل میں تبدیل نہیں کیا جاسکتا۔

مثالیں: آئرن، آکسیجن وغیرہ۔

5- کمپاؤنڈ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ دو مثالیں دیں۔

جواب: کمپاؤنڈ: جب دو یا دو سے زیادہ ایلیمنٹس ایک متعین نسبت میں کیمیائی طور پر ملتے ہیں تو کمپاؤنڈ بنتا ہے۔

مثالیں: پانی (H_2O)، کاربن ڈائی آکسائیڈ (CO_2)۔

6- تین کیسی ایلیمنٹس کے نام لکھیں۔

جواب: کیسی ایلیمنٹس: آکسیجن، نائٹروجن، کلورین وغیرہ۔

7- ہومو جینیس کمپور کی تعریف لکھیں۔

جواب: ہومو جینیس کمپور: وہ کمپورز جو بڑے پیمانے پر یکساں کمپوزیشن رکھتے ہومو جینیس کمپور کہلاتے ہیں۔ جیسے ہوا۔

8- ہیٹرو جینیس کمپور سے کیا مراد ہے؟

جواب: ہیٹرو جینیس کمپور: وہ کمپورز جو بڑے پیمانے پر یکساں کمپوزیشن نہیں رکھتے ہیٹرو جینیس کمپور کہلاتے ہیں۔ جیسے چٹانیں۔

9- تین کمپاؤنڈز کے نام لکھیں۔

میں کیا جاسکتا ہے۔

5- لیکوئڈ کرشل میں کرشل فوائد لکھیں۔

جواب: لیکوئڈ کرشل کے کرشل فوائد: لیکوئڈ کرشل ڈسپلے آلات میں استعمال ہوتے ہیں جن میں کمپیوٹر، مانیٹرز، گھڑیاں اور نیوکلیشن سسٹم شامل ہیں۔

6- مادے کی ایکوولیشن کوئی ہیں؟ مثالیں دیں۔

جواب: مادے کی ایکوولیشن: مادے کی وہ حالتیں جن کا عام طور پر سامنا نہیں ہوتا ایکوولیشن کہلاتی ہیں۔ مثلاً: تاریک مادہ، باس آئن اشائن کنڈینسٹ، نیوکلئیر مادہ، کوانٹم اسپن مانع۔

7- لیب میں سائنسدانوں نے کونسا پہلا ایلیمنٹ تخلیق کیا؟

جواب: ٹیکنیٹیم پہلا ایلیمنٹ تھا جو سائنسدانوں نے لیب میں تخلیق کیا۔

8- سلفر کی دو کرسلائن ایلوٹراپک فارمز کے نام لکھیں۔

جواب: سلفر دو کرسلائن ایلوٹراپک فارمز میں پایا جاتا ہے: (i) مونوکلینک سلفر (ii) رومبک سلفر

9- کولائیڈل سلوشنز کی کوئی سی دو مثالیں دیں۔

جواب: شارچ سلوشن اور انڈے کی سفیدی کولائیڈل سلوشنز کی عام مثالیں ہیں۔

10- دو کمپاؤنڈز کے نام لکھیں جن کی سولوبیلیٹی ٹمپریچر کے زیادہ ہونے سے کم ہو جاتی ہے؟

جواب: لیتھیم کاربونیٹ (Li_2CO_3) اور کیلشیم کاربونیٹ (CaCrO_4) کمپاؤنڈز کی سولوبیلیٹی ٹمپریچر زیادہ کرنے سے کم ہو جاتی ہے۔

(ii) شاخوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان شاخوں میں سائنسدانوں کے مطالعہ کے لیے الگ الگ شعبے ہیں۔
کیمیکل ری ایکشنز ایٹم کے نیوکلیس کے بارے میں وجود الیکٹرونز کی وجہ سے وقوع پذیر ہوتے ہیں اور نیوکلیس کے اندر وقوع پذیر ہوتے ہیں
کیمسٹری کی کن شاخوں میں ان ری ایکشنز کا مطالعہ کیا جاتا ہے؟
جواب: فزیکل کیمسٹری اور نیوکلیئر کیمسٹری میں ان اقسام کے ری ایکشنز ہوتے ہیں۔

(iii) اینالٹیکل کیمسٹری میں کس قسم کے مسائل پر بحث کی جاتی ہے؟
جواب: اینالٹیکل کیمسٹری میں مسائل کا حل: اس میں مادی چیزوں کی علیحدگی، شناخت اور ارتکاز کا تعین شامل ہے۔
(iv) گریفائٹ اور گریفلن (Graphene) دونوں میں کاربن ایٹمز سے بننے والے ہیکساگونل دائرے موجود ہیں ان دونوں میں فرق بتائیں۔

گریفین	گریفائٹ
گریفین ہیکساگونل ساخت میں کاربن ایٹمز کی ایک تہہ پر مشتمل ہے۔ یہ گریفائٹ کے مقابلے میں زیادہ مضبوط اور وزن میں ہلکی ساخت ہے۔	گریفائٹ کاربن ایٹمز کی ہیکساگونل رنگ سے بنی ایک تہہ دار ساخت ہے۔ یہ تہیں کمزور بانڈز سے جڑی ہوتی ہیں۔ جو گریفائٹ کو کمزور اور پھسلن والا بناتی ہیں۔

(v) سپرکریٹیکل فلیوڈز کی اہمیت واضح کریں۔
جواب: سپرکریٹیکل فلوئڈ اہم ہیں کیونکہ کیمیکل ری ایکشنز، جو کنوینشنل سولوینٹ میں نہیں کیے جاسکتے ممکنہ طور پر سپرکریٹیکل کاربن ڈائی آکسائیڈ میں کیے جاسکتے ہیں۔

(vi) سورج میں مادہ کس حالت میں پایا جاتا ہے؟

انوائرمینٹل کیمسٹری

(د) ایکوسسٹم (Ecosystem)

ان آرگینک کیمسٹری

(ذ) آتش بازی کے دوران وقوع پذیر ہونے والے کیمیکل ری ایکشنز

(ر) الرادائیٹ پیکٹرومیٹر (Ultraviolet Spectrometer) کی

مدد سے ایک مخصوص ویولینتھ کی روشنی جذب ہونے کی پیمائش کرتا۔ اینالٹیکل کیمسٹری

(iii) اشیاء کی ایلوٹراپی سے کیا مراد ہے؟ کاربن اور سلفر کی ایلوٹراپک فارمز کی وضاحت کریں؟ کوسٹل اور ڈائنامکس میں کیا فرق ہے؟

جواب: ایک ایٹیمسٹ کی دو یا دو سے زیادہ فارمز جن کی کیمیائی خصوصیات ایک جیسی ہوں لیکن فزیکل خصوصیات مختلف ہوں ایلوٹراپس یا ایلوٹراپک فارمز کہلاتی ہیں اور اس عمل کو ایلوٹراپی کہتے ہیں۔

-ii گریفائٹ

-i ڈائنامکس کاربن کی ایلوٹراپک فارمز:

-i مونوکلینک سلفر

-ii رومبک سلفر سلفر کی ایلوٹراپک فارمز:

(iii) سپر کرٹیکل فلیوڈز کیا ہیں؟ عام لیکوڈ سے ان کے فرق کو واضح کریں۔

جواب: سوال نمبر 9 دیکھیے۔

(iv) کسی سولیوٹ کی سولوبیلیٹی کی تعریف کریں۔ درجہ حرارت بڑھنے سے مختلف اشیاء کی سولوبیلیٹی پر کیا فرق پڑتا ہے؟

جواب: سوال نمبر 23 دیکھیے۔

(v) گیس اور مائع کے مالیکیولز کتنی اقسام کی حرکت کرتے ہیں؟

جواب: گیسز: مالیکیولز تیز رفتار سے آزادانہ طور پر تمام سمتوں میں حرکت کرتے ہیں۔ (بے ترتیب موشن)

الکٹرون گیس: کمیتا بلطہ آتہ حرکت کرتے ہیں اور ان کے درمیان کڑی جاذبہ قوت ہوتی ہے۔ (بائے)

انشائی طرز سوالات



محکمہ تعلیم کی نئی امتحانی تکنیکس (Knowledge, Understanding, Application, Analytical & Conceptual) کی روشنی میں مرتب کیے گئے انشائی طرز سوالات

سوال 1: ایلیمینٹس ایک دوسرے سے مختلف کیوں ہیں؟

جواب: ایلیمینٹ: ایلیمینٹ مادہ کی سب سے سادہ شکل ہے۔ یہ ایک خالص شے ہے جس میں ایک ہی قسم کے ایٹمز موجود ہوتے ہیں۔

وجہ: ایلیمینٹس ایک دوسرے سے مختلف دکھائی دیتے ہیں کیونکہ ایلیمینٹس کے خواص میں یہ فرق ان میں موجود ایٹمز کے خواص کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔

مثالیں: سلفر گولڈ سے مختلف دکھائی دیتا ہے اس طرح گولڈ اور برومین بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ آئرن ایک بہت بھاری میٹل ہے جبکہ ایلو میسیم اور زنک ہلکی میٹلز ہیں مثلاً سلفر اور کاربن چمکدار دکھائی نہیں دیتی۔



مختلف ایلیمینٹس مختلف دکھائی دیتے ہیں۔

سوال 6: نیوٹرون کیسے دریافت ہوئے؟ وضاحت کریں۔

جواب: نیوٹرون کی دریافت (Discovery of Neutron) : 1933ء میں ایٹم میں موجود ایک اور پارٹیکل نیوٹرون دریافت کیا گیا۔ اس پر کسی قسم کا کوئی چارج نہیں تھا۔ نیوٹرون کا ماس تقریباً پروٹان کے ماس کے برابر ہے۔ یہ تین پارٹیکلز الیکٹرون، پروٹان اور نیوٹرون ایٹم میں موجود بنیادی پارٹیکلز تصور کیے جاتے ہیں۔ اور ہر قسم کے ایٹم میں یہی پارٹیکلز موجود ہوتے ہیں (ماسوائے ہائیڈروجن ایٹم جس میں نیوٹران نہیں ہوتا) قطع نظر اس بات کہ ان ایٹمز کے خواص کتنے بھی مختلف کیوں نہ ہوں۔ تاہم ہر ایٹم کے ایٹم میں ان ذرات کی تعداد دوسرے ایٹم کے ذرات سے مختلف ہوتی ہے۔

سوال 7: لارڈ رورفورڈ نے نیوکلئیس کیسے دریافت کیا؟ وضاحت کریں۔

جواب: 1911ء میں لارڈ رورفورڈ نے نیوکلئیس دریافت کیا۔

لارڈ رورفورڈ کا تجربہ: رورفورڈ نے ایک بہت ہی پتلی سونے کی جھلی بنائی اور اس پر ایک خاص قسم کے پارٹیکلز کی بارش برسائی۔ اس تجربہ کے نتائج سے اس نے اخذ کیا کہ ایٹم کے دو حصے ہیں۔ ایک بہت ہی چھوٹا مرکزی حصہ ہے۔ جس کو اس نے نیوکلئیس کا نام دیا اور دوسرا اس نیوکلئیس کا بیرونی حصہ ہے جسے ایکسٹرانیوکلیر پورٹن (Extra nuclear Portion) کہتے ہیں۔ رورفورڈ کے تجربہ سے یہ نتیجہ بھی نکالا گیا کہ ایٹم کا تقریباً سارا ماس اسی نیوکلئیس کی وجہ سے ہے کیونکہ دونوں بھاری ذرات یعنی پروٹان اور نیوٹرون اسی نیوکلئیس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ جہاں ان کے درمیان ایک مضبوط کشش موجود ہے۔

سوال 8: بوہر کا ایٹمی ماڈل پر نوٹ لکھیں۔

جواب: 1913ء میں نیلز بوہر (Neils Bohr) نے سب سے پہلے ہائیڈروجن کے ایٹم کا ماڈل پیش کیا۔ اس ماڈل کے مطابق الیکٹرون ایٹم کے

جواب: (i) $^{195}_{78}\text{Pt}$ (ii) $^{55}_{25}\text{Mn}$ (iii) $^{127}_{53}\text{I}$

78 = الیکٹرونز کی تعداد

25 = الیکٹرونز کی تعداد

53 = الیکٹرونز کی تعداد

78 = پروٹونز کی تعداد

25 = پروٹونز کی تعداد

53 = پروٹونز کی تعداد

117 = 195 - 78 = نیوٹرونز کی تعداد

30 = 55 - 25 = نیوٹرونز کی تعداد

74 = 127 - 53 = نیوٹرونز کی تعداد

آکسوٹوپس اور ان کے ماسز (Isotopes and their Masses)

2/3


Not

سوال 13: آکسوٹوپس اور ان کے ماسز پر نوٹ لکھیں نیز کاربن اور ہائیڈروجن کے آکسوٹوپس لکھیں۔

جواب: آکسوٹوپس: ایک ایلیمنٹ کے تمام ایٹمز کے اٹامک نمبر کا ایک جیسا ہونا ضروری ہے لیکن ان کے ماس نمبر میں فرق ہو سکتا ہے اگر ان میں نیوٹرونز کی تعداد مختلف ہے۔ ایک ہی ایلیمنٹ کے ایٹمز کے نیوکلیائی میں اگر نیوٹرونز مختلف تعداد میں موجود ہوں تو ان کو آکسوٹوپس کہتے ہیں۔

کاربن کے آکسوٹوپس: کاربن ایلیمنٹ میں تین آکسوٹوپس پائے جاتے ہیں جن کے نیوکلیائی میں نیوٹرونز کی تعداد بالترتیب 6، 7 اور 8 ہوتی ہے۔ ان آکسوٹوپس کو $^{14}_6\text{C}$ ، $^{13}_6\text{C}$ ، $^{12}_6\text{C}$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ہائیڈروجن کے آکسوٹوپس: ہائیڈروجن کے بھی تین آکسوٹوپس ہیں جن کو علیحدہ نام دیے گئے ہیں۔ ہائیڈروجن یا پروٹیم ^1_1H ، ڈیوٹیریم ^2_1H اور ٹرائیم ^3_1H ۔ ہائیڈروجن واحد ایسا ایٹم ہے جس میں نیوٹرون نہیں ہوتا۔ چونکہ کسی ایلیمنٹ کے کیمیکل خواص کا انحصار اس ایلیمنٹ کے ایٹمز میں موجود الیکٹرونز کی تعداد پر ہوتا ہے اس لیے آکسوٹوپس کے کیمیکل خواص تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں البتہ ان کے فزیکل خواص میں خاصا فرق پایا جاتا ہے۔ ڈیوٹیریم کا ماس ہائیڈروجن ^1_1H سے دو گنا جبکہ ٹرائیم ^3_1H کا ماس اس سے تین گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کاربن کے تین آکسوٹوپس کے ماسز بھی مختلف ہوتے ہیں۔

کے ساتھ نکراتی ہے کہ وہ ایٹم سے باہر نکل جاتا ہے۔ اگر سوڈیم کے ایٹم سے ان ریڈیشن کو نکرایا جائے تو اس میں سے الیکٹرون خارج ہو جاتا ہے اور نتیجتاً سوڈیم ایٹم، سوڈیم کیٹائن (Na⁺) میں تبدیل ہو جاتا ہے۔



Long

ریلیو اٹامک ماس (Relative Atomic Mass)

2.4

سوال 17: ریلیو اٹامک ماس کی وضاحت کریں۔

جواب: ریلیو اٹامک ماس: 1961ء میں کیمیادانوں نے ماس کے ایک نئے پیمانے کو اختیار کیا جس کی مدد سے ہم ایٹمز کے تقابلی ماسز معلوم کر سکتے ہیں۔

اس سکیل کی رو سے کاربن کے ہلکے آئسوٹوپ C-12 کو معیار مقرر کیا گیا ہے اور اس ایٹم کے ماس کے بارہویں حصہ کو ماس کی اکائی (Unit Mass) قرار دیا گیا ہے۔ اس سکیل پر C-12 کے ایک ایٹم کا ماس ٹھیک 12 ہے اور باقی ایٹمز کے ماسز اس سے مقابلہ کے بعد معلوم کیے جاتے ہیں۔ اس سکیل کی مدد سے ریلیو اٹامک ماس کی تعریف کچھ اس طرح کی جاتی ہے:

”کسی ایلیمنٹ کے ایٹم کا ریلیو ماس اس کا وہ ماس ہوگا جس کو کاربن C-12 کے ماس سے مقابلے کے بعد نکالا جائے گا۔ ایلیمنٹس کے ریلیو

اٹامک ماسز اٹامک ماس یونٹس (Atomic Mass Units) میں ظاہر کیے جاتے ہیں جو کہ C-12 کے ماس کے 1/12 حصہ کے برابر ہے۔“

تاہم کلوگرام سکیل پر اس کی قیمت درج ذیل ہے۔

$$1 \text{ amu} = 1.67377 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

میٹرل کی عمر معلوم کرتے ہیں۔ اس طریقہ کار کے تحت (کسی مردہ پودے یا مردہ جانور مثلاً لکڑی کا ٹکڑا یا ہڈی میں ^{14}C کی مقدار معلوم کی جاتی ہے۔ اس ^{14}C کی مقدار کی مدد سے یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ وہ پودا یا جانور کب مرا۔ جتنا بھی جانور یا پودا پرانا ہوگا اس میں ^{14}C کی مقدار اتنی کی کم ہوگی۔

سوال 2: ریڈیو ایکٹیو آکسوٹوپس کی میڈیکل ویلیو لکھیں۔

جواب: ریڈیو ایکٹیو آکسوٹوپس کو میڈیکل امیجنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر بیماری کی تشخیص کے لیے ریڈیو ایکٹیو آکسوٹوپس کی تھوڑی سی مقدار مریض کے جسم میں داخل کرتے ہیں۔ جسم میں داخل کیے گئے مائع ریڈیو ایکٹیو آکسوٹوپس کا جائزہ ایک کیمبرہ کی مدد سے لیا جاتا ہے جس سے بیماری کی تشخیص میں مدد ملتی ہے۔ ٹیکنیشیم-99m سے انسانی اعضاء مثلاً دماغ اور پھیپھڑوں کی تصاویر لی جاتی ہیں جن سے تشخیص ممکن ہوتی ہے۔ ریڈیو ایکٹیو آکسوٹوپس کو کینسر اور تھائی رائیڈ گلیٹڈ سے متعلق بیماریوں کی تشخیص اور ان کے علاج کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔

سوال 3: ایٹم کی ساخت کیسے وجود میں آئی؟

جواب: ایٹم کی ساخت (Structure of Atom): ایٹم کی موجودگی کا خیال سب سے پہلے یونانی فلاسفر ڈیموکریٹس (Democritus) کے ذہن میں آیا جب اس نے یہ بتایا کہ ہر قسم کا مادہ بہت ہی چھوٹے پارٹیکلز سے مل کر بنا ہے ان پارٹیکلز کو اس نے ایٹمز کا نام دیا کیونکہ ان کو مزید تقسیم نہیں کیا جاسکتا۔ 1800 عیسوی کے آس پاس ایک انگریز کیمیا دان جان ڈالٹن (John Dalton) نے کپاؤنڈز پر کیے جانے والے تجربات سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ واقعہً مادہ میں ایٹمز موجود ہیں۔

انیسویں صدی کی آخری دہائی میں سائنس دانوں کا ایک گروپ اس بات کی کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح گیس کا پریشر کم کر کے اس میں سے بجلی گزاری جائے۔ ان تجربات کو ڈسچارج ٹیوب تجربات (Discharge Tube Experiments) کا نام دیا گیا۔ ان تجربات کے دوران سائنس دانوں نے یہ محسوس کیا کہ ایٹمز مادہ کے سب سے چھوٹے پارٹیکلز نہیں ہیں بلکہ کچھ پارٹیکلز ان سے بھی چھوٹے ہیں۔ ان تجربات

18- دوسرے ٹیل میں کتنے الیکٹرانز ہوتے ہیں؟

(D) 32

(C) 18

(B) 8

(A) 2

○ جوابات ○

(A) -10	(C) -9	(A) -8	(B) -7	(C) -6	(A) -5	(B) -4	(A) -3	(C) -2	(A) -1
		(B) -18	(A) -17	(A) -16	(C) -15	(B) -14	(D) -13	(C) -12	(B) -11

کثیر الانتخابی کنسیپچوئل (Conceptual) سوالات

□ درست جواب کا انتخاب کریں۔

1- ایٹم میں پاز نیوچارج شدہ پارٹیکلز کی موجودگی کا پہلی بار مشاہدہ کیا:

(A) بوہرنے (B) گولڈسٹائن نے (C) ردرفورڈ نے (D) چیڈوک نے

2- مندرجہ ذیل میں سے کون سا چمکدار ایلیمنٹ ہے:

(A) سلفر (B) ایلومینیم (C) آکسیجن (D) a اور c دونوں

3- پروٹون کا ماس ایک الیکٹرون سے کتنے گنا زیادہ ہوتا ہے:

(A) 1836 (B) 1736 (C) 1636 (D) 1336

4- مندرجہ ذیل میں سے کون سا نیوٹرل مارٹکل ہے؟

3- الیکٹرونک کنفکریشن سے کیا مراد ہے؟

جواب: الیکٹرونک کنفکریشن: نیوکلئیس کے گرد مختلف شیلز اور سب شیلز میں ان کی بڑھتی ہوئی انرجی کے مطابق الیکٹرونز کی تقسیم کو الیکٹرونک کنفکریشن کہتے ہیں۔

4- الیکٹرونک کنفکریشن کا فارمولا لکھیں۔

جواب: الیکٹرونک کنفکریشن کا فارمولا $2n^2 =$ جبکہ n سے مراد شیل کا نمبر ہے۔

5- $2n^2$ فارمولا کے مطابق پہلے شیل میں کتنے الیکٹرونز آ سکتے ہیں؟

جواب: پہلے شیل میں الیکٹرونز کی تعداد $2n^2 =$

$$2(1)^2 = 2$$

ایٹامک ماس اور ماس نمبر	2.2
آکسائیڈیشن اور ان کے ماس	2.3

6- پروٹون نمبر کیا ہے؟

جواب: ایک ایٹم کے نیوکلئیس میں موجود پروٹونز کی تعداد کو پروٹون نمبر کہتے ہیں۔ مثلاً: کاربن کا پروٹون نمبر 6 ہے۔

7- نیوکلئون نمبر کیا ہے؟

مخصوص آر بٹ میں گھومتا ہے اس کی انرجی بھی مخصوص ہوتی ہے۔ اگر الیکٹرون نوکلیس سے دور کسی آر بٹ میں موجود ہو تو اس کی انرجی بھی زیادہ ہوتی ہے۔

- 7- کسی ایلیمینٹ کے ایٹم میں پروٹونز کی ک تعداد کو اس ایلیمینٹ کا ایٹامک نمبر کہتے ہیں۔
- 8- کسی ایلیمینٹ کے ایٹم میں پروٹونز اور نیوٹرونز کی کل تعداد کو اس ایلیمینٹ کا ماس نمبر کہتے ہیں۔
- 9- ایک ایلیمینٹ کے ایسے ایٹمز جن میں پروٹونز کی تعداد ایک جیسی ہو لیکن نیوٹرونز کی تعداد مختلف ہو ان کو آئسوٹوپس کہتے ہیں۔
- 10- ایک ایلیمینٹ کے مختلف آئسوٹوپس کے کیمیائی خواص ایک جیسے ہوتے ہیں جب کہ ان کے طبعی خواص میں فرق ہوتا ہے۔
- 11- کسی ایلیمینٹ کے آئسوٹوپس سسٹیمبل بھی ہوتے ہیں اور ریڈیو ایکٹیو بھی۔ ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپس کو بیماریوں کی تشخیص اور علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
- 12- ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپس کے نیوکلیائی آن سسٹیمبل ہونے کی وجہ سے ریڈییشن خارج کرتے ہیں۔
- 13- ایلیمینٹ کا ریڈیو ایٹامک ماس اس میں موجود آئسوٹوپس کے ریڈیو آئسوٹوپک ماسز اور ان کی آئسوٹوپک مقداروں سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔

حل مشقی سوالات

- 1- صحیح جواب پر ٹک (✓) کریں۔
 - (i) ایلیمینٹس کے تیسرے شیل میں زیادہ سے زیادہ کتنے الیکٹرونز موجود ہو سکتے ہیں؟

(الف) 8	(ب) 18	(ج) 10	(د) 32
---------	--------	--------	--------
 - (ii) ڈیپارج ٹیوب پر تجربات سے کیا معلومات حاصل کی گئیں؟

(ii) ڈسچارج ٹیوب کے اندر موجود گیس کے پریشر کو کم کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟

جواب: ڈسچارج ٹیوب میں گیس کا پریشر کم کرنا ضروری ہے کیونکہ عام پریشر پر کرنٹ گیس میں سے نہیں گزر سکتا۔

(iii) الیکٹرون کے بارے ہمارے ہمارے خیالات کیا ہیں اور وقت کے ساتھ ان میں کیا تبدیلی آئی ہے؟

جواب: الیکٹرانز کا کلاسیکل تصور، J. J. تھامسن اور بوہر کے ابتدائی اٹامک ماڈلز پر مبنی ہے۔ ان ماڈلز کے مطابق الیکٹرونز نیوکلئیس کے گرد مخصوص سرکول راستوں (آرٹس) میں گردش کرتے ہیں جیسے سورج کے گرد سیارے چکر لگاتے ہیں۔ تاہم کوانٹم تیئوری نے یہ تصور بدل دیا۔ تاہم کوانٹم میکینکس کی دریافت نے الیکٹرون کے بارے میں ہمارے خیالات کو تبدیل کر دیا ہے الیکٹرون اب صرف پارٹیکل کے طور پر نہیں بلکہ ایک ویو اور پارٹیکل دونوں کی خصوصیات رکھنے والی شے کے طور پر سمجھا جاتا ہے اس کے علاوہ الیکٹرون کی پوزیشن کو صرف امکان کی صورت میں ظاہر کیا جاتا ہے۔

(iv) ریڈیو ایکٹو ایلیمنٹ کے نیوکلیائی آن سسٹم کیوں ہوتے ہیں؟

جواب: نیوکلئیس میں موجود پارٹیکلز کے درمیان فورسز کے عدم توازن کی وجہ سے ریڈیو ایکٹو ایلیمنٹس کا نیوکلئیس غیر مستحکم ہوتا ہے۔

(v) ڈسچارج ٹیوب پر ہونے والے تجربات کے دوران سائنس دان کس طرح اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک ہی جیسے الیکٹرونز اور پروٹونز سارے ایلیمنٹس

میں موجود ہوتے ہیں؟

جواب: سائنسدانوں نے مشاہدہ کیا کہ ڈسچارج ٹیوب میں پیدا ہونے والی کیتھوڈ ریز ہمیشہ ایک جیسی خصوصیات کی رکھتی ہیں، بلا لحاظ اس کی نیوب میں

استعمال ہونے والی گیس کوئی بھی ہو۔ یہ ریز نیکیو خارج شدہ پارٹیکلز (الیکٹرونز) پر مشتمل ہوتی ہیں جس میں خارج ٹوماس تناسب مخصوص ہوتا

باب 3

کیمیکل بانڈنگ

Chemical Bonding

حاصلاتِ تعلیم:

- اس باب میں آپ سیکھیں گے:
- نو بل گیس کی الیکٹرانک کنفگوریشن بیان کریں۔ نیز آکٹیٹ اور ڈپلٹ اصولوں (Octet and Duplet Rules) کی مدد سے عناصر کی خصوصیات کی پیش گوئی کیسے کی جاسکتی ہے اس کو بیان کریں۔
- مثبت آئن اور منفی آئن کی تشکیل کا موازنہ کریں۔
- میٹلز اور نان میٹلز کی الیکٹرو پوزیٹیو اور الیکٹرو نیگیٹیو نوعیت کا تعین کریں۔
- آئیونک (Ionic) کوویلنٹ (Covalent) کوآرڈینیٹ کوویلنٹ (Coordinate Covalent) اور میٹلک بانڈ (Metallic bond) کی تعریف کریں۔

(الف) آئیونک مرکبات اور کوویلنٹ مرکبات کا موازنہ کریں (مندرجہ ذیل نکات کو متعلقہ تعریفوں میں شامل کریں)

(ب) آئیونک بانڈ مخالف چارج شدہ آئنز کے درمیان مضبوط الیکٹرو سٹیک کشش کے طور پر۔

سوال 5: کیمیکل بانڈ کی انرجیٹکس سے کیا مراد ہے؟

جواب: کیمیکل بانڈ کی انرجیٹکس: کیمیکل بانڈ کے دوران ان کے درمیان کشش کی قوتیں جنم لیں جبکہ دوسرا امکان اس بات کا ہے کہ ان کے درمیان دفع کی قوتیں پیدا ہوں۔ اگر کشش کی قوتیں دفع کی قوتوں سے زیادہ طاقتور ہوں گی تو منسلک ہونے والے دونوں ایٹمز کی انرجی کم ہوگی اور نتیجتاً وہ ایک دوسرے سے منسلک ہو کر نیا مالیکیول بنائیں گے۔ دوسری صورت میں وہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں گے۔


سوال 6: سوڈیم کلورائیڈ کی مثال سے آئیونک بانڈ بننے کی وضاحت کریں۔

جواب: آئیونک بانڈ: یہ کیمیکل بانڈ ایلیمینٹ کے ایٹمز کی اس خصوصیت کی وجہ سے وجود میں آتا ہے کہ وہ خود کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کوشش میں یہ ایٹمز اپنے بیرونی شیلز میں موجود الیکٹرونز کھودیتے ہیں یا پھر الیکٹرون یا الیکٹرونز جذب کر لیتے ہیں۔ دراصل یہ ایٹمز اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ ان کے بیرونی شیل میں موجود الیکٹرونز کی تعداد نزدیک ترین نوبل گیس جیسی ہو جائے تاکہ ان میں بھی نوبل گیس جیسا استحکام پیدا ہو جائے۔ سوڈیم کلورائیڈ میں آئیونک بانڈ اس وقت وجود میں آتا ہے جب سوڈیم اور کلورین کیمیکل ری ایکشن کرتے ہیں۔ ان کے الیکٹرونک کنفیگوریشنز درج ذیل ہے۔

	تیسرا شیل	دوسرا شیل	پہلا شیل
$_{11}\text{Na}$	1	8	2
$_{17}\text{Cl}$	7	8	2

سوڈیم اور کلورین کی الیکٹرونک کنفیگوریشنز

سوڈیم کے بیرونی شیل میں سے ایک الیکٹرون کلورین کے بیرونی شیل میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح ان دونوں ایلیمینٹس کے الیکٹرونک کنفیگوریشنز نزدیک ترین نوبل گیس جیسے ہو جاتے ہیں۔



اشتراک کر کے کیمیکل بانڈ بناتے ہیں۔ اس قسم کا بانڈ جو الیکٹرونز کے باہمی اشتراک سے وجود میں آتا ہے کو ویلنٹ بانڈ کہلاتا ہے۔ جب دو اینمز بانڈ بنانے کی غرض سے ایک دوسرے کے نزدیک آتے ہیں تو دونوں کی انرجی میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ ایک اینم کے الیکٹرونز دوسرے اینم کے نیوکلئیس کی کشش میں آنے کی وجہ سے دونوں کی انرجی میں کمی ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک اینم کا نیوکلئیس جب دوسرے اینم کے نیوکلئیس کے قریب آتا ہے تو دفع کی قوتیں جنم لیتی ہیں ایسی ہی قوتیں اینمز کے الیکٹرونز کے نزدیک آنے کی وجہ سے بھی وجود پذیر ہوتی ہیں اور ان کی وجہ سے انرجی میں اضافہ ہوتا ہے۔ قریب آنے والے دونوں اینمز اپنے آپ کو ایک دوسرے سے اتنی دوری پر رکھتے ہیں جس سے ان کے درمیان کشش کی قوتیں دفع کی قوتوں سے زیادہ مضبوط ہوں۔ دونوں اینمز پھر اپنے آپ کو اتنی ہی دوری پر رہنے کو ترجیح دیں گے جس سے کشش کی قوتوں کا اثر زیادہ رہے۔ اس جگہ ان اینمز کی انرجی کم از کم ہوتی ہے۔ اس طرح ایک مالیکیول وجود میں آتا ہے۔

سوال 9: کو ویلنٹ بانڈ کی اقسام کی وضاحت کریں اور ہر قسم کے لیے کم از کم ایک مثال دیں۔

جواب: کو ویلنٹ بانڈ کی اقسام: کو ویلنٹ بانڈ دو اینمز کے درمیان الیکٹرونز کے باہمی اشتراک سے وجود میں آتا ہے۔ ایسے الیکٹرون جو کیمیکل بانڈ بنانے کے لیے باہم جوڑے بناتے ہیں، بانڈ بننے والے الیکٹرونز کہلاتے ہیں۔ بانڈ بننے والے الیکٹرونز کی تعداد کے لحاظ سے کو ویلنٹ بانڈ کی درج ذیل تین اقسام ہیں۔


1- سنگل کو ویلنٹ بانڈ 2- ڈبل کو ویلنٹ بانڈ 3- ٹریپل کو ویلنٹ بانڈ

1- سنگل کو ویلنٹ بانڈ: جب کو ویلنٹ بانڈ بنانے والا ہر اینم ایک ایک الیکٹرون فراہم کرتا ہے تو ایک بانڈ بننے والے الیکٹرونز کے وجود میں آتا ہے۔ اسے سنگل کو ویلنٹ بانڈ کہتے ہیں۔




اینمز کے درمیان موجود سنگل کو ویلنٹ بانڈ کو سنگل لائن (—) سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

سنگل کو ویلنٹ بانڈ کی مثالیں ہائیڈروجن (H_2)، کلورین (Cl_2)، ہائیڈروجن کلورائیڈ گیس (HCl) اور میتھین (CH_4) ہیں۔

کلورین کا بانڈ: $Cl-Cl$ ہائیڈروجن کا بانڈ: $H-H$ ہائیڈروجن کلورائیڈ کا بانڈ: $H-Cl$ میتھین کا بانڈ: $C-H$ (چار)




(ii) کاربن ڈائی آکسائیڈ: کاربن ڈائی آکسائیڈ کا مالیکیول ایک کاربن ایٹم اور دو آکسیجن ایٹمز سے مل کر بنتا ہے۔ کاربن کا ایٹم اپنے دو الیکٹرونز ایک آکسیجن ایٹم کے دو الیکٹرونز سے شیئر کرتا ہے جبکہ یہی ایٹم اور دوسرا آکسیجن ایٹم بھی دو الیکٹرونز آپس میں شیئر کرتے ہیں۔




(iii) ہائیڈروجن سائیائیڈ (Hydrogen cyanide)



(Ammonia) امونیا





(iv)



پانی اور پروٹون (H^+) کے درمیان کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ کا بننا


اس طرح وجود میں آنے والا مثبت چارج پورے ہائیڈروآکسوینیم آئن کا احاطہ کر لیتا ہے۔ ایک بار جب یہ کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ بن جاتا ہے تو پھر اس میں اور پانی میں موجود دونوں کوویلنٹ بانڈز میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ آکسیجن سے منسلک تینوں بانڈز بالکل ایک جیسے خواص رکھتے ہیں۔ امونیا اور بورون ٹرائی فلورائیڈ کے درمیان تعامل:

کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ کی ایک مثال اس وقت سامنے آتی ہے جب امونیا، بورون ٹرائی فلورائیڈ سے ری ایکٹ کرتی ہے۔ اس ری ایکشن کے دوران ٹرانسفر وجن پر موجود الیکٹرونز کا جوڑا بورون کے بیرونی شیل کو دے کر اس کو مکمل کیا جاتا ہے۔



سوال 14: سوڈیم اور میگنیشیم کے موازنے کی بنیاد پر مثیلک بانڈ کی مضبوطی کو متاثر کرنے والے عوامل پر بحث کریں۔

جواب: مثیلک بانڈ کی مضبوطی کا انحصار دو باتوں پر ہے۔ پہلی بات اس میٹل میں موجود آئنز پر مثبت چارجز کی تعداد اور دوسری بات یہ کہ ایک آئنم نے کتنے الیکٹرونز آزاد کیے ہیں۔ مثال کے طور پر سوڈیم میٹل میں اس کا ایک آئنم صرف ایک الیکٹرون آزاد کرتا ہے اس لیے سوڈیم میٹل میں مثیلک بانڈ کوئی زیادہ مضبوط نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس میگنیشیم میٹل میں میگنیشیم کا ایک آئنم دو الیکٹرونز آزاد کرتا ہے جس کی وجہ سے میگنیشیم کے آئنز پر دو مثبت چارجز ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ میگنیشیم میں موجود مثیلک بانڈ سوڈیم کی نسبت زیادہ مضبوط ہوگا۔ اسی وجہ سے میگنیشیم کا میلنگ پوائنٹ سوڈیم سے کافی زیادہ ہے۔



میگنیشیم میں موجود مثیلک بانڈ

سوال 15: میٹلز کے خواص لکھیں۔

میں مالیکیوز کے درمیان یہ کشش کی قوتیں سب سے زیادہ طاقتور ہوتی ہیں۔
مالیکیوز کے درمیان یہ کشش کی قوتیں بہت سی قسموں کی ہیں ان میں سے کچھ کمزور ہوتی ہیں اور کچھ نسبتاً طاقت ور۔ اشیاء کی طبعی خصوصیات کا انحصار ان قوتوں پر ہوتا ہے۔ اشیاء کے میلنگ اور بوائلنگ پوائنٹس کا انحصار کشش کی ان قوتوں کی طاقت پر ہے۔ یہ قوتیں جتنی طاقت ور ہوں گی اشیاء کے میلنگ اور بوائلنگ پوائنٹس اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔

سوال 20: انٹر مالیکیولر فورسز کی اقسام کی وضاحت کریں۔

جواب: انٹر مالیکیولر فورسز: ایٹمنٹس اور مالیکیولز کے درمیان کشش کی قوتوں کو انٹر مالیکیولر فورسز آف اٹریکشن کہتے ہیں۔

انٹر مالیکیولر فورسز کی اقسام: انٹر مالیکیولر فورسز کی اقسام درج ذیل ہیں:

1- ڈائی پول۔ ڈائی پول کشش کی قوتیں 2- ہائیڈروجن بانڈنگ

1- ڈائی پول۔ ڈائی پول کشش کی قوتیں: کشش کی یہ قوتیں پولر کمپاؤنڈ مثلاً HCl میں پائی جاتی ہیں۔ HCl میں موجود ہائیڈروجن اور کلورین اپنے درمیان بانٹے گئے الیکٹرونی جوڑے کو مختلف طاقتوں سے کھینچتے ہیں۔ ایٹم کی اس طاقت کو الیکٹرونیکسٹیوٹی کہتے ہیں۔ چونکہ کلورین کا ایٹم بانٹے گئے الیکٹرونی جوڑے کو زیادہ قوت سے کھینچتا ہے اس لیے یہ جوڑا اس کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ نتیجتاً کلورین ایٹم پر ایک چھوٹا سا منفی چارج بن جاتا ہے۔ اس طرح کا مثبت چارج ہائیڈروجن پر بھی بن جاتا ہے۔ ان چارجز کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ HCl ایک پولر مالیکیول ہے۔



ان مثبت اور منفی چارجز کی وجہ سے HCl کے مالیکیولز آپس میں کشش رکھتے ہیں۔ کشش کیا اس قوت کو ڈائی پول۔ ڈائی پول کشش کی قوتیں

کہتے ہیں۔

خصوصیات:

- (i) آئیونک کپاؤنڈز کرسٹل لیس بناتے ہیں۔ (ii) یہ پازینو اور نیکسیو آئنز پر مشتمل ہوتے ہیں۔
 (iii) یہ روم ٹمپرچر پر ٹھوس ہوتے ہیں۔ (iv) ان کے میلنگ اور بوائلنگ پوائنٹس زیادہ ہوتے ہیں۔
 (v) یہ پولر سالوینٹس جیسے کہ پانی میں حل پذیر ہوتے ہیں۔ (vi) یہ ہیٹ اور الیکٹریسیٹی کے اچھے کنڈکٹرز ہیں۔
 (vii) یہ سخت ہوتے ہیں۔

سوال 25: کوویلنٹ کپاؤنڈز سے کیا مراد ہے؟ ان کی خصوصیات لکھیں۔

جواب: کوویلنٹ کپاؤنڈ: کوویلنٹ کپاؤنڈ وہ کپاؤنڈز ہیں جو ایٹمز کے درمیان الیکٹرونز کی شراکت سے بنتے ہیں۔ اس شراکت سے ایک کوویلنٹ بانڈ بنتا ہے۔

کوویلنٹ کپاؤنڈ کی خصوصیات:

- (i) کوویلنٹ کپاؤنڈ کے میلنگ اور بوائلنگ پوائنٹس کم ہوتے ہیں۔
 (ii) یہ زیادہ تر نان پولر سالوینٹس میں حل پذیر ہوتے ہیں جیسے کہ ایٹھر، بےنزین۔
 (iii) یہ عام طور پر بجلی کے اچھے کنڈکٹرز نہیں ہوتے۔ (iv) یہ زیادہ تر نیوٹرل مالیکیولز کے طور پر پائے جاتے ہیں۔

سوال 26: گریفاٹ پر مختصر نوٹ لکھیں۔

جواب: گریفاٹ میں چھ کاربن ایٹمز مل کر ہیکزاگونل رنگز (Hexagonal rings) بناتے ہیں اور پھر بہت سے یہ رنگز درتہ آپس میں جڑے ہوتے ہیں۔ چونکہ ہر تہ کا دوسری تہ سے تعلق زیادہ مضبوط نہیں ہوتا اس لیے یہ ایک دوسرے پر آسانی سے پھسل جاتے ہیں۔ اس وجہ سے گریفاٹ کو صنعتی یمانے رلیبریکنٹ (Lubricant) کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مزید گریفاٹ کی تہوں کے درمیان آزادانہ حرکت کرنے والے الیکٹرونز

- 2- ایٹم کے آخری شیل میں آٹھ الیکٹرون حاصل کرنے کی صلاحیت کو کہا جاتا ہے:
- (A) آکٹیٹ رول (B) ڈپلیٹ رول (C) d اور f اور (D) اینٹرونیٹو یعنی رول
- 3- کشش کی قوت جو پارٹیکلز کو آپس میں جوڑتی ہے کہلاتی ہے:
- (A) آکٹیٹ رول (B) ڈپلیٹ رول (C) کیمیکل بانڈ (D) ان میں سے کوئی نہیں
- 4- نیوکلئیس کے گرد الیکٹرون کی ترتیب کہلاتی ہے:
- (A) الیکٹرونک کنفیگریشن (B) ٹرپل کوویلنٹ بانڈ (C) اینٹرونیٹو یعنی (D) آئیونک بانڈ
- 5- سوڈیم کلورائیڈ میں کس قسم کا کیمیکل بانڈ موجود ہوتا ہے؟
- (A) کوویلنٹ بانڈ (B) مینلک بانڈ (C) آئیونک بانڈ (D) کو-آرڈی نیٹ کوویلنٹ بانڈ
- 6- الیکٹرون کی مکمل منتقلی سے بننے والا بانڈ کہلاتا ہے:
- (A) آئیونک بانڈ (B) کوویلنٹ بانڈ (C) مٹیلک بانڈ (D) کو-آرڈی نیٹ کوویلنٹ بانڈ
- 7- کس قسم کے ایلمنٹس آئیونک بانڈ بناتے ہیں؟
- (A) میٹلز (B) نان میٹلز (C) میٹلز اور نان میٹلز (D) ان میں سے کوئی نہیں
- 8- کیلشیم اور کلورین کے درمیان کس قسم کا کیمیکل بانڈ بنتا ہے؟
- (A) آئیونک بانڈ (B) کوویلنٹ بانڈ (C) مٹیلک بانڈ (D) آئیونک اور کوویلنٹ بانڈ
- 9- دو ایٹمز کے درمیان الیکٹرونز کے باہمی اشتراک سے بننے والا بانڈ کہلاتا ہے:
- (A) آئیونک بانڈ (B) ڈبل کوویلنٹ بانڈ (C) ٹرپل کوویلنٹ بانڈ (D) سنگل کوویلنٹ بانڈ

انٹرمالیکولر فورسز

3.7

29- کمپاؤنڈ کے مختلف مالیکیولز کے درمیان کشش کی قوتیں کہلاتی ہیں:

(A) انٹرمالیکولر فورسز (B) آئیونک فورسز (C) نیوٹرل فورسز (D) نیچرل فورسز

30- کس بانڈنگ کی وجہ سے پانی کا بوائٹنگ پوائنٹ H_2S اور NH_3 سے زیادہ ہے؟

(A) آئیونک بانڈنگ کی وجہ سے (B) کوویلنٹ بانڈنگ کی وجہ سے
(C) میٹلک بانڈنگ کی وجہ سے (D) ہائیڈروجن بانڈنگ کی وجہ سے

31- ڈائی پول۔ ڈائی پول فورسز موجود ہوتی ہیں:

(A) H_2 (B) O_2 (C) HCl (D) N_2

32- انٹرمالیکولر فورسز مضبوط ہوتی ہیں:

(A) H_2O (B) H_2 (C) N_2 (D) O_2

33- کسی ایٹم کی مالیکیول میں موجود اشتراک شدہ الیکٹرون پیر کو اپنی طرف کھینچنے کی صلاحیت کہلاتی ہے:

(A) الیکٹرونیکٹیوٹی (B) الیکٹرپازٹیوٹی (C) میٹلک بانڈ (D) آئیونائزیشن انرجی

اشیا میں موجود بانڈنگ اور ان کی خصوصیات کا آپس میں تعلق

3.8

34- آئیونک بانڈ ہیں:

(A) ڈائیٹرکشنل (B) نان۔ ڈائیٹرکشنل (C) a اور b دونوں (D) ان میں سے کوئی نہیں

(D) مٹیلک بانڈ

(C) ڈبل کوویلنٹ بانڈ

10- کس کیمیکل بانڈ کو عموماً تیر (←) سے ظاہر کیا جاتا ہے:

(C) کوآرڈی نیٹ کوویلنٹ بانڈ (D) مٹیلک بانڈ

(A) آئیونک بانڈ (B) کوویلنٹ بانڈ

جوابات

(C) -10	(A) -9	(A) -8	(C) -7	(C) -6	(B) -5	(A) -4	(D) -3	(B) -2	(A) -1
---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

محکمہ تعلیم کی نئی امتحانی تکنیکس (Knowledge, Understanding, Application, Analytical & Conceptual) کی روشنی میں مرتب کیے گئے مختصر جوابی سوالات

ایٹمز کیمیکل بانڈ کیوں بناتے ہیں	3.1
کیمیکل بانڈ	3.2

مختصر جواب دیں۔ □

1- ایٹمز کیمیکل بانڈز کیوں بناتے ہیں؟

جواب: ایٹمز اپنے بیرونی شیل کو مکمل کرنے اور استحکام حاصل کرنے کے لیے کیمیکل بانڈز بناتے ہیں۔

2- کیمیکل بانڈ کی تعریف لکھیں۔

جواب: کیمیکل ایٹمز کے درمیان عمل کرنے والی ایسی فورس جو انہیں ایک مالیکیول میں جوڑنے رکھتی ہے۔ کیمیکل بانڈ کہلاتی ہے۔

میٹلوکس الیکٹروپاز یو کریکٹر	3.4
نان میٹلوکس الیکٹرو نیگیو کریکٹر	3.5
آئیونک اور کوویلنٹ کپاؤنڈ کی خصوصیات کا موازنہ	3.6

20- کیٹائن سے کیا مراد ہے؟ دو مثالیں دیں۔

جواب: کیٹائن: پازیو چارج شدہ میٹل آئنز کو کیٹائن کہلاتے ہیں۔

مثالیں: Mg^{2+} , Na^{+} وغیرہ۔

21- اینائن سے کیا مراد ہے؟ دو مثالیں دیں۔

جواب: اینائن: نیگیو چارج شدہ نان۔ میٹلک آئنز اینائن کہلاتے ہیں۔

مثالیں: O_2^{-} , Cl^{-} وغیرہ۔

22- کس قسم کے ایلیمینٹس کیٹائنز بناتے ہیں؟

جواب: میٹلوکس کیٹائنز بناتی ہیں۔

23- کس قسم کے ایلیمینٹس اینائنز بناتے ہیں؟


جواب: نان میٹلوکس اینائنز بناتی ہیں۔

24- الکلائن ارتھ میٹلوکس کی کوئی سی دو مثالیں دیں۔

مسکنہ

2- میتھین (CH_4) کے ڈاٹ اور کراس ساخت کی ڈایا گرام بنائیں۔

جواب: CH_4



3- میٹلو میں سے الیکٹریسیٹی کیوں گزرتی ہے؟

جواب: موبائل الیکٹرونز کی وجہ سے میٹلوں میں سے الیکٹریسیٹی گزرتی ہے۔

4- آئیونک بانڈ کو ویلنٹ بانڈ سے مختلف کیوں ہے؟

جواب:

آئیونک بانڈ	کوویلنٹ بانڈ
ایسا کیمیکل بانڈ جو ایک ایٹم سے دوسرے ایٹم میں الیکٹرون کی مکمل منتقلی کے نتیجے میں بنتا ہے آئیونک بانڈ کہلاتا ہے۔ یہ میٹلو اور نان میٹلوں کے درمیان بنتا ہے۔	ایسا کیمیکل بانڈ جو الیکٹرونز کے باہمی اشتراک کی وجہ سے بنتا ہے کوویلنٹ بانڈ کہلاتا ہے۔ یہ نان میٹلوں میں بنتا ہے۔

5- PCl_3 کی ڈاٹ اور کراس ڈایا گرام بنائیں۔

جواب: PCl_3



(viii) کس آئیونک کمپاؤنڈ کا میلنگ پوائنٹ سب سے زیادہ ہوگا؟

(الف) NaCl (ب) KCl (ج) LiCl (د) RbCl

(ix) کس کمپاؤنڈ میں کوویلنٹ بانڈ اور آئیونک بانڈ دونوں موجود ہیں؟

(الف) $MgCl_2$ (ب) NH_4Cl (ج) CaO (د) PCl_3

(x) درج ذیل میں سے کس میں ڈبل کوویلنٹ بانڈ ہے؟

(الف) ایتھین (Ethane) (ب) میتھین (Methane) (ج) ایتھالین (Ethylene) (د) ایسٹ لین (Acetylene)

○ جوابات

1- (ج)	2- (ب)	3- (ب)	4- (د)	5- (ج)	6- (ب)	7- (د)	8- (الف)	9- (ب)	10- (ج)
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	--------	---------

2- مختصر سوالات:

(i) کس قسم کے ایلیمنٹ اپنے بیرونی شیل میں موجود الیکٹرون کو آسانی سے کھودیتے ہیں اور کس قسم کے ایلیمنٹ اپنے بیرونی شیل میں الیکٹرون جذب کر لیتے ہیں؟

جواب: میٹلز آسانی سے اپنے بیرونی الیکٹرونز خارج کر سکتے ہیں جبکہ نان میٹلز آسانی سے الیکٹرونز حاصل کرتے ہیں۔

(ii) کم ماس رکھنے والے کوویلنٹ کمپاؤنڈز کیوں گیس یا کم بوائٹنگ پوائنٹ والے مائع کی طرح پائے جاتے ہیں؟

جواب: لوئر مالیکیولر ماس کوویلنٹ کمپاؤنڈز اپنے مالیکیولز کے درمیان کشش کی کمزور فورسز کی وجہ سے گیسز یا کم بوائٹنگ لیکوڈز کے طور پر موجود ہیں۔


(iii) ایسے کسی ایلیمنٹ کی مثال دیں جو کرسٹلائن ٹھوس کی طرح پایا جاتا ہے اور اس کے ایٹمز کے درمیان کوویلنٹ بانڈز ہیں؟

(vi) میلز عام طور پر بھاری اور سخت کیوں ہوتی ہیں؟
 جواب: میلز عام طور پر سخت اور بھاری ہوتی ہیں کیونکہ میلز میں اینم مضبوطی سے جکڑے ہوتے ہیں اور قطاروں کی شکل میں ایک دوسرے کے اوپر ترتیب دیے جاتے ہیں۔ یہ ترتیب انھیں سخت اور بھاری بناتی ہے۔

-5 تحقیقی سوالات (Investigative Questions)

(i) کیسی حالت میں $AlCl_3$ ڈائی مر (Dimer) کے طور پر پایا جاتا ہے اور اس کا فارمولا Al_2Cl_6 ہے۔ اس ڈائی مر میں موجود مالکیولز کے درمیان کس قسم کا بانڈ ہوتا ہے؟

جواب: اس ڈائی مر میں آرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ پایا جاتا ہے۔



کیمیکل فارمولا (Chemical Formula)	4.1
امپیریکل فارمولا (Empirical Formula)	4.2

سوال 2: کیمیکل فارمولا کیا ہے؟ ایلیمینٹس اور کمپاؤنڈز کے کیمیکل فارمولوں میں فرق واضح کریں۔




جواب: کیمیکل فارمولا: کیمیکل فارمولا کسی کمپاؤنڈ یا ایلیمینٹ کی سادہ علامتی نمائندگی ہوتی ہے جو اس میں موجود ایٹمز اور ان کے تناسب کو ظاہر کرتی ہے۔ مثلاً: پانی کا کیمیکل فارمولا H_2O ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس میں ہائیڈروجن کے دو اور آکسیجن کا ایک ایٹم ہوتا ہے۔ کیمیکل فارمولا کی اہمیت:

- (i) کیمیکل فارمولا مادوں کی شناخت کرنے میں مدد کرتا ہے۔
- (ii) یہ کیمیائی تعاملات کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے۔
- (iii) یہ کیمیائی حساب کتاب میں مدد کرتا ہے۔

ایلیمینٹس کے کیمیکل فارمولے: اس دنیا میں موجود ایلیمینٹس مختلف شکل و صورت میں پائے جاتے ہیں۔ کچھ ایلیمینٹس ایسے ہیں جن میں ایٹمز مجموعی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوتے ہیں۔ ان ایلیمینٹس کو صرف ان کے سمبلز (Symbols) سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سوڈیم (Na)، کالشیم (Ca)، کاربن (C)، آئرن (Fe) وغیرہ۔ ان کے علاوہ کچھ ایلیمینٹس علیحدہ علیحدہ مالیکیولز کی شکل میں اپنا وجود برقرار رکھتے ہیں جیسے آکسیجن (O_2)، نائٹروجن (N_2)، ہائیڈروجن (H_2)۔ ان مالیکیولز میں ایٹمز آپس میں کیمیکل بانڈ کے ذریعے جڑے ہوتے ہیں۔ اوزون میں آکسیجن کے تین ایٹمز بیک وقت ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ اس کا فارمولا (O_3) ہے۔

کمپاؤنڈز کے کیمیکل فارمولے: ایلیمینٹس کی طرح کیمیکل کمپاؤنڈز مختلف انداز میں پائے جاتے ہیں۔ عام نمک یعنی سوڈیم کلورائیڈ آئنز کے مجموعہ کے



مثالیں:



ایٹمز اور ان کے کیٹائنز اور اینائنز:

ایٹمز اور ان کے کیٹائنز اور اینائنز بمعہ چارج		ایٹمز اور ان کے کیٹائنز بمعہ چارج	
چارج	ایٹم	چارج	ایٹم
O^{2-}	O	H^{+}	H
N^{3-}	N	Na^{+}	Na
C^{+}	Cl	Li^{+}	Li
Br^{-}	Br	K^{+}	K
I^{-}	I	Mg^{2+}	Mg
Cu^{+}, Cu^{2+}	Cu	Ca^{2+}	Ca
Fe^{2+}, Fe^{3+}	Fe	Ba^{2+}	Ba
Sn^{2+}, Sn^{4+}	Sn	Zn^{2+}	Zn

مالیکیولر فارمولا = n (امپیریکل فارمولا)



مثال: ایک مرکب کا امپیریکل فارمولا CH ہے۔ اس کا مولر ماس 78 g mol^{-1} ہے۔ اس کا مالیکیولر فارمولا معلوم کریں۔


$$\text{مولر ماس} = 78 \text{ g mol}^{-1}$$

جواب: امپیریکل فارمولا CH

(امپیریکل فارمولا) $n =$ مالیکیولر فارمولا

$$n = \frac{\text{مولر ماس}}{\text{امپیریکل فارمولا ماس}}$$


$$n = \frac{78}{13} = 6$$



سٹرکچرل فارمولا سے مالیکیولر فارمولا اخذ کرنا	4.5
(Deduce the Molecular Formula From Structural Formula)	
ایووگیڈروڈز نمبر (N_A) (Avogadro's Number)	4.6

سوال 6: سٹرکچرل فارمولا سے مالیکیولر فارمولا اخذ کرنے کا طریقہ کار بیان کریں۔

اس حد تک بڑھانے کی ضرورت ہے جن سے ہمارے لیے ان کے ماسز کا حساب کرنا آسان ہو۔



6.022×10^{23} ایک بہت ہی بڑا نمبر ہے اور اس کا انتخاب ہم نے اس لیے کیا ہے کیوں کہ
ایٹمک ماس یونٹس $(6.022 \times 10^{23}) = 1.00$ گرام


اب مساوات 2 میں موجود ری ایکٹنٹس اور پراڈکٹس کی مقداریں ہم اس طرح لکھیں گے۔

$$2 \times 6.022 \times 10^{23} \times (12.0 \text{ amu}) = 24.00 \text{ گرام کاربن ایٹمز}$$

$$6.022 \times 10^{23} \times (32.0 \text{ amu}) = 32.00 \text{ گرام آکسیجن مالیکیولز}$$

$$2 \times 6.022 \times 10^{23} \times (28.0 \text{ amu}) = 2 \times 28.00 \text{ گرام کاربن مونو آکسائیڈ مالیکیولز}$$

ری ایکٹنٹس اور پراڈکٹس کے درمیان ماسز کی نسبت اب اس طرح ہوگی۔



ایک سادہ ایکویشن سے شروع ہو کر ہم نے ری ایکٹنٹس اور پراڈکٹس کے ماسز کی نسبت معلوم کر لی ہے جس کو ہم با آسانی لیبارٹری میں استعمال کر سکتے ہیں۔

مساوات نمبر 3 کے مطابق 24 گرام کاربن میں $2 \times 6.022 \times 10^{23}$ کاربن کے ایٹمز ہیں جبکہ 32 گرام آکسیجن میں 6.022×10^{23}

سوال 10: کیمیکل ایکویشن سے کیا مراد ہے؟ مثال سے واضح کریں۔

جواب: کیمیکل ایکویشن: کیمیکل ایکویشن کیمیکل ری ایکشنز کو علامات اور فارمولوں کی مدد سے ظاہر کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ ری ایکشن میں حصہ لینے والے ری ایکٹنٹس اور بننے والے پراڈکٹس کو ظاہر کرتی ہے۔




کیمیکل ایکویشن کا بنیادی مقصد: کسی بھی کیمیکل ایکویشن کا بنیادی مقصد ان ایٹمز یا مالیکیولز کی نشاندہی کرنا ہے جو کیمیکل ری ایکشن میں حصہ لیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں بنتے ہیں۔

ری ایکٹنٹس: وہ مادے جو کیمیکل ری ایکشن میں حصہ لیتے ہیں۔ یہ مساوات کی بائیں جانب لکھے جاتے ہیں۔

پراڈکٹس: وہ مادے جو ری ایکشن کے نتیجے میں بنتے ہیں۔ یہ مساوات کی دائیں جانب لکھے جاتے ہیں۔

ایکویشن $\text{C} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2$ میں $\text{C} + \text{O}_2$ ری ایکٹنٹس ہیں جبکہ CO_2 پراڈکٹ ہے۔



ری ایکٹنٹس

پراڈکٹس

سوال 11: کیمیکل ایکویشن لکھتے وقت کن نکات کا خیال رکھنا ضروری ہے؟


جواب: کیمیکل ایکویشن لکھتے وقت ضروری نکات: کیمیکل ایکویشن لکھتے وقت درج ذیل نکات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔

1- کیمیکل ایکویشن کو لکھتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ قانون بقائے مادہ کے مطابق ہو یعنی اس میں نہ تو کوئی ایٹم نیا بنے اور نہ ہی

کوئی ایٹم فنا ہو۔ کیمیکل ری ایکشن میں حصہ لینے والے ایٹمز کی تعداد دونوں طرف لازمی طور پر برابر ہونی چاہیے یعنی کیمیکل ایکویشن متوازن

$$\begin{aligned}
 & \text{ایک مول الکوحل کو پوری طرح جلانے کے لیے درکار آکسیجن} = 3 \text{ مولز} \\
 & 1.8 \text{ مولز الکوحل کو جلانے کے لیے درکار آکسیجن} = \frac{3}{1} \times 1.8 \\
 & = 5.4 \text{ مولز} \\
 & \text{ایک مول الکوحل کتنے مولز کاربن ڈائی آکسائیڈ بناتی ہے۔} = 2.0 \\
 & 1.8 \text{ مولز الکوحل کتنے مولز کاربن ڈائی آکسائیڈ بنائے گی۔} = \frac{2}{1} \times 1.8 \\
 & = 3.6 \text{ مولز}
 \end{aligned}$$

مثال 3: ایلومینیم آکسجن کے ساتھ ری ایکٹ کر کے ایلومینیم آکسائیڈ بناتی ہے۔ 0.3 مولز ایلومینیم سے ری ایکٹ کرنے کے لیے آکسیجن کے کتنے گرام کی ضرورت ہوگی؟



ایکویشن کے مطابق

$$4 \text{ مولز ایلومینیم کے لیے درکار آکسیجن} = 3.0 \text{ مولز}$$

$$1 \text{ مول ایلومینیم کے لیے درکار آکسیجن} = \frac{3}{4}$$

$$3.0 \text{ مول ایلومینیم کے لیے درکار آکسیجن} = \frac{3}{4} \times 0.3$$

مولز کی تعداد = 0.5 moles

ایٹمز کی تعداد = مولز کی تعداد $\times$ ایووگیڈرو نمبر

$$0.5 \times 6.022 \times 10^{23} \text{ atoms} =$$

$$3.011 \times 10^{23} \text{ atoms} =$$

کاربن (ڈائنمڈ) کے 6g میں ایٹمز کی تعداد 3.011×10^{23} atoms ہے۔

سوال 3: ایلمینیم ایک ہلکی میٹل ہے۔ یہ دودھ کے ٹینک بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ 204g ایلمینیم آکسائیڈ (Al_2O_3) میں ایلمینیم (Al) کی مقدار معلوم کریں۔

حل: ایلمینیم آکسائیڈ کا مولر ماس $\text{Al}_2\text{O}_3 = (27 \times 2) + (16 \times 3) =$

$$54 + 48 =$$

$$102 \text{ g} =$$

$$102 \text{ g ایلمینیم آکسائیڈ میں ایلمینیم (Al) } = 54 \text{ g}$$

$$1 \text{ g ایلمینیم آکسائیڈ میں ایلمینیم (Al) } = \frac{54}{102} \text{ g}$$

$$204 \text{ g ایلمینیم آکسائیڈ میں ایلمینیم (Al) } = \frac{54}{102} \times 204 =$$

$$108 \text{ g} =$$

5- آئرن کا سہل ہے:

Fe (A) Ir (B) In (C) F/ (D)

6- بینزین کا مالیکیولر فارمولا ہے:

CH (A) C₆H₆ (B) C₂H₂ (C) C₅H₅ (D)

7- مالیکیول میں موجود تمام اٹیمس اور ان کے ایٹمز کی حقیقی تعداد کو ظاہر کرتا ہے:

(A) مالیکیولر فارمولا (B) امپیریکل فارمولا (C) کیمیکل فارمولا (D) سہل فارمولا

8- سلفورک ایسڈ کا کیمیکل فارمولا ہے:

HNO₃ (A) HC/ (B) H₂SO₄ (C) SO₄ (D)

9- پٹلین کا کیمیکل فارمولا ہے:

C₂H₂ (A) CH (B) C₆H₆ (C) C₃H₃ (D)

10- "CH" امپیریکل فارمولا ہے:

(A) پانی (B) بینزین (C) ہائیڈروجن پر آکسائیڈ (D) کلورین

بائنری آئیونک مرکبات کے کیمیائی فارمولاز

4.3

کپاؤنڈز کے کیمیکل فارمولاز


4.4

11- ٹیکسٹ جاریہ شدہ آئٹمز کو کتر ہر:

- 2- سائو شیو میٹری مٹی ہے:
- (A) لاء آف کنزرویشن آف ماس پر (B) لاء آف ماس ایکشن پر (C) سائنٹیفک لاء پر (D) ڈسٹری بیوٹولاء پر
- 3- گلوکوز کا مالیکیولر فارمولا ہے:
- (A) C_6H_6 (B) CH_2O (C) $C_6H_{12}O_6$ (D) CH_2
- 4- کیشیم آکسائیڈ کا مالیکیولر فارمولا ہے:
- (A) CO_2 (B) $CaCO_3$ (C) CaO (D) Ca_2O
- 5- ایک کپاؤنڈ کا سٹرکچرل فارمولا $H - \begin{array}{c} H \\ | \\ C \\ | \\ H \end{array} - \begin{array}{c} H \\ | \\ C \\ | \\ H \end{array} - H$ ہے۔ اس کا مالیکیولر فارمولا کیا ہوگا؟
- (A) C_2H_4 (B) C_3H_6 (C) C_2H_6 (D) C_2H_5
- 6- 6.022×10^{23} کہلاتا ہے:
- (A) ایوگیڈرو زمبر (B) بوہر زمبر (C) رورفورڈ زمبر (D) لیوس زمبر
- 7- بنزین (C_6H_6) کا مولر ماس ہے:
- (A) 100g (B) 78g (C) 80g (D) 13g
- 8- کسی بھی شے میں ایوگیڈرو ز پارٹیکلز کی تعداد کہلاتی ہے:
- (A) مول (B) امپیریکل فارمولا (C) مالیکیولر فارمولا (D) (A) اور (C) دونوں

4.7	مول اور مولر ماس
4.8	کیمیکیل ایکوییشنز اور کیمیکیل ری ایکشنز

8- ایسٹک ایسڈ کے سٹرکچرل فارمولا سے مالیکیولر فارمولا اخذ کریں۔



جواب: C ایٹمز کی تعداد: 2

H ایٹمز کی تعداد: 4

O ایٹمز کی تعداد: 2

ایسٹک ایسڈ کا مالیکیولر فارمولا: $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$

9- ہائیڈروجن پرائکسائیڈ کا امپیریکل فارمولا HO ہے اور مولر ماس 34 ہے۔ اس کا مالیکیولر فارمولا معلوم کریں۔

جواب: $17 = 1 + 16$ ہائیڈروجن پرائکسائیڈ کا امپیریکل فارمولا

$= 34$ ہائیڈروجن پرائکسائیڈ کا مولر ماس

$= 34$ HO کا امپیریکل فارمولا

$$n = \frac{\text{مولر ماس}}{\text{امپیریکل فارمولا ماس}}$$

$$\text{پانی کے مولز کی تعداد} = \frac{\text{گرامز میں ماس}}{\text{مولر ماس}}$$

$$\text{مولز کی تعداد} = \frac{1}{8} = 0.055$$

$$\begin{aligned} \text{مالیکیولز کی تعداد} &= \text{ایووگیڈرو ز نمبر} \times \text{مولز کی تعداد} \\ &= 0.055 \times 6.022 \times 10^{23} \\ &= 0.03345 \times 10^{23} \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} 3 \text{ پانی کے ایک مالیکیول میں ایٹمز} &= 3 \\ 3 \times 0.03345 \times 10^{23} \text{ ایٹمز} &= 0.03345 \times 10^{23} \text{ مالیکیولز} \\ &= 1.0036 \times 10^{23} \text{ ایٹمز} \end{aligned}$$

8- 25g H_2SO_4 میں مولز کی تعداد معلوم کریں۔
جواب:

$$\begin{aligned} \text{H}_2\text{SO}_4 \text{ کا گرامز میں ماس} &= 25\text{g} \\ \text{H}_2\text{SO}_4 \text{ کا مولر ماس} &= (1 \times 2) + (32 \times 4) + (16 \times 4) \\ &= 98\text{g} \\ \text{مولز کی تعداد} &= \frac{\text{گرامز میں ماس}}{\text{مولر ماس}} \end{aligned}$$

$$= \frac{25}{98}$$

(II) ایک ایسے مرکب کا مالیکیولر فارمولا معلوم کریں جس کا امپیریکل فارمولا (CH_2O) ہے اور اس کا مولر ماس 180 ہے۔
جواب:



$$CH_2O = (12 \times 1) + (1 \times 2) + (16 \times 1) \\ = 30$$

$$\text{کمپاؤنڈ کا مولر ماس} = 180$$

$$n = \frac{\text{مولر ماس}}{\text{امپیریکل فارمولا ماس}}$$

$$n = \frac{180}{30} = 6$$

$$n = 6$$

$$\text{مالیکیولر فارمولا} = n(\text{امپیریکل فارمولا})$$

$$= 6(CH_2O)$$

$$= C_6H_{12}O_6$$

(III) 1.5 گرام پانی میں کتنے مالیکیولز ہوں گے؟

جواب:

$$H_2O \text{ کا گرامز میں ماس} = 1.5g$$

$$H_2O \text{ کا مولر ماس} = (1 \times 2) + (16 \times 1)$$

(۳) آپ ایک ریورسبل ری ایکشن میں پراڈکٹس کے ماسو کس طرح معلوم کریں گے؟

جواب: ریورسبل ری ایکشنز میں بننے والے پراڈکٹس کے ماسز کا حساب لگانے کے لیے پہلے متوازن (بیلنس) کیمیائی ایکویشن لکھیں پھر دیے گئے ری ایکٹنٹس کے ماس کو مولز میں تبدیل کریں، متوازن مساوات سے مول تناسب کا استعمال کر کے بننے والے پراڈکٹ کے مولز تلاش کریں اور آخر میں ان مولز کو پراڈکٹ کے مولر ماس سے ضرب دے کر ماس معلوم کریں۔

4۔ تفصیلی سوالات

(i) ایک ری ایکشن کی کیمیکیل ایکویشن لکھنے سے پہلے کن شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے؟

جواب: دیکھئے سوال نمبر 11

(ii) ایوگیڈرو زمبر اور مول کی وضاحت کیجیے۔

جواب: دیکھئے سوال نمبر 8 اور 9

(iii) اگر 10 گرام میتھین کو بہت زیادہ آکسیجن میں جلایا جائے تو درج ذیل ایکویشن کے مطابق کاربن ڈائی آکسائیڈ کی کتنی مقدار بنے گی؟



جواب: متوازن کیمیائی مساوات:



(vii) درج ذیل میں ایٹمز کی تعداد معلوم کریں۔

(ج) 10 گرام $C_6H_{12}O_6$ (ب) 4.3 مولز N_2 (الف) 3 گرام H_2 جواب: (الف) 3 گرام H_2

گرامز میں مولز

$$= 3 \text{ gm}$$

 H_2 کا مولر ماس

$$= 1 \times 2 = 2 \text{ g}$$

 H_2 میں مولز کی تعداد

$$= \frac{3}{2} = 1.5 \text{ moles}$$

پارٹیکلز (مالیکیولز) کی تعداد

$$= \text{ایووگیڈرو نمبر} \times \text{مولز کی تعداد}$$

$$= 1.5 \times 6.022 \times 10^{23} \text{ molecules}$$

$$= 9.033 \times 10^{23} \text{ molecules}$$

ہائیڈروجن کے ایک مالیکیول میں ایٹمز

$$= 2 \text{ atom}$$

 9.033×10^{23} ہائیڈروجن کے مالیکیولز میں ایٹمز کی تعداد

$$= 2 \times 9.033 \times 10^{23} \text{ atoms}$$

$$= 1.8066 \times 10^{22} \text{ atoms}$$

3 گرام ہائیڈروجن میں ایٹمز کی تعداد

$$= 1.8066 \times 10^{22} \text{ atoms}$$

(ب) 4.3 مولز N_2 N_2 میں مولز کی تعداد

$$= 3.4 \text{ moles}$$

 N_2 مالیکیولز کی تعداد

$$= \text{ایووگیڈرو نمبر} \times \text{مولز کی تعداد}$$

$$= 3.4 \times 6.022 \times 10^{23} \text{ molecules}$$

باب 5

توانائی اور اس میں تبدیلیاں

Energetics

حاصلاتِ تعلیم:

اس باب میں آپ سیکھیں گے:

- کیمیائی سسٹم اور سرآونڈنگ کے تعلق کی وضاحت کریں۔ نیز کیمیائی ری ایکشن کے دوران توانائی کی منتقلی کی بھی وضاحت کریں۔
- مثالیں دے کر اینڈو تھرمل اور ایکسو تھرمل ری ایکشنز کے درمیان فرق واضح کریں۔
- واضح کیجیے کہ ری ایکشن میں سے خارج یا جذب ہونے والی انرجی کو اینتھالپی چینج بھی کہتے ہیں۔
- ایکسو تھرمل ری ایکشنز کے لیے یہ اینتھالپی چینج منفی ہوتی ہے جبکہ اینڈو تھرمل ری ایکشن کے لیے مثبت ہوتی ہے۔
- ایکٹیویشن انرجی کو کم سے کم توانائی کے طور پر بیان کریں جو کہ متصادم ذرات کے کامیاب تصادم کے لیے درکار ہوتی ہے۔
- اینڈو تھرمل اور ایکسو تھرمل ری ایکشنز کے لیے ری ایکشن پر وفاقل ڈایا گرام بنائیں۔
- واضح کریں کہ کسی ری ایکشن کی ایکٹیویشن انرجی کا انحصار ری ایکشن کے اختیار کردہ راستے پر ہوتا ہے۔ یہ راستہ کیپالسٹ یا اینزائم کی موجودگی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جس میں اینتھالپی چینج ایکٹیویشن انرجی (کیپالسٹ کی موجودگی یا اس کے بغیر) ری ایکشنز پر اڈکشن کی نشان دہی کریں۔
- اس بات کی وضاحت کریں کہ بانڈ توڑنا اینڈو تھرمل جبکہ بانڈ بنانا ایکسو تھرمل عمل ہے۔

سوال 6: سسٹم اور سرائوٹنگ سے کیا مراد ہے؟ مثال کی مدد سے وضاحت کریں۔

جواب: سسٹم: کیمسٹری میں سسٹم سے مراد ہر وہ شے کا مطالعہ ہے جس میں کوئی فزیکل یا کیمیکل تبدیلی واقع پذیر ہو رہی ہو۔

سرائوٹنگ: ہر وہ شے جو زیر غور کیمیائی ری ایکشن کا حصہ نہیں ہے اسے سرائوٹنگ کہتے ہیں۔

مثال: اگر آپ ایک بیکر میں پانی لے کر اسے ابال رہے ہیں تو اُٹنے والا پانی سسٹم ہے باقی ہر چیز یعنی بیکر، برز وغیرہ سرائوٹنگ کا حصہ ہوں گے۔ اسی طرح ایک کپ میں آکس کریم، آکس کریم سسٹم ہے اور کپ کی دیوار اور ہوا سرائوٹنگ۔

سوال 7: ہیٹ اور اینتھالپی میں فرق کی وضاحت کریں۔

جواب:	ہیٹ	انتھالپی
(i) ہیٹ انرجی کی وہ مقدار ہے جو ایک گرم جسم سے ٹھنڈے جسم کی طرف بہتی ہے کیونکہ ان دونوں جسموں کے درجہ حرارت میں فرق ہوتا ہے۔	(i) انتھالپی کسی سسٹم کی ٹوٹل ہیٹ کنٹینٹ کے برابر ہوتی ہے۔	
(ii) ہیٹ کی مقدار کو جاولز (Joules) میں ناپا جاتا ہے۔ ہیٹ دراصل دو جسموں کے درمیان حرارت کا تبادلہ ہے۔	(ii) انتھالپی میں تبدیلی کو عام طور پر KJ/mole میں ناپا جاتا ہے۔	
(iii) ہیٹ کسی سسٹم کا لازمی حصہ نہیں ہے یہ انرجی کی ایک ایسی فارم ہے جو اس سسٹم میں داخل ہوتی ہے یا باہر نکلتی ہے۔	(iii) جب ہیٹ سسٹم میں داخل ہوتی ہے یا باہر نکلتی ہے تو اس سسٹم کی انتھالپی تبدیل ہو جاتی ہے۔	

گھروں اور صنعتوں میں: ہم گھروں اور صنعتوں میں کھانا پکانے اور دوسری ضروریات کے لیے کوئلہ، گیس اور آئل استعمال کرتے ہیں۔ جلنے کے عمل کو کسبھن (combustion) کہا جاتا ہے اور اس عمل کے دوران ایندھن میں پائے جانے والے کیمیکل کمپاؤنڈز ہوا میں موجود آکسیجن سے ری ایکشن کر کے بہت زیادہ حرارت خارج کرتے ہیں۔

ہائیڈروجنک ایندھن کے طور پر: جہ بی دار اشیاء اور نشاستہ دار اشیاء زندگی کو رواں دواں رکھنے کے لیے بطور ایندھن استعمال ہوتی ہیں۔ ہضم کرنے کے دوران ان اشیاء میں موجود کیمیائی توانائی حرارت میں تبدیل ہو کر ہمارے جسم کو گرم رکھتی ہے۔

بجلی کے کارخانوں میں: بجلی بنانے والے کارخانوں میں قدرتی گیس اور کوئلہ بطور ایندھن استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان اشیاء کے جلنے سے جو حرارت خارج ہوتی ہے اس سے سیم بنائی جاتی ہے جس سے ٹر بائن چلتی ہیں اور بجلی پیدا ہوتی ہے۔



آتش بازی

کار چلانے اور آتش بازی میں: کار چلانے کے دوران پٹرول یا ڈیزل ہوا کی مدد سے جلتے ہیں اور ان سے ملنے والی توانائی کار چلانے کا موجب بنتی ہے۔ ایکسو تھرمک ری ایکشنز کی ایک مثال جو لوگوں کے لیے تفریح مہیا کرتی ہے وہ آتش بازی کا استعمال ہے۔ آتش بازی کے دوران ایسی اشیاء جلائی جاتی ہیں جن سے حرارت، روشنی اور آواز پیدا ہوتی ہیں مختلف دھاتوں کے سائلس جب آکسائیڈنگ ایجنٹس (Oxidising Agents) کی موجودگی میں جلتے ہیں تو مختلف قسم کی رنگین روشنیاں نکلتی ہیں۔


مشق

1- سوڈیم میٹل اور پانی کے درمیان ری ایکشن اتنا تیز اور شدید کیوں ہوتا ہے؟

جواب: سوڈیم پانی کے ساتھ بہت تیزی سے ری ایکٹ کرتا ہے کیونکہ یہ بہت ری ایکٹیو الکی میٹل ہے جو پانی میں ہائیڈروجن آئن کو ایک الیکٹرون فراہم کرتی ہے جس


ری ایکٹنس کو ملانے سے پہلے ری ایکٹنس A اور B ملانے سے پہلے ان کے مالکیع ٹرانز انفرادی طور پر حرکت کر رہے تھے یہ نہ صرف آپس میں ٹکراتے تھے بلکہ جس برتن میں موجود تھے اس کی دیواروں سے بھی ٹکراتے تھے۔ ان مالکیع ٹرکی انرٹی ایک بھی نہیں تھیں۔ زیادہ تر مالکیع ٹرکی انرٹی اوسط تھیں جبکہ کچھ مالکیع ٹرکی انرٹی اوسط سے کم اور کچھ کی انرٹی اوسط سے زیادہ تھیں۔ جن مالکیع ٹرکی انرٹی اوسط سے زیادہ تھیں ان کو ایکسائٹڈ (Excited) مالکیع ٹر کہتے ہیں۔

ری ایکٹنس کو ملانے کے بعد: جب ان ری ایکٹنس کے مالکیع ٹر کو ملایا جاتا ہے تو یہ ایک دوسرے سے ٹکرانا شروع کر دیتے ہیں۔ جن مالکیع ٹرکی انرٹی اوسط یا اوسط سے کم ہوتی ہے ان کے ٹکرانے سے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ لیکن جب ایکسائٹڈ مالکیع ٹر آپس میں ٹکراتے ہیں تو یہ یقیناً ممکن ہے کہ وہ ٹرانزیشن سٹیٹ بنادیں۔



ری ایکٹنس سے ٹرانزیشن سٹیٹ کا بننا

بہت ہی مختصر وقت میں یہ ٹرانزیشن سٹیٹ یا توری ایکٹنس میں تبدیل ہو جاتی ہے یا پھر پراڈکٹس بنادیتی ہے۔



معروضی سوالات

نکمر تعلیم کی نئی امتحانی تکنیکس (Knowledge, Understanding, Application, Analytical & Conceptual) کی روشنی میں مرتب کیے گئے کثیر الانتخابی سوالات

سٹم اور سراؤنڈنگ + انتخابی

5.1+5.2

□ درست جواب کا انتخاب کریں۔

1- کسی مالکپول میں ذخیرہ شدہ انرجی کہلاتی ہے:

- (A) کیمیکل انرجی (B) ہیٹ انرجی (C) الیکٹرک انرجی (D) مکینیکل انرجی

2- ہاڈ بننے یا ٹوٹنے کے درمیان خارج یا جذب ہونے والی انرجی کہلاتی ہے:

- (A) کیمیکل انرجی (B) ہیٹ انرجی (C) پوٹینشل انرجی (D) کائینٹک انرجی

3- کیمسٹری کی کون سی شاخ کیمیکل ری ایکشنز کے دوران ہونے والی تبدیلیوں کے متعلق ہے؟

- (A) بائیو کیمسٹری (B) آرگینک کیمسٹری (C) فزیکل کیمسٹری (D) کیمیکل انرجیٹکس

4- وہ ری ایکشنز جن میں انرجی کا اخراج ہوتا ہے کہلاتے ہیں:

- (A) اینڈو تھرمل ری ایکشنز (B) کیمیکل ری ایکشنز (C) ایکسو تھرمل ری ایکشنز (D) اینابولک ری ایکشنز

5- وہ کیمیکل ری ایکشنز جن میں انرجی جذب ہوتی ہے، کہلاتے ہیں:

8- تھامس نے ”انرجی“ کا لفظ کب استعمال کیا:

- (A) 1902ء (B) 1702ء (C) 1802ء (D) 1602ء

9- ہیٹ کی پیمائش میں استعمال ہونے والے یونٹس ہیں:

- (A) m/sec (B) Kg/cm³ (C) Joules (D) m³

10- گاڑی چلانے کے دوران پٹرول کا جلنا مثال ہے:

- (A) ایکسو تھرمک ری ایکشنز (B) اینڈو تھرمک ری ایکشنز (C) ریڈیو سڈری ایکشنز (D) مینابولک ری ایکشنز

11- پانی کا برف میں تبدیل ہونا ہے:

- (A) اینڈو تھرمک پروسیس (B) ایکسو تھرمک پروسیس (C) کینابولک پروسیس (D) اینابولک پروسیس

12- آئل کی ہائیڈروجنیشن میں کینڈل سٹ کے طور پر کام کرتا ہے:

- (A) Na (B) Zn (C) Ni (D) Fe

13- گلوکوز کو ذخیرہ کیا جاتا ہے:

- (A) گلائیکوجن کی شکل (B) گلائیکوسائیڈ کی شکل (C) ہائیڈرولائس (D) ان میں سے کوئی نہیں

70 جوابات

(A) -10	(C) -9	(C) -8	(C) -7	(B) -6	(A) -5	(A) -4	(B) -3	(B) -2	(C) -1
							(A) -13	(C) -12	(B) -11

- 2- ہم تھرموڈائنامکس میں کیا مطالعہ کرتے ہیں؟
 جواب: تھرموڈائنامکس اس بات سے متعلق ہے کہ کیمیکل ری ایکشن کے دوران انرجی کی تبدیلیاں کیمیکل سسٹم کی خصوصیات کو کیسے متاثر کرتی ہیں۔
- 3- کیمیکل ری ایکشن کے دوران خارج ہونے والی انرجی کی کیا اہمیت (استعمالات) ہے؟
 جواب: کیمیکل ری ایکشن کے دوران خارج ہونے والی انرجی روزمرہ زندگی میں کھانا پکانے، روشنی، حرارت، نقل و حمل، مواصلات، تفریح اور بہت سے کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔
- 4- ایک بیکر میں پانی کا ابلا اینڈو تھرمک ری ایکشن ہے یا ایکسو تھرمک ری ایکشن اس سسٹم میں کس قسم کی انرجی منتقل ہوتی ہے؟
 جواب: ایک بیکر میں پانی کا ابلا ایک اینڈو تھرمک ری ایکشن ہے۔ اس سسٹم میں جو انرجی منتقل ہو رہی ہوتی ہے اسے ہیٹ انرجی کہتے ہیں۔
- 5- حرارت گرم جسم سے ٹھنڈے جسم میں کیوں منتقل ہوتی ہے؟
 جواب: حرارت انرجی کی ایک شکل ہے جو نیچے پرچ میں فرق کی وجہ سے گرم جسم سے ٹھنڈے جسم کی طرف منتقل ہوتی ہے۔
- 6- برف کا پگھلنا ایک اینڈو تھرمک تبدیلی ہے یا ایکسو تھرمک۔
 جواب: برف کا پگھلنا ایک اینڈو تھرمک تبدیلی ہے۔
- 7- H_2SO_4 کی تیاری میں استعمال ہونے والے کیپالسٹ کا نام بتائیں۔
 جواب: H_2SO_4 کی تیاری میں پلائیم کیپالسٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔
- 8- آئل کو بنا پستی گھی میں تبدیل کرنے کے لیے ہائیڈروجنیشن میں استعمال ہونے والے کیپالسٹ کا نام بتائیں۔
 جواب: تیل کو بنا پستی گھی میں تبدیل کرنے کے لیے Ni ایک کیپالسٹ کے طور پر کام کرتا ہے۔

(ج) ری ایکشن کا ایکسو تھرمل ہونا بانڈز بننے یا ٹوٹنے سے متعلق نہیں ہے۔





(د) یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ری ایکٹنٹس، پراڈکٹس سے زیادہ مستحیل ہیں۔

(vii) جب سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ کو ہائیڈروکلورک ایسڈ سے ملایا جاتا ہے تو سسٹم کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ری ایکشن:


(الف) اینڈو تھرمل ہے اور اس کی اینتھالپی چینج مثبت ہے۔ (ب) اینڈو تھرمل ہے اور اس کی اینتھالپی چینج منفی ہے۔

(ج) ایکسو تھرمل ہے اور اس کی اینتھالپی چینج مثبت ہے۔ (د) ایکسو تھرمل ہے اور اس کی اینتھالپی چینج منفی ہے۔

(viii) C-H بانڈز کی اوسط بانڈ ٹوٹنے کی انرجی 412 kJ mol^{-1} ہے۔ ذیل میں درج کون سے ری ایکشن کی اینتھالپی چینج 412 kJ mol^{-1} کے قریب ہوگی؟



(ix) O=O اور O-O بانڈز ٹوٹنے کی انرجیز بالترتیب 146 kJ mol^{-1} اور 496 kJ mol^{-1} ہیں۔ ذیل میں درج ری ایکشن کی اینتھالپی میں تبدیلی kJ میں نکالیں۔



+394kJ (د)

+350kJ (ج)

+102kJ (ب)


-102kJ (الف)

(x) ذیل میں دیا گیا اینڈو تھرمل ری ایکشن کیوں وقوع پذیر نہیں ہوتا۔

(ii) اس بات کی وضاحت کریں کہ ہوا میں موجود نائٹروجن اور آکسیجن عام حالات میں کیوں ری ایکشن نہیں کرتیں؟ لیکن آسمانی بجلی کی موجودگی میں یہ گیسوں کی ری ایکشن کر کے نائٹریک آکسائیڈ (NO) بناتی ہیں۔ لیکن جیسے ہی آسمانی بجلی چمکنا بند ہوتی ہے یہ ری ایکشن بھی ختم ہو جاتا ہے۔

جواب: نائٹروجن گیس ہوا میں نائٹروجن گیس کی نائٹروجن ری ایکٹیوٹی کی وجہ سے نائٹروجن کے دو ایٹمز کے درمیان ٹریپل کوویلنٹ بانڈ (N≡N) موجود ہے۔ اس بانڈ کی انرجی تقریباً 958.38 KJ/mole ہوتی ہے، اس لیے اسے توڑنا مشکل ہے۔ نائٹروجن آکسیجن کی ری ایکٹیوٹی کو کمزور کر دیتی ہے، اس لیے نائٹروجن عام حالات میں آکسیجن کے ساتھ ری ایکٹ نہیں کرتی۔

نائٹروجن صرف انتہائی سخت حالات میں ہی آکسیجن کے ساتھ ری ایکٹ کرتی ہے جیسے کہ بجلی چمکنے (لائٹنگ) کے دوران۔ بجلی زیادہ ری ایکٹیویشن انرجی فراہم کرتی ہے جو نائٹروجن گیس کو NO بنانے کے لیے درکار ہوتی ہے۔



جب بجلی رکتی ہے تو ری ایکشن بھی رک جاتا ہے، کیونکہ زیادہ ری ایکٹیویشن انرجی کے بغیر یہ ری ایکشن جاری نہیں رہ سکتا۔

(iii) قدرتی گیس یا سوئی گیس ہوا میں موجود آکسیجن سے کوئی ری ایکشن نہیں کرتی جب تک اسے دیا سلائی نہ دکھائی جائے۔ جب دیا سلائی دکھائی جاتی ہے تو ری ایکشن فوراً شروع ہو جاتا ہے اور اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک ری ایکٹنٹس میں سے ایک یا دونوں بالکل ختم نہیں ہو جاتے؟ وضاحت کریں۔

جواب: قدرتی گیس (CH₄) اور امونیاک آکسیجن کے درمیان ری ایکشن اس وقت نہیں ہوتا انہیں ملایا جاتا ہے، کیونکہ ری ایکشن شروع کرنے کے لیے درکار انرجی دستیاب نہیں ہوتی۔

باب 6

ایکولبریا

(Equilibria)


حاصلات تفہم:

اس باب میں آپ سیکھیں گے:

- ریورسیبل ری ایکشنز کو ایک خاص سہل سے ظاہر کیا جاتا ہے اور یہ کبھی مکمل نہیں ہوتے۔
- وضاحت کریں کہ کیمیکل ایکولبریم کی حالت میں اگر کسی ری ایکشن کی کنڈیشنز تبدیل کی جائیں تو دونوں سمتوں میں چلنے والے ری ایکشنز کیسے متاثر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر (a) اگر ہائیڈروجن کپروکسائیڈ کو گرم کیا جائے (b) این ہائیڈروس اشیا خاص طور پر کاپر (II) سلفائیڈ اور کوبالٹ (II) کلورائیڈ کو پانی میں ڈالا جائے۔
- ریورسیبل ری ایکشنز کو اگر بند برتن میں کیا جائے تو یہ ایکولبریم کی حالت پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر فارورڈ چلنے والی ری ایکشن ریورس چلنے والے ری ایکشن کا ریٹ برابر ہو جاتا ہے۔

انشائی طرز سوالات

تعلیم کی نئی امتحانی تکنیکس (Knowledge, Understanding, Application, Analytical & Conceptual) کی روشنی میں مرتب کیے گئے انشائی طرز سوالات



ڈائنامک ایکولبریم (Dynamic Equilibrium)

6.1

سوال 6: ڈائنامک ایکولبریم سے کیا مراد ہے؟ وضاحت کریں کہ اسے کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟

جواب: ڈائنامک ایکولبریم: ڈائنامک ایکولبریم ایک ایسی حالت ہے جہاں ریورسیبل ری ایکشن دونوں سمتوں میں ایک ہی رفتار سے ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر چہ ری ایکشن رک نہیں گیا لیکن ری ایکٹنٹس اور پراڈکٹس کی مقدار میں مجموعی طور پر کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔


وضاحت: اگر ایک ریورسیبل ری ایکشن شروع کرنے کے لیے ری ایکٹنٹس کو آپس میں ملایا جائے تو ری ایکشن پہلے صرف فارورڈ سمت میں چلے گا۔ کچھ عرصہ بعد جب پراڈکٹس کا ارتکاز کافی بڑھ جائے گا تو پھر یہ ری ایکشن ریورس سمت میں چلنا شروع ہوگا۔ یہ ری ایکشن دونوں سمتوں میں چلے گا جب تک کہ فارورڈ سمت میں چلنے والے ری ایکشن کاریت ریورس سمت میں چلنے والے کے ریٹ کے برابر نہ ہو جائے۔ دوسرے الفاظ میں ری ایکشن کا فارورڈ سمت میں چلنے کی وجہ سے ری ایکٹنٹس کے مالیکیولز کی تعداد جتنی کم ہوگی اتنے ہی یہ مالیکیولز ری ایکشن کی پچھلی سمت میں چلنے کی وجہ سے بن جائیں گے۔ پراڈکٹس کے مالیکیولز کے لیے بھی یہی صورت حال ہوگی۔ اس حالت میں ہم کہتے ہیں کہ ری ایکشن نے کیمیکل ایکولبریم کی حالت اختیار کر لی ہے۔ چونکہ اس حالت میں ری ایکٹنٹس اور پراڈکٹس کے مالیکیولز کا ارتکاز مستقل ہو جاتا ہے اس لیے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ری ایکشن بظاہر رُک گیا ہے۔ لیکن دراصل صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ ری ایکشن فارورڈ سمت میں بھی چل رہا ہے اور ریورس سمت میں بھی۔ ری ایکشن کے دونوں سمتوں میں چلنے کے ریش اس حالت میں برابر ہو جاتے ہیں اس لیے ری ایکشن کی اس حالت کو ڈائنامک ایکولبریم کہتے ہیں۔ اس حالت میں ری ایکٹنٹس اور پراڈکٹس

گی۔ ری ایکشن کی اس حالت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے شامل کی گئی نائٹروجن گیس ہائڈروجن گیس سے ری ایکشن کر کے امونیا بنادے گی۔ یہ ری ایکشن اُس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ ایکولبریم کی حالت دوبارہ نہ حاصل کر لے۔ اس ایکولبریم کی نئی حالت میں تمام ری ایکٹنٹس اور پراڈکٹس کے ارتکاز دوبارہ مستقل ہو جائیں گے۔ تاہم ارتکاز کی نئی قیمتیں پہلی قیمتوں سے مختلف ہوں گی۔

ری ایکشن کی ایکولبریم کی حالت کو دوبارہ ڈسٹرب کرتے ہیں اس طرح کہ اس میں اس سے امونیا گیس نکال لیتے ہیں۔ اس طرح امونیا گیس کا ارتکاز کم ہو جائے گا۔ ایکولبریم کی حالت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ نائٹروجن اور ہائڈروجن ری ایکٹ کر کے اور زیادہ امونیا بنائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایکولبریم کی حالت پر ہم پھر پہنچ جائیں گے لیکن اب ان سب ری ایکٹنٹس اور پراڈکٹس کا ارتکاز پہلے سے مختلف ہوگا۔


سوال 10: ایک ریوورسیبل ری ایکشن جب ایکولبریم کی حالت پر پہنچ چکا ہو تو اس پر ٹمپریچر میں تبدیلی کے کیا اثرات ہوں گے؟

جواب: ٹمپریچر میں تبدیلی کے ایکولبریم پر اثرات: امونیا گیس کا بننا ایک ایکسو تھرمک ری ایکشن ہے جبکہ اس کا تحلیل ہونا ایک اینڈو تھرمک ری ایکشن ہوگا۔




اگر درج بالا ری ایکشن ایکولبریم کی حالت پر آچکا ہے اور اس حالت پر اس کا ٹمپریچر بڑھایا جائے تو ایکولبریم کی حالت ڈسٹرب ہو جائے گی۔ اس ری ایکشن کی اینتھالپی چینج منفی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ری ایکٹنٹس کی ٹوٹل انرجی پراڈکٹس سے زیادہ ہے۔ ایکولبریم کی حالت پر ٹمپریچر کے بڑھنے سے ری ایکشن پیچھے کی سمت چلنا شروع ہو جائے گا جس سے ری ایکٹنٹس زیادہ بننے شروع ہو جائیں گے۔ دوسرے الفاظ میں امونیا کی تحلیل بڑھ جائے گی۔ حتیٰ کہ ری ایکشن ایکولبریم کی حالت پر دوبارہ پہنچ جائے گا۔ اسی طرح اگر ایکولبریم کی حالت حاصل کرنے کے بعد ری ایکشن کا ٹمپریچر کم کیا جائے گا تو ری ایکشن آگے کی طرف چلنا شروع ہو جائے گا اور امونیا زیادہ بنے گی۔

ایکشن کیا جاتا ہے تو کاربن مونو آکسائیڈ اور ہائیڈروجن بنتے ہیں۔ یہ پراڈکٹس پھر ایک ریورسبل ری ایکشن جسے کیا لیک میٹھانیٹیشن (Catalytic Methanation) کہتے ہیں، کے ذریعے مستحکم گیس بناتے ہیں۔



واٹر گیس



سوال 3: امونیا کی تیاری میں اس کی زیادہ مقدار حاصل کرنے کے لیے آپ کون سی کنڈیشنز استعمال کریں گے؟

جواب: امونیا کی زیادہ مقدار حاصل کرنے کے لیے درج ذیل کنڈیشنز استعمال کی جائیں گی:

(i) کم درجہ حرارت: کم درجہ حرارت امونیا کی پیداوار کو بڑھاتا ہے۔

(ii) زیادہ پریشر: امونیا کی تیاری میں گیسوں کے مولز کی تعداد کم ہوتی ہے لہذا زیادہ پریشر امونیا کی پیداوار کو بڑھاتا ہے۔

(iii) کیٹالسٹ کا استعمال: آئرن آکسائیڈ جیسا کیٹالسٹ استعمال کرنے سے ری ایکشن کی رفتار بڑھ جاتی ہے جس سے امونیا کی پیداوار میں

اضافہ ہوتا ہے۔

(iv) پروڈکٹ کو ہٹانا: امونیا کو مسلسل ہٹاتے رہنے سے ری ایکشن آگے کی طرف بڑھتا رہتا ہے، جس سے امونیا کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔

معروضی سوالات


- 2- جب سفید این ہائیڈرس سلفیٹ ماحول سے نمی جذب کرتا ہے تو اس کا رنگ بدل جاتا ہے:
- (A) سرخ (B) بنر (C) نیلے (D) سفید
- 3- ڈائنامک ایکولبریم پر:
- (A) ری ایکشن مزید نہیں ہو سکتا (B) ری ایکشن رک جاتا ہے
- (C) فارورڈ اور ریورس ری ایکشن کی رفتار برابر ہوتی ہے۔ (D) ان میں سے کوئی نہیں
- 4- ریورسیبل ری ایکشنز کو ظاہر کیا جاتا ہے:
- (A) $\rightarrow$ (B) $=$ (C) $\rightleftharpoons$ (D) $\Rightarrow$
- 5- جب ہائیڈریٹڈ کاپر سلفیٹ ($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) کو ہیٹ کیا جائے، تو اس کا رنگ بدل جاتا ہے:
- (A) سفید (B) بنر (C) سرخ (D) نیلے
- 6- ایک ارریورسیبل ری ایکشن میں، ڈائنامک ایکولبریم کب قائم ہوتا ہے؟
- (A) فوراً قائم ہو جاتا ہے (B) کبھی قائم نہیں ہوتا
- (C) ری ایکشن مکمل ہونے سے پہلے قائم ہو جاتا ہے (D) ری ایکشن مکمل ہونے کے بعد قائم ہوتا ہے
- 7- ڈائنامک ایکولبریم قائم کرنے کے لیے کیا شرط ہے؟
- (A) فارورڈ ری ایکشن کی رفتار، ریورس ری ایکشن کی رفتار کے برابر ہونی چاہیے۔
- (B) فارورڈ ری ایکشن کی رفتار، ریورس ری ایکشن سے کم ہونے چاہیے۔
- (C) فارورڈ ری ایکشن کی رفتار، ریورس ری ایکشن سے زیادہ ہونی چاہیے۔

- 4- ریورسبل ری ایکشن دونوں اطراف میں وقوع پذیر ہوتا رہے گا جب تک کہ فارورڈ ری ایکشن کا ریٹ ریورس ری ایکشن کے ریٹ کے برابر نہیں ہو جاتا۔ اس مرحلہ پر ہم کہتے ہیں کہ کیمیائی ری ایکشن کیمیکل ایکولبریم کی حالت کو پہنچ چکا ہے۔
- 5- چونکہ کیمیکل ایکولبریم کی حالت پر آ کر ری ایکشن بدستور فارورڈ اور ریورس سمتوں میں وقوع پذیر ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے اس حالت کو ڈائنامک ایکولبریم کہتے ہیں۔
- 6- ایک ریورسبل ری ایکشن ڈائنامک ایکولبریم کی حالت تک پہنچنے کے لیے جو وقت لیتا ہے اس کا انحصار ری ایکشن کی قسم پر اور ری ایکشن پر موجود کنڈیشنز پر ہے۔
- 7- ایکولبریم کی حالت پر پہنچے ہوئے ایک ریورسبل سسٹم کی یہ حالت کئی طرح سے ڈسٹرب کی جاسکتی ہے۔ اس کے لیے یا تو اس سسٹم میں موجود آپ ری ایکٹنٹس یا پراڈکٹس کے ارتکاز کو تبدیل کر دیں یا پھر اس حالت میں ری ایکشن کی کنڈیشنز کو تبدیل کر دیں۔ کنڈیشنز میں تبدیلی کے لیے آپ اس کا ٹمپریچر یا پریشر تبدیل کر سکتے ہیں یا پھر اس میں کیٹالسٹ ڈال سکتے ہیں۔

حل مشقی سوالات

- 1- صحیح جواب پر ٹک (✓) کریں۔
- (i) اگر فارورڈ اور ریورس سمتوں میں چلنے والے ری ری ایکشنز کے ریٹس زیادہ ہوں تو کیا ہوتا ہے۔
- (الف) ایکولبریم کی حالت تک ہم جلد پہنچ جائیں گے
- (ب) ایکولبریم کی حالت تک ہم دیر سے پہنچے گے
- (ج) ری ایکشن ایکولبریم کی حالت تک نہیں پہنچ پائے گا
- (د) ری ایکشن عملی طور پر ایک اور ریورسبل ری ایکشن ہو جائے گا
- (ii) ہوا میں موجود کون سی گیسیں بجلی چمکنے سے ری ایکشن کرتی ہیں۔
- (الف) N_2 اور H_2O (ب) O_2 اور H_2O (ج) CO_2 اور O_2 (د) N_2 اور O_2

(ii) ذیل میں درج ریورسبل ری ایکشن پر نمبر پچر بڑھانے کے کیا اثرات ہوں گے؟



جواب: ری ایکشن فارورڈ سمت میں جائے گا تا کہ زیادہ ہائیڈروجن اور آکسیجن پیدا ہوں گی۔


(iii) ایک ریورسبل ری ایکشن میں پراڈکٹس کی زیادہ سے زیادہ مقدار کیسے حاصل کی جاتی ہے؟

جواب: ایک ریورسبل ری ایکشن میں زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے ہمیں ری ایکشن کی شرائط کو زیادہ سے زیادہ پیداوار کے حق میں ایڈجسٹ کرنا ہوگا۔

مثال کے طور پر مصنوعات کی زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی پروڈکٹ بنے، ری ایکشن مکچر سے نکال دیا جائے۔ اس طرح پریشراور نمبر پچر کو بھی پروڈکٹ کے حق میں ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔

(iv) ایک ریورسبل ری ایکشن کو ایکولبریم کی حالت تک پہنچنے کے لیے جو وقت درکار ہے اس میں کیسے کمی لائی جاسکتی ہے؟

ذیل میں درج ری ایکشن پر پریشر بڑھانے سے کیا اثرات ہوں گے؟



جواب: ہم کیونسلٹ شامل کر کے ریورسبل ری ایکشن میں ایکولبریم حاصل کرنے کے وقت کو کم کر سکتے ہیں۔

ری ایکٹنٹس اور پروڈکٹس کے اطراف مولز کی تعداد ایک جیسی ہے۔ اس لیے دیے گئے ری ایکشن میں پریشر بڑھانے سے کوئی اثر نہیں ہوگا۔

3- تعمیری فکر پر مبنی سوالات (Constructed Response Questions)

(i) کچھ ری ایکشنز ریورسبل ہوتے ہیں اور کچھ ارریورسبل (irreversible) ایسا کیوں ہے؟

جواب: کچھ ری ایکشنز ریورسبل ہوتے ہیں جبکہ بعض دیگر ارریورسبل ہوتے ہیں۔ مثلاً ری ایکشن $\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O}$ ارریورسبل ہے جبکہ $\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2 + \text{O}_2$ ریورسبل ہے۔

باب 7

ایسڈ بیس کیمسٹری

(Acid Base Chemistry)

حاصلاتِ قلم:

اس باب میں آپ یکمیں گے:

- برونسڈ۔ لوری ایسڈ کو پروٹون ڈونر (Donor) اور برونسڈ۔ لوری بیس کو پروٹون ایکسپٹر (Acceptor) کے طور پر بیان کریں۔
- ایسڈ کے آبی محلول میں H^+ آئنز جبکہ الکلیز کے آبی سلوشن میں OH^- آئنز ہونے کی شناخت کریں۔
- ایک طاقتور ایسڈ اور بیس ایک ایسا ایسڈ اور بیس ہیں جو پانی میں مکمل طور پر آئیونائز ہو جاتے ہیں جبکہ کمزور ایسڈ اور بیس جو جزوی طور پر پانی میں آئیونائز ہوتے ہیں۔ (چند مثالیں جیسے کہ ہائڈروکلورک ایسڈ، سلفیورک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ اور اتھنوائک ایسڈ)۔
- پانی میں کسی ایسڈ یا بیس کے منقسم ہونے کی ایکویشن مرتب کریں۔
- اس بات کی شناخت کریں کہ میٹلز کے آکسائیڈز پانی میں حل ہونے والے بیس ہیں۔
- ایسڈز کی خصوصیات کو میٹلز، بیسز اور کاربونیٹس کے ساتھ ان کے ری ایکشنز کے لحاظ سے بیان کریں۔
- ایسڈز کے امونیم سالٹس کے ساتھ ری ایکشنز کے لحاظ سے بیسز کی خصوصیات کی نشاندہی کریں۔
- ایسڈز کی تعریف کریں۔
- تیزابی خصوصیات کی بنیاد پر ایسڈز کے اثرات بیان کریں۔

بیک آکسائیڈز کی دوسری مثالیں کیلشیم آکسائیڈ، زنک آکسائیڈ اور میگنیشیم آکسائیڈ ہیں۔

سوال 6: نیوٹرلائزیشن سے کیا مراد ہے؟ مثال دیں۔

جواب: ایسڈ اور بیسز کو ایک جیسی مقدار میں آپ میں ملانے سے یہ ایک دوسرے کے خواص زائل کر دیتے ہیں۔ اس ری ایکشن کو نیوٹرلائزیشن (Neutralization) کہتے ہیں اور اس کے نتیجہ میں سالٹ اور پانی بنتے ہیں۔



مشق

1- چند ایسے پھلوں کے نام بتائیں جن میں سرک ایسڈ پایا جاتا ہے؟

جواب: مندرجہ ذیل پھلوں میں سرک ایسڈ پایا جاتا ہے: (i) لیموں (ii) مالے

2- منرل ایسڈز ہمارے لیے کس طرح مفید ہیں؟

جواب: منرل ایسڈز کئی طریقوں سے ہمارے لیے مفید ہیں:

(i) منرل ایسڈز کئی صنعتی کاموں میں استعمال ہوتے ہیں۔

(ii) خوراک کی صنعت میں منرل ایسڈز ذائقہ بڑھانے والے ایجنٹس کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔

(iii) صفائی کے ایجنٹ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔

سوال 10: آرمینک ایسڈز کی آئیونائزیشن بیان کریں۔

جواب: آرمینک ایسڈز کی آئیونائزیشن: آرمینک ایسڈز پانی میں بہت کم تقسیم ہو کر آئنائز ہوتے ہیں اس لیے ان کو ایک ایسڈز (Weak Acids) کہا جاتا ہے۔
خالص لیسٹک ایسڈ صرف 0.132% آئیونائز ہوتا ہے۔




اس کا مطلب ہے کہ ایک ہزار لیسٹک ایسڈ کے مالیکیٹز میں سے صرف 1.32 مالیکیٹز آئیونائز ہوتے ہیں اور باقی مالیکیٹز ان آئیونائزڈی رہتے ہیں۔ اسی طرح 1.50 مولر اسیٹک ایسڈ (HCOOH) کی فیصد آئیونائزیشن صرف 1.06% ہے۔ جس کا مطلب ہے کہ 1000 مالیکیٹز میں سے 987 مالیکیٹز غیر آئیونائزڈ رہتے ہیں۔




سوال 11: سٹرونٹیم ہائیڈروآکسائیڈ اور کزنورسٹروم میں فرق کریں۔

جواب: سٹرونٹیم ہائیڈروآکسائیڈ اور پوٹاشیم ہائیڈروآکسائیڈ سٹرونٹیم ہائیڈروآکسائیڈ کی مثالیں ہیں کیوں کہ یہ بھی پانی میں مکمل طور پر آئیونائز ہو جاتی ہے۔





امونیم ہائیڈروآکسائیڈ (NH₄OH) اور ایلومینیم ہائیڈروآکسائیڈ (Al(OH)₃) کزنورسٹروم کی مثالیں ہیں کیوں کہ یہ پانی میں بہت کم آئیونائز ہوتی ہیں۔





تان ری ایکٹو میٹلز یعنی Pt , Au , Ag , Cu ایسڈز سے ری ایکٹ کر کے ہائڈروجن گیس نہیں بناتے۔

-III ایسڈز، میٹل کاربونیٹس اور ہائڈروجن کاربونیٹس کی تحلیل کر کے کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس بناتے ہیں۔




سوال 14: ہمز کے کیمیائی خواص بیان کریں۔

جواب: ہمز جو پانی میں حل ہو جاتی ہیں ان کو الکلیز کہتے ہیں۔ مثلاً NaOH اور KOH ، تاہم کیشیم ہائڈروآکسائیڈ Ca(OH)_2 پانی میں بہت کم حل

ہوتی ہے جبکہ Cu(OH)_2 عملی طور پر پانی میں حل نہیں ہوتی۔

ایسڈز سے ری ایکٹ کرنے کے علاوہ ہمز امونیم سالتس سے ری ایکٹ کر کے امونیا گیس بناتی ہیں۔






-ii میٹل آکسائیڈز کے ساتھ ری ایکشن: ایسڈز میٹل آکسائیڈز کے ساتھ ری ایکٹ کر کے سالٹ اور پانی بناتے ہیں۔



-iii میٹل آکسائیڈز کے ساتھ ری ایکشن: ایسڈز میٹل آکسائیڈز کے ساتھ ری ایکٹ کر کے سالٹ اور پانی بناتے ہیں۔





-iv میٹل کاربونیٹ کے ساتھ ری ایکشن: ایسڈز میٹل کاربونیٹس کے ساتھ ری ایکٹ کر کے سالٹ، پانی اور کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس بناتے ہیں۔



سوال 2: جب الکلیز ایسڈ اور امونیا سالٹس کے ساتھ ری ایکٹ کرتی ہیں تو کیا بناتی ہیں؟ متوازن کیمیائی مساوات کی مدد سے وضاحت کریں۔

جواب: ایسڈز: الکلیز ایسڈز کے ساتھ ری ایکٹ کر کے سالٹ اور پانی بناتی ہیں۔



سوال 3: ہائپر ایسڈیٹی سے کیا مراد ہے؟ یہ کیوں ہوتی ہے؟ اس بیماری کو کیسے کنٹرول کیا جاسکتا ہے؟

جواب: ہائپر ایسڈیٹی: معدے کی تیز ابیت یا ہائپر ایسڈیٹی بہت ہی عام بیماری ہے۔ اکثر اوقات یہ عمل اس وقت مسائل پیدا کرتا ہے جب معدہ میں ضرورت سے زیادہ ایسڈ بنتا ہے۔

وجوہات: یہ بیماری مصالحے دار خوراک اور چربی دار خوراک کے کھانے سے پیدا ہوتی ہے۔ اس قسم کی خوراک کھانے سے معدے میں ضرورت سے

- 17- جب ایسڈز میٹل آکسائیڈ کے ساتھ ری ایکٹ کرتے ہیں تو ہناتے ہیں:
- (A) سالٹ اور کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس (B) سالٹ اور پانی
(C) سالٹ اور ہائیڈروجن گیس (D) B اور C دونوں
- 18- جب میٹل کاربونیٹس، ایسڈز کے ساتھ ری ایکٹ کرتے ہیں تو کون سی گیس پیدا ہوتی ہے؟
- (A) کاربن ڈائی آکسائیڈ (B) ہائیڈروجن (C) نائٹروجن (D) آکسیجن
- 19- نمک اور پانی صرف تب ہی حاصل ہوتے ہیں جب ایسڈز ری ایکٹ کرتے ہیں:
- (A) میٹل کاربونیٹس کے ساتھ (B) میٹل ہائیڈرو آکسائیڈ کے ساتھ
(C) میٹل کے ساتھ (D) الکلیز کے ساتھ
- 20- پانی میں حل پذیر ہوسر کہلاتی ہیں:
- (A) الکلیز (B) میٹل کاربونیٹس (C) نان۔ میٹل آکسائیڈ (D) میٹل آکسائیڈ
- 21- جب بارش کے پانی کی pH کے درمیان 4.2 - 4.4 کے درمیان ہوتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے:
- (A) بیسک رین (B) ایسڈ رین (C) A اور B دونوں (D) ان میں سے کوئی نہیں
- 22- جب نان میٹلک آکسائیڈز ہوسر کے ساتھ ملتے ہیں تو ہناتے ہیں سالٹ اور.....
- (A) ہائیڈروجن گیس (B) کاربن ڈائی آکسائیڈ (C) پانی (D) آکسیجن گیس
- 23- جب NaHCO_3 سلفیورک ایسڈ کے ساتھ ری ایکٹ کرتا ہے تو کون سی گیس بنتی ہے؟
- (A) O_2 (B) H_2 (C) N_2 (D) CO_2
- 24- مندرجہ ذیل میں سے کون سی مضبوط الکلی ہے؟


7.3	بر آئن شیڈ۔ لوری کے ایسڈز اور بیسز کے بارے میں نظریات
7.4	ایسڈز اور بیسز کے خواص

9- بروئسڈ۔ لوری ایسڈز کی تعریف لکھیں۔

جواب: بروئسڈ۔ لوری کے مطابق ایسڈ وہ شے (مالیکیول یا آئن) ہے جو کسی دوسری شے کو پروٹون (H^+) دے سکتی ہے۔ مثلاً: HCl

10- مٹلک آکسائیڈز پر ایسڈز کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟

جواب: مٹلک آکسائیڈز ایسڈز اور پانی کے ساتھ ری ایکٹ کرتے ہیں:



11- ایسڈرین سے کیا مراد ہے؟

جواب: ایسی بارش جس کی pH 4.2-4.4 کے درمیان ہو تیزابی بارش یا ایسڈرین کہلاتی ہے۔

12- بروئسڈ۔ لوری بیسز سے کیا مراد ہے؟

جواب: بروئسڈ۔ لوری کے مطابق بیس وہ شے ہے جو کسی دوسری شے سے پروٹون (H^+) قبول کر سکتی ہے۔ مثلاً: OH^-

مختصر جوابی کنسیپچوئل (Conceptual) سوالات

□ مختصر جواب دیں۔

1- کچھ مادے جیسے لیموں اور دہی ذائقے میں کٹھے کیوں ہوتے ہیں؟

(v) پوٹاشیم ہائیڈروآکسائیڈ اور فاسفورک ایسڈ (H_3PO_4) کے درمیان نیوٹرلائزیشن ری ایکشن کے دوران پوٹاشیم ہائیڈروآکسائیڈ کے کتنے مالیکیولز فاسفورک ایسڈ کے ایک مالیکیول سے ری ایکٹ کریں گے؟

- (الف) 2 (ب) 1 (ج) 3 (د) 4

(vi) صابن کی تیاری کے دوران کون سا ایسڈ استعمال ہوتا ہے؟

- (الف) ٹارٹارک ایسڈ (ب) سٹرک ایسڈ (ج) سٹرک ایسڈ (د) آگزیلیک ایسڈ


(vii) جب SO_2 پانی میں حل ہوتی ہے تو کون سا کمپاؤنڈ بنتا ہے؟

- (الف) SO_3 (ب) H_2SO_3 (ج) H_2SO_4 (د) $H_2S_2O_7$

(viii) ذیل میں دی گئی اشیاء میں سے کس میں آگزیلیک ایسڈ پایا جاتا ہے؟

- (الف) ٹماٹر (ب) بالانا (ج) اٹلی (د) پھٹا ہوا دودھ

(ix) ذیل میں درج ری ایکشن میں کون سا آئن یا کمپاؤنڈ کا نیٹو جیسٹ ہیس کے طور پر حصہ لیتا ہے؟




- (الف) CH_3COOH (ب) H_2O (ج) CH_3COO^{-} (د) H_3O^{+}

(x) ایک کیمیکیل ری ایکشن جب وقوع پذیر ہوتا تو ایک گیس بنتی ہے جو سرخ ٹمپس پیپر کو نیلا کر دیتی ہے۔ ری ایکشن کی نشاندہی کریں؟

- (الف) ایسڈ اور میٹل کاربونیٹ کاری ایکشن (ب) ایسڈ اور امونیم سالٹ کاری ایکشن

- (ج) الکلی اور میٹل کاربونیٹ کاری ایکشن (د) الکلی اور امونیم سالٹ کاری ایکشن

$MgCO_3$: سفیدورک ایسڈ کے ساتھ ری ایکٹ کر کے $MgSO_4$ ، H_2O اور CO_2 بناتا ہے۔



(iv) جب ہم ایک ٹان مٹیلک آکسائیڈ سے ری ایکٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس ری ایکشن سے آپ ٹان مٹیلک آکسائیڈ کے خواص کے بارے میں کیا اندازہ لگائیں گے؟

جواب: جب ٹان مٹیلک آکسائیڈ ایسڈ کے ساتھ ری ایکٹ کرتے ہیں تو وہ سالٹ اور پانی بناتے ہیں۔
مثالیں:



ٹان مٹیلک آکسائیڈز کی انچھر: ٹان مٹیلک آکسائیڈ عام طور پر ایسڈ ہوتے ہیں کیونکہ جب یہ ہمیں کے ساتھ ری ایکٹ کرتے ہیں تو سالٹ اور پانی بناتے ہیں۔

(v) ڈرائی ہائیڈروجن کلورائیڈ گیس اور ہائیڈروکلورک ایسڈ کا پانی میں سلوشن دونوں ایسڈ کے خواص رکھتے ہیں۔ اس بات کی وضاحت کریں۔

جواب: ٹنگ HCl ایسڈک خصوصیت نہیں دکھاتی کیونکہ ٹنگ HCl میں ہائیڈروجن آئنز نہیں ہوتے لیکن ایسڈیٹی کے لیے پانی ضروری ہے۔ پانی میں HCl سلوشن: HCl پانی میں مکمل طور پر آئیونائز ہو کر بڑی تعداد میں ہائیڈروجن آئنز دیتا ہے۔ جو تمام ایسڈک خصوصیات کے ذمہ دار ہیں۔



(vi) ایسڈ اور اس کے کانجوگٹ ہیں میں کیا فرق ہے؟

سوال 2: پیریڈز سے کیا مراد ہے؟ پیریاڈک ٹیبل کے پیریڈز کی وضاحت کریں۔

جواب: پیریڈز: پیریاڈک ٹیبل میں موجود افقی قطاروں کو پیریڈز کہتے ہیں۔

پیریڈز کی تعداد: ٹیبل میں کل سات پیریڈز ہیں۔ پہلے پیریڈ کے علاوہ باقی سارے پیریڈز کا آغاز الکی میٹل سے اور اختتام نوبل کیسز سے ہوتا ہے۔ ایک پیریڈ کی تکمیل دراصل ایک ٹیل کی تکمیل ہے چونکہ کسی ٹیل میں موجود الیکٹرونز کی تعداد مخصوص ہوتی ہے اس لیے پیریڈ میں موجود الیمینٹس کی تعداد بھی مخصوص ہوگی۔

پیریاڈک ٹیبل میں پیریڈز

پیریڈ نمبر	پیریڈ کا نام	پیریڈ میں موجود عناصر کی تعداد	مکمل ہونے والے ٹیل کا نمبر
1	شورت (Short)	2	پہلا
2	نارمل (Normal)	8	دوسرا
3	نارمل (Normal)	8	تیسرا
4	لوگ (Long)	18	چوتھا
5	لوگ (Long)	18	پانچواں
6	دیری لوگ (Very long)	32	چھٹا
7	دیری لوگ (Very long)	32	ساتواں

سوال 6: گروپ نمبر اور ایلیمنٹس کے ایٹمز پر چار جز کا باہمی تعلق کیا ہے؟

جواب: جب ہم پیریاڈک ٹیبل میں بائیں سے دائیں چلیں تو مین گروپ ایلیمنٹس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے گروپ کے نمبر کے برابر الیکٹرون یا الیکٹرونز کھو کر کیانائز بنائیں۔ مثلاً گروپ 1 کے ایلیمنٹس + 1 آئز، گروپ 2 کے ایلیمنٹس + 2 آئز اور گروپ 3 کے ایلیمنٹس + 3 آئز بناتے ہیں۔ کیانائز پر چار جز کی تعداد ان ایلیمنٹس کے بیرونی شیلز میں موجود الیکٹرونز کی تعداد کے برابر ہے۔

جب ہم پیریاڈک ٹیبل میں اٹھارہویں گروپ سے بائیں طرف چلیں تو ایلیمنٹس اکثر اپنے گروپ نمبر کے برابر چار جز والے اینائز بناتے ہیں۔ گروپ کو نمبر دینا نو بل گیسوں کے گروپ کے بائیں طرف سے شروع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر گروپ 117 ایلیمنٹس (نو بل گیسوں سے بائیں طرف) ایک منفی چارج والے آئز بناتے ہیں۔ اسی طرح گروپ 16 کے ایلیمنٹس دو منفی چار جز والے آئز بناتے ہیں۔ ان آئز پر چار جز کی تعداد اتنی ہی ہے جتنے الیکٹرونز ان کو اپنے آکٹیٹس (octets) مکمل کرنے کے لیے درکار ہوتے ہیں۔

سوال 7: اٹامک ریڈیئس سے کیا مراد ہے؟ پیریاڈک ٹیبل میں اٹامک ریڈیئس کے رجحان کے وضاحت کریں۔

جواب: اٹامک ریڈیئس: اٹامک ریڈیئس دو ایٹمز کے نیوکلیائی کے درمیان فاصلے کے نصف کے برابر ہے جب ان دو ایٹمز کے درمیان کوویلنٹ بانڈ موجود ہو۔


نوٹ: اٹامک ریڈیئس کو پیکومیٹر میں ظاہر کیا جاتا ہے۔

جبکہ $1 \text{ pm} = 10^{-12} \text{ m}$ ہے۔

مثال: مثال کے طور پر دو کاربن ایٹمز جو آپس میں کوویلنٹ بانڈ بناتے ہیں ان کے نیوکلیائی کے درمیان فاصلہ 154 pm ہے۔ اس فاصلے کا نصف یعنی 77 pm کو کاربن ایٹم کی ریڈیئس کہتے ہیں۔ اسے کاربن ایٹم کا کوویلنٹ ریڈیئس بھی کہتے ہیں۔

پیریاڈک ٹیبل میں رجحان:

مثال: مثال کے طور پر جب فلورین ایٹم ایک الیکٹرون حاصل کرتا ہے تو -328 kJ mol^{-1} انرجی خارج ہوتی ہے۔



الیکٹرون افیلیٹی اور اٹامک سائز کے درمیان تعلق: الیکٹرون افیلیٹی کی ویلیوز کا تعلق بھی ایٹم کے سائز سے ہوتا ہے۔ ایٹم کا سائز جتنا چھوٹا ہوگا اتنا ہی نیوکلیس بیرونی شیل میں جذب ہونے والے الیکٹرون کو زیادہ قوت سے کھینچے گا اور الیکٹرون افیلیٹی کی ویلیوز بھی زیادہ ہوگی۔
پیریاڈک ٹیبل میں الیکٹرون افیلیٹی کا رجحان:

گروپ میں رجحان: پیریاڈک ٹیبل میں اوپر سے نیچے چلیں تو الیکٹرون افیلیٹی کی ویلیوز بتدریج کم ہوتی جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایٹم کا سائز اوپر سے نیچے بڑھتا ہے اور بیرونی شیل میں جذب ہونے والے الیکٹرون کو نیوکلیس کم شدت سے کھینچتا ہے جس سے خارج ہونے والی انرجی کم ہو جاتی ہے۔
گروپ 17 کے ہیلیمس کی الیکٹرون افیلیٹی ویلیوز

گروپ 1 کے عناصر	الیکٹرون افیلیٹی (kJ mol^{-1})
F	-328
Cl	-349
Br	-324.6
I	-295.2

پیریاڈ میں رجحان: اٹامک سائز کم ہونے کی وجہ سے بائیں سے دائیں جانب پیریاڈ میں الیکٹرون افیلیٹی کی ویلیوز بڑھتی ہیں۔

سوال 10: الیکٹرو نیگیٹیوٹی کی تعریف لکھیں نیز پیریاڈک ٹیبل میں اس کا رجحان بتائیں۔

(ii) کیا یہ ایلیمینٹ الیکٹرو پوزیٹو ہوگا یا الیکٹرو نیگیو؟

جواب: ایلیمینٹ الیکٹرو پازٹیو ہوگا۔

(iii) اس کے آکسائیڈ کی نوعیت کیا ہوگی؟

جواب: یہ بیسک ہوگا۔

(iv) یہ ایلیمینٹ کسی طبعی حالت میں اپنا وجود برقرار رکھتا ہے؟

جواب: یہ ٹھوس حالت میں اپنا وجود برقرار رکھتا ہے۔

2- سب سے زیادہ اٹامک ریڈیئس رکھنے والا ایلیمینٹ کس گروپ اور کس پیریڈ میں ہوگا؟

جواب: سب سے زیادہ ریڈیئس رکھنے والا ایلیمینٹ گروپ 1 اور پیریڈ 7 سے ہوگا۔

3- کیا آپ سب سے زیادہ الیکٹرو نیگیو اور سب سے زیادہ الیکٹرو پوزیٹو ایلیمینٹ کے گروپ نمبر کی نشاندہی کر سکتے ہیں؟

جواب: سب سے زیادہ الیکٹرو پازٹیو ایلیمینٹ گروپ 1 اور سب سے زیادہ الیکٹرو نیگیو ایلیمینٹ گروپ 17 سے ہوگا۔

4- ذیل میں درج ایلیمینٹس میں سے کون سے ایلیمینٹ کی آئیونائزیشن انرجی سب سے کم ہوگی اور کس ایلیمینٹ کی الیکٹرون افینٹیٹی سب سے زیادہ ہوگی۔ نیز

اس ایلیمینٹ کے گروپ اور پیریڈ کا نمبر بھی معلوم کریں۔

Li, K, O, F, Cl

جواب: سب سے کم آئیونائزیشن انرجی والا ایلیمینٹ K =

سب سے زیادہ الیکٹرون افینٹیٹی والا ایلیمینٹ F =

5- پیریڈک ٹیبل کے کون سے دو ایلیمینٹس ری ایکٹ کر کے بناتے ہیں۔

(ii) ایک ایسڈک آکسائیڈ

(i) ایک بیسک آکسائیڈ

- 7- مٹلو کے گروپ کو کہا جاتا ہے:
- (A) ہیلوجنز (B) الکالائن ارتھ مٹلو (C) الکی (D) ان میں سے کوئی نہیں
- 8- 17 ایلیمنٹس کے گروپ کو عام طور پر کہا جاتا ہے:
- (A) ہیلوجنز (B) الکی مٹلو (C) نوبل گیسز (D) کاربن فیملی
- 9- گروپ 4 کے ایلیمنٹس کو کہا جاتا ہے:
- (A) ٹرانزیشن فیملی (B) کاربن فیملی (C) ہیلوجنز (D) ان میں سے کوئی نہیں
- 10- نوبل گیسز کس گروپ میں موجود ہوتی ہیں؟
- (A) 1 (B) 17 (C) 18 (D) 13

ہیراڈاک ٹیبل کے گروپ میں ایلیمنٹس کے کیمیکل خواص میں مماثلت

8.3

- 11- ایلیمنٹس کی کیمیکل خصوصیات کس ٹیبل میں الیکٹرونز کی تعداد پر منحصر ہیں؟
- (A) پہلے ٹیبل (B) دوسرے ٹیبل (C) سب سے بیرونی ٹیبل (D) (A) اور (B) دونوں
- 12- گروپ 1 مٹلو کے بیرونی ٹیبل میں کتنے الیکٹرونز موجود ہوتے ہیں؟
- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 13- مندرجہ ذیل میں سے کس گروپ کو الکی مٹلو کہا جاتا ہے؟

- 5- نوپل گیسوں کے سب سے بیرونی شیل کی الیکٹرانک کنفیگریشن کی نشاندہی کرتا ہے:
- (A) ns^2np^6 (B) ns^2np^5 (C) ns^2np^4 (D) ns^2np^1
- 6- گروپ 13 کے ایلیمینٹس کو کہا جاتا ہے:
- (A) بورون فیملی (B) ٹائٹروجن فیملی (C) کاربن فیملی (D) آکسیجن فیملی
- 7- گروپ 1 کے ایلیمینٹس کے بیرونی شیل میں الیکٹرونز کی تعداد ہے:
- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 1
- 8- کس گروپ کے ایلیمینٹس کو ڈائی پوزیٹو آکسز کہا جاتا ہے؟
- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 9- کونسا ایلیمینٹ ڈائی ٹیکسٹو آئن بناتا ہے؟
- (A) آکسیجن (B) کلورین (C) سوڈیم (D) میگنیشیم
- 10- گروپ 16 کے ایلیمینٹس کو اپنا آکائیڈ مکمل کرنے کے لیے کتنے الیکٹرونز کی ضرورت ہوتی ہے؟
- (A) 6 (B) 7 (C) 2 (D) 1
- 11- ایک پیکومیٹر برابر ہے:
- (A) $10^{12}m$ (B) $10^{-12}m$ (C) $10^{-6}m$ (D) 10^6m
- 12- کاربن ایٹم کا کوویلنٹ ریڈیوس ہے:
- (A) 154pm (B) 145pm (C) 77pm (D) 7pm

14- پیریڈ میں میٹلک کریکٹر کارحان کیا ہے؟

جواب: پیریڈ میں بائیں سے دائیں جانب میٹلک کریکٹر کم ہوتا ہے۔

15- پیریڈ میں میٹلک کریکٹر کم کیوں ہوتا ہے؟

جواب: پیریڈ میں دائیں سے بائیں جانب ایٹمک سائز کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے میٹلک کریکٹر کم ہوتا ہے۔

16- الیکٹرونیکلویٹی سے کیا مراد ہے؟

جواب: الیکٹرونیکلویٹی: کسی ایٹم کی مالیکول میں موجود اشتراک شدہ الیکٹرون ہینز کو اپنی طرف کھینچنے کی صلاحیت کو الیکٹرونیکلویٹی کہتے ہیں۔

17- الیکٹرون آفینٹیٹی کی تعریف لکھیں۔

جواب: کسی ایلیمنٹ کے آزاد کسی ایٹم کے ویلنس شیل میں الیکٹرون حاصل کرنے کے سبب خارج ہونے والی انرجی کو الیکٹرون آفینٹیٹی کہتے ہیں۔



مختصر جوابی کنسیپچوئل (Conceptual) سوالات

□ مختصر جواب دیں۔

1- جدید پیریڈک ٹیبل میں ایلیمنٹس کو کیسے ترتیب دیا گیا ہے؟

جواب: جدید پیریڈک ٹیبل بڑھتے ہوئے ایٹمک نمبر کے مطابق ایلیمنٹس کی ترتیب پر مبنی ہے۔

(iii) کوئی میٹل سب سے نرم ہے؟

Na (الف) Ca (ب) Al (ج) Zn (د)

(iv) ایک پیلے رنگ کا ٹھوس ایلمنٹ جس کی ایلیٹراپک اشکال بھی ہیں اور جو فول فلز میں بھی موجود ہے اس کا نام کیا ہے؟

(الف) کاربن (ب) آئیوڈین (ج) ایلیومینیم (د) سلفر

(v) ٹائٹروجن کا ایٹم اپنے بیرونی شیل میں کتنے الیکٹرونز حاصل کر سکتا ہے؟

2 (الف) 3 (ب) 4 (ج) 5 (د)

(vi) کون سا ایلمنٹ سب سے زیادہ ری ایکٹیو ہے؟

(الف) آکسیجن (ب) کلورین (ج) فلورین (د) ٹائٹروجن

(vii) کون سے ایلمنٹ کا میلنگ پوائنٹ سب سے زیادہ ہے؟

Na (الف) K (ب) Rb (ج) Cs (د)

(viii) دوسرے گروپ میں میٹلک آرڈر کیسے تبدیل ہوتا ہے؟

Mg > Ca > Ba > Sr (الف) Sr > Ba > Ca > Mg (ب)

Mg > Sr > Ca > Ba (ج) Ba > Sr > Ca > Mg (د)

(ix) ذیل میں درج کون سا آرڈر آکسیجن، فلورین اور ٹائٹروجن کے ایٹمک ریڈیئس کے بارے میں صحیح ہے؟

O < F < N (الف) N < F < O (ب) F < O < N (ج) O < N < F (د)

(ii) پیریاڈک ٹیبل کا پہلا ایلمنٹ کون سا ہے؟ کیا یہ الیکٹران کھوتا ہے یا حاصل کرتا ہے؟

جواب: پیریاڈک ٹیبل کا پہلا ایلمنٹ ہائیڈروجن ہے۔ اس کے بیرونی شیل میں ایک الیکٹرون ہوتا ہے۔ یہ کیمیائی ماحول کے لحاظ سے H^+ (میلز کی طرح) بننے کے لیے ایک الیکٹرون کو خارج کر سکتا ہے یا H^- (نان میلز کی طرح) بننے کے لیے ایک الیکٹرون حاصل کر سکتا ہے۔

(iii) بورون اور ایلومینیم کے اٹامک ریڈیسیں بالترتیب 88pm اور 128pm ہیں۔ کون سا ایلمنٹ الیکٹرون یا الیکٹرونز آسانی سے کھو دے گا؟

جواب: ایلومینیم زیادہ آسانی سے الیکٹرون خارج کر دے گا کیونکہ اس کا اٹامک ریڈیوس (125pm) زیادہ ہے۔ اٹامک ریڈیوس جتنا بڑا ہوگا، نیوکلئیس اور بیرونی الیکٹرونز کے درمیان کشش اتنی ہی کمزور ہوگی، جس سے الیکٹرون الیکٹرونز کو خارج کرنا آسان ہوگا۔

(iv) آپ کسی ایٹم کا ریڈیوس کیسے معلوم کریں گے؟

جواب: دو جڑے ہوئے ایٹم کے نیوکلئیائی کے درمیان فاصلے کا نصف اس ایٹم کا اٹامک ریڈیوس ہوگا۔ سائنس دان اس فاصلے کو درست طریقے سے ناپنے کے لیے X-ray ڈیفریکشن اور سپیکٹروسکوپ جیسی تکنیکوں کا استعمال کرتے ہیں۔

(v) نائٹروجن تو تین الیکٹرونز جذب کر کے N^{3-} بنا دیتی ہے آکسیجن کیوں ایسا نہیں کر سکتی؟

جواب: آکسیجن کے پاس چھ ویلنس الیکٹرونز ہوتے ہیں، اس لیے تین الیکٹرونز قبول کرنے کے نتیجے میں بیرونی شیل میں 9 الیکٹرونز ہو جائیں گے جو کہ مستحکم آکٹیٹ رول سے تجاوز کر جائے گا۔ یہ بہت زیادہ الیکٹرون، الیکٹرون ری پلشن پیدا کرے گا جس سے O^{3-} غیر مستحکم ہو جائے گا۔ نائٹروجن 5 ویلنس الیکٹرونز کے ساتھ ایک مستحکم N^{3-} آئن بنانے کے لیے 3 الیکٹرون قبول کر سکتا ہے۔

تفصیلی سوالات

4-

(i) پیریاڈک ٹیبل میں کسی ایلمنٹ کو تلاش کرنے کے لیے کون سی معلومات کا ہونا ضروری ہے اگر اس کے اٹامک نمبر کا آپ کو پتہ نہیں ہے۔ کیا

اس کا اٹامک ماس آپ کی مدد کر سکتا ہے؟

باب 9

گروپ کی خصوصیات اور ایلیمینٹس

(Group Properties and Elements)

حاصلات لقلم:

اس باب میں آپ سیکھیں گے:

- گروپ 1 میں موجود الکی میٹلز کے بارے میں بتائیں کہ یہ نرم میٹلز ہیں۔ اس گروپ میں جب ہم اوپر سے نیچے آتے ہیں تو ایلیمینٹس کے میلنگ پوائنٹس کم ہوتے جاتے ہیں جبکہ ان کی ڈینسٹی اور ری ایکٹیویٹی کی ویلیوز بڑھتی چلی جاتی ہیں۔
- گروپ 1 میں موجود ایلیمینٹس کی خصوصیات کا احاطہ کریں۔ (گروپ 1 کے ایلیمینٹس کے بارے میں معلومات دیے جانے پر دیگر ایلیمینٹس کی خصوصیات کی پیش گوئی کریں۔)
- گروپ 1 کے ایلیمینٹس کی خصوصیات کو مناسب معلومات کی بنیاد پر ان کی ری ایکٹیویٹی کی ترتیب میں پیش گوئی کریں۔ گروپ 1 میں موجود ایلیمینٹس کی ری ایکٹیویٹی میں درجہ بندی کے بارے میں بتائیں۔
- گروپ 17 ہیلوجنز کو ڈائی اٹامک نان میٹلز کے طور پر بیان کریں۔ ان کی ڈینسٹی کے بڑھنے کے رجحان کے بارے میں بتائیں نیز ان کی ری ایکٹیویٹی میں کمی کے رجحان کے بارے میں بھی بتائیں۔
- کمرے کے درجہ حرارت پر ہیلوجنز کی کسی نظر آتی ہیں مثال کے طور پر فلورین ہلکی پیلے رنگ کی گیس ہے جبکہ کلورین کا رنگ ہلکا سبز ہے۔ برومین

قوت بتدریج کم ہوتی ہے۔ اس وجہ سے جیسے جیسے ہم نیچے آتے ہیں میلٹرو بتدریج نرم ہوتی جاتی ہیں جس سے ان کے میلٹنگ پوائنٹس کم ہوتے جاتے ہیں۔
ڈینسٹی: اسی طرح گروپ میں اوپر سے نیچے کی طرف ایٹمز کے سائز اور حجم دونوں بڑھتے ہیں لیکن چونکہ الیمینٹس کے ماسسز میں اضافہ زیادہ ہوتا ہے اس لیے ان کی ڈینسٹی میں بتدریج اضافہ ہوتا ہے۔

Cs	Rb	K	Na	Li	ٹیل
28	39	64	98	180	میلٹنگ پوائنٹ °C
1.87	1.53	0.86	0.97	0.53	ڈینسٹی g/cm ³

سوال 4: ہیلوجنز کی فزیکل اور کیمیکل خصوصیات لکھیں۔

جواب: ہیلوجنز: گروپ 17 کے الیمینٹس کو عام طور پر ہیلوجنز کہا جاتا ہے۔

بیرونی شیل میں الیکٹرونز کی تعداد: گروپ 17 میں شامل تمام الیمینٹس کے بیرونی شیلز میں 7 الیکٹرونز (ns^2p^5) ہوتے ہیں۔

الیکٹرونیکوٹان میلٹرو: گروپ 17 کے تمام الیمینٹس الیکٹرونیکوٹان میلٹرو ہیں۔ کیونکہ ان میں ایک الیکٹرون حاصل کر کے اینائن بنانے کا

رجحان بہت زیادہ ہوتا ہے۔

گروپ 17 (ہیلوجنز) کی فزیکل خصوصیات: گروپ 17 کے الیمینٹس ڈائی اٹامک مالیکیولز کی صورت میں اپنا وجود برقرار رکھتے ہیں۔ اٹامک

ریڈیس، میلٹنگ اور بوائیٹنگ پوائنٹس اوپر سے نیچے گروپ میں بتدریج بڑھتے ہیں۔

وجہ: الیمینٹس کے ایٹمز میں موجود شیلز میں الیکٹرونز بڑھتے رہتے ہیں۔ جن سے ان کے سائز بھی بڑھتے ہیں۔ جب یہ ایٹمز آپس میں مل کر

مالیکیولز بناتے ہیں تو ان کے سائز بھی بتدریج بڑھتے جاتے ہیں۔ چونکہ بڑے سائز کے مالیکیولز کے درمیان کشش کی قوت زیادہ ہوتی ہے اس لیے

ٹرانزیشن ایلیمینٹس کی خصوصیات (Group Properties of Transition Elements)	9.3
نوبل گیسوں کے خواص (Properties of Nobles Gases)	9.4
میٹلز اور نان میٹلز کی طبعی خصوصیات (Physical Properties of Metals and Non Metals)	9.5

سوال 7: ٹرانزیشن ایلیمینٹس سے کیا مراد ہے؟ ان کی خصوصیات اور اہمیت لکھیں۔
 جواب: ٹرانزیشن ایلیمینٹس: جدید پیراڈک ٹیبل کے درمیان میں گروپ 3 سے گروپ 12 میں موجود ایلیمینٹس کو d بلاک یا ٹرانزیشن ایلیمینٹس کہتے ہیں۔
 طبعی خصوصیات: تمام ٹرانزیشن ایلیمینٹس میٹلز ہیں اور ان کی خصوصیات آپس میں ملتی جلتی (ایک جیسی) ہے۔

- ٹرانزیشن ایلیمینٹس عموماً سخت ہوتے ہیں۔
- ان کی ڈینسٹی، میلنگ اور بوائونگ پوائنٹس بھی زیادہ ہیں۔
- یہ میٹلز مختلف آکسائیڈیشن سٹیٹس میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔
- ان کے کمپاؤنڈز اکثر رنگدار ہوتے ہیں۔
- یہ میٹلز میلبل اور ڈکٹائل ہوتی ہیں۔

- (v) نان میٹلز کے ایٹمز کے درمیان الیکٹرونز آزاد نہیں گھوم سکتے اس لیے یہ بجلی اور حرارت کے کنڈکٹرز نہیں ہوتے۔
- (vi) نان میٹلز کو پالش کرنا ممکن نہیں ہے یہ یا تو پاؤڈرز کی شکل میں ملتے ہیں یا پھر کیسز ہیں۔
- (vii) زیادہ تر نان میٹلز کے پاؤڈر غیر چمکدار ہوتے ہیں۔
- (viii) ڈکٹیلیٹی یا ملیا بیٹی ممکن نہ ہونے کی وجہ سے نان میٹلز مضبوط نہیں ہوتیں۔
- (ix) ان کے بانڈز کمزور ہونے کی وجہ سے آسانی سے ٹوٹ جاتے ہیں۔
- (x) تمام نان میٹلز کے میلنگ اور بوائٹنگ پوائنٹس کم ہوتے ہیں سوائے گریفائٹ اور ڈائمنڈ کے۔
- (xi) نان میٹلز کی ڈینسٹی کی ویلیوز میٹلز کے مقابلے میں کم ہوتی ہیں۔
- (xii) آکسیجن، نائٹروجن، کلورین، سلفر، کاربن اور برومین وغیرہ نان میٹلز کی چند مثالیں ہیں۔
- سوال 12: میٹلز اور نان میٹلز کے خواص کا موازنہ کریں۔

جواب:

میٹلز اور نان میٹلز کے طبعی خواص کا موازنہ

Comparison of the Physical Properties of Metals and Non-metals

نان میٹلز	میٹلز
نان میٹلز عام درجہ حرارت پر ٹھوس مائع اور گیس کی حالتوں میں پائی جاتی	عام طور پر میٹلز کے میلنگ اور بوائٹنگ پوائنٹس کافی زیادہ ہوتے ہیں۔

4- لیٹھیم کا میلنگ پوائنٹ ہے:

180°C (D)

39°C (C)

64°C (B)

98°C (A)

5- ہیلوجن کس گروپ کا نام ہے:

(D) گروپ 12 پٹیمنٹس

(C) گروپ 11 پٹیمنٹس

(B) گروپ 17 پٹیمنٹس

(A) گروپ VI پٹیمنٹس

6- تمام ہیلوجنز موجود ہوتے ہیں:

(B) ٹرائی اٹامک مالیکیولز کے طور پر

(A) ڈائی اٹامک مالیکیولز کے طور پر

(D) a اور b دونوں

(C) مونو اٹامک مالیکیولز کے طور پر

7- مندرجہ ذیل میں سے کون سا ہیلوجن ہے؟

O₂ (D)

Cl₂ (C)

Ca (B)

Na (A)

8- الیکٹرونز کا اخراج کہلاتا ہے:

(D) b اور c دونوں

(C) ہائیڈرولائس

(B) ریڈکشن

(A) آکسیدیشن

9- ہیلوجنز کا اٹامک ریڈیئس:

(B) گروپ میں نیچے کی جانب بڑھتا ہے

(A) گروپ میں نیچے کی جانب کم ہوتا ہے

(D) ان میں سے کوئی نہیں

(C) پیریڈ میں دائیں سے بائیں جانب کم ہوتا ہے

10- الیکٹرونز حاصل کرنے کو کہتے ہیں:

- 5- مندرجہ ذیل میں سے کس گروپ کے ایلیمینٹس کو الیکٹرو نیگٹوٹان میٹلو کہا جاتا ہے؟
 (A) گروپ 3 (B) گروپ 17 (C) گروپ 18 (D) گروپ 2
- 6- کس گیس کا رنگ زرد ہوتا ہے؟
 (A) برومین (B) آئیوڈین (C) فلورین (D) کلورین
- 7- میٹلو ہیلائیڈز عام طور پر ہوتے ہیں:
 (A) آئیونک کپاؤنڈز (B) کوویلنٹ کپاؤنڈز (C) ڈبل کوویلنٹ کپاؤنڈز (D) کوآرڈی نیٹ کوویلنٹ کپاؤنڈز
- 8- کون سا ہیلوجن چمکدار سرخی کرٹل کے طور پر موجود ہوتا ہے: جو گرم ہونے پر آسانی سے گہرے جامنی بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے؟
 (A) فلورین (B) کلورین (C) برومین (D) آئیوڈین
- 9- سوئمنگ پول کے پانی کو کیسے سٹر یلائز (جراثیم سے پاک) کیا جاتا ہے؟
 (A) فلورین (B) کلورین (C) آئیوڈین (D) برومین
- 10- کون سی میٹلو ریکٹس کپاؤنڈز بناتی ہیں؟
 (A) ٹرانزیشن میٹلز (B) الکی میٹلز (C) الکلائن ارتھ میٹلز (D) ٹان میٹلز
- 11- مہر کے عمل میں کیا لسٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے:
 (A) Ni (B) C (C) Co (D) Fe
- 12- تیل کی ہائیڈرو جینیشن کے لیے کون سی میٹل بطور کیا لسٹ استعمال ہوتی ہے؟
 (A) Fe (B) Ni (C) CO (D) Zn
- 13- ٹان میٹلو ناقص کنڈکٹر ہوتی ہیں سوائے:

- 13- ہمد کے پراس میں کون سا ایلیمنٹ بطور کیٹالسٹ استعمال ہوتا ہے؟
جواب: ہمد کے پراس میں آرن بطور کیٹالسٹ استعمال ہوتا ہے۔
- 14- نوبل گیسز سے کیا مراد ہے؟
جواب: نوبل گیسز: جدید پیریاڈک ٹیبل کے گروپ 18 میں موجود ایلیمنٹس کو نوبل گیسز کہا جاتا ہے۔ مثلاً ہیلیم۔
- 15- ہیلیم کی الیکٹرونک کنفیگریشن لکھیں۔
جواب: ہیلیم کی الیکٹرونک کنفیگریشن $1s^2$ ہے۔
- 16- کوئی سی دو نوبل گیسز کے نام لکھیں۔
جواب: (i) ہیلیم (ii) نیون
- 17- سلیفورک ایسڈ کی تیاری کے لیے کون سا پروکس استعمال ہوتا ہے؟
جواب: سلیفورک ایسڈ کی تیاری کے لیے کنٹیکٹ کا پروکس استعمال ہوتا ہے۔
- 18- امونیا کی تیاری کے لیے کون سا پروکس استعمال ہوتا ہے؟
جواب: امونیا کی تیاری کے لیے ہمد پروکس استعمال ہوتا ہے۔
- 19- امونیا کا ایک استعمال لکھیں۔
جواب: امونیا یوریا کھاد تیار کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
- 20- امونیا کی تیاری کے لیے کیمیکل ایکویشن لکھیں۔

- 3- گروپ 1 میں موجود الیمینٹس کے اناک سائز میں اضافے کی وجہ سے موجود ایٹمز کے مابین کشش اوپر سے نیچے بتدریج کم ہو جاتی ہے۔ جس کی وجہ سے یہ الیمینٹس بتدریج نرم ہو جاتے ہیں اور ان کے میلنگ پوائنٹس بھی کم ہو جاتے ہیں۔
- 4- ایٹمز کے سائز اور حجم میں اضافے کے باعث الکی میلز کی ڈینسٹی گروپ میں اوپر سے نیچے بڑھتی ہے۔
- 5- گروپ 17 الیمینٹس یا ہیلوجنز ڈائی اناک مالیکیولز کے طور پر موجود ہوتے ہیں۔ یہ انتہائی ری ایکٹو نان میلز ہیں جو الکی اور الکلائن ارتھ میلز کے ساتھ ری ایکٹ کرتے ہیں۔
- 6- ہیلوجنز آکسی ڈائزنگ ایجنٹس ہیں اور ان کی آکسی ڈائزنگ طاقت (Oxidizing Power) گروپ میں اوپر سے نیچے کم ہوتی جاتی ہے۔
- 7- گروپ 17 میں جیسے جیسے نیچے کی جانب بڑھتے ہیں ہائڈروجن اور ہیلوجنز کا بانڈ کمزور ہوتا جاتا ہے۔ اسی لیے گروپ میں نیچے آنے سے ہائڈروجن ہلائڈز کی تھرمل سٹیبلٹی کم ہو جاتی ہے۔
- 8- d بلاک کے الیمینٹس یا ٹرانزیشن الیمینٹس سب میلز ہیں۔ عام طور پر یہ میلز سخت ہوتی ہیں اور ان کی ڈینسٹی ویلیوز بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ان الیمینٹس اور ان کے کمپاؤنڈز کو بطور کیٹالسٹ استعمال کیا جاتا ہے۔
- 9- تمام نوبل گیسز نان ری ایکٹو ہیں کیونکہ ان کے بیرونی شیلز مکمل ہیں۔
- 10- میلز اور نان میلز کی فزیکل خصوصیات میں بہت فرق ہے۔

حل مشقی سوالات

- 1- صحیح جواب پر ٹک (✓) کریں۔
- (i) کون سا ہیلوجن الکلائن ارتھ میلز کے ساتھ سب سے آہستہ ری ایکٹ کرے گا؟

(iii) عام طور پر مٹلو ٹھوس جبکہ نان مٹلو عموماً مائع اور گیس حالت میں پائی جاتی ہیں کیوں؟

جواب: مٹلو میں آزاد حرکت کرنے والے الیکٹرونز کی وجہ سے مضبوط میلک بانڈز موجود ہوتے ہیں جو انہیں روم ٹمپرچر پر ٹھوس بناتے ہیں۔ نان مٹلو میں کمزور انٹر مالیکیولر فورسز موجود ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سی نان مٹلو کیسز یا کمزور ٹھوس حالت میں پائی جاتی ہیں۔

(iv) ہیریڈک ٹیبل میں سے کوئی سے تین ایلیمینٹس کے نام بتائیں جو مائع حالت میں پائے جاتے ہیں۔

جواب: مرکری (Hg) • برومین (Br) • گیلیم (Ga)

(v) ٹرانزیشن ایلیمینٹس نارمل ایلیمینٹس سے کیوں مختلف ہوتے ہیں؟

جواب: ٹرانزیشن ایلیمینٹس میں جزوی طور پر بھرے ہوئے d آر بیٹلز ہوتے ہیں جو انہیں منفرد خصوصیات دیتے ہیں جیسے کہ ویری-ہبل آکسائیڈیشن سٹیٹس، رنگین کمپاؤنڈز کی تشکیل اور کیوبک روپ۔

(vi) کلورین اور برومین کا بطور آکسیڈائزنگ ایجنٹ موازنہ کریں۔

جواب: کلورین برومین سے زیادہ مضبوط آکسائیڈائزنگ ایجنٹ ہے کیونکہ اس کی الیکٹرونک نیگیٹیویٹی زیادہ اور اناک سائز چھوٹا ہوتا ہے جو اسے الیکٹرونز کو زیادہ آسانی سے حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے۔

(vii) ہیلوجنز میں سے کون سا ایلیمینٹ سب سے زیادہ ری ایکٹیو اور کون سا ایلیمینٹ سب سے کم ری ایکٹیو ہے؟ اپنے جواب کی دو جواہات بیان کریں۔

جواب: سب سے زیادہ ری ایکٹیو: فلورین سب سے زیادہ ری ایکٹیو ہے کیونکہ اس کی الیکٹرونک نیگیٹیویٹی زیادہ ہوتی ہے اور اناک سائز چھوٹا ہوتا ہے۔

سب سے کم ری ایکٹیو: آئیوڈین سب سے کم ری ایکٹیو ہے کیونکہ اس کی الیکٹرونک نیگیٹیویٹی کم ہوتی ہے اور اناک سائز زیادہ ہوتا ہے۔

باب 10

ماحولیاتی کیمسٹری

(Environmental Chemistry)

حاصلاتِ تفہیم:

اس باب میں آپ سیکھیں گے:

- وضاحت کریں کہ صاف اور خشک ہوا میں نائٹروجن (N_2) 78% آکسیجن (O_2) 21% جبکہ باقی مقدار نوبل گیسوں اور کاربن ڈائی آکسائیڈ پر مشتمل ہے۔
- فضائی آلودگی کے بڑے ذرائع بیان کریں۔ چند مثالیں یہ ہیں۔
 - (الف) کاربن ڈائی آکسائیڈ کا اخراج، کاربن پر مشتمل ایندھن کے مکمل طور پر جلنے سے۔
 - (ب) کاربن مونو آکسائیڈ اور ذرات کا اخراج، کاربن پر مشتمل ایندھن کے نامکمل جلنے سے۔
 - (ج) پودوں کے گلنے سے اور جانوروں کے ہانسنے سے خارج ہونے والی میتھین گیس۔
 - (د) گاڑی کے انجن سے خارج ہونے والے نائٹروجن کے آکسائیڈز۔
 - (ذ) سلفر ڈائی آکسائیڈ کا اخراج جو کہ فوسل فیول کے جلنے سے پیدا ہوتی ہے۔ جس میں سلفر کے کمپاؤنڈز شامل ہوتے ہیں۔
- گراؤنڈ لیول اوزون جو گاڑی کے انجن سے نکلنے والے نائٹروجن کے آکسائیڈز اور وولٹائل آرگینک کمپاؤنڈز کے ملنے سے بنتی ہے۔
- فضائی آلودگی سے پیدا ہونے والے مضر اثرات تحریر کریں۔ چند مثالیں یہ ہیں۔

دوسری جگہ دن کے مختلف حصوں میں اور مختلف موسموں میں تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اس کے اجزائے ترکیبی کی فیصد مقداریں حجم کے لحاظ سے نیچل میں دیکھائی گئی ہیں۔

کرہ ہوائی کے اہم اور غیر اہم اجزاء

فیصد مقدار	غیر اہم اجزاء	فیصد مقدار	اہم اجزاء
0.04	کاربن ڈائی آکسائیڈ	78.0	نائٹروجن
About 1.0	نوبل گیس	21.0	آکسیجن
متغیر (ہوا میں نمی کے لحاظ سے)	آبی بخارات	0.934	آرگون

مشق

1- دن اور رات کے کن حصوں میں ہوا میں نمی سب سے زیادہ ہوتی ہے؟
جواب: ہوا میں نمی صبح کے وقت سب سے زیادہ ہوتی ہے خاص طور پر طلوع آفتاب سے پہلے۔ رات کے آخری حصہ میں بھی نمی کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس وقت ماحول کا درجہ حرارت سب سے کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہوا میں موجود پانی کے بخارات شبنم یا اوس کی صورت میں گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔

2- کاربونیٹڈ مشروبات کی بوتلوں کو کھولا جاتا ہے تو کون سی گیس نکلتی ہے؟
جواب: جب کاربونیٹڈ مشروبات کھلتے ہیں تو CO_2 گیس خارج ہوتی ہے۔

سوال 3: پلوٹنس کی تعریف کریں نیز ہوا میں موجود اہم پلوٹنس کے نام لکھیں۔

4-	سلفر کے آکسائیڈز (SO_x)	SO_x سے آنکھوں میں خارش ہوتی ہے۔ سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے اور یہ ایسڈ رین کا موجب بھی بنتے ہیں۔
5-	ہائڈرو کاربنز	ہوا میں ان کی موجودگی سے غمو نیا، کھانسی اور دوسری سانس اور پھیپھڑوں کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ گلوبل وارمنگ کا باعث بھی بنتے ہیں۔
6-	مادی ذرات	آنکھوں میں خارش کا باعث بنتے ہیں۔ سانس لینے میں مشکلات ہوتی ہیں۔ خاص طور پر ایسے لوگوں میں جو کہ دمہ کے مریض ہوں۔ لباس کو گندہ کرتے ہیں اور ہوا میں آلودگی کا باعث بنتے ہیں جس سے دور تک دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔
7-	اوزون	اوزون کی موجودگی میں سانس لینے سے صحت کے کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں جن میں سینے میں درد، کھانسی، گلے کی خراش اور گلے میں رکاوٹ شامل ہیں۔

ان آلودہ اشیاء کے اثرات کے علاوہ فضا میں موجود سموگ صحت کے لیے کئی قسم کی مشکلات پیدا کرتی ہے۔ جن میں الرجیز، دمہ اور پھیپھڑوں کی بیماریاں شامل ہیں۔ یہ سموگ پودوں کو بڑھنے سے روکتی ہے کیونکہ فوٹو سنتھیسز کے لیے درکار کاربن ڈائی آکسائیڈ کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔

10.3 ایسڈ رین (Acid Rain)


سوال 6: ایسڈ رین سے کیا مراد ہے؟ کیمیکل ری ایکشنز کی مدد سے ایسڈ رین کی تشکیل کی وضاحت کریں۔

جواب: ایسڈ رین: جب بارش کے پانی کی pH کی ویلیو 4.2 اور 4.4 کے درمیان ہو جائے تو اس کو ایسڈ رین کہتے ہیں۔

تعمیراتی

2- جب SO_2 اور NO_2 پانی میں حل ہوتے ہیں تو کون سے تیزاب بنتے ہیں؟

جواب: جب SO_2 پانی میں حل ہوتا ہے تو سلفورس ایسڈ بنتا ہے۔



جب NO_2 پانی میں حل ہوتا ہے تو نائٹرس ایسڈ بنتا ہے۔



3- اگر ایسڈ رین کی وجہ سے درخت اکڑ جائیں تو اس سے زمین کیسے متاثر ہوتی ہے؟

جواب: اگر ایسڈ رین سے درخت اکڑ جائیں گے تو مٹی میں بہت سے ضروری نیوٹریٹس جیسے کہ کیلشیم، میگنیشیم وغیرہ کی کمی ہو جائے گی۔

درخت جو کہ پہاڑوں پر موجود مٹی کو اپنی جڑوں سے باندھ کر رکھتے ہیں ان کے کم ہونے سے مٹی سرکنا شروع ہو جائے گی جس کی وجہ سے وہاں نئے پودے نہیں اگ سکتے۔

10/4- گلوبل وارمنگ (Global Warming) اور گرین ہاؤس ایفیکٹ (Greenhouse Effect)

سوال 8: گرین ہاؤس ایفیکٹ کی وضاحت کریں۔ گرین ہاؤس گیسز کیسے زمین کا درجہ حرارت بڑھانے کا باعث بنتی ہیں؟

جواب: گرین ہاؤس ایفیکٹ: انسانی سرگرمیوں سے پیدا ہوئی کاربن ڈائی آکسائیڈ، میتھین اور دوسری گیسیں جب فضا میں شامل ہوتی ہیں اور ان سے زمین کے اوپر گیسوں کا ایک غلاف سا بن جاتا ہے۔ یہ غلاف زمین سے خارج ہونے والی گرمی کو اوپر والی فضا کی طرف جانے سے روکتا ہے۔ نتیجتاً زمین آہستہ آہستہ گرم ہوتی جاتی ہے۔ اس گرم ہوتی زمین کی وجہ سے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں انہیں گرین ہاؤس ایفیکٹ کا نام دیا گیا ہے۔



گرمی اور سردی

گرمیاں زیادہ گرم اور سردیوں کا وقفہ تھوڑا:
دنیا کے ان علاقوں میں جہاں کی آب و ہوا معتدل ہے وہاں اس بات کے امکانات ہیں کہ گرمیاں زیادہ گرم ہوں اور ان کا وقفہ بھی زیادہ لمبا ہو جبکہ سردیاں کم سرد ہوں اور ان کا وقفہ بھی کم ہو۔


ماحولیاتی مسائل کو کم کرنے کی حکمت عملی (Strategies to Reduce Environmental Issues)

10/5

سوال 11: ماحولیاتی مسائل کو کم کرنے کے لیے کون سے اقدامات کیے جائیں؟

جواب: ماحولیاتی مسائل کو کم کرنے کی حکمت عملی: فوسل فیولز کے جلنے سے بہت زیادہ آلودہ گیسیں ہر وقت ہوا میں شامل ہوتی رہتی ہیں۔ سڑکوں پر چلنے والی ہر قسم کی کاریں، ہوائی جہاز، صنعتی مشینیں اور کونسلر کی مدد سے چلنے والے بجلی کے کارخانے زیادہ تر بڑے شہروں میں موجود آلودگی کی وجہ ہیں۔ سائنس دانوں نے ایسے بہت سے طریقے ایجاد کیے ہیں جن کی مدد سے آلودگی کی اس خطرناک لہر کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔

1- شجرکاری: شجرکاری ہوا کی آلودگی کو کم کرنے کا ایک بہت ہی اچھا اور آسان ذریعہ ہے۔ پودے ضیائی تالیف کے ذریعے ہوا میں موجود کاربن ڈائی آکسائیڈ کو جذب کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں آکسیجن ہوا میں چھوڑتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی اہم ری ایکشن ہے جو سورج کی روشنی اور پتوں میں موجود سبز رنگ کے مادہ یعنی کلوروفل کی موجودگی میں وقوع پذیر ہوتا ہے۔



دلچسپ معلومات

- ☆ ماحولیاتی سائنس ہمیں ماحولیاتی نظام میں ہونے والی پیچیدہ تبدیلیوں اور زندگی پر اس کے اثرات کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔
- ☆ بحرالکاہل میں ایک جگہ تقریباً 100 ملین ٹن پلاسٹک اور دیگر اشیا کا فضلہ ایک بہت بڑے رقبے میں تیر رہا ہے۔
- ☆ گرین ہاؤس ایفیکٹ، اوزون تہہ میں سوراخ اور ایسڈ رین آلودگی کے عالمی اثرات ہیں۔
- ☆ زمین کی فضا میں موجود آبی بخارات بھی گرین ہاؤس گیس کا کردار ادا کرتے ہیں۔ دنیا پر پڑنے والے گرین ہاؤس اثرات میں سے نصف اثرات انہی آبی بخارات کی وجہ سے ہیں۔
- ☆ 1990ء سے اب تک دنیا میں موجود 28 ٹریلین ٹن برف پگھل چکی ہے جبکہ اس کے پگھلنے کی رفتار ایک سال میں 1.2 ٹریلین ٹن ہے۔


انشائی طرز کنسیپچوئل (Conceptual) سوالات

سوال 1: کیٹالیٹک کنورٹر کی اہمیت لکھیں۔

جواب: کیٹالیٹک کنورٹر: موجودہ دور کی کاروں میں گیسوں کے اخراج کے لیے ایک آلہ لگاتے ہیں جسے کیٹالیٹک کنورٹر کہتے ہیں۔

اہمیت: کیٹالیٹک کنورٹر بیک وقت تین کام سرانجام دیتے ہیں اور خطرناک گیسز کو ختم کر دیتے ہیں۔

(i) یہ کنورٹر نائٹروجن کے آکسائیڈز کو نائٹروجن اور آکسیجن میں تبدیل کر دیتے ہیں۔



12- فوسل فیوز کے جلنے سے کون سی گیس خارج ہوتی ہے؟

He (D) SO₂ (C) O₂ (B) N₂ (A)

13- ایسڈرین:

(A) مٹی کی ایسڈیٹی کو بڑھاتی ہے
(B) مٹی کی ایسڈیٹی کو کم کرتی ہے
(C) pH کو کم کرتی ہے
(D) اور c اور a دونوں

14- ایسڈرین نقصان دہ ہے:

(A) آبی مخلوق کے لیے (B) پودوں اور درختوں کے لیے (C) عمارتوں کے لیے (D) ان تمام کے لیے

15- کاربن ڈائی آکسائیڈ، میتھین، پانی کے بخارات اور ایٹوسفیئر میں دوسری گیسز کی وجہ سے زمین کا گرم ہونا کہلاتا ہے:

(A) ایسڈرین (B) گلوبل وارمنگ (C) پلوشن ایفیکٹ (D) گرین ہاؤس ایفیکٹ

16- مندرجہ ذیل میں سے کون سی گرین ہاؤس گیس ہے؟

(A) آکسیجن (B) نائٹروجن (C) کاربن ڈائی آکسائیڈ (D) a اور b دونوں

17- مندرجہ ذیل میں سے کون سی گیس گلوبل وارمنگ میں حصہ نہیں لیتی:

(A) CO₂ (B) CH₄ (C) پانی کے بخارات (D) نائٹروجن

ماحولیاتی مسائل کو کم کرنے کی حکمت عملی

10.5

18- ریڈیو ایکٹیو گیس ہے:

5- ہوا میں کتنے فیصد نائٹروجن موجود ہے؟

جواب: ہوا میں والیوم کے لحاظ سے 78 فیصد نائٹروجن موجود ہے۔

6- سلفر کے آکسائیڈ SO_2 (SO₂, SO₃) کے مضر اثرات کون سے ہیں؟

جواب: (i) SO_2 ایک انتہائی ماحوشگوار اور کھنکھنے والی گیس ہے۔ یہ مریضوں کے لیے سانس لینے میں مشکلات کا باعث بنتی ہے۔

(ii) یہ سلفیورک ایسڈ بناتی ہے جو عمارتوں اور نباتات کو نقصان پہنچاتا ہے۔

(iii) یہ ایسڈ رین کا باعث بنتی ہے۔

7- ایسڈ رین کی تعریف لکھیں۔

جواب: جب بارش کے پانی کی pH 2.2 سے 2.4 کے درمیان میں ہو تو یہ ایسڈ رین کہلاتی ہے۔ یہ فضا میں موجود آلودگی کی وجہ سے بنتی ہے۔

ایسڈ رین	10.3
گلوبل وارمنگ اور گرین ہاؤس ایفیکٹ	10.4

8- گلوبل وارمنگ سے کیا مراد ہے؟

جواب: گلوبل وارمنگ سے مراد زمین کے درجہ حرارت میں بتدریج اضافہ ہے۔ یہ اضافہ بنیادی طور پر گرین ہاؤس گیسوں جیسے کاربن ڈائی آکسائیڈ،

میٹھن، پانی کے بخارات اور فضا میں موجود دوسری گیسوں کی مقدار بڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ گیسیں سورج سے آنے والی حرارت کی

شعاعوں کو روک لیتی ہیں جس سے زمین کا ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے۔

9- گلوبل وارمنگ کے اثرات تحریر کریں۔

اہم نکات

- 1- زمین کے ارد گرد کرہ ہوائی کا غلاف موجود ہے۔ جس میں تہہ در تہہ مختلف گیسیں پائی جاتی ہیں۔
- 2- ہوا میں موجود ہر وہ شے جس کی موجودگی سے انسانی صحت، معیار زندگی اور قدرتی ماحول کو نقصان پہنچے آلودہ شے کہلاتی ہے۔
- 3- کاربن، نائٹروجن اور سلفر کے آکسائیڈز، میتھین گیس اور مادی ذرات نمایاں آلودہ اشیا ہیں۔
- 4- انسانی سرگرمیاں ان آلودہ اشیا کی ماخذ ہیں جن میں سے سب سے اہم فوسل فیولز کا جلنا ہے۔
- 5- آلودہ اشیا کی ہوا میں موجودگی نہ صرف انسانوں کے لیے خطرہ ناک ہے بلکہ پورا قدرتی ماحول اس وجہ سے خطرے میں ہے۔
- 6- سلفر اور نائٹروجن کے آکسائیڈز جب ہوا میں موجودگی سے ملتے ہیں تو ایسڈ رین بنتی ہے۔
- 7- کاربن ڈائی آکسائیڈ، میتھین اور دوسری گیسوں کی ہوا میں موجودگی سے زمین آہستہ آہستہ گرم ہو رہی ہے۔ یہ گیسیں زمین کے گرد ایک غلاف بنا دیتی ہیں۔ جن سے حرارت واپس نہیں گزر سکتی اور اس زمین کو گرم کرنے کا موجب بنتی ہے۔ اس کو گرین ہاؤس ایفیکٹ کہتے ہیں۔
- 8- ہوا میں آلودہ اشیا کو کم کرنے کے لیے ہر قسم کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس میں فوسل فیولز کے استعمال کی حوصلہ شکنی، درخت اگانا اور قابل تجدید ذرائع سے انرجی کی ترسیل شامل ہے۔
- 9- ایسا ہر قدم اٹھانا چاہیے جس سے ایسے لوگوں کو آلودگی کے برے اثرات سے بچایا جاسکے جن کے بیماری ہونے کا اندیشہ ہو۔

حل مشقی سوالات

- 1- صحیح جواب پر ٹک (✓) کریں۔

ہیں۔ جب پرندے ان کیمیکلز سے آلودہ بیج کھاتے ہیں تو وہ ان کے لیے زہریلے ہو سکتے ہیں۔ جراثیم کش ادویات پرندوں کے مدافعتی نظام (ایمیون سسٹم) کو کمزور کر سکتی ہیں، ان کی افزائش کو متاثر کر سکتی ہیں، انڈوں کے خول کو پتلا کر سکتی ہیں اور یہاں تک کہ ان کی موت کا باعث بن سکتی ہیں۔ ایسے کیمیکلز کا زیادہ استعمال کیزوں کی دستیابی کو بھی کم کرتا ہے جن پر پرندے غذا کے لیے انحصار کرتے ہیں جس سے ان کی قدرتی خوراک میں خلل پڑتا ہے۔

(ii) ہوا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ صرف 0.04% ہے۔ کس طرح یہ گیس ہمارے ماحول کے لیے خطرناک ہے؟

جواب: اگرچہ SO_2 کم مقدار میں موجود ہے لیکن یہ زمین کے اٹموسفیر میں حرارت کو روکنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ فوسل فیولز جلانے سے حاصل ہونے والی اضافی SO_2 گھوہل دار منگ کا باعث بنتی ہے جس سے موسمیاتی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ گھوہل دار منگ سے گلیشیرز پگھلتے ہیں، سمندر کی سطح بڑھ جاتی ہے اور یہ پودوں، جانوروں اور انسانوں کے لیے بھی خطرناک ہے۔ SO_2 سمندروں کو بھی ایسڈک بناتی ہے جس سے سمندری زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔

(iii) ہوا میں موجود چند گیس گرین ہاؤس ایفیکٹ کا موجب بنتی ہیں جبکہ باقی گیسوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ ایسا کیوں ہے؟

جواب: CO_2 اور N_2O جیسی گیسیں ہیٹ کو جذب کرتی ہیں اور اسے فضا میں روکے رکھتی ہیں جو گرین ہاؤس ایفیکٹ کی وجہ بنتی ہیں۔ ان گیسز کو گرین ہاؤس گیسز کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سورج کی روشنی کو زمین میں داخل ہونے دیتی ہیں لیکن حرارت کو باہر نکلنے سے روکتی ہیں۔ دوسری گیسز جیسے نائٹروجن (N_2) اور آکسیجن (O_2) اس خاصیت کی حامل نہیں ہوتیں، اس لیے یہ گرین ہاؤس ایفیکٹ میں حصہ نہیں ڈالتی۔

(iv) موٹر کاروں میں فیول کے جلنے سے بننے والی کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس کی مقدار کو ہم کس طرح کم کر سکتے ہیں؟

جواب: CO_2 کو کم کرنے کے لیے

باب 11

ہائڈروکاربنز

Hydrocarbons

عاصلاٲ تعلیم:

اس باب میں آپ یکھیں گے:

- ایلکینز (Alkanes) کے خواص بیان کریں اور بتائیں کہ یہ کیا وٹڈز ری ایکٹ نہیں کرتے سوائے دوری ایکشنز کے جن میں ایک کمبشن (Combustion) اور دوسرا کلورین کے ساتھ ان کے سب سٹی ٹیوشن (substitution) ری ایکشنز۔
- بتائیں کہ سب سٹی ٹیوشن (substitution) ری ایکشنز میں ایلکینز میں موجود ہائیڈروجن ایٹم کسی دوسرے ایٹم یا ایٹمز کے ایک گروپ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔
- ایلکینز کے کلورین کے ساتھ سب سٹی ٹیوشن (substitution) ری ایکشنز تفصیل سے لکھیں اور بتائیں کہ یہ ری ایکشنز فوٹو کیمیکل ری ایکشنز ہیں۔ ان ری ایکشنز کے نتیجے میں بننے والے پروڈکٹس کے مالیکیولر فارمولا اور سٹرکچرل فارمولا بھی لکھیں۔
- ایلکینز (Alkenes) کے بڑے ہائڈروکاربنز کی کریکنگ (cracking) سے، ایلکینز (Alkenes) اور الکائنز (Alkynes) کی ہائیڈرو جینیٹیشن ری ایکشنز سے اور الکائل ہیلائیڈز (Alkyl halides) کی ریڈکشن سے ایلکینز (Alkanes) کی تیاری کی ایکوشنز مع سمبلز لکھیں۔

انشائی طرز سوالات

پوسٹ ہائڈروکاربنز: الکیلز کو پوسٹ ہائڈروکاربنز بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں کاربن ایٹم کے چاروں الیکٹرونز یا تو ہائڈروجن ایٹمز یا پھر دوسرے کاربن ایٹمز کے ساتھ سنگل کوویلنٹ بانڈ بناتے ہیں۔

مثال: مثال کے طور پر اتھین میں موجود دونوں کاربن ایٹمز نے چھ ہائڈروجن ایٹمز کے ساتھ سنگل بانڈ بنائے ہیں یعنی یہ الیکٹرونز صرف سنگل بانڈ بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔

جنرل فارمولا: الکیلز کو C_nH_{2n+2} کے جنرل فارمولا سے ظاہر کیا جاتا ہے جبکہ n ایک مثبت عدد ہے جو زیر نہیں ہو سکتا۔

سوال 6: آرکینک کپاؤنڈز کو IUPAC نام کیوں دیے گئے ہیں؟ IUPAC نوین کلچر کے حصوں کی وضاحت کریں۔



Root	No. of Carbon atoms
Meth-	1
Eth-	2
Prop-	3
But-	4
Pent-	5
Hex-	6
Hept-	7
Oct-	8
Non-	9
Dec-	10

جواب: آرکینک کپاؤنڈز کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ان میں پیچیدگی بہت زیادہ پائی جاتی ہے اس لیے ہر کپاؤنڈ کو انفرادی نام دینا ممکن نہیں ہے۔ دی انٹرنیشنل یونین آف پور اینڈ ایپلائیڈ کیمسٹری (IUPAC) نے آرکینک کپاؤنڈز کو نام دینے کا ایک منظم طریقہ نکالا ہے جسے آئی یو پی اے سی نوین کلچر (IUPAC Nomenclature) کہتے ہیں۔ نوین کلچر کے حصے: اس سسٹم کے مطابق آرکینک کپاؤنڈ کے پورے نام کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔



1- روٹ Root: یہ حصہ ہمیں آرکینک کپاؤنڈ کے مالیکیول میں موجود کاربن ایٹمز کی لگاتار قطار میں موجود کاربن ایٹمز کی تعداد کے بارے میں بتاتا ہے

2- سفیکس Suffix: سفیکس کو روٹ کے بعد لکھا جاتا ہے اور یہ آرکینک کپاؤنڈ کی فیملی کے بارے میں بتاتا ہے۔



3- پریفکس Prefix: اس کو روٹ سے پہلے لکھا جاتا ہے اور یہ کاربن چین (Chain) کے ساتھ لگے ہوئے گروپس



(ii) آئین




(iii) پروپین



(iv) بوتین


مشق

اوپر دیے گئے کپاؤنڈز میں کتنے میٹھائل اور میٹھلین گروپس موجود ہیں؟




کلورو میتھین میتھین


یہ ری ایکشن یہاں ختم نہیں ہو جاتا بلکہ آگے بڑھتا ہے اور ایک ایک کر کے سارے ہائیڈروجن ایٹمز کی جگہ کلورین ایٹمز آ جاتے ہیں۔



ڈائی کلورو میتھین




ٹرائی کلورو میتھین یا کلورو فورم



ٹیترا کلورو میتھین یا کاربن ٹیٹرا کلورائیڈ

اوپر دیئے گئے ری ایکشن کے پراڈکٹس کے سٹرکچرل فارمولہ نیچے دیئے گئے ہیں۔



معروضی سوالات

مکمل تعلیم کی نئی امتحانی تکنیکس (Knowledge, Understanding, Application, Analytical & Conceptual) کی روشنی میں مرتب کیے گئے کثیر الانتخابی سوالات

ہائڈروکاربنز	11.1
ایلیکٹریز	11.2

□ درست جواب کا انتخاب کریں۔

1- آرکینک کہاؤٹھ ہے:

(A) پانی (B) کاربن ڈائی آکسائیڈ (C) میٹھیم کلورائیڈ (D) میتھین

2- کاربن ایٹم کی دوسرے کاربن ایٹم کے ساتھ جڑنے کی صلاحیت کہلاتی ہے:

(A) کٹنیشن (B) کاربوناٹیشن (C) ہائیڈروآکسیلیشن (D) a اور b دونوں

3- میتھین کا کیمیکل فارمولا ہے:

(A) C_2H_6 (B) CH_4 (C) CO_2 (D) C_2H_6O

4- کون سے کہاؤٹھ صرف کاربن اور ہائڈروجن ایٹم سے بنتے ہیں؟

(A) کاربوناٹیشن (B) الکول (C) ہائڈروکاربنز (D) یہ تمام


5- ہائڈروکاربن جس میں تمام کاربن ایٹمز ایک دوسرے کے ساتھ منسلک کوہلٹ ہائڈ کے ذریعے جڑے ہوتے ہیں:

2- ان آرگینک کپاؤنڈز سے کیا مراد ہے؟

جواب: وہ کپاؤنڈ جن میں کاربن اور ہائیڈروجن اکٹھے نہیں ہوتے ان آرگینک کپاؤنڈ کہلاتے ہیں۔ آرگینک کپاؤنڈز کے علاوہ کائنات کے تمام ایلیمنٹس اور کپاؤنڈز ان آرگینک کپاؤنڈز کہلاتے ہیں۔

3- میتھین کا سٹرکچرل فارمولا لکھیں۔

جواب: میتھین کا سٹرکچرل فارمولا:




4- ہائڈروکاربنز سے کیا مراد ہے؟


جواب: ہائڈروکاربنز وہ کپاؤنڈز ہیں جو صرف کاربن اور ہائیڈروجن ایلیمنٹس سے مل کر بنتے ہیں۔ مثلاً میتھین CH_4 ۔

5- ایلیکٹریز سے کیا مراد ہے؟

جواب: ایک ایلیکٹریز ایسا ہائڈروکاربن ہے جس میں تمام کاربن ایٹمز ایک دوسرے کے ساتھ سنگل کوویلنٹ بانڈ کے ذریعے ملے ہوتے ہیں۔ مثلاً:



6- 2 میتھائل بیوٹین کا سٹرکچرل فارمولا لکھیں۔



جواب:

اہم نکات

- 1- پودوں اور جانداروں سے حاصل کردہ کپاؤنڈز کو آرگینک کپاؤنڈز (Organic Compounds) کہا جاتا ہے۔
- 2- آرگینک کیمسٹری کاربن کے کپاؤنڈز کی کیمسٹری ہے جس میں کاربن ایٹیمٹ اپنے طرز عمل میں منفرد ہے۔
- 3- آرگینک کپاؤنڈز دراصل کوویلنٹ کپاؤنڈز ہیں۔
- 4- کاربن اور ہائیڈروجن پر مشتمل کپاؤنڈز ہائیڈروکاربنز کہلاتے ہیں۔ جن کی پچور ہنڈ ہائیڈروکاربنز میں درجہ بندی کی جاتی ہے۔
- 5- ایسے ہائیڈروکاربنز جن میں کاربن اور ہائیڈروجن کے درمیان سنگل کوویلنٹ بانڈ ہوں ان کو پچور ہائیڈروکاربنز یا ایلیکٹریز کہتے ہیں۔
- 6- ایلیکٹریز کا نام منظم (Systematic) طریقے سے رکھا جاتا ہے۔ جسے IUPAC ناموں کا نظام کہا جاتا ہے۔
- 7- ایلیکٹریز کو مختلف طریقوں سے تیار کیا جاسکتا ہے۔
- 8- ایلیکٹریز دوسرے کپاؤنڈز سے بہت کم ری ایکٹ کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی یہ ہیلوجنز سے ری ایکٹ کرتے ہیں۔ اور کمپن ری ایکشن دیتے ہیں۔

حل مشقی سوالات


- 1- صحیح جواب پر ٹک (✓) کریں۔
 - (i) آرگینک کپاؤنڈز میں کون سا ایٹیمٹ کاربن ایٹم کے ساتھ اکثر موجود ہوتا ہے۔

(الف) آکسیجن	(ب) نائٹروجن	(ج) ہائیڈروجن	(د) ہیلوجن
--------------	--------------	---------------	------------
 - (ii) کون سی دوسری مٹلو کو الکائل ہیلائیڈز کو ریڈیوس کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

(vii) ایسے پانچ آرگینک کمپاؤنڈز کے نام لکھیں جو کہ قدرتی طور پر پائے جاتے ہیں۔

جواب: قدرتی طور پر پائے جانے والے کمپاؤنڈز میں میتھین، گلوکوز، اسٹیمائول، لیسینک ایسڈ اور سرک ایسڈ شامل ہیں۔

(viii) مندرجہ ذیل کمپاؤنڈز کو IUPAC کے مطابق نام دیں۔



جواب: دیے گئے کمپاؤنڈ کا IUPAC نام 2- میتھائل بیوٹین ہے۔

(ix) جب ہم لوئر ہائڈروکاربنز سے ہائر ہائڈروکاربنز کی طرف جاتے ہیں تو ان کے میلنگ اور بوائلنگ پوائنٹس میں کس طرح تبدیلی آتی ہے؟

جواب: ایٹکینز کے میلنگ اور بوائلنگ پوائنٹس اس وقت بڑھتے ہیں جب وندروالز فورسز کی وجہ سے مالیکیولرویت بڑھتا ہے۔

3- تعمیری فکر پر مبنی سوالات (Constructed Response Questions)

(i) ایٹکینز (Alkanes) دوسرے ری ایجنٹس (Reagents) سے ری ایکٹ کیوں نہیں کرتے؟

جواب: ایٹکینز میں مضبوط C-C اور C-H بانڈز موجود ہوتے ہیں اور یہ نان پولر ہوتے ہیں، جو کہ انہیں مستحکم اور کم ری ایکٹیو بناتے ہیں۔

(ii) قدرتی گیس اور ہوا کا آمیزہ دھماکے سے کیوں پھٹتا ہے؟

جواب: قدرتی گیس اور ہوا کا کمپاؤنڈ ایک انتہائی آتش گیر کمپاؤنڈ بناتا ہے۔ جب اسے جلایا جاتا ہے، تو یہ تیزی سے انرجی خارج کرتا ہے جو دھماکے کا باعث بنتی ہے۔

(iii) آپ آرگینک اور ان آرگینک کمپاؤنڈز کے میلنگ پوائنٹ کا موازنہ کیسے کریں گے؟

باب 12

تجرباتی ڈیٹا اکٹھا کرنا اور اُن کا تجزیہ

(Empirical Data Collection and Analysis)

حاصلاتِ تعلیم:

اس باب میں آپ سیکھیں گے:

• واضح کریں کہ شینڈرڈ یونٹس (Standard Units) کا استعمال باہمی رابطوں اور باہمی ریسرچ کے لیے ضروری ہے۔ (چند مثالیں: کیمسٹری میں فزیکل مقداریں (Physical quantities) مثلاً ماس (Mass)، حجم (Volume) اور ٹمپریچر (Temperature) کی پیمائش کے لیے ایس آئی یونٹس استعمال کرتے ہیں۔ یہ فزیکل یونٹس کا سسٹم اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ دنیا میں ہر جگہ کیمسٹس یہی استعمال کریں جن سے ان کے درمیان باہمی رابطہ بہتر ہو۔ اس معیاری اکائیوں کے سسٹم کے بغیر کیمسٹس کے لیے اپنی تحقیقی نتائج اور ان کے درمیان یکسانیت پیدا کرنا بھی مشکل ہوتا۔ مثال کے طور پر تصور کریں کہ اگر ایک جگہ ایک کیمسٹ اشیاء کے ماس کو گراموں میں ظاہر کرتا ہے جب کہ دوسرا اس کو اونس میں ظاہر کرتا ہے تو یہ دونوں پیمائشوں کا مقابلہ کرنا کتنا مشکل ہوگا اور اس سے نتائج بھی غلط نکلیں گے۔)

• فزیکل اور ایب سٹریکٹ (Abstract) مقداروں کو ماپنے کے لیے ایس آئی یونٹس کی شناخت کریں۔ (مثلاً ماس، وقت اور مادہ کی مقدار) اس نظریہ کا استعمال کریں کہ اکائیوں کی مقدار کو کم یا زیادہ ظاہر کرنے کے لیے سابقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثلاً کلو، ڈیسی اور ملی۔

• وجہ بتائیں کہ کیمسٹس لیبارٹری میں اشیاء کی کم مقداروں سے کام کرتے ہوئے g, cm^3 اور s کا استعمال کیوں کرتے ہیں؟

• مختلف پیمائشوں کے دوران لازمی غلطیاں (Errors) سے بچنے کے لیے ایکسٹریکٹ (Accuracy) اور پیمائش (Precision) کے


سوال 4: طبعی مقداروں کے بنیادی یونٹس کونے ہیں؟ وضاحت کریں۔

جواب: ایس آئی یونٹس: ایس آئی سسٹم میں طبعی مقداروں کے سات بنیادی یونٹس ہیں جن میں سے کیمسٹری میں ہم پانچ استعمال کرتے ہیں۔ یہ طبعی مقداریں لمبائی، ٹائم، کسی شے کی مقدار، ماس اور ٹمپریچر ہیں۔

میٹر: یہ لمبائی کا معیاری یونٹ ہے اور اسے m سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ایک میٹر ایک سیکنڈ کے 3000 لاکھوں حصے میں ویکیم میں روشنی کا طے کردہ فاصلہ ہے۔

میٹراڈ

کلوگرام: یہ ماس کا معیاری یونٹ ہے اور اسے kg سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ فرانس میں ایک بلاک موجود ہے جس کا معیاری ماس ایک کلوگرام ہے۔ پانی 1000 cm^3 حجم کا ماس بھی ایک کلوگرام ہوتا ہے۔



10^{-9}	n	نینو (nano)
10^{-12}	p	پیکو (pico)

سوال 7: کیمسٹری میں ہم چھوٹے یونٹس کیوں استعمال کرتے ہیں؟ مثالوں کے ذریعے وضاحت کریں۔

جواب: ماس کی پیمائش: کیمسٹری میں ہم ری ایکٹنٹس کے ماسز کو گرامز میں ظاہر کرتے ہیں۔ ایسا کرنا ضروری ہے کیونکہ ماس کو ناپنے کا یونٹ مولر ماس ہے جسے گرام پر مول gmol^{-1} میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس طرح ہمیں اشیاء کے مولز نکالنے میں مدد ملتی ہے۔ علاوہ ازیں لیبارٹری میں تجربات کے دوران اشیاء کو کلو گرام کی بجائے گراموں میں لیتے ہیں۔ گرام ایک چھوٹا سا یونٹ ہے جو کہ لیبارٹری میں کام کرنے کے لیے اور دیگر اعداد و شمار کے لیے نہایت موزوں تصور ہوتا ہے۔

ٹمپرچر کی پیمائش: اس طرح ٹمپرچر کیلون کی بجائے سیلسیوس سکیل میں ناپا جاتا ہے جو ہر لحاظ سے ہمارے لیے سہولت کا باعث ہے۔ سیلسیوس سکیل میں 100 ڈی ویز نر ہیں جو ایس آئی یونٹس سے مطابقت رکھتے ہیں۔ اس سکیل کو استعمال کرنے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ جو ٹمپرچر سیلسیوس سکیل میں ناپا جاتا ہے اس کو آسانی سے ذیل میں درج ایکویشن سے کیلون میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔

$$K = ^\circ C + 273$$

والیوم کی پیمائش: کیمسٹری میں والیوم ناپنے کا یونٹ کیوبک میٹر (m^3) کی بجائے کیوبک سینٹی میٹر (cm^3) استعمال کیا جاتا ہے۔ کیوبک سینٹی میٹر میں ولیم ناپنا نہ صرف آسان ہے بلکہ اس سے حساب کتاب کرنا آسان ہے اور نتائج بھی زیادہ بہتر حاصل ہوتے ہیں۔ کیمسٹری لیبارٹری میں ہم عام طور پر چھوٹے ولیم ناپتے ہیں جو کیوبک میٹر (m^3) کی نسبت کیوبک سینٹی میٹر (cm^3) سے آسانی سے ناپے جاسکتے ہیں۔

مشق

- 1- ایک طالب علم ایک شے کا ماس تین بار معلوم کرتا ہے اور اس کا نتیجہ ہر بار 5.2 گرام آتا ہے۔ اگر اس شے کا حقیقی ماس 5.0 گرام ہو تو کیا طالب علم کے کام میں ایکوریسی اور پری سیشن دونوں ہوں گے یا پھر ایکوریسی ہوگی لیکن پری سیشن نہیں ہوگی یا پھر ایکوریسی نہیں ہوگی لیکن پری سیشن ہوگی؟
جواب: پری سائز لیکن ایکوریٹ نہیں۔
- 2- آپ سسٹمٹک اور رینڈم ایرر سے کیسے بچ سکتے ہیں؟
جواب: بار بار ماپ کر، بڑا نمونہ استعمال کر کے اور اضافی متغیر کو کنٹرول کر کے رینڈم ایرر سے بچا جاسکتا ہے۔ سسٹمٹک ایرر سے آلات کو معیاری کر کے، تجزیے کے لیے مناسب طریقہ کار کو اختیار کر کے اور آلات کی جانچ کر کے بچا جاسکتا ہے۔

دلچسپ معلومات

ایس آئی یونٹس کے سمبلز (symbols) کو جمع کے میخ کے لیے تبدیل نہیں کیا جاتا۔ مثلاً 100 ملی میٹر کو 100 mms کی بجائے 100 mm لکھا جاتا ہے۔

انشائی طرز کنسیپچوئل (Conceptual) سوالات

- سوال 1: دنیا میں یونٹس کے کتنے اور کون سے سسٹمز استعمال کیے جاتے ہیں؟
جواب: اس دنیا میں درج ذیل یونٹس کے سسٹمز استعمال کیے جاتے ہیں۔
- 1- انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹس (SI System)

10- میگا (m) کا مطلب ہے:

- (A) 10^6 (B) 10^3 (C) 10^{-2} (D) 10^{-6}

12.2 ایکوریسی اور پری سیشن حاصل کرنے کے ذرائع

12.2

11- ہر پائنش میں ایک لیول کی غیر یقینی صورت حال ہوتی ہے جسے کہتے ہیں:

- (A) پائنش (B) ایرر (C) پری سیشن (D) کوانٹم

12- کیمسری میں نمبر پچر کی پائنش کے لیے کیلون کی بجائے کون سا پائننا استعمال کیا جاتا ہے؟

- (A) سسٹمیک سکیل (B) سلسیسیس سکیل (C) کونٹین سکیل (D) ان میں سے کوئی نہیں

13- ڈیسی (d) کا مطلب ہے:

- (A) 10^1 (B) 10^2 (C) 10^{-1} (D) 10^{-2}

14- پائنش کی گئی ویلیو اور اصل ویلیو کے درمیان فرق کو کہتے ہیں:

- (A) پری سیسن (B) ایکوریسی (C) ایرر (D) ان میں سے کوئی نہیں

15- دو یا دو سے زیادہ پائنشوں کا ایک دوسرے کے قریب ہونا کہلاتا ہے:

- (A) ایرر (B) ایکوریسی (C) پری سیشن (D) a اور b دونوں

3- طبعی مقداروں کے نام لکھیں۔

جواب: طبعی مقداریں درج ذیل ہیں:

(i) لمبائی (ii) وقت (iii) مادے کی مقدار (iv) ماس (v) نمپرچ

4- مول کی تعریف لکھیں۔

جواب: کسی مادے کی وہ مقدار جس میں 6.022×10^{23} پارٹیکلز موجود ہوں، مول کہلاتی ہے۔

5- ڈیروڈیونٹس سے کیا مراد ہے؟

جواب: ڈیروڈیونٹس: ڈیروڈیونٹس وہ یونٹس ہیں جو بنیادی یونٹس سے اخذ کیے جاتے ہیں۔

6- کیلون اور سیلسیوس سکیل کے درمیان تعلق لکھیں۔

جواب: $K = C^{\circ} + 273$

ایکوریسی اور پری سیشن حاصل کرنے کے ذرائع	12.2
ایکوریسی اور پری سیشن	12.3

7- پیمائش کی کیا اہمیت ہے؟

جواب: پیمائش سائنس میں تمام تجربات کی بنیاد ہے۔

(iv) SI یونٹس میں پریشر (Pressure) کو کس یونٹ سے ماپا جاتا ہے۔

(الف) نیوٹن پری میٹر (Nm^{-1})

(ب) نیوٹن پری میٹر سکوائر (Nm^{-2})

(ج) جول (J)

(د) پاسکل (Pa)

(v) کلوگرام کے لیے SI یونٹس میں کون سی علامت استعمال کی جاتی ہے۔

(الف) K

(ب) k

(ج) kg

(د) Kgm

(vi) ایک مول کیا ظاہر کرتا ہے۔

(الف) نمبر

(ب) ماس

(ج) حجم

(د) لمبائی

(vii) کیمسٹری میں حجم کے لیے عام طور پر کون سی اکائی استعمال کی جاتی ہے۔

(الف) ملی لیٹر (milli litre)

(ب) لیٹر (litre)

(ج) مکعب سینٹی میٹر (cm^3)

(د) مکعب میٹر (m^3)

(viii) 0.000840 کو سائنسی طریقہ میں ظاہر کریں۔

(الف) 8.40×10^{-3}

(ب) 840×10^{-6}

(ج) 8.40×10^{-4}

(د) 84.0×10^{-5}

(ix) SI یونٹس میں سابقہ نیو سے کیا مراد ہے؟

(الف) 10^{-9}

(ب) 10^{-8}

(ج) 10^{-11}

(د) 10^{-12}

4 تفصیلی سوالات

(i) ماس اور حجم اور لمبائی کی پیمائش کے مقامی یونٹس کیا ہیں؟

جواب: ماس: من، سیر ولیم: لیٹر لمبائی: میٹر، گز

(ii) ایکوریسی اور پری سیشن کے درمیان فرق کو واضح کریں۔

جواب: دیکھیے سوال نمبر 9

(iii) آپ اپنی پیمائش میں سسٹمٹک ایرر (Systematic Error) سے کیسے بچ سکتے ہیں؟

جواب: پیمائش میں سسٹمٹک غلطیوں سے بچنے کے لیے:

- آلات کو درست طریقے سے کیلیبریت کریں۔
- ناقص آلات سے بچیں۔
- مناسب پیمائشی تکنیکوں کا استعمال کریں۔
- پیمائش کرنے والا شخص کا تجربہ کار ہونا چاہیے۔

(iv) SI یونٹس میں لیگی پیمائش کو ہم کیسے محفوظ اور قابل اعتبار بنا سکتے ہیں؟

جواب: SI یونٹس عالمی سطح پر تسلیم شدہ اور معیاری ہوتے ہیں ان سے حسابی غلطیوں کے امکانات کم ہو جاتے ہیں اور سائنسی و صنعتی کاموں میں

- (iv) لیبارٹری میں مخصوص جگہوں پر پیش آنے والے غیر معمولی خطرات، خطرناک میسرلز، خطرناک سامان اور دوسرے مخصوص آلات کے لیے انتباہی نشانات (warning signs) لگائے جاتے ہیں۔ طلباء کو چاہیے کہ ان انتباہی نشانات کے مطابق احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔
- (v) استعمال کے بعد کیمیکلز کو نالی میں پھینکنے کی بجائے مخصوص برتن میں ڈالیں۔
- (vi) اگر پریکٹیکل کے دوران استعمال میں آنے والے کیمیکلز خطرناک نہیں ہیں تو ان کو کوڑا دان میں ڈالا جاسکتا ہے یا نالی میں بہایا جاسکتا ہے۔ ایسڈ اور بیسز کو نیوٹرلائز کرنے کے بعد نالی میں بہانا چاہیے۔

لیبارٹری میں پیش آنے والے خطرات (Chemical Hazards in the Laboratory)

13.1

سوال 3: کیمسٹری لیبارٹری میں آتش گیر اور دھماکہ خیز کیمیکلز سے کیا مراد ہے؟

یا آتش گیر اور دھماکہ خیز کیمیکلز کیسے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں؟

جواب: آتش گیر کیمیکلز: آتش گیر کیمیکلز اور آمیزے ایسی اشیاء ہیں جن کے فلیش پوائنٹ کمرے کے درجہ حرارت کے قریب ہوتے ہیں۔

مثالیں: آتش گیر کیمیکلز کی مثالیں ایٹھرز (Ethers) میتھیلید سپرٹ (Methylated spirit) بنزین (Benzene) ایسی ٹون (Acetone) اور پٹرول وغیرہ ہیں۔

آتش گیر کیمیکلز: ایسے کیمیکلز جو یکدم دباؤ کے ساتھ گیس اور حرارت خارج کرتے ہیں، دھماکہ خیز کیمیکلز کہلاتے ہیں۔

مثالیں: ایسے دھماکہ دار کیمیکلز کی مثالیں پیکرک ایسڈ (Picric acid)، ڈائی نائٹرو فینائل ہائڈرازین (di-Nitrophenyl Hydrazine)، بنزائل پراکسائیڈ (Benzoyl Peroxide) اور نائٹرو سیلولس (Nitrocellulose) وغیرہ ہیں۔

وضاحت: لیبارٹری میں کام کرنے کے دوران حد درجہ کی احتیاط، ذمہ دارانہ برتاؤ اور یکسوئی درکار ہے۔ خطرناک کیمیکلز، جلتی ہوئی آگ اور نازک

سوال 9: ریڈیشن کے خطرات پر نوٹ لکھیں۔

جواب: ریڈیشن کے خطرات: جب کسی شخص کو کافی دیر تک ریڈیشن دی جائے تو اس بات کے خطرات ہیں کہ یہ ریڈیشن اس کے عضلات اور مختلف اعضاء کو نقصان پہنچائیں، جلد کو جلادیں، بال ختم کر دیں، اور اٹیو کا باعث بنیں۔ نیز ریڈیشن سے مخصوص بیماری (Radiation Syndrome) بھی لاحق ہو سکتی ہے۔ ایسا ریڈیو ایکٹو میٹریل جو الفا (Alpha) اور بیٹا (Beta) ذرات خارج کرے اس کی موجودگی میں سانس لینا یا انجکشن کے ذریعے اسے جسم میں داخل کرنا نہایت خطرناک ہو سکتا ہے۔ گیماریز (Gamma rays) سے جسم بیرونی طور پر متاثر ہوتا ہے۔ طب میں استعمال ہونے والی ایکس ریز (X-rays) جسم میں عضلات کے لیے نقصان دہ ہیں۔

احتیاطی تدابیر:

- 1- ریڈیو ایکٹو میٹریل کسی محفوظ جگہ پر سنور کریں۔
- 2- لمبے عرصے کے لیے ریڈیشن کا سامنا مت کریں۔
- 3- گھر کے اندر رہیں کیونکہ دیواریں اور چھت ریڈیشن سے آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔
- 4- حفاظتی لباس اور ماسک پہنیں۔
- 5- ریڈیشن خارج کرنے والے آلے کو بغیر تربیت کے ہرگز استعمال نہ کریں۔
- 6- ننگے ہاتھوں سے ریڈیشن خارج کرنے والے میٹریل کو مت چھوئیں۔
- 7- مخصوص بیجز والا لباس استعمال کریں جو ریڈیشن ایکسپوز کو مارتا ہے۔

سوال 10: دم گھٹنے کے خطرات کی وضاحت کریں اور ان کی احتیاطی تدابیر لکھیں۔

جواب: دم گھٹنے کے خطرات: یہ خطرات ایسے ماحول کی نشان دہی کرتے ہیں جس میں کسی گیس یا بخارات سے دم گھٹنے یا بے ہوش ہونے کا ڈر ہو۔ سانس لینے کے لیے لازمی ہے کہ ہوا میں آکسیجن کی مخصوص مقدار موجود ہو۔ اگر کسی وجہ سے کہیں آکسیجن کی مقدار کم ہو جائے تو بہت خطرناک صورت حال پیدا کر سکتی ہے۔ ان حالات کا سامنا کرنے والا آدمی اس بات سے بے خبر رہتا ہے کہ ہوا میں آکسیجن کی مقدار کم ہو گئی ہے۔ جب کسی جگہ آکسیجن کی مقدار

ایمرجنسی کی صورت حال کا مقابلہ کیا جاسکے۔ ان سے خطرناک کیمیکلز سے بچاؤ بھی ممکن ہوگا۔ ذاتی حفاظت کے سامان میں لیب کوٹ، حفاظتی عینک، منہ کوڈھانپنے والی شیلڈ، لمبا کوٹ (Apron)، جوتے اور کانوں کی حفاظت کے آلات شامل ہیں۔

سوال 13: کیمسٹری لیبارٹری میں آگ بجھانے والے آلات کہاں موجود ہونے چاہئیں؟

جواب: آگ بجھانے والے آلات کی مخصوص جگہ: اگر کسی لیبارٹری میں ایسے تجربات کیے جاتے ہیں جن میں استعمال ہونے والے کیمیکلز یا دوسرے آلات کے بارے میں یہ خدشات ہوں کہ وہ آگ نہ پکڑ لیں تو اس صورت میں ضروری ہے کہ اس لیبارٹری میں آگ بجھانے والے آلات موجود ہوں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آگ لگنے کے چھوٹے واقعات پر طلبہ خود قابو پالیں گے۔ اس صورت حال سے عہدہ برآ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہر طالب علم کو اس بات کا علم ہو کہ آگ بجھانے والے آلات کہاں پڑے ہیں۔ علاوہ ازیں ایسی تربیتی ورکشاپس باقاعدگی کے ساتھ منعقد ہوں جن میں طلبہ کو ان آلات کے کام کرنے کا طریقہ بتایا جائے۔ مزید اس بات کی تربیت دی جائے کہ کس طرح کوئی نقصان پہنچائے بغیر صورت حال کا سامنا کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح ہر لیبارٹری میں شاور کی سہولت بھی میسر ہونا چاہیے اور اس کی جگہ کے بارے میں بھی ہر طالب علم کو بتایا جانا چاہیے۔ ان اقدامات سے آگ یا کسی بھی قسم کی ہنگامی صورت حال سے نمٹنا آسان ہو جاتا ہے۔

مشق

1- ہنگامی حالات کا سامنا کرنے کے لیے تجرباتی مشقوں میں شرکت ہر فرد کے لیے لازمی ہونی چاہیے یا اختیاری۔
جواب: ہنگامی حالات کا سامنا کرنے کے لیے تجرباتی مشقوں میں شرکت ہر فرد کے لیے لازمی ہونی چاہیے کیونکہ یہ جان بچانے اور ہنگامی صورت حال میں بہتر رد عمل دینے میں مدد کرتی ہے۔ یہ ایمرجنسی کے طریقہ کار کی عملی مشق ہے اور ملازمین کے رد عمل، سہولیات اور نظاموں کو جانچنے کے لیے ضروری ہے۔

سوال 14: کیمسٹری لیبارٹری میں ہنگامی صورت حال میں ایک طالب علم کو کیا کرنا چاہیے؟

9- لیب میں ذاتی حفاظتی سامان (PPE) ہے:

(A) لیب کوٹ (B) چشما (C) گھڑی (D) برنز

10- جن کیمیائی لیبارٹریوں میں ایسے مواد استعمال ہوتے ہیں جن کے تجربے کے دوران آگ لگنے کا امکان ہوتا ہے، ان کے پاس ہونا چاہیے:

(A) آگ بجھانے والا آلہ (B) فیومنگ کپ بورڈ (C) ایئر جنسی ایگزٹ (D) گیس برنز

جوابات

(C) -1	(D) -2	(B) -3	(B) -4	(C) -5	(B) -6	(C) -7	(C) -8	(A) -9	(C) -10
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

کثیر الانتخابی کنسپچوئل (Conceptual) سوالات

درست جواب کا انتخاب کریں۔

1- وہ کیمیکل یا کیمیکلز کے مکسچرز جن کا فلش پوائنٹ کمرے کے ٹمپریچر کے آس پاس ہوتا ہے، کہلاتے ہیں:

(A) کروسیو کیمیکلز (B) فلیم ایبل کیمیکلز (C) قدرتی کیمیکلز (D) ان میں سے کوئی نہیں

2- وہ کیمیکلز جو اچانک جھٹکا لگنے پر پریشر، گیس اور حرارت کا اخراج کرتے ہیں، کہلاتے ہیں:

(A) آتش گیر کیمیکلز (B) قدرتی کیمیکلز (C) دھماکہ خیز کیمیکلز (D) a اور b دونوں

3- ایک زہریلا مادہ جو صحت کے لیے سنگین مسائل پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

(A) کولڈ کیمیکل (B) آتش گیر کیمیکل (C) واٹر سولیو بل کیمیکل (D) ٹاکسک کیمیکل

اہم نکات

- 1- لیبارٹری میں کام کرنے کے دوران احتیاط کی ضرورت ہے۔ خطرناک کیمیکلز اور آگ کے نزدیک کام کرنے سے اگر احتیاط نہ کی جائے تو صحت کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔
- 2- حرارت اور شاک (Shock) کی وجہ سے کیمیکلز دھماکے سے پھٹ سکتے ہیں۔ اس لیے ان کو احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔
- 3- آگ لگنے والے اور دھماکہ سے پھٹنے والے کیمیکلز کے خطرات سے بچنے کے لیے حفاظتی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے۔
- 4- جلانے والے کیمیکلز جلد کو، آنکھوں کو اور سانس کی نالی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ان خطرات سے بچنے کے لیے ان کو فیوم کپ بورڈ (Fume Cupboard) میں استعمال کریں۔
- 5- اگر کیمیکلز کو ہدایات کے مطابق استعمال نہ کیا جائے تو زہریلے کیمیکلز آپ کی صحت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔
- 6- کچھ کیمیکلز اتنے ری ایکٹیو ہوتے ہیں کہ ان کے استعمال کے لیے خاص احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔
- 7- ریڈیو ایکٹیو مادے عضلات اور اعضاء کو متاثر کرتے ہیں اور صحت کے دوسرے مسائل بھی بن سکتے ہیں۔ ریڈییشن والے علاقے میں زیادہ دیر تک نہ ٹھہریں تاکہ صحت مند رہیں۔
- 8- دم گھٹنے کی وجہ بننے والے کیمیکلز بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ ان کو ہوا دار جگہ پر پورے حفاظتی لباس کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔
- 9- لیبارٹری کے اندر اور کیمیکلز کی بوتلوں پر وارننگ سمبلز ہونے چاہئیں تاکہ لوگوں کا ان کے خطرات کا پتہ ہو۔
- 10- لیبارٹری میں داخل ہونے سے پہلے آپ کے لیے لازم ہے کہ حفاظتی لباس پہنیں۔
- 11- طلباء کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ لیبارٹری میں آگ بجھانے والے آلات اور شاؤر کہاں ہیں اور کسے استعمال ہوتے ہیں۔

- وہ افراد کو حقیقی ایمرجنسی میں موثر طریقے سے رد عمل ظاہر کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔
- وہ گھبراہٹ کو کم کرتے ہیں اور بروقت انخلاء یا مزاحمت کو یقینی بناتے ہیں۔

3- تعمیری فکر پر مبنی سوالات (Constructed Response Questions)

(i) آپ شارٹ سرکٹ سے لگنے والی آگ سے پیدا ہونے والی ہنگامی صورت حال سے کیسے نمٹیں گے؟
جواب: شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگنے والی آگ کی صورت میں ہنگامی صورت حال سے نمٹنے کے لیے:

- (a) بجلی کی مین پاور سپلائی کو بند کر دیں: شارٹ سرکٹ کو روکنے کے لیے فوری طور پر مین پاور سپلائی کو بند کر دیں۔
 - (b) فائر الارم کو ایکٹیویٹ کریں: آگ کے آس پاس موجود ہر شخص کو آگاہ کریں۔
 - (c) مناسب آگ بجھانے والے آلات کا استعمال کریں: الیکٹرک آگ کے لیے CO_2 یا C کلاس استعمال کریں۔ پانی استعمال نہ کریں کیونکہ یہ بجلی کا موصل (کنڈکٹر) ہے۔
 - (d) علاقے کو خالی کروائیں: یقینی بنائیں کہ تمام افراد منظم طریقے سے اُس جگہ سے باہر نکل جائیں۔
 - (e) ایمرجنسی سروسز کو کال کریں: فائر سروسز سے رابطہ کریں اور آگ کے متعلق تفصیلات فراہم کریں۔
- (ii) فیوم کپ بورڈ (Fume Cupboard) میں کس قسم کے ری ایکشنز کرنے چاہیں؟
جواب: فیوم کپ بورڈ میں کیے جانے والے ری ایکشنز:

- (a) ڈولائٹائل ری ایکشنز: وہ ری ایکشنز جو نقصان دہ بخارات خارج کرتے ہیں جیسے امونیا یا کلورین گیس۔
- (b) ٹاکسک ری ایکشنز: وہ ری ایکشنز جن میں زہریلے کیمیکلز شامل ہوتے ہیں جیسے ہائیڈروجن سلفائیڈ یا فارمائیڈی ہائیڈ۔
- (c) آکسائیڈیشن ری ایکشنز: وہ ری ایکشنز جو آکسائیڈیشن کے لیے کیمیکلز شامل ہوتے ہیں جیسے ہائیڈروجن سلفائیڈ یا فارمائیڈی ہائیڈ۔

بچاؤ کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔
 دہاتی ہیں، درج ذیل ہیں:
 چشمے، دستا نے اور لیب کوٹ۔

س کے مطابق ذخیرہ کریں۔

یہ، جیسے آگ بجھانے والے آلات اور آئی واش اسٹیشنز۔

ت کی اہمیت کی وضاحت کریں۔

پاتی ہیں۔ وہ صارفین کو ممکنہ خطرات سے آگاہ کرتی ہیں جیسے کہ آتش گیر مواد،
 اور اسٹورج کی رہنمائی کر کے حادثات کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔

یلاؤ کے اثرات بیان کریں۔

کسائیڈ اور ہائیڈروجن سائینائیڈ شامل ہیں۔ اگر کوئی زہریلی گیس لیب میں
 برب بن سکتی ہے۔ یہ سطحوں اور آلات کو بھی آلودہ کر سکتی ہے، جس سے طویل

مل چھلک پڑا ہے۔ اس صورت حال سے نمٹنے کے لیے آپ کون سے ہنگامی

ہلال کتب خانہ

کی ترسیم شدہ سلیبس کے مطابق مستند و معیاری امدادی کتب
ہلال امتحانی کتب برائے میٹرک کلاسز

ہلال امتحانی انگلش | ہلال امتحانی اردو

ہلال امتحانی اسلامیات (الزامی)

ہلال امتحانی اسلامیات (اختیاری)

ہلال امتحانی ریاضی II-I | ہلال امتحانی جنرل سائنس

ہلال امتحانی مطالعہ پاکستان | ہلال امتحانی ہوم سائنس

ہلال امتحانی مبادیات تعلیم (ایجوکیشن)

ہلال امتحانی فزکس II-I | ہلال امتحانی کیمیا II-I

ہلال امتحانی تاریخ II-I | ہلال امتحانی ریاضی II-I